بررسی اثرات میدان الکترومغناطیس بر مخاط کانال دفران و پروستات در رت

فاطمه افشاری^{(*}، جعفر سلیمانی راد^۲، غلامعلی ترابی اسکویی^۲، بهزاد یثربی^۴

تاريخ دريافت 1392/03/01 تاريخ پذيرش 1392/05/21

چکیدہ

پیش زمینه و هدف: در دنیای مدرن امروز، وسایل و تجهیزات مولد امواج الکترومغناطیس در سطح بسیار وسیعی مورد استفاده قرار میگیرند. نظر به اهمیت آگاهی از اثرات این میدانها تصمیم گرفته شد تا اثرات میدانهای الکترومغناطیس بر مخاط کانال دفران و پروستات و نیز بر مورفولوژی اسپرم مورد مطالعه قرار گیرد.

مواد و روش کار: در این تحقیق رتهای نر نژاد Wistar به عنوان مدل آزمایشگاهی انتخاب گردیدند. رتها به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. رتهای گروه آزمایش به مدت ۳ ماه و روزانه ۴ ساعت در معرض میدان الکترومغناطیس با شدت ۵۰ گوس قرار گرفتند. پس از انقضای این مدت حیوانات گروههای آزمایش و کنترل با جابهجایی مهرههای گردنی کشته شدند و از کانال دفران و پروستات آنها برای مطالعه با میکروسکوپ نوری نمونهبرداری گردید. همچنین پس از تهیه اسمیر، مورفولوژی اسپرم مورد بررسی قرار گرفت.

یافتهها: نتایج به دست آمده نشان داد که در گروه آزمایش ارتفاع سلولهای مخاط کانال دفران و غدد پروستات نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و هسته سلولها متراکم شدهاند. از تغییرات دیگر در گروه آزمایش میتوان به از بین رفتن استریوسلیا در مخاط کانال دفران و کاهش ترشحات غدد پروستات اشاره کرد. در بررسی لامهای مربوط به اسمیر، مورفولوژی اسپرم در مقایسه با گروه کنترل تغییر نیافته بود ولی در گروه آزمایش پدیده فرنینگ از بین رفته بود. **بحث و نتیجهگیری:** امواج الکترومغناطیس موجب ایجاد اثرات سوء بر سیستم تناسلی میگردد. **کلمات کلیدی**: میدان الکترومغناطیس، مورفولوژی اسپرم، مخاط کانال دفران، مخاط پروستات، پدیده فرنینگ

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و چهارم، شماره هفتم، ص ۵۳۳ -۵۲۷، مهر ۱۳۹۲

مرس مکاتبه: تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه هیستوپاتولوژی و آناتومی، تلفن: ۹۱۴۱۱۴۷۷۹۴ Email: f_afshar@iaut.ac.ir

مقدمه

انسان هر روز در معرض برخورد با امواج الکترومغناطیس متعدد می باشد که ممکن است از منابع طبیعی ایجاد شود و یا توسط منابع ساخت بشر مانند پرتوهای تشخیصی، نیروگاههای هستهای، گیرندههای تلویزیونی و سساطع گردد. میدانهای الکترومغناطیس اثر گرمایی و غیرگرمایی ایجاد کرده که در هر دو صورت میتوانند بر روی سطوح سلولی و مولکولی اثرات مخربی داشته باشد. این میدانها به عنوان یک فاکتور استرس زا میتوانند موجب تغییر در سطوح هورمونی و ایمنی شده و

^۱ استادیارگروه هیستوپاتولوژی و آناتومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (نویسنده مسئول) ۲ استاد گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲ مربی گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۴ استادیارگروه مهنسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

ساختار و عملکرد دستگاههای بدن از جمله دستگاه تولید مثل را تحت تأثیر قرار دهند(۱). مطالعات فراوانی در مورد توانیایی میدان های الکترومغناطیس در جهت ایجاد طیف وسیعی از ناهنجاریهای سوماتیک انجام گرفته است که از این میان میتوان به نازایی، سقط جنین، تولدهای نارس، عقبماندگی رشد داخل رحمی اشاره کرد (۲، ۳). مطالعه انجام گرفته توسط Borhani در سال ۲۰۱۱ بیانگر این است که برخورد با امواج الکترومغناطیس در مرحله قبل از لانه گزینی بر میزان باروری و رشد جنین اثرات سوئی دارد (۴).

مطالعات انجام شده در مورد نقش امواج الكترومغناطيس بر اسپرماتوژنز موش صحرایی نشان داده است که این امواج دارای اثرات سوء و مخرب بر روند اسپرماتوژنز میباشد. مطالعهای که توسط جین سانگ لی انجام گرفت نشان داد که میدانهای الكترومغناطيس با شدت 1/0 تسلا سبب القاء مرگ سلولى در سلولهای زایای موش شده است(۵). در مورد مکانیسم اثرات ناشی از میدانهای الکترومغناطیس عقیده بر این است که ۷۵درصد اثرات تابش بر روی سلول وابسته به تولید رادیکالهای آزاد می باشد. رادیکال های آزاد در حضور اکسیژن می توانند باعث پراکسیداسیون چربیهای غشا، سلولی و نیز غشا، موجود در غشاهای آندامکها و آسیب به رتیکولوم آندوپلاسمیک و شوند (۶). keari و همکارانش نیز در سال ۲۰۱۱ نشان دادند که تغییرات ایجاد شده در باروری به دنبال استفاده از تلفن همراه به نظر می رسد که مربوط به افزایش تولید رادیکالهای آزاد باشد (۷). مطالعات نشان دادہ است کے میدان کی الکترومغناطیسی می توانند اثرات سوئی بر دستگاه تناسلی داشته باشند با این وجود اثرات میدان های الکترومغناطیس با فرکانس پایین تحت بررسی میباشد. از طرفی دیگر بر خی مطالعات اپیدمیولوژیک انجام گرفته نتوانستند ارتباطي ما بين شدت امواج الكترومغناطيس و تغييرات پاتولوژیک پیدا کنند (۸، ۹). هدف از ایـن مطالعـه بررسی اثـرات بیولوژیکی میدان الکترومغناطیس بر مخاط کانال دفران و پروستات و بررسی مورفولوژی اسپرم میباشد.

مواد و روشها

در این تحقیق دستگاه مولد میدان الکترومغناطیس با شدت ۵۰ گوس به کار گرفته شد و رتهای نژادwistar با سن ۴ ماهه، وزن ۲۰۰ - ۲۵۰ گرم به عنوان مدل آزمایشگاهی انتخاب گردیدند. حیوانات در شرایط ۱۲ ساعت روشنائی و ۱۲ ساعت تاریکی با امکانات دسترسی به آب و غذای کافی نگه داری میشدند. رتها به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند.

گروه آزمایش: در این گروه رتها به مدت ۳ ماه و روزانه ۴ ساعت در معرض میدان الکترومغناطیس قرار گرفتند. در گروه کنترل نیز شرایط کاملاً مشابه گروه آزمایش بود و فقط در این گروه رتها تحت تأثیر میدان الکترومغناطیس قرار نمی گرفتند. لازم به ذکر است که دستگاه مولد میدان بر اساس تئوری پیچه هلمهوتز ساخته شد که در رابطه با این انتخاب، مواردی از قبیل نیاز به دستیابی به یک میدان یکنواخت و با شدت معین و نیز محدودیتهایی چون لزوم تهیه محل نسبتاً مناسب برای زیست رتها در داخل دستگاه از امور تعیین کننده بود. پس از انقضای

این مدت حیوانات گروههای آزمایش و کنترل با جابهجایی مهرههای گردنی کشته شدند و از کانال دفران و پروستات آنها برای مطالعه با میکروسکوپ نوری نمونهبرداری گردید. همچنین پس از تهیه اسمیر، مورفولوژی اسپرم مورد بررسی قرار گرفت.

برای بررسی با میکروسکوپ نوری، نمونههای به دست آمده از گروه آزمایش و کنترل فیکس شده و پس از تهیه قالبهای پارافینی، مقاطع بافتی تهیه گردید. از برشهای تهیه شده جهت رنگ آميزي با پاپانيکولا و هماتوکسيلين و ائوزين (H & E) استفاده شد. برشهای رنگ آمیزی شده از نظر هیستومورفومتری نیز ارزیابی شدند در رنگ آمیزی پاپانیکولا از هماتوکسیلین جهت رنگآمیزی هسته سلولها و برای رنگآمیزی سیتوپلاسم از Orange G استفاده شد. لازم به ذکر است که جهت مطالعه مورفومترى ارتفاع سلول هاى اپى تليالى كانال دفران وپروستات اندازه گیری شد و اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون تی تست مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی مورفولوژی اسپرم، اپیدیدم به داخل محیط کشت Hams F1o انتقال داده شد. در داخل محیط کشت با برش اپیدیدیم اسپرمها به داخل آن رها شدند. سیس با استفاده از Sampler یک قطره از محیط کشت حاوی اسپرم را برداشته و بر روی لام قرار دادیم. پس از خشک شدن لام جهت بررسی مورفولوژی اسپرم از رنگ آمیزی پاپانیکولا استفاده گردید.

يافتهها

نتایج به دست آمده از مطالعات هیستولوژیک وهیستومورفومتریک در ۳ قسمت به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- اثرات ميدان الكترومغناطيس بر مخاط كانال دفران
 - اثرات ميدان الكترومغناطيس برپروستات
- اثرات میدان الکترومغناطیس بر مورفولوژی اسپرم

۱ - اثرات میدان الکترومغناطیس بر مخاط کانال دفران
 بررسی مخاط کانال دفران گروه کنترل نشان داد که اپی تلیوم
 پوشاننده از نوع مطبق کاذب حاوی سلول های قاعدهای و اصلی
 میباشد و استروسلیاها در ناحیه راسی سلول های اصلی به خوبی
 دیده میشود (تصویر ۱ - A) در صورتی که در گروه آزمایش
 ارتفاع سلول های اپی تلیالی نسبت به گروه کنترل کاهش یافته
 است و استروسلیاها به صورت پراکنده دیده میشدند. سلول ها
 دارای هسته متراکم بوده و به سادگی از سلول های همبندی زیرین
 قابل تشخیص بودند (تصویر 1-1)



تصویر شماره (۱): مخاط کانال دفران گروه کنترل و آزمایش، به پراکندگی مژههای ثابت در راس سلولهای گروه آزمایش توجه نمایید. رنگ آمیزی H & E

۲- اثرات میدان الکترومغناطیس بر مخاط پروستات بررسی غدد پروستات گروه کنترل نشان داد که اپی تلیوم پوشاننده غدد متفاوت بوده و معمولاً مکعبی و یا منشوری ساده میباشد و لومن غدد عمدتاً حاوی ترشحات است. بافت همبند شل بین غدد دیده میشود (تصویر ۲- ۸،). در صورتی که در گروه

آزمایش ارتفاع سلولهای اپی تلیالی نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و ترشحات موجود در لومن غدد در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است. افزایش تراکم هسته سلولها در گروه آزمایش از تغییرات دیگری است که به وضوح قابل مشاهده میباشد (تصویر ۲- B).



تصویر شماره (۲): پروستات گروه کنترل و آزمایش، به کاهش ارتفاع اپی تلیوم غدد و کاهش ترشحات غدد توجه نمایید. رنگآمیزی H&E.

۳- اثرات میدان الکترومغناطیس بر مورفولوژی اسپرم جهت بررسی مورفولوژی اسپرمها، پس از تهیه فروتی، لامها با روش پاپانیکولا رنگآمیزی شدند. در بررسی اسمیرهای مربوط به گروه کنترل و آزمایش حدود ۱۰درصد آنومالی دیده شد که بیشترین نوع آنومالیهای قابل مشاهده از نوع دم مارپیچ و اسپرم بدون سر بود.

در بررسی اسمیرهای گروه کنترل نکته قابل توجه وجود پدیده (Ferning) یا سرخسی شدن بود که این حالت در اسمیرهای مربوط به گروه آزمایش مشاهده نگردید(تصویر B-۳). برای تعیین پدیده(Ferning)از امتیاز زیر استفاده گردید.

- عدم وجود کریستالیزاسیون (۰)
 - سرخسی شدن آتیپیک (۱)

- وجود پایههای اولیه و ثانویه (۲)
- وجود پایههای سه تایی و چهارتایی (۳)

بر اساس این امتیاز بندی نـوع مـورد مشـاهده در اسـمیرهای مورد بررسی دارای پایههای سه تایی و چهارتـایی بودنـد بنـابراین امتیاز متعلقه به آنها ۳ بود.



تصویر شماره (۳): اسمیر گروه کنترل و آزمایش، به وجود پدیده فرنینگ در گروه کنترل توجه نمایید. رنگآمیزی پاپانیکولا



تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنی دار می باشد (P< ·/ · · ۱).

دوره ۲۴، شماره ۷، مهر ۱۳۹۲

بحث و نتيجه گيرى

کاربرد روزافزون دستگاههای مولد امواج الکترومغناطیس در زندگی روزمره باعث نگرانیهای بسیاری در ارتباط با اثرات این امواج بر سلامت انسان شده است.

بر اساس مطالعات انجام گرفته گزارشات متناقضی مبنی بر اثرات میدان الکترومغناطیس بر روی سیستمهای بیولوژیکی موجودات زنده وجود دارد. Pool و Goodman گزارش کردند که اثرات القایی میدان الکترومغناطیس موجب افزایش فعالیت رونویسی RNA، افزایش سنتز پروتئین و تسریع در فرایندهای رشد و نمو می گردد (۱۰، ۱۱). درحالی که مطالعات liboff نشان دهنده تأثیرات با میدانهای ۵۶۰ میکروتسلا بر روی سنتز DNA است که ارتباط زیادی با شدت میدان دارد(۱۲).

نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر افزایش تراکم هسته سلولهای مخاط کانال دفران و پروستات در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل میباشد. نکته مسلم در مورد افزایش تراکم سلولی این است که افزایش تراکم هسته سلولی با کاهش فعالیت سلول همراه است و افزایش این تراکم منجر به پیکنوزه شدن هسته و مرگ سلول می گردد.

یافتههای ما همچنین نشان دهنده کاهش ارتفاع سلولهای اپی تلیالی مخاط کانال دفران و پروستات در گروه آزمایش بود که این امر می تواند دلیل دیگری بر کاهش فعالیت سلول باشد که خود از کاهش فعالیت هسته سلول ناشی می شود. در همین راستا از بین رفتن کامل یا پراکنده آستروسلیاها در گروه تحت تأثیر میدان الکترومغناطیس بود که این امر دلیل دیگری بر کاهش فعالیت سلولی در گروه آزمایش میباشد. با توجه به اینکه آستروسلیاها در باز جذب مواد دخالت دارند بنابراین میتوان گفت که از بین رفتن آستروسلیاها میتواند در ترکیب و ماهیت ترشحات مايع سيمن مؤثر باشد. مطالعه انجام گرفته توسط رجايي و همکارانش نشان داد که میدان الکترومغناطیس باعث کاهش در ضخامت اپیدیدیم و کانال دفران، کاهش ارتفاع سلولهای اپی تلیالی و نیز کاهش در وزن بیضه نسبت به گروه کنترل شده است که موافق با قسمتی از نتایج حاصله از مطالعهی حاضر میباشد (۱۳). نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که کاهش فعالیت سلول در اپی تلیومهای ترشحی با کاهش ترشحات همراه است و در بررسی حاضر کاهش ارتفاع سلولهای اپی تلیالی غده پروستات با کاهش میزان ترشحات غده پروستات همراه بود. بررسىها نشان مىدهد كه امواج الكترومغناطيس موجب كاهش معنیداری در قطر لولههای سمینی فر و نیز میزان تستوسترون سرم خون می گردد (۱۴).

از دیگر یافتههای این مطالعه عدم بروز پدیده سرخسی شدن در گروه آزمایش بود. این پدیده در مایع انزالی انسان، كريستال هاى توليد شده مربوط به فسفات اسپرمين مىباشد كه عمدتاً از پروستات ترشح می گردد. با این وجود به نظر میرسد که پدیده فرنینگ در ترشحات مجاری ناقل رت امری نرمال میباشد که تحت تأثیر میدانهای الکترومغناطیس از بین میرود. بنابراین مي توان گفت كه ميدان الكترومغناطيس با تأثير بر سلول بر ماهیت مواد ترشحی اثر گذاشته و میزان سنتز مواد ترشحی را کاهش میدهد. دربررسی لامهای مربوط به مورفولوژی ساختمان اسپرم در گروههای آزمایش و کنترل افزایش معنی داری در ارتباط با افزایش آنومالیهای اسپرم در گروه آزمایش مشاهده نگردید. مطالعه Ozlem و همکارانش در سال ۲۰۱۲ نیز نشان داد که افزایش معنی داری در آنومالی های اسپرم رت به دنبال برخورد با امواج الكترومغناطيس ديده نمى شود (١۵). در حالى كه مطالعه Kowalczuk و همکارانش نشان داد که میدانهای الكترومغناطيس بر اپي تليوم لولههاي سميني فر، شمارش اسپرم، مورفولوژی اسپرم و اسپرماتوسیتهای اولیه تأثیرگذار میباشد (۱۶). همچنین بر اساس مطالعهای که توسط شفیق صورت گرفت، افرادی که در معرض میدانهای الکترومغناطیس قرار گرفتهاند دچار کاهش تعداد اسپرم، کاهش اسپرمهای متحرک و افزایش اشکال غیر طبیعی اسپرم شده است و بررسی هیستولوژیکی بیضه نیز نشان دهنده تغییرات دژنراتیو میباشد (۱۷). مطالعات انجام گرفته توسط Celik S و همکارانش در سال ۲۰۱۲ نشان داد که امواج ناشی از تلفنهای همراه به مدت ۳ ماه موجب تغییرات معنیداری در پارامترهای بیضوی رت نمی گردد. آنها نتیجه گیری کردند که با افزایش مدت زمان برخورد ممکن است تغییرات معنی دار حاصل گردد (۱۸). در حالی که نتایج برخی از مطالعات بیانگر آن است که استفاده از تلفن همراه باعث افزایش آنومالیهای سر اسپرم، تعداد و تحرک اسپرم می گردد (۲۰ ۱۹).

در نهایت نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر آن است که امواج الکترومغناطیس دارای اثرات سو، بر مخاط کانال دفران و پرستات و ترشحات مایع سیمن می باشد.

نتیجهگیری کلی: بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه جادارد که در ارتباط با اثرات میدان الکترومغناطیس بر سلامتی انسان مخصوصاً در افرادی که بنا به اقتضای نوع شغل و یا محل سکونت برای مدت مدیدی در معرض میدانهای الکترومغناطیس قرار دارند بررسی و تحقیق بیشتر به عمل آید تا پس از حصول اطمینان از اثرات سوء این میدانها در مورد چگونگی محافظت در برابر میدانهای الکترومغناطیس تدابیر لازم اندیشیده شود.

References:

- Parvari K , Nabiuni M , Golestanian N , Aminin E. Effect of low frecuency electromagnetic fields on the spermatogenesis and blood serum protein of Balb/c mice. Cell and tissue 2011 ; 2(1): 47-56.
- Bracken MB, Belanger K, Hellenbrand K, Dlugosz L, Holford TR, McSharry JE, et al. Exposure to electromagnetic fields during pregnancy with emphasis on electrically heated beds: association with birthweight and intrauterine growth retardation. Epidemiology 1995;6(3):263– 70.
- Kultursay N, Koprubasi F, Kutukcuk N. Video display terminal the risk of trisomy18 ? Clin gen 1994; 45: 270-1.
- Borhani N, Rajaei F, Salehi Z, Javadi A. Analysis of DNA fragmentation in mouse embryos exposed to an extremely low-frequency electromagnetic field. Electromagn Biol Med 2011;30(4):246–52.
- Lee JS, Ahn SS, Jung KC, Kim Y-W, Lee SK. Effects of 60 Hz electromagnetic field exposure on testicular germ cell apoptosis in mice. Asian J Androl 2004;6(1):29–34.
- Eibert TF, Alaydrus M, Wilczewski F, Hansen VW. Electromagnetic and thermal analysis for lipid bilayer membranes exposed to RF fields. IEEE Trans Biomed Eng 1999;46(8):1013–21.
- Kesari KK, Kumar S, Behari J. Effects of radiofrequency electromagnetic wave exposure from cellular phones on the reproductive pattern in male Wistar rats. Appl Biochem Biotechnol 2011;164(4):546–59.
- Schüz J, Ahlbom A. Exposure to electromagnetic fields and the risk of childhood leukaemia: a review. Radiat Prot Dosimetry 2008;132(2):202– 11.
- Calvente I, Fernandez MF, Villalba J, Olea N, Nuñez MI. Exposure to electromagnetic fields (non-ionizing radiation) and its relationship with childhood leukemia: a systematic review. Sci Total Environ 2010;408(16):3062–9.
- Pool R. Electromagnetic fields: the biological evidence. Science 1990;249(4975):1378–81.

- Goodman R, Bassett CA, Henderson AS. Pulsing electromagnetic fields induce cellular transcription. Science 1983;220(4603):1283–5.
- Liboff RL. A biomagnetic hypothesis. Biophys J 1965;5(6):845–53.
- Rajaei F, Farokhi M, Ghasemi N, Pahlevan AA.
 Effects of extremely low frequency magnetic field on mouse epididymis and deferens ducts.
 Iran J Reproductive Medicine 2009 ;7(2): 85-9.
- Kumar S, Behari J, Sisodia R. Influence of electromagnetic fields on reproductive system of male rats. Int J Radiat <u>Biol</u>. 2013;89(3):147–54.
- Ozlem Nisbet H, Nisbet C, Akar A, Cevik M, Karayigit MO. Effects of exposure to electromagnetic field (1.8/0.9 GHz) on testicular function and structure in growing rats. Res Vet Sci 2012;93(2):1001–5.
- Kowalczuk CL , Saunders RD , Stapleton HR. Sperm count and sperm abnormality in male mice after exposer to 2. 45 GHz microwave radiation. Mutat Res 1983 ; 122: 155-6.
- Ahmad S. Effect of electromagnetic field exposure on spermatogenesis and sexual activity. Asian J Androl 2005; 7: 106-9.
- Çelik S, Aridogan IA, Izol V, Erdoğan S, Polat S, Doran S. An evaluation of the effects of long-term cell phone use on the testes via light and electron microscope analysis. Urology 2012;79(2):346–50.
- Otitoloju AA, Obe IA, Adewale OA, Otubanjo OA, Osunkalu VO. Preliminary study on the induction of sperm head abnormalities in mice, Mus musculus, exposed to radiofrequency radiations from global system for mobile communication base stations. Bull Environ Contam Toxicol 2010;84(1):51–4.
- Agarwal A, Desai NR, Makker K, Varghese A, Mouradi R, Sabanegh E, et al. Effects of radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMW) from cellular phones on human ejaculated semen: an in vitro pilot study. Fertil Steril 2009;92(4):1318–25.

EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC FIELD ON THE DUCTUS DEFERENT AND PROSTATE

Fateme Afshari¹*, Jafar Soleimani Rad², Gholam Ali Torabi G³, Behzad Yasrebi⁴

Received: 22 May, 2013; Accepted: 12 Aug, 2013

Abstract

Background & Aims: In the modern world of today, high level technologic facilities are necessary. The present study aimed to investigate the effects of electromagnetic field (EMF) on vasa deferent, prostate, and morphology of sperm.

Materials & Methods: In this study, male wistar rats were exposed to 50 Gause EMF 4 hours a day for 3 months. After the experimental period, the rats were sacrificed, sperms were obtained from epididymis; and tissue samples were obtained from vasa deferent and prostate and were prepared for histological study. Morphology of sperm was examined after smear preparation.

Results: According to the findings, the height of epithelium and the nuclei in the prostate decreased in the experimental group; and vasa deferent were condensed in comparison to the control group. In the vasa deferent stero cilia were disappeared and prostatic secretion were reduced. Morphology of sperm in the experimental group was similar to the control group. In the experimental group ferning test disappeared.

Conclusion: This finding indicates that EMF has a detrimental effect on semen producing organs. Keywords: Electromagnetic field, Vasa deferent, Prostate, Morphology of sperm, Ferning test

Address: Department of Histopathology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran *Tel*: +98 9141147794

Email: f afshar@iaut.ac.ir

rchi

SOURCE: URMIA MED J 2013: 24(7): 533 ISSN: 1027-3727

¹ Assistant Professor, Department of Histopathology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Corresponding Author)

² Professor, Department of Histology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

³ Instructor, Department of Histology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

⁴ Assistant Professor, Department of Biomedical Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran