

پدیده های ژئومورفولوژیکی گسل تبریز

دکتر حمید صدیق

دکتر محسن پور کرمانی

استاد زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

استاد یارزمنی‌شناسی ساختمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

گسل تبریز، یک گسل امتدادی راست لغز است که از کوههای زنجان - سلطانیه در ایران تا کوههای آرارات در ترکیه تداوم دارد (خسروتهرانی، ۱۳۶۳: ۴۰). در طول این گسل در فاصله بستان آباد تا سلماس، پدیده‌های ژئومورفولوژیکی متنوعی وجوددارد که شامل جابه جایی و قطع شدگی آبراهه‌ها، اختلاف ارتفاع وایجاد پرتگاه گسلی، دره‌ی گسلی، چشمه‌های گسلی، آبهای زاینده، استخرهای طبیعی و دریاچه‌ی ارومیه است. این دریاچه، مهم ترین پدیده‌ی حاصل از فعالیت گسل تبریز می‌باشد. دریاچه‌ی ارومیه قبل از تشکیل توسط یک کانال به رودخانه‌ی قطور چای و در نهایت به رودخانه‌ی ارس متصل می‌گرددیده است (افتخارنژاد، ۱۹۱۰: ۶).

کانال مذکور در شمال شرق سلماس و در شمال دریاچه‌ی ارومیه قرار دارد. اشکال فوق‌الذکر علاوه بر زیبایی طبیعی منطقه، موجب تعیین مسیر دقیق گسل تبریز در محدوده مورد مطالعه گردیده‌اند. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیده‌های ژئومورفولوژیکی حاصل از فعالیت گسل تبریز و بهخصوص، نحوه تشکیل دریاچه‌ی ارومیه بوده است. روش کار شامل بررسی تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌های هوایی، نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی و برداشت صحراوی می‌باشد.

وازگان کلیدی: گسل امتدادی، سلماس، ژئومورفولوژی، دریاچه‌ی ارومیه.

مقدمه

گسل تبریز مهم‌ترین گسل شمال غرب ایران است. این گسل، از طرف جنوب شرقی به کوههای زنجان - سلطانیه می‌رسد و در شمال تبریز پس از گذشتن از خوی به طرف ماکو و سپس به سمت کوههای آرارات در ترکیه ادامه می‌یابد (خسروتهرانی، ۱۳۶۳: ۴۰). مطالعه‌ی تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌های هوایی و بررسی‌های صحراوی نشان می‌دهد که مسیر گسل تبریز در فاصله سلماس تا بستان آباد، قابل تعقیب و

www.SID.ir




This PDF was created using the Sonic PDF Creator.

To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com

شناسایی است (شکل ۱). فعالیت این گسل در محدوده‌ی فوق‌الذکر، علاوه بر وقوع تحولات زمین‌شناسی، سبب ایجاد پدیده‌های ژئومورفولوژیکی گردیده است. در این نوشتار، عوارض ژئومورفولوژیکی حاصل از حرکت گسل تبریز، در فاصله‌ی سلماس تابستان آباد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

شکل ۱: موقعیت جغرافیایی گسل تبریز



روش کار

برای شناسایی پدیده‌های ژئومورفولوژیکی گسل تبریز در محدوده‌ی مورد مطالعه، پس از بررسی تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌های هوایی و نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، عملیات صحرا ای به صورت راه‌پیمایی قدم به قدم آغاز شد. در این عملیات، عوارض موجود از نزدیک مورد مشاهده و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و کار برداشت صحرا ای که شامل تهیه‌ی عکس و اندازه‌گیری‌های مورد لزوم بود به انجام رسید.


نتایج حاصل از مطالعات انجام شده به شرح زیر است :

الف - جابه جایی و قطع شدگی آبراهه ها : درامتداد گسل تبریز جابه جایی های متعددی در آبراهه ها به وجود آمده و در بعضی نقاط آبراهه ها قطع گردیده اند (تصاویر ۱ و ۲). مقدار جابه جایی آبراهه ها در نقاط مختلف منطقه هی مورد مطالعه به شرح ذیل می باشد :

نام محل	مقدار جابه جایی
غرب روستای سیوان	۵۰ متر
جنوب روستای سیوان	۴۰ متر
غرب روستای زبرلو	۱۰۰ متر
شمال تبریز	۱۹ الی ۳۰ متر
شرق روستای قزلجه میدان	۱۵۰ متر
شمال غرب روستای اکین آباد	۵۰ متر

ب - ایجاد پرتگاه گسلی : فعالیت های جدید گسل تبریز سبب تشکیل این عرضه گردیده است.

تصویر ۱: جابه جایی آبراهه ها در شمال غرب تبریز (دید به سمت جنوب غرب)




تصویر ۲: قطع شدگی آبراهه ها در شمال غرب تبریز (دید به سمت شمال غرب)




مطالعات انجام شده نشان دهنده اختلاف ارتفاع دو طرف این گسل از ۱۵ تا ۳۵ متر می باشد. اختلاف ارتفاع موجود، سبب تشکیل پرتگاه گسلی در نقاط مختلف منطقه‌ی مورد مطالعه گردیده است. از جمله این عوارض می توان به پرتگاه‌های موجود در شمال غرب آناختون و شمال شرق تبریز اشاره نمود (تصویر ۳).

تصویر ۳: پرتگاه گسلی شمال غرب آناختون (دید به سمت شمال شرق)



ج- دره‌ی گسلی: یکی از اشکال ژئومورفولوژیکی موجود در طول گسل‌ها، دره‌ی گسلی است. این پدیده، در قسمت‌های مختلف گسل تبریز قابل مشاهده می باشد. به عنوان مثال می توان از دره‌ی واقع در ارتفاعات شمال تبریز نام برد (تصویر ۴).

تصویر ۴: دره گسلی شمال تبریز (دید به سمت غرب)



د- چشمه‌های گسلی و آب‌های زاینده: چشمه‌های متعددی بر روی گسل تبریز وجود دارد که در اثر فعالیت این گسل ایجاد شده‌اند. عامل اصلی تمرکز روستاهای منطقه در امتداد گسل تبریز نیز وجود همین چشمه‌ها بوده است. همچنین در محدوده‌ی مورد مطالعه، آب‌های زاینده‌ای نیز وجود دارند که سبب رشد گیاهان و پوشش گیاهی منطقه گردیده اند.


ه- استخرهای طبیعی: یکی از پدیده‌های جالب توجه موجود در طول گسل تبریز، تشکیل استخرهای طبیعی است. ساز و کار تشکیل این استخرها به این شکل است که گسل تبریز با قطع کردن لایه‌ها و ایجاد اختلاف ارتفاع، مجرای مناسبی آب به سطح زمین و تجمع آن‌ها و تشکیل این استخرها فراهم آورده است. از مهمترین این استخرها استخر قوری گل در غرب روستای کرجان می‌باشد (تصویر ۵). استخرهای دیگری نیز با ابعاد کوچک‌تر در نقاط مختلف منطقه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به استخر موجود در غرب روستای چله خانه اشاره نمود.

تصویر۵: استخر طبیعی قوری گل (دید به سمت جنوب غرب)



و- تشکیل دریاچه‌ی ارومیه: این دریاچه نیز یکی از پدیده‌های ژئومورفولوژیکی موجود در منطقه می‌باشد که در اثر فعالیت گسل تبریز ایجاد شده است. فعالیت گسل تبریز در این قسمت سبب بالا آمدگی قطعه‌ی شمالی این گسل شده و قطعه‌ی فوق الذکر با ایجاد مانعی در مقابل جریان آب، موجبات تشکیل دریاچه ارومیه را فراهم آورده است (تصویر ۶).

تصویر۶: مسیر اتصال دریاچه ارومیه به قطورچای (دید به سمت جنوب غرب)




بحث و تفسیر

مطالعات ژئومورفولوژیکی گسل تبریز در فاصله‌ی سلاماس تا بستان‌آباد، نشان‌دهنده شکل‌های ژئومورفولوژیکی متنوعی در این محدوده‌ی از گسل تبریز می‌باشد. به علت

وجود عوارض فوق‌الذکر مسیر گسل تبریز در محدوده‌ی مورد مطالعه، مشخص بوده و قابل شناسایی می‌باشد. پدیده‌های ژئومورفولوژیکی شامل جابه‌جایی و قطع شدگی آبراهه‌ها، اختلافات ارتفاع و ایجاد پرتگاه گسلی، آب‌های زاینده، استخرهای طبیعی و دریاچه‌ی ارومیه است که در اثر فعالیت گسل تبریز ایجاد شده‌اند. مهم‌ترین پدیده ژئومورفولوژیکی موجود در منطقه، دریاچه‌ی ارومیه است. دریاچه تکتونیکی ارومیه یکی از دریاچه‌های وسیع و کم‌زرفای دنیاست (شهرابی، ۱۳۷۳: ۹). این دریاچه پیش از این که به شکل کنونی درآید، به صورت فلات بلندی بوده که قسمتی از حوزه‌ی آبریز دریای خزر را تشکیل می‌داد و یک کanal حوزه ارومیه را به رودخانه ارس کنونی وصل می‌کرده است (افتخارنژاد، ۱۹۱۰: ۶). مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که این کanal در شمال دریاچه ارومیه و در شمال شرق سلماس قرار دارد. موقعیت کanal در شکل ۲ نشان داده شده است. قبل از فعالیت گسل تبریز، حوزه‌ی ارومیه از طریق این مجا به رودخانه قطور چای و سپس به ارس منتقل می‌گردیده است ولی در اثر فعالیت گسل فوق‌الذکر، قطعه‌ی شمالی این گسل در اثر بالآمدگی، همانند یک سد طبیعی عمل کرده و از انتقال آب حوزه ارومیه به رودخانه قطور چای جلوگیری به عمل آورده و سبب تشکیل دریاچه‌ی ارومیه گردیده است.

شکل ۲: محل اتصال دریاچه‌ی ارومیه به قطور چای قبل از بالآمدگی قطعه‌ی شمالی گسل تبریز



منابع و مأخذ

- ۱- اسدیان، ع؛ ج، افتخارنژاد: نقشه زمین شناسی چهارگوش تبریز ، مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ سازمان زمین شناسی کشور، ۱۳۷۲.
- ۲- بربریان، م؛ م، قرشی: پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت کاربردی و خطر زمین لرزه، گسلش در گستره دریاچه تکتونیکی ارومیه و چگونگی زایش آن، سازمان زمین شناسی کشور، گزارش داخلی ۱۳۶۶.
- ۳- بهروزی، ا؛ ب، امینی آذر، و م، امامی: نقشه زمین شناسی چهارگوش استان آباد، مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ سازمان زمین شناسی کشور، ۱۳۷۷.
- ۴- خسرو تهرانی ، خ؛ ع، درویشزاده: زمین شناسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳.
- ۵- شهرابی، م: زمین شناسی ایران، دریاها و دریاچه های ایران، سازمان زمین شناسی کشور، طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران ، شماره ۱۰، ۱۳۷۳.
- ۶- شهرابی، م: شرح نقشه زمین شناسی چهارگوش ارومیه، مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ سازمان زمین شناسی کشور، ۱۳۷۳.
- 7- Berberian, M. & Arshadi, S., On the evidence of the youngest activity of the NorthTabriz Fault and seismicity of Tabriz city. Geol. Survey, Iran, Int. Rep. No 39 ,1975.
- 8- Eftekhar-Nezhad, J.,Brief description of tectonic history and structural development of Azarbeijan, Geol. Survey, Iran, Int. Rep, 1975.
- 9- Eftekhar-Nezhad, J.,Saltmansh and captured water (in relation with Urumieh lake) unpublished paper, 1980.
- 10- Eftekhar- Nezhad, J. Geological map of Tabriz-Poldasht quadrangl, map 1:250000, Geol. Surve. Iran,1991.
- 11- Shahrabi, M.(compiler), et al, Geological map of Urumieh quadrangle. Map 1:250000, Geol. Survey , Iran,1986.