

فعالیت بیوشیمیایی و ضد میکروبی روغن‌های انسانی مریم گلی و نعناع فلفلی

چکیده:

مقدمه و هدف: اگر چه از آنتی‌بیوتیک‌ها به عنوان درمان مرسوم در بیماری‌ها استفاده می‌شود، اما این درمان‌ها با مشکلات زیادی از جمله؛ عوارض جانبی ناخواسته و مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها همراه می‌باشد. گیاهان مریم گلی و نعناع فلفلی از جمله گیاهانی هستند که به سهولت در بسیاری از مناطق ایران یافت می‌شوند. با توجه به دارا بودن اثرات ضد میکروبی این گیاهان، در این مطالعه فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی انسان‌های این گیاهان مورد سنجش قرار گرفته و تأثیر ضد میکروبی آنها ارزیابی شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربی در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه بوعالی سینا همدان انجام گرفت. انسان گیاهان مریم گلی و نعناع فلفلی را با روش تقطیر با بخار آب استخراج و ترکیب‌های آنها با دستگاه‌های گاز کروماتوگرافی و گاز کروماتوگرافی متصل به طیفسنج جرمی‌شناسایی شدند. میکروارگانیسم‌های مورد پژوهش اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا انتریتیدیس و لیستریا مونوسیتوژن بودند. فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی انسان‌ها مورد سنجش قرار گرفته و تأثیر ضد میکروبی آنها ارزیابی شد. داروهای جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری تی و دانکن تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: در انسان‌های مریم گلی و نعناع فلفلی به ترتیب ۲۸ و ۳۷ ترکیب شناسایی شدند. میکروارگانیسم‌های لیستریا مونوسیتوژن، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا انتریتیدیس به ترتیب نسبت به انسان‌ها حساسیت نشان دادند. تأثیر ضد میکروبی برگ نعناع فلفلی قوی‌تر از مریم گلی بود. همچنین اندازه قطر هاله عدم رشد ارتباط چندانی با سینتیک میکربکشی آن نداشت.

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر مناسب انسان‌های مریم گلی و نعناع فلفلی بر ^۴ میکروارگانیسم می‌باشد و می‌توان به ساخت داروی مناسب برای از بین این بردن این میکروارگانیسم‌ها با منشأ گیاهی و با عوارض بسیار کمتر دارویی امیدوار بود.

واژه‌های کلیدی: مریم گلی، نعناع فلفلی، روغن‌های انسانی، آنتی‌اکسیدان

* زهرا ایزدی

** گودرز احمدوند

*** محمود اثنی عشری

**** خسرو پیری

***** پوراندخت داوید

* کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه بوعالی سینا همدان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

** دکترای زراعت، استادیار دانشگاه بوعالی سینا همدان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

*** دکترای علوم باگبانی، دانشیار دانشگاه بوعالی سینا همدان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باگبانی

**** دکترای بیوتکنولوژی، دانشیار دانشگاه بوعالی سینا همدان، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی

***** متخصص بیماری‌های دهان، استادیار داشتگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده دندانپزشکی، گروه بیماری‌های دهان

تاریخ وصول: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۱۲/۲۳

مولف مسئول: گودرز احمدوند

g.ahmadvand@Basu.ac.ir

مقدمه

باشد. یکی از مهمترین اثرات تخریبی رادیکال‌های آزاد شروع پراکسیداسیون لیپید می‌باشد که به تخریب غشاء سلول منجر می‌شود. پراکسیداسیون لیپید باعث اختلال در سازمان‌بندی غشاء و تغییر فعالیت آنزیم‌های وابسته به آن و پروتئین‌های دیگر می‌شود که همراه با آزاد کردن رادیکال‌های هیدروپراکسیل و آلکوپراکسیل به صورت بالقوه برای سلول مضر می‌باشد. آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند بوتیلیت هیدروکسی تولوئن^(۳) که به طور وسیع مورد مصرف قرار می‌گیرند، دارای نقش بسیار مؤثری هستند، ولی مصرف آنها در محصولات غذایی به دلیل عدم پایداری و نقش احتمالی سرطان‌زای آنها با شکست منجر می‌شود^(۹) و بدین دلیل تمایل زیادی به استفاده از عوامل و افزودنی‌های طبیعی به عنوان مواد آنتی‌اکسیدان بالقوه مؤثر وجود دارد. اخیراً استراتژی تجربی مطلوب‌سازی تغذیه انسانی با آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی گزارش شده است و خواص آنتی‌اکسیدانی برخی از گیاهان نشان داده شده است^(۱۰).

در کشور ایران به رغم فراوانی منابع طبیعی، به جوانب علمی گیاهان دارویی کمتر پرداخته شده است. بنابراین لزوم توجه علمی به این موضوع حائز اهمیت بوده و تحقیق حاضر به بخشی از آن می‌پردازد. در این مطالعه انسانس دو گونه گیاه دارویی ایران، با روش‌های علمی استخراج و ترکیب‌های آنها

گیاهان قسمت اعظم طبیعت اطراف آدمی را تشکیل می‌دهند. بنابراین به عنوان اولین انتخاب برای حل مشکلات زندگی از آنها کمک گرفته شده است. تا چند دهه گذشته آنچه که به عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گرفت، از منابع طبیعی و به طور عمده از گیاهان به دست می‌آمد^(۱). پیشرفت علم از یک سو و مسایل اقتصادی از سوی دیگر باعث کاهش مصرف گیاهان دارویی شده است و داروهای صناعی در بسیاری از موارد جایگزین داروهای گیاهی شده‌اند^(۲). مصرف روز افزون داروهای شیمیایی روز به روز مشکلات حادتری از قبل پدیده خود اینمی‌بر اثر مصرف مداوم و بی‌رویه دارو و عوارض جانبی که برخی از خود بیماری خطرناکتر هستند را به وجود می‌آورند. به دلیل مشکل مقاومت میکروارگانیسم‌ها به داروهای شیمیایی و عوارض جانبی و ناخواسته آنها، استفاده از عصاره‌های گیاهی و گیاهانی که فعالیت ضد میکروبی از خود نشان می‌دهند در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است^(۳).

مریم گلی^(۱) و نعناع فلفلی^(۲) دو گیاه انسانس دار از خانواده نعناعیان می‌باشند که در طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند^(۴). خواص ضد میکروبی عصاره‌های گیاهان مختلف نیز مطالعه و گزارش شده است^(۶ و ۵). قارچ‌ها نیز از تأثیر ضد میکروبی روغن‌های انسانسی مصنون نمانده‌اند^(۸ و ۷).

رادیکال‌های آزاد، مولکول‌های فعال شده‌ای هستند که ممکن است منشأ داخلی یا خارجی داشته

1-Salvia Officinalis L.

2-Mentha Piperita L.

3-Butylated Hydroxy Toluene

شناسایی ترکیب‌ها با استفاده از شاخص‌های بازداری آنها که با تزریق هیدروکربن‌های نرمال (C7-C25) تحت شرایط یکسان با تزریق اسانس‌ها و به وسیله برنامه رایانه‌ای محاسبه شدند و با استفاده از طیف‌های جرمی ترکیب‌های استاندارد و استفاده از اطلاعات موجود در کتابخانه ترپنوبیدها در رایانه دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی انجام شد. محاسبه‌های تعیین درصد هر ترکیب به کمک داده پرداز Euro chrom 2000 به روش نرمال کردن سطح و نادیده گرفتن ضرایب پاسخ مربوط به طیف‌ها انجام شد.^(۱۲)

برای آزمایش‌های میکروبی‌بیولوژی روش‌های استاندارد مورد استفاده قرار گرفتند و نتیجه ثبت شده، میانگین سه بار آزمایش می‌باشد. برای بررسی اثرات ضد میکروبی از دو روش انتشار^(۸) و رقت^(۹) استفاده شد که از میان روش‌های انتشار از روش دیسک پلیت^(۱۰) و از میان روش‌های رقت از روش رقت لوله‌ای استفاده شد. در روش دیسک از دیسک‌های بلانک به قطر ۶ میلی‌متر استفاده شد. از محیط کشت مولرهیتون آگار جهت این روش استفاده گردید که با روش استاندارد و به مقدار مناسب در پلیت‌ها تهیه شده بود. غلظت سوسپانسیون میکروبی به وسیله

شناسایی شد. سپس فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی اسانس‌ها مورد سنجش قرار گرفته و تأثیر ضد میکروبی آنها ارزیابی گردید.

مواد و روش‌ها

این مطالعه تجربی در سال ۱۳۸۸ در آزمایشگاه گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام گرفت.

سویه‌های میکروبی مورد استفاده شامل؛ اشرشیاکلی^(۱)، استافیلوکوکوس اورئوس^(۲)، سالمونلا انتریتیدیس^(۳) و لیستریا مونوسینتوئن^(۴) بودند.

گیاهان مورد استفاده، مریم گلی و نعناع فلفلی بودند که از ارتفاع پنج سانتی‌متری سطح زمین و در مرحله گله‌ی کامل از مزرعه آموزشی - پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان جمع‌آوری شدند.

نمونه‌های گیاهی جمع‌آوری شده پس از انتقال به آزمایشگاه، ابتدا از خار و خاشاک جدا شده سپس برای مدتی در محیط آزمایشگاه (دور از نور مستقیم خورشید) قرار داده شدند تا خشک شوند. قبل از اسانس‌گیری، گیاهان کاملاً خرد شده و به روش تقطیر با بخار آب^(۵) اسانس‌گیری شدند. اسانس‌های حاصل به دقت وزن شده و در یخچال با درجه حرارت ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند.

برای شناسایی ترکیب‌های اسانس‌ها از دستگاه‌های گاز کروماتوگرافی^(۶) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی^(۷) استفاده شد^(۱۱).

1-E.coli (ATCC 25922)
2-S. Aureus (ATCC 25923)
3-S. Enteritidis (Clinical isolate)
4-L. Monocytogenes (PTCC 1298)
5-Steam Distillation
6-GC
7-GC/MS
8-Diffusion Test
9-Dilution Test
10-Disc-Plate Method

کشنگی در ۵ میلی‌لیتر سوسپانسیون ریخته و در فواصل زمانی معین، مقدار ۱۰ میکرولیتر از هر لوله برداشته و پس از رقیق سازی به نسبت‌های ۱:۱۰، ۱:۱۰۰ و ۱:۱۰۰۰ روی سطح محیط نوترینت آگار قرار داده و با میله شیشه‌ای استریل به طور یکنواخت گستردۀ شدن. پلیت‌ها را به مدت ۲۴ ساعت داخل انکوباتور گذاشته و سپس تعداد کلنی‌ها با کلنی کانتر شمارش شده با ضرب عکس رقت در تعداد کلنی‌ها، تعداد باکتری‌های زنده در هر میلی‌لیتر سوسپانسیون تعیین گردید.

حالهای مختلف که در اسانس‌گیری یا رقیق‌سازی اسانس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند قبل از رقت‌های مختلف تهیه و تأثیر آنها روی میکروب‌های مورد مطالعه با روش‌های انتشار و رقت آزمایش شدند.

کلیه اسانس‌ها در صورت لزوم با حلال دی‌متیل‌سولفوکساید^(۲) رقیق شدن. در کلیه مراحل آزمایش‌ها از دی‌متیل‌سولفوکساید به عنوان شاهد مواد ضد میکروبی استفاده شد.

ارزیابی فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی با استفاده از روش کاسپر^(۴) انجام گرفت.^(۱۴)

داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS^(۵) و آزمون‌های آماری تی^(۶) و دانکن^(۷) تجزیه و تحلیل گردیدند.

دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین و بر همان اساس رقت‌های مختلف تهیه شدن.^(۱۳)

بعد از کشت میکروب مورد نظر به صورت چمنی در سطح پلیت حاوی محیط کشت مولرهیتنون آگار، دیسک‌های استریل تهیه شده را با پنس استریل روی سطح پلیت آلوهه به میکروب قرار داده و بعد از تماس کامل با محیط کشت، با فاصله مناسب از یکدیگر و از لبه پلیت با میکروپیپت استریل مقدار مشخص اسانس (۵ میکرولیتر) روی دیسک‌ها ریخته شد. بعد از انجام مراحل فوق، پلیت‌ها را در داخل انکوباتور و در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار داده و بعد از ۱۸ تا ۲۴ ساعت، قطر هاله عدم رشد به وسیله کولیس اندازه‌گیری شد.^(۱۳)

به کمک روش رقت لوله‌ای حداقل غلظت مهارکنندگی^(۱) و حداقل غلظت کشنگی^(۲)، ماده ضد میکروبی تعیین گردید. مقادیر ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ میکرولیتر اسانس در ۵ میلی‌لیتر سوسپانسیون میکروبی ریخته و پس از هم زدن در انکوباتور به مدت ۱۸-۲۴ ساعت قرار داده شد و سپس به وسیله اسپکتروفتومتر جمعیت میکروبی تعیین شده و در نتیجه حداقل غلظت مهارکنندگی مشخص گردید. سپس از هر کدام از لوله‌ها که رشد جمعیت نشان نداده بودند، ۱/۰ میلی‌لیتر روی پلیت حاوی نوترینت آگار کشت داده شد تا حداقل غلظت کشنگی مشخص گردد.^(۱۳)

پس از تعیین حداقل غلظت کشنگی سوسپانسیون‌های میکروبی محتوی ۱۰^۷ باکتری تهیه و مقدار ۵۰ میکرومول اسانس برای حداقل غلظت

1-Minimal Inhibitory Concentration(MIC)
2-Minimal Bactericidal Concentration(MBC)
3-Dimethyl Sulfoxide
4-Kasper
5- Statistical Package for Social Sciences
6- T-Test
7- Duncan s' test

یافته‌ها

تأثیر را بر روی باکتری لیستریا مونوستیتوژن و کمترین تأثیر را بر روی باکتری سالمونلا انتریتیدیس داشت.

بررسی سینتیک مرگ باکتریایی در مواجهه با کمترین غلظت باکتری کشی اسانس نعناع فلفلی و مریم گلی نشان داد که اسانس‌ها قادر به کشتن تمام باکتری‌ها در فاصله زمانی ۱۵–۴۵ دقیقه می‌باشد. تأثیر ضد میکروبی نعناع فلفلی قویتر از مریم گلی بود، ولی مقدار اسانس لازم برای ایجاد هاله یا تاثیر مهارکنندگی و یا اثر کشندگی بر میکروارگانیسم‌ها در یک اسانس نسبت به نوع میکروارگانیسم‌ها متفاوت بود (نمودار ۱ و ۲).

بررسی رابطه خاصیت ضد باکتریایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی و رادیکال آزادزدایی اسانس نعناع فلفلی و مریم گلی به ترتیب نشان داد که قطره‌های ممانعت رشد باکتری ارتباط مستقیمی به مقدار اسانس و مدت زمان لازم برای کشتن باکتری‌ها نداشت و عوامل دیگری نیز دخالت دارند. همچنین در مورد رابطه نسبت دی‌فنیل‌پیکریل هیدرازیل به هاله عدم رشد، بتا کاروتین به هاله عدم رشد و زمان مرگ باکتری، هاله عدم رشد مشخص گردید که باکتری سالمونلا انتریتیدیس بیشترین فعالیت را در اسانس‌های نعناع فلفلی و مریم گلی داشت.

ترکیب‌های اسانس‌ها با دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف‌سنج جرمی آنالیز شد که در نتیجه آن در اسانس مریم گلی ۲۸ ترکیب شناسایی شد که ۹۱/۵ درصد از کل اسانس را شامل می‌شد. جرم‌ماکردن D، بتاکاریوفیلن ۱۵/۵ درصد، لینالول ۱۲/۵ درصد، بی‌سیکلوجرم‌ماکردن ۹/۲ درصد، کاریوفیلن اکسید ۳/۶ درصد و اسپاتولول ۷/۵ درصد ترکیب‌های اصلی روغن اسانسی این گونه را تشکیل می‌داد. همچنان بخش اعظم ۷۷/۷ درصد اسانس این گیاه را ترکیب‌های سزکوئی‌ترپنی تشکیل می‌داد. پس از سزکوئی‌ترپن‌ها، مونوتربین‌ها مهمترین ترکیب‌های این اسانس را تشکیل می‌دهند. در اسانس نعناع فلفلی ۳۷ ترکیب شناسایی شد که مهمترین آنها عبارت بودند از: پیپریتون اکسید ۲۱/۲ درصد، آلفا ترپین ۲۰/۱ درصد، منتول ۱۸/۶ درصد، کاروئول ۱۵/۲ درصد، ایزومنتون ۱۰/۱ درصد و بتا کریوفیلن ۶/۹ درصد و بخش اعظم اسانس این گیاه را تشکیل می‌دهند.



همان‌گونه که در جدول ۱ و ۲ نشان داده می‌شود اسانس گیاه نعناع فلفلی بیشترین تأثیر ضد باکتریایی را بر باکتری استافیلوکوکوس ارئوس و کمترین تأثیر را بر باکتری سالمونلا انتریتیدیس داشته است، همچنان اسانس گیاه مریم گلی بیشترین

جدول ۱: تأثیر اسانس نعناع فلفلی و مریم گلی بر سویه‌های مورد آزمایش

سویه	نعناع فلفلی										متغیر (میلی‌متر)
	مریم گلی					میانگین قطر هاله عدم رشد	۱۱/۶۷ ± ۰/۵۸	۱۲/۶۷ ± ۱/۵۳	اشرشیاکلی		
	میزان اسانس نعناع فلفلی (میکرولیتر)	میزان اسانس مریم گلی (میکرولیتر)	در ۵ میلی‌لیتر سوسپانسیون میکروبی	۵ میلی‌لیتر سوسپانسیون میکروبی	میانگین قطر هاله عدم رشد	۱۱/۶۷ ± ۰/۵۸	۱۲/۶۷ ± ۱/۵۳	استافیلوکوکوس ارئوس	سالمونلا انتریتیدیس	لیستریا مونوستیتوژن	
۲۰	۲۰	۱۰	۵	۲۰	۲۰	۱۰	۵	۹±۰	۹±۰	۱۱/۶۷ ± ۱/۵۳	
-	-	+	++	-	-	+	++	۱۱/۶۷ ± ۰/۵۸	۱۲/۶۷ ± ۱/۵۳	اشرشیاکلی	
-	-	+	++	-	-	+	++	۱۴/۳۲ ± ۱/۵۲	۱۱/۶۷ ± ۱/۱۵	استافیلوکوکوس ارئوس	
-	+	++	+++	-	+	++	+++	۹/۳۲ ± ۰/۵۸	۹±۰	سالمونلا انتریتیدیس	
-	-	+	+	-	+	++	+++	۲۸/۶۷ ± ۲/۲۱	۱۱/۶۷ ± ۱/۵۳	لیستریا مونوستیتوژن	
حداقل غلظت مهار کشندگی = +					حداقل غلظت مهار کشندگی = -			رشد متوسط = ++	رشد خوب = +++	رشد بسیار خوب = +++++	

جدول ۲: مقایسه حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت کشنده اسانس کیاهان نعناع فلفای و مریم کلی بر سویه‌های مورد آزمایش

سویه	متغیر			
	نعناع فلفای	حداقل غلظت کشنده	حداقل غلظت مهار کنندگی	مریم کلی
اشرشیاکلی	۱۳	۴۱/۵	۱۵	۲۹
استافیلوکوکوس ارئوس	۲۱	۷۶	۱۵	۳۰
ساملونلا انتریتیدیس	۴۴	۴۰	۳۸	۶۵
لیستریا مونوسیتوژن	۲۱	۴۰	۵/۵	۵/۵



بحث و نتیجه‌گیری

میکروارگانیسم‌ها متفاوت بود که این تفاوت نشان دهنده اثربخشی متفاوت ترکیب‌های مختلف شیمیایی اسانس‌ها بر میکروارگانیسم‌ها می‌باشد. تأثیر بازدارنده رقت‌های مختلف روغن‌های اسانسی بر رشد میکروارگانیسم‌ها نشان داد که باکتری‌ها حساس‌تر از سایر میکروارگانیسم‌ها هستند که این نتیجه منطبق با نتایج مطالعه سینگ^(۱) (۲۰۰۰) می‌باشد.^(۱۷)

سینتیک باکتریسیدال اسانس‌ها نشان داد که اسانس‌ها قادر به کشتن تمام باکتری‌ها در فاصله زمانی ۴۵-۱۵ دقیقه می‌باشند. در مقایسه با تأثیرپذیری کمتر باکتری‌های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس تحت تأثیر روغن اسانسی پونه^(۱۸)، در این مطالعه باکتری‌های فوق به شدت تحت تأثیر اسانس‌های مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج این مطالعه نشان داد که قطر هاله‌های ممانعت رشد باکتری ارتباط مستقیمی با مقدار اسانس و مدت زمان لازم برای کشتن باکتری‌ها نداشت و عوامل دیگری نیز دخالت دارند. بنابراین می‌توان استنباط نمود که اندازه قطر هاله‌های عدم رشد دقیقاً نمی‌تواند بیانگر حداقل غلظت مهار کنندگی یا حداقل غلظت کشندگی باشد و برای تعیین میزان حساسیت هر میکروارگانیسم به هر ماده ضد میکروبی، تعیین قطر هاله و حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ۸۰ درصد از مردمی که در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند کم و بیش برای درمان از گیاهان دارویی استفاده می‌نمایند. این مسئله سبب می‌گردد تا بررسی دقیق‌تری در مورد اثرات درمانی و بی‌خطر بودن مصرف گیاهان دارویی انجام شود. در این میان مقاومت میکروبی روز افزون نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های موجود سبب می‌گردد در جهت یافتن ترکیبات ضد میکروبی جدید، گیاهان نیز مورد بررسی قرار گیرند. گیاهان خانواده نعناع به سبب وجود ترکیبات ترپنوبئیدی گوناگون، اسانس و ترکیبات فلزی به خصوص فلاونوئیدها از لحاظ اثرات ضد میکروبی بسیار مورد توجه می‌باشند^{(۱۵) و (۱۶)}. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی فعالیت بیوشیمیایی و ضد میکروبی روغن‌های اسانسی مریم گلی و نعناع فلفلی بود.

نتایج نشان داد که میکروارگانیسم‌های لیستریا مونوستیوژنز، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا انتریتیدیس به ترتیب نسبت به اسانس‌ها حساسیت نشان دادند. اسانس‌های هر دو گیاه خاصیت کشندگی و مهارکنندگی میکروبی خوبی نشان دادند. تأثیر ضد میکروبی نعناع فلفلی قوی‌تر از مریم گلی بود، ولی مقدار اسانس لازم برای ایجاد هاله یا تأثیر مهارکنندگی و یا اثر کشندگی بر میکروارگانیسم‌ها در یک اسانس نسبت به نوع

هستند و در مطالعه خواص رادیکال زدایی اسانس‌های مورد مطالعه نتیجه‌ای عکس آزمایش بتا کاروتین حاصل شد. این تفاوت‌ها به دلیل به کارگیری روش‌های مختلف آزمایش دور از انتظار نیست. پراکسیداسیون لیبید فرآیند پیچیده‌ای در سلول‌های هوایی است و بیانگر برهم کنش بین اکسیژن مولکولی و اسیدهای چرب اشباع نشده است (۲۰). نتایج مطالعه اخیر نشان داد که نسبت خواص آنتی‌اکسیدانی به خاصیت ضد میکروبی با هر دو روش به کار گرفته شده در خصوص اسانس مریم گلی به طور موازی است و بنا براین ضمن تأیید خاصیت آنتی‌اکسیدانی اسانس مریم گلی ارتباط مستقیم بین این خاصیت با قدرت ضد میکروبی آن به دست می‌آید.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان از قدرت مهار کنندگی، ضد باکتریابی و ضد اکسیدانی بالای اسانس گیاهان نعناع فلفلی و مریم گلی کشت شده در شرایط اکولوژیکی همدان پر میکروارگانیسم‌های مورد آزمایش دارد. اثر اسانس این گیاهان را می‌توان به ترکیب‌های مونوتربنی موجود در ترکیبات شیمیایی این گیاهان نسبت داد که اثر ضد میکروبی این ترکیب‌ها به اثبات رسیده است (۲۰). بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و محدودیت‌های روز افزون استفاده از مواد شیمیایی ضد میکروبی و نظیر عوارض جانبی و ایجاد مقاومت دارویی و

کشنده‌گی لازم است. این اختلاف تأثیر روغن‌های فرار بر عوامل بیماری‌زا، نشان دهنده اثربخشی مختلف ترکیب‌های شیمیایی متفاوت در اسانس هر گیاه است و این اختلاف در گیاهان مختلف و گونه‌های متفاوت بیشتر می‌شود که نشان دهنده وابستگی اثر دارویی به ترکیب‌های شیمیایی اسانس‌ها و شرایط اقلیمی گیاهان و حتی احتمال موارد استفاده دارویی گوناگون یک گونه گیاهی می‌باشد (۱۹).

به نظر می‌رسد بیشترین خاصیت ضد میکروبی در کلیه اسانس‌های مورد مطالعه از ترکیب‌های مونوتربنی ناشی می‌شود (۲۰). براساس یک مطالعه، برخی هیدروکربن‌های مونوتربنی مثل پیپن و بورنئول کمترین تأثیر ضد میکروبی را دارند (۲۱). بررسی هاله عدم رشد میکروبی و حداقل زمان لازم برای کشتن میکروارگانیسم‌ها نشان می‌دهد که اندازه قطر هاله عدم رشد ارتباط چندانی با سینتیک میکروبکشی آن ندارد. همان‌طوری که در این مطالعه نشان داده شد، هرچند قدرت ضد میکروبی اسانس‌ها بیشتر بود، ولی در تست انتشار، گاه هاله‌هایی با قطر کمتر، ولی قدرت میکروبکشی بیشتر دیده می‌شد که این موضوع با نظر پاندی و همکاران (۱۹۹۶) مطابقت دارد (۷).

بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی اسانس‌ها نشان داد که اسانس‌های تحت مطالعه دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی مساوی یا برتر در مقایسه با آنتی‌اکسیدان شیمیایی بوتیلیت‌هیدروکسی تولوئن

همچنین موارد حساسیت نسبت به نگهدارنده‌های سنتیک نیاز به جایگزینی این مواد با مواد طبیعی و اسانس‌های گیاهی احساس می‌شود که این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز مطالعه‌های آتی برای جایگزینی مواد فوق در جهت حفظ مواد خوراکی و کنترل بیماری‌ها باشد.

تقدیر و تشکر

از مرکز جهاد دانشگاهی کرج که آنالیز اسانس‌های این مطالعه را بر عهده داشتند و همچنین از دکتر بهمن شریفی که در انجام این مطالعه همکاری کردند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

Biochemical and Antimicrobial Activities of *Salvia Officinalis L.* and *Mentha Piperita L.* Essential oils

Izadi Z^{*},
Ahmadvand G^{**},
Esna-Ashari M^{***},
Piri KH^{****},
Davoodi P^{*****}.

*MSc in Agronomy, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

** Assistant Professor of Agronomy, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

*** Associate Professor of Horticultural Sciences, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

**** Associate Professor of Biotechnology, Department of Biotechnology, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

***** Assistant Professor of Oval Medicine, Department of Oval Medicine, Dental Faculty, Medical University, Hamedan, Iran.

Received: 31/01/2010

Accepted: 14/03/2010

Corresponding Author: Ahmadvand G
Email: g.ahmadvand@basu.ac.ir

ABSTRACT:

Introduction & Objective: Although antibiotics are used in conventional treatment of infectious diseases, a lot of unexpected side effects along with resistance to antibiotics appear. *Salvia officinalis* and *Mentha piperita* are plants found abundantly in most parts of Iran. In the present study, we extracted and identified the chemical compounds of the essential oils of *Salvia officinalis* and *Mentha piperita*. Moreover, the anti-oxidative property, free radical scavenging capacity, and antimicrobial activities of the essential oils of these plants were studied.

Materials & Methods: This study was conducted in the Biotechnology Department laboratories, Agricultural Faculty of Avicina University, Hamadan, Iran, in 2009. The aerial parts of *Salvia officinalis* and *Mentha piperita* were harvested in summer, when the plants were in their full blooming stage and dried in the shade. The essential oil of the aerial parts was extracted by hydro-distillation and was analyzed by capillary GC and GC/MS method. The micro-organisms employed in this study were: *E. coli*, *S. aureus*, *S. enteritidis*, *L. monocytogenes*. By employing disc diffusion and tube dilution methods, antimicrobial effects of the oils were studied. Antioxidative property, free radical scavenging capacity, and antimicrobial activities of the oils were also studied.

Results: Chemical analysis of the extracts resulted in the identification of 28 and 37 compounds in the essential oils of *Salvia officinalis* and *Mentha piperita* respectively. The sensitivity of the bacteria to the oils in order of decreasing the sensitivity was *L. monocytogenes*, *E. coli*, *S. aureus*, and *S. enteritidis*. The antibacterial properties of the essential oil from *Mentha piperita* leaves were higher than the oil of *Salvia officinalis* leaves. Also inhibitions zones of microbial growth were not correlated with the microbicidal kinetics of the oils.

Conclusion: This study showed that the herbal essences of *Salvia officinalis* and *Mentha piperita* are very active against *E. coli*, *S. aureus*, *S. enteritidis* and *L. monocytogenes*.

Key words: *Salvia officinalis L*, *Mentha piperita L*, Essential oils, Antioxidant

REFERENCES:

- 1.Arrieta J, Reyes B, Calzada F, Cedillo-Rivera R, Navarrete A. Amoebicidal and giardicidal compounds from the leaves of *Zanthoxylum liebmannianum*. *Fitoterapia* 2001; 72(3): 295-7.
- 2.Ciani M, Menghini L, Mariani, F, Pagiotti R, Menghin A, Fatichenti F. Antimicrobial properties of essential oil of *Satureja Montana* L. On pathogenic and spoilage yeasts. *Biotechnology Letters* 2000; 22(12): 1007-10.
- 3.Ngo BE, Schmutz M, Meyer C, Rakoronirina A, Bopelet M, Portet C, Jeker A, Rakotonirina SV, Olpe HR, Herrling P. Anticonvulsant properties of the methanolic extract of *Cyperus articulatus* (Cyperaceae). *Journal of Ethnopharmacology* 2001; 76(2): 145-50
- 4.Vikrant V, Grover JK, Tandon N, Rathi SS, Gupta N. Treatment with extracts of *Momordica charantia* and *Eugenia jambolana* prevents hyperglycemia and hyperinsulinemia in fructose fed rats. *Journal of Ethnopharmacology* 2006; 76(2): 139-43.
- 5.Khan MR, Kihara M, Omoloso AD. Antimicrobial activity of *Harpulliu ramiflora*. *Fitoterapia* 2003a; 72(3): 298-300.
- 6.Khan MR, Kihara M, Omoloso AD. Antimicrobial activity of *picrasma javanica*. *Fitoterapia* 2003b; 72(4): 406-8.
- 7.Pandey MC, Sharma JR, Dikshit A. Antifungal evaluation of the essential oil of *cymbopogon pendulus* (Nees ex st. eud) wats. *Flavour and Fragrance Journal* 1996; 11: 257-60.
- 8.Bishop CD, Thornton IB. Evaluation of the antifungal activity of the essential oils of *Monarda citriodora* var. *Citriodora* and *Melaleuca alternifolia* on post harvest pathogens. *Journal of Essential Oil Research* 1997; 9: 77-82.
- 9.Narmiki M. Antioxidants/ antimutagens in food. *Critical Review in Food Science Nutrition* 1996; 32: 273-300.
- 10.Aruoma OI. Nutrition and health aspects of free radicals and antioxidants. *Food Chemistry and Toxicology* 2009 142: 671-83.
- 11.Davis NW. Gas Chromatographic Retention index of Monoterpenes and Sesquiterpenes on Methyl silicone and Carbowax 20 M phases. *Journal of Chromatography* 1999; 513: 1-24.
- 12.Adams R. Identification of essential oil components by gas chromatography mass spectroscopy. 1th ed. Paris: Illinois Allured Publication; 2001; 400-51.
- 13.Williams SA. Bacterial susceptibility and chemical composition of essential oils from *Thymus kotschyanus* and *Thymus persicus*. *J Agric Food Chem* 2003; 51: 2200-5.
- 14.Kasper L. Identification and bacteriostatic activity of the essential oil of *Lamium gaganum*. *Phytochemistry* 2007; 67(12): 1249-55.
- 15.Zargari A. Medicinal Plants. 6th ed. Tehran: Tehran University; 1999; 256-9.
- 16.Clark IV, Cameron GC. An aroma chemical profile. *Menthol Perfumer and Flavorist* 2002; 23(4): 33-46.
- 17.Sing M. Antibacterial activities of essential oils from Turkish spices and citrus. *Flavour and Fragrance Journal* 2000; 31: 175-9.
- 18.Haznedaroglu MZ, Karabay U, Zaybek U. Antibacterial activity of *mentha spicata* L. Essential oil. *Fitoterapia* 2001; 72: 829-31.
- 19.Chi KS, Lawrence, MB. Reasons for the variation in composition of some commercial essential oils. 1th ed. USA: Facts and Comparisons; 1999; 138-59.
- 20.Lis-Balchin M, Deans SG, Eaglesha E. Relationship between bioactivity and chemical composition of commercial essential oils. *Flavour and Fragrance Journal* 2006; 113: 98-104.
- 21.Dorman HJD, Deans, SG. Antimicrobial agents from plants: Antibacterial activity of plant volatile oils. *Journal of Applied Microbiology* 2002; 88: 308-16.