

حساسیت سویه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از بیماران ایدزی به داروی فلوكونازول و تعیین ژن مقاومت CDR2 در سویه‌های مقاوم با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس

چکیده:

مقدمه و هدف: امروزه قارچ‌های فرستاده به ویژه قارچ کاندیدا آلبیکنس از جمله شایع‌ترین عوامل مخاطره‌انگیز در بیماران نقص سیستم ایمنی می‌باشند. افزایش روز افزون سویه‌های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به داروهای آزوی مشکل اصلی بیماران مبتلا به ایدز می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی ژن CDR2 در سویه‌های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوكونازول در بیماران ایدزی مبتلا به کاندیدیازیس دهانی - حلقی به روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربی در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. سویه‌های کاندیدا آلبیکنس جا شده از بیماران ایدزی با استفاده از روش‌های استاندارد مانند: تشکیل جرم تیوب، کلامیدوسپور و رنگ کلری بر روی محیط کروم آکار کاندیدا شناسایی شدند. ابتدا حساسیت سویه‌های کاندیدا آلبیکنس مطابق روش استاندارد انتشار دیسک بررسی شد. سپس بیان ژن مقاومت به فلوكونازول CDR2 با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس و الکتروفورز محصول واکنش، در مقایسه با نمونه‌های شاهد ارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها: آزمایش حساسیت دارویی ۶۰ سویه کاندیدا آلبیکنس نشان داد که ۶۲/۶ درصد سویه‌ها حساس، ۸/۶ درصد وابسته به دوز ۲۸/۷ درصد مقاوم به فلوكونازول می‌باشند. ارزیابی محصول واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس مشخص کرد که ۶ درصد بیماران دارای ژن مقاومت CDR2 بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، استفاده از روش مقرون به صرفه انتشار دیسک به همراه روش‌هایی مانند واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس که امکان مطالعه بر روی مکانیسم مقاومت دارویی و ژن‌های دخیل در مقاومت را فراهم می‌آورد، پیشنهاد می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: کاندیدا آلبیکنس، ژن CDR2، واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس

احسان فرج بخش*

محمد حسین یادگاری**

مصطفویه رجبی بدل***

مجتبی تقی‌زاده ارمکی*

* کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی،

گروه قارچ شناسی پزشکی

** دکترای قارچ شناسی پزشکی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی،

گروه قارچ شناسی پزشکی

*** دکترای بیوشیمی بالینی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم پزشکی، گروه بیوشیمی بالینی

تاریخ وصول: ۱۳۸۹/۱۲/۲۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۲/۲۱

مؤلف مسئول: محمد حسین یادگاری

پست الکترونیک: Yadegarm@modares.ac.ir

مقدمه

مکانیسم‌های مولکولی متفاوتی در پیدایش مقاومت کاندیدا آلبیکنس در برابر فلوکونازول شناخته شده است^(۸)، که این مکانیسم‌ها شامل؛ کاهش انتقال دارو به داخل سلول، تغییرات در آنزیم‌های مسیر بیوسنتز ارگوسترون، تغییرات در آنزیم هدف(جهش‌های نقطه‌ای، افزایش بیان و تغییر ژن) و افزایش انتشار دارو به خارج به وسیله پمپ‌های انتشار غشایی می‌باشد. یک مکانیسم مهم که باعث شکل‌گیری مقاومت آزوی می‌شود، کاهش تجمع داخل سلولی دارو است که با بیان و افزایش بیان ژن‌های CDR (ژن‌های مقاومت دارویی کاندیدا) در ارتباط است. از میان ژن‌های CDR شناخته شده CDR1 و CDR2 باعث مقاومت کاندیدا به فلوکونازول می‌شوند^(۹-۱۴). هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان مقاومت ایزوله‌های کاندیدا آلبیکنس بومی جدا شده از بیماران ایدزی با روش‌های فنوتیپی و ژنوتیپی و تعیین ژن مقاومت CDR2 در سویه‌های مقاوم با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مرازن معکوس^(۳) بود.

مواد و روش‌ها

این مطالعه تجربی در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. اجرای این تحقیق به تصویب کمیته ایمنی زیستی و اخلاق پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس رسید. در این مطالعه، ۶۸ نمونه شامل ۶۶ ایزوله بالینی و دو گونه کاندیدا آلبیکنس استاندارد

1-Oropharyngeal Candidiasis (OPC)

2-*Candida albicans*

3-Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)

امروزه قارچ‌های بیماری‌زا فرستاد

از جمله عفونت‌های تهدید کننده زندگی در بیماران نقص سیستم ایمنی می‌باشد. مخمرها و در رأس آنها گونه‌های کاندیدا معمول‌ترین قارچ‌هایی هستند که از عفونت‌های انسانی جدا می‌شوند^(۱). علی‌رغم پیشرفت‌های زیاد در زمینه مراقبت‌های بهداشتی و روش‌های درمانی، وقوع کاندیدیازیس سیستمیک مهاجم به طور قابل توجهی رو به افزایش است^(۲). بیماری‌های قارچی در بیماران ایدزی اغلب به صورت کاندیدیازیس دهانی حلقی^(۱) ظاهر می‌یابند و از جمله عوامل ایجاد کننده آن، گونه قارچ‌های مخمری کاندیدایی می‌باشد که شایع‌ترین آنها کاندیدا آلبیکنس^(۲) است. کاندیدیازیس دهانی از عفونت‌های شایع در بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی است و در بیش از ۹۰ درصد از این بیماران در طی عفونت با این ویروس و به ویژه در مراحل اولیه قبل از درمان و مراحل پیشرفتی بیماری ایدز دیده می‌شود^(۳-۵).

درمان به وسیله عوامل ضد قارچی آزوی به ویژه فلوکونازول به عنوان راهکاری مؤثر جهت درمان عفونت‌های ناشی از مخمر کاندیدا آلبیکنس معروفی می‌شود، اما بروز مقاومت‌های دارویی این روش درمان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است^(۶-۷)، لذا شناسایی گونه‌های مقاوم به عوامل ضد قارچی جهت درمان کارآمد و جلوگیری از مصرف بی‌رویه داروها بسیار ضروری می‌باشد.

دیسکهای ۲۵ میکرومتری فلوكونازول در مرکز پلیت قرار داده شدند و در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد زمان های ۲۴ و ۴۸ ساعت مورد بررسی قرار گرفتند و قطر مهارکنندگی از رشد بر حسب میلی متر ثبت گردید.

چند روش متفاوت جهت استخراج RNA سلول های مخمری کاندیدا مورد آزمایش قرار گرفت و در نهایت بهترین و مؤثر ترین روش پس از مشاهده باندهای RNA استخراج شده بر روی ژل آگارز انتخاب گردید. استخراج RNA با استفاده از پرل شیشه ای^(۴)، در حضور فتل، کلروفرم و ایزوآمیل الکل به نسبت ۱:۲۴:۲۵ صورت گرفت^(۱۵). جهت استخراج RNA از کشت تازه مخمر کاندیدا آلبیکنس در فاز لگاریتمی استفاده شد. همچنین از میکروتیوب ها و DNase RNase سرمسیپرهای عاری از آنزیم استفاده شد. RNA استخراج شده از نظر کمی و کیفی با دو روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز بر روی ژل رنگ آمیزی شده با اتیدیوم بروماید مورد بررسی قرار گرفت. پس از مشاهده تصویر RNA بارگذاری شده بر روی ژل آگارز، تفاوت غاظت RNA ها از شدت باند آنها مشخص شد. بدین منظور جهت یکسان نمودن شرایط، جذب نوری تمامی نمونه ها با دستگاه بیوفوتومتر اپن دورف قرائت شد و سپس با دی اتیل پیرو کربنات میزان غاظت RNA قبل از سنتز cDNA^(۵) و استفاده در واکنش زنجیره ای پلی مراز

حساس و مقاوم به فلوكونازول مورد بررسی قرار گرفتند. ایزوله های بالینی که از ضایعات دهانی افراد ایدزی جدا شده بود و گونه استاندارد حساس به فلوكونازول (۱۰۲۲۱) (ATCC^(۱)) از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و گونه استاندارد مقاوم به فلوكونازول (ATCC ۷۶۶۱۵) از مرکز دارویی دانشگاه شانگهای چین تهیه گردید.

گونه های استاندارد و سویه های بالینی بر روی محیط کشت ساپورو دکسترون آگار (۶۵ گرم در لیتر) حاوی آنتی بیوتیک کلاموفنینیکل (۵۰ میلی گرم در ۱۰ میلی لیتر الکل) کشت داده شد و به مدت ۴۸ ساعت در انکوباتور ۳۰ درجه سانتی گراد قرار گرفت. تک کلنی های مخمری حاصل از کشت تازه جهت انجام آزمون های فنوتیپی و مولکولی مورد استفاده قرار گرفت. از روش های فنوتیپی، کشت در محیط کروم آگار کاندیدا^(۲)، آزمایش ایجاد لوله زایا و همچنین آزمایش تولید کلامیدوکونیدی به منظور شناسایی نمونه ها استفاده گردید. آزمایش تعیین حساسیت به فلوكونازول با روش استاندارد انتشار دیسک صورت گرفت. بدین منظور ابتدا ۳۴ گرم از پودر محیط مولر هیلتون آگار^(۳) در یک لیتر آب مقطر حل گردید. سپس ۲۰ گرم از پودر گلوكز و ۰/۵ میلی گرم از پودر متیلن بلو به آن افزوده شد. سوسپانسیون قارچی جهت تلقیح به محیط کشت مولر هیلتون آگار با غاظت ۱۰ سلول در هر میلی لیتر از کشت تازه مخمر، در لوله های استریل حاوی سرم فیزیولوژی تهیه گردید. پس از انتقال سوسپانسیون به محیط کشت

1-American Type Culture Collection (ATCC)

2-Chrom Agar Candida Medium

3-Mueller Hinton Agar Medium

4-Glass Bead

5- Complementary DNA

مطالعه استفاده شد. جهت صحت عملکرد پرایمرهای مورد استفاده، پرایمرها با انجام BLAST^(۵) در سایت NCBI^(۶) و با استفاده از نرم افزار ژن رانر^(۷) کنترل شدند. توالی اسید نوکلئیک پرایمرهای مورد استفاده به این شرح بودند:

CDR2F: (5'-CACGTCTTGTCGCAACAGC-3')

CDR2R:(5'-ATGTTGTGACTTGCAGTAGC-3')

ACT1F:(5'-CCAGCTTCTACGTTCC-3')

ACT1R:(5'-CTGTAACCACGTTCAGAC-3')

واکنش زنجیره‌ای پلی مراز معکوس در حجم ۱۲/۵ میکرولیتر با استفاده از ترموسایکلر بایو رد انجام شد. ۱ میکرولیتر از cDNA ساخته شده، مقدار ۱۰ پیکومول از هر یک از پرایمرها، ۶/۲۵ میکرولیتر از مستر میکس حاوی مخلوط نوکلئوتیدها با غلظت ۴٪. میلی مولار، کلرید منزیزم با غلظت ۴ میلی مولار و آنزیم تگ پلی مراز^(۸)، به میکروتیوب واکنش اضافه شد و حجم نهایی با آب مقطر دیونیزه استریل به ۱۲/۵ میکرولیتر رسانده شد. مخلوط بالا در دستگاه ترموسایکلر قرار داده شد و برنامه حرارتی برای آن اعمال شد. دمای واسرشتگی اولیه الگو ۹۴ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه، دمای واسرشتگی ثانویه الگو ۹۴ درجه سانتی گراد به مدت ۵۰ ثانیه، دمای

یکسان گردید. تصویر RNA های استخراج شده بر روی ژل آگارز وجود DNA را در نمونه‌ها نشان داد، به همین علت تمامی نمونه‌های RNA برای از بین رفتن DNA با آنزیم DNase تیمار^(۹) گردید.

پس از اطمینان از خلوص RNA، ساخت cDNA از روی آن به وسیله کیت K1621 ساخت شرکت فرمنتاز و بر اساس دستور العمل آن انجام گرفت. بدین ترتیب که به ۲ میکروگرم RNA استخراج شده، ۱ میکرولیتر پرایمر رندوم هگزامر اضافه شد. حجم نهایی این مرحله با آب تیمار شده با دی‌اتیل‌پیروکربنات^(۱۰) به ۱۲ میکرولیتر رسانده شد. میکروتیوب‌های حاوی مقداری مذکور به مدت ۵ دقیقه در دمای ۶۵ درجه سانتی گراد قرار داده شد و سپس بلافالصله به یخ منتقل گردید. در ادامه ۴ میکرولیتر بافر ۰.۵X، ۲ میکرولیتر مخلوط ۱۰ میلی مولار ۱.dNTP، ۱ میکرولیتر ریبونوکلئاز و ۱ میکرولیتر آنزیم ریورس ترانس کریپتاز^(۱۱) ۲۰۰ واحد در میلی لیتر به میکروتیوب اضافه شد. سپس محلول واکنش به مدت ۵ دقیقه در ۲۵ درجه سانتی گراد و به مدت ۶۰ دقیقه در ۴۲ درجه سانتی گراد قرار گرفت. با قرار دادن میکروتیوب به مدت ۱۰ دقیقه در ۷۰ درجه سانتی گراد، واکنش متوقف شد. cDNA حاصل تا زمان انجام واکنش زنجیره‌ای پلی مراز در فریزر -۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شد. به منظور بیان ژن عامل مقاومت به فلوكونازول در سویه‌های کاندیدا آلبیکننس از پرایمرهای CDR2 و ACT1 ساخت شرکت سیناژن استفاده گردید. ژن ACT1 در زمرة ژن‌های خانگی^(۱۲) است که به عنوان کنترل داخلی در این

1-Treatment

2-Diethylpyrocarbonate (DEPC)

3- Reverse Transcriptase M-MuLV

4- House Keeping

5- Basic Local Alignment Search Tool (BLAST)

6-National Center for Biotechnology Information (NCBI)

7-Gene Runner

8- Taq Polymerase

این نتایج نشان داد که ۶۸/۱۸ درصد سویه‌ها نسبت به فلوكونازول حساس، ۲۴/۲۴ درصد مقاوم و ۷/۵۸ درصد حالت بینابینی دارند(نمودار ۱). جهت تأیید نتایج به دست آمده با این روش از ایزوله استاندارد مقاوم به فلوكونازول کاندیدا آلبیکنس و ایزوله استاندارد حساس به فلوكونازول کاندیدا آلبیکنس استفاده گردید.

RNA های استخراج شده از ایزوله‌های کاندیدا آلبیکنس پس از الکتروفورز بر روی ژل آگارز مورد تأیید قرار گرفتند. نتیجه استخراج RNA مخمرهای کاندیدا آلبیکنس به وسیله پرل شیشه‌ای و ترکیب سه تایی فنل، کلروفرم و ایزو آمیل الکل با افزایش زمان ورتکس موفقیت آمیز بود.

انجام واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس با استفاده از پرایمرهای اختصاصی CDR2 و ACT1 در سویه‌های استاندارد حساس و مقاوم به فلوكونازول و نیز نمونه‌های بالینی جدا شده از افراد ایدزی سبب به دست آمدن نتایج قابل قبولی در زمینه بررسی نسخه برداری از ژن مورد بررسی گردید. پس از انجام واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس و الکتروفورز محصول واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز، مشخص گردید که از ۶۶ ایزوله بالینی مورد بررسی، ۴ ایزوله (۶ درصد) دارای ژن مقاومتی CDR2 هستند(تصویر ۱).

1-Statistical Package for Social Sciences
2-Germ Tube

اتصال پرایمر به رشتہ الگو ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۵ ثانیه، دمای گسترش رشتہ جدید ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵۰ ثانیه و ۳۴ سیکل از مرحله ۲ تا ۴ تکرار شد. دمای بسط نهایی ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۰ دقیقه در نظر گرفته شد. در آخر محصولات واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز بر روی ژل آگارز ۱/۸ درصد حاوی ۰/۵ میکروگرم اتیدیوم بروماید به ازای هر میلی‌لیتر ژل الکتروفورز گردید. پس از اتمام الکتروفورز ژل‌ها بر روی دستگاه ژل داکیومنتیشن از نظر وجود باند ژن مورد نظر تکثیر شده، بررسی شدند و با باند حاصله از نمونه استاندارد کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوكونازول مقایسه شدند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از


نرم افزار SPSS^(۱) تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها


تعداد ۶۶ نمونه کاندیدا آلبیکنس مورد مطالعه بر اساس رنگ ویژه کلنی در محیط کروم آگار کاندیدا، کشت بر روی محیط کورن میل آگار حاوی تؤین ۸۰ و آزمایش تولید لوله زایا^(۲) تأیید شدند. در این روش فنوتیپی از سویه استاندارد مقاوم به فلوكونازول کاندیدا آلبیکنس به عنوان شاهد مثبت و کاندیدا کروزئی به عنوان شاهد منفی استفاده شدند. نتایج حاصل از آزمون انتشار دیسک جهت ارزیابی حساسیت ایزوله‌های بالینی کاندیدا آلبیکنس نسبت به داروی فلوكونازول در شرایط دمایی ۲۵ درجه سانتی‌گراد و پس از ۲۴ ساعت به دست آمد.

واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس از ژن ACT1 به عنوان کنترل داخلی و حصول اطمینان از سنتز cDNA استفاده شد.

پس از بررسی نتایج حاصل از واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس و روش انتشار دیسک نشان داده شد که هر ۴ نمونه دارای واکنش مثبت در واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس، با روش انتشار دیسک نیز مقاوم می‌باشند. در تمامی مراحل انجام



نمودار ۱: مقایسه درصد میزان حساسیت ایزوله‌های بالینی کاندیدا آلبیکنس نسبت به فلوکونازول با روش انتشار دیسک



تصویر ۱: نتایج حاصل از الکتروفورز محصول واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس ژن‌های CDR2 و ACT1

M: مارکر ۵۰ جفت بان، ۱: ژن CDR2 کاندیدا آلبیکنس استاندارد مقاوم به فلوکونازول، ۳: ژن CDR2 کاندیدا آلبیکنس استاندارد حساس به فلوکونازول، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳: ژن CDR2 ایزوله‌های بالینی مقاوم به فلوکونازول، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲: ژن‌ها خانگی ACT1، ۱۴: کنترل منفی ژن ACT1، ۱۴: کنترل منفی ژن CDR2

بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج به دست آمده از روش انتشار دیسک می‌توان ادعا نمود که در ارزیابی اثر بخشی داروهای ضد قارچی، در صورت استفاده از دیسکهای مورد تأیید استانداردهای بین المللی، روشی قابل اطمینان و کم هزینه در کلیه آزمایشگاههای تشخیص طبی می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی ژن CDR2 در سویه‌های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول در بیماران ایدزی مبتلا به کاندیدیازیس دهانی-حلقی به روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس بود.

این مطالعه نشان داد که با استفاده از روش انتشار دیسک میزان مقاومت به داروی فلوکونازول در ۶۶ سویه کاندیدا آلبیکنس جدا شده از بیماران ایدزی، ۲۴/۳ درصد بود. این امر نشان می‌دهد میانگین میزان مقاومت به این دارو در بیماران مبتلا به کاندیدیازیس دهانی علی رغم جذب مناسب گوارشی بالا می‌باشد. در مجموع، تحقیق حاضر نشان داد که آزمایش حساسیت دارویی گام اول و ضروری جهت انتخاب داروی مناسب برای درمان انواع کاندیدیازیس است، تا بدین ترتیب از مصرف بی رویه داروها و ایجاد مقاومت دارویی ناخواسته جلوگیری شود.

امروزه تکنیک‌های مولکولی به علت اختصاصیت و حساسیت بالا بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند و بیولوژی مولکولی علم قارچ‌شناسی را همانند سایر علوم متحول ساخته است. گسترش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز به عنوان روشی برای بررسی الگوی بیان ژن‌ها و تشخیص مقادیر کم نمونه

داروهای گروه آزول به ویژه فلوکونازول از جمله مؤثرترین داروهای مورد استفاده در درمان عفونت‌های ناشی از کاندیدا آلبیکنس بوده و هم‌چنین رایج‌ترین و پرمصرف‌ترین عامل ضد قارچی شناخته شده می‌باشد. فلوکونازول به علت دارا بودن خاصیت درمانی بالا به طور معمول جهت درمان عفونت‌های ناشی از کاندیدا استفاده می‌شود^(۱۶). مقاومت در برابر عوامل ضد قارچی آزولی تا دهه ۱۹۸۰ بسیار نادر بود، اما در دهه ۱۹۹۰ تاکنون مقاومت نسبت به این عوامل ضد قارچی (آزول‌ها) افزایش چشمگیری یافته است^(۱۷). شیوع عفونت‌های قارچی منجر به افزایش استفاده از داروهای ضد قارچی و افزایش قابل ملاحظه مقاومت گونه‌های کاندیدا نسبت به ترکیب‌های مورد استفاده شده است. شیوع عفونت‌های حاد و سیستمیک کاندیدایی و متعاقب آن درمان با داروهای ضد قارچی به ویژه ترکیب‌های آزولی و مقاومت نسبت به این ترکیب‌ها، ضرورت استفاده از روش‌های تعیین حساسیت دارویی عوامل قارچی را بیش از پیش آشکار ساخته است. تعیین حساسیت عامل ایجاد بیماری قبل از شروع درمان جهت درمان مناسب و ریشه‌کنی و حذف عوامل قارچی روش بسیار سودمندی می‌باشد تا بدین ترتیب از مصرف بی رویه داروها و بالطبع از ایجاد مقاومت‌های دارویی ثانویه و ناخواسته جلوگیری شود^(۱۴ و ۱۹).

مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که روش مولکولی واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس توانایی شناسایی سریع، صحیح و قابل اعتماد ایزوله‌های مقاوم به عوامل ضد قارچی را دارا می‌باشد. با وجود این مطلوب آن است که از روش فنتیپی انتشار دیسک با هزینه کمتر و امکان شناسایی تعداد زیادی نمونه در هر آزمایش همراه با روش‌های ژنتیکی مانند واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس با امکان بررسی مکانیسم‌های مقاومت دارویی و ژن‌های دخیل در آن استفاده شود.

تقدیر و تشکر

این تحقیق با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تحت عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته قارچ‌شناسی پزشکی انجام شده است.

الگو، حساسیت روش‌های بررسی بیان ژن‌ها را متحول کرده است. بادی و همکاران^(۲۰۰۹) حساسیت ۱۷۲ ایزوله کاندیدا آلبیکنس را نسبت به فلوکونازول با روش مایکرودایلوجن براث ارزیابی نمودند. تعداد ایزوله کاندیدا آلبیکنس مقاوم به دارو ۹ عدد گزارش شد^(۱۸). در مطالعه صالح^(۲۰۰۸) حساسیت ۱۰۷ ایزوله کاندیدا آلبیکنس به داروی فلوکونازول با روش دیسک دیفیوژن ارزیابی شد، که ۲۶/۱ درصد از ایزوله‌های مورد بررسی به داروی فلوکونازول مقاوم بودند^(۱۹). یان و همکاران^(۱۰) در مطالعه خود ژن‌های متعددی مانند CDR1, MDR1, ERG11 را عوامل ایجاد کننده مقاومت در سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول عنوان کردند^(۲۰). فراد و همکاران^(۲۰۰۴) اظهار داشتند، جهت بررسی ژن‌های مقاومتی مانند CDR2 حساسیت و اختصاصیت روش‌های واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس و هیبریداسیون پروب نشاندار^(۲۱) از روش نورترن بلات^(۲۲) بیشتر است.

در این تحقیق از سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول که دارای ژن‌های مقاومتی متعددی از جمله CDR2 می‌باشد و همچنین از سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس حساس به فلوکونازول استفاده شد. جهت شناسایی و ارزیابی سویه‌های بالینی مقاوم به فلوکونازول، الگوی الکتروفورزی باندهای سویه‌های بالینی با الگوی الکتروفورزی باندهای سویه‌های استاندارد حساس و مقاوم مقایسه شد. در مجموع از نتایج حاصل از این

1-Yan et al
2-Frade et al
3-Fluorescent Probe Hybridization
4-Northern Blot

Evaluation of Susceptibility of Strains of Candida Albicans Isolated from AIDS Patients to Fluconazole and Determination of CDR2 Resistance Gene in Resistant Strains by RT-PCR Method

Farahbakhsh E*,
Yadegari MH**,
Rajabi Bazl M***,
Taghizadeh Armaki M*.

*MSc in Medical Mycology,
Department of Medical science,
Tarbiat Modares University,
Tehran, Iran.

**Associate Professor of Medical
Mycology, Department of Medical
science, Tarbiat Modares
University, Tehran, Iran

***Assistant Professor of Clinical
Biochemistry, Department of
Medical Science, Shaheed
Beheshti Medical University,
Tehran, Iran.

Received: 12/03/2011
Accepted: 11/05/2011

Corresponding Author: Yadegari MH
Email: Yadegarm@modares.ac.ir

ABSTRACT:

Introduction & Objective: Nowadays, opportunistic fungi especially *Candida albicans* are the most common cause of life-threatening infections in immunodeficiency patients. Increasing Azole-resistant strains of *C.albicans* are a main problem in human immunodeficiency virus-infected patients. The aim of this study was to evaluate the CDR2 gene in *C.albicans* azole resistant strains, isolated from AIDS patients with oropharyngeal candidiasis by RT-PCR method.

Materials & Methods: The present experimental study was conducted at Tarbiat Modares University of Medical Sciences in 2009. *C. albicans* isolates from HIV infected patients were identified by standard procedures, including germ tube formation, clamidospor and color of colonies on CHROM agar. At first, susceptibility of *C. albicans* isolates was assessed by disk diffusion agar technique. Then, CDR2 resistance gene was analyzed by RT-PCR and electrophoresis of the PCR products. Finally, patterns of the resulted bands were compared with standard fluconazole resistant strains. The collected data was analyzed using the SPSS software.

Results: The results of drug sensitivity of 66 *C. albicans* isolates from AIDS patients revealed that 62.6% were susceptible, 8.6% were susceptible-dose dependent (SDD) and 28.7% were resistant. In RT-PCR analysis, 6% of patients had the CDR2 gene.

Conclusion: The use of phenotypic methods like disk diffusion agar, which is cheaper, along with genotypic methods, like RT-PCR, which provide the possibility of studying the mechanism of drug resistance, is recommended.

Key words: *Candida albicans*, CDR2 gene, RT-PCR

REFERENCES:

- 1.Neppelenbroek KH, Campanha Nh, Spolidorio DMP, Spolidorio LC, Seó RS, Pavarina AC. Molecular fingerprinting Methods for discrimination between *C. albicans* and *C. dubliniensis*. *Mycoses* 2006; 12: 242-253.
- 2.Mirhendi H, Makimurak A, Khoram zade M, Yamaguchi H. A one-Enzyme PCR-RFLP assay for identification of six medically Important *Candida* species. *Jpn J Med Mycol* 2006; 47: 225-9.
- 3.Casalino IA, Francesco PD, Garaci E . Fluconazole resistance in *Candida albicans*: a review of mechanism. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2004; 8 (2): 69-77.
- 4.Fichtenbaum CJ, Koletar S, Powderly WG .Refractory mucosal candidiasis in advanced human immunodeficiency virus infection. *Clin Infect Dis* 2000; 30: 749-56.
- 5.Gottlieb MS, Schroff R, Schanker HM, Weisman JD, Fan PT, Wolf RA, et al. *Pneumocystis carinii* pneumonia and mucosal candidiasis in previously healthy homosexual men: evidence of a new acquired cellular immunodeficiency. *N Engl J Med* 1981; 305:1425-31.
- 6.Revankar SG, Kirkpatrick WR, McAtee RK, Dib OP, Fothergill AW, Redding SW, et al. Detection and significance of fluconazole resistance in oropharyngeal candidiasis in human immunodeficiency virus-infected patients. *J Infect Dis* 1996; 174:821-7.
- 7.Redding S, Smith J, Farinacci G, Rinaldi M, Fothergill A, Rhine- Chalberg J, et al. Resistance of *Candida albicans* to fluconazole during treatment of oropharyngeal candidiasis in a patient with AIDS: documentation by in vitro susceptibility testing and DNA subtype analysis. *Clin Infect Dis* 1994; 18:240-2.
- 8.Franz R, Kelly S, Lamb DC, Kelly D, Ruhnke M, Morschha J. Development of fluconazole resistance in clinical *Candida albicans* strains. *Antimicrob. Agents Chemother* 1998; 42: 3065-3072.
- 9.White TC, Marr KA, Bowden RA. Clinical, cellular, and molecular factors that contribute to antifungal drug resistance. *Clin Microbiol Rev* 1998; 11:382-402.
- 10.Sanglard D, Odds FC. Resistance of *Candida* species to antifungal agents: molecular mechanisms and clinical consequences. *Lancet Infect Dis* 2002; 2:73-85.
- 11.Higgins CF. ABC transporters: from microorganisms to man. *Annu Rev Cell Biol* 1992; 8:67-113.
- 12.Sanglard D, Ischer F, Monod M, Bille J. Cloning of *Candida albicans* genes conferring resistance to azole antifungal agents: characterization of CDR2, a new multidrug ABC transporter gene. *Microbiology* 1997; 143:405-416.
- 13.Albertson GD, Niimi M, Cannon RD, Jenkinson HF. Multiple efflux mechanisms are involved in *Candida albicans* fluconazole resistance. *Antimicrob Agents Chemother* 1996; 40:2835-41.
- 14.Coste AT, Karababa M, Ischer F, Bille J, Sanglard D. TAC1, transcriptional activator of CDR genes, is a new transcription factor involved in the regulation of *Candida albicans* ABC transporters CDR1 and CDR2. *Eukaryot Cell* 2004; 3:1639-52.
- 15.Dunn B, Wobbe RC. Current Protocols in Molecular Biology. John Wiley and Sons Inc 1992; 13(3):1-9.
- 16.Troillet N, Durussel C, Bille J, Glauser MP,Chave JP. Correlation between in vitro susceptibility of *Candida albicans* and fluconazoleresistant oropharyngeal candidiasis in HIVinfected patients. *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis* 1993; 12: 911 – 5.
- 17.White TC, Marr KA, Bowden R A. Clinical, cellular, and molecular factors that contribute to antifungal drug resistance. *Clin Microbiol* 1998; Rev. 11:382-402.
- 18.Badiee P, Alborzi A,Shakiba E, Ziyaeyan M, Rasuli M. Molecular Identification and In-Vitro Susceptibility of *Candida albicans* and *C. dubliniensis* Isolated from Immunocompromised Patients. *Iranian Red Crescent Medical Journal* 2009;11(4):391-397.
- 19.Saleh AK. In vitro, Susceptibilities of Clinical Yeast Isolates to Antifungal Drugs of Polyene, Pyrimidine, and Azoles, and their Effect in Yeast Adhesion and Mycelial Formation.The Official Journal of the Saudi Biological Society.*Saudi Journal of Biological Sciences* 2008; 15(2): 189-98.
- 20.Yan L, Zhang J, Li M, Cao Y, Xu Z, Cao Y, et al. DNA microarray analysis of fluconazole resistance in a laboratory *Candida albicans* strain. *Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai)* 2008; 40(12): 1048-60.
- 21.Frade JP, Warnock DW, Arthington-Skaggs BA. Rapid Quantification of Drug Resistance Gene Expression in *Candida albicans* by Reverse Transcriptase Light Cycler PCR and Fluorescent Probe Hybridization. *J Clin Microbiol* 2004; 2085-93.