

# تأثیر تمرین هوایی بر سطوح ترکیب‌های بدن و سطح هموسیستئین در زنان سالمند

چکیده :

مقدمه و هدف: افزایش سطح هموسیستئین به عنوان یک بیومارکر قلبی - عروقی جدید مطرح شده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ۱۲ هفته تمرین هوایی منتخب بر ترکیب‌های بدن و سطح هموسیستئین در زنان سالمند ۷۵-۶۰ ساله بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۸۹ در فرهنگسرای امام خمینی شهر اصفهان انجام شد. پس از معاینه پزشکی تعداد ۳۰ زن سالمند با شرایط سنی و وزنی مشابه به صورت هدفمند انتخاب شده و سپس به طور تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب‌های بدن، وزن، درصد چربی بدن و نسبت دور کمر به دور لگن تعیین شد. سپس نمونه خونی در حالت ناشتا گرفته شد. سطح هموسیستئین به روش الیزا اندازه‌گیری شد. گروه مداخله تحت تأثیر یک برنامه تمرین هوایی فزاینده (راه رفت) ۳ جلسه در هفته، به مدت ۳ ماه قرار گرفتند. پس از ۳ ماه همه متغیرها در هر دو گروه مجدداندازه‌گیری شد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری تی زوجی و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج کاهش معنی‌داری را در شاخص‌های وزن، درصد چربی، شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به دور لگن گروه تجربی قبل و بعد از ۱۲ هفته دوره تمرینی نشان داد. هم‌چنین، در پایان ۱۲ هفته دوره تمرینی، کاهش معنی‌داری در سطح هموسیستئین در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد ( $p \leq 0.05$ ).

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد، یک برنامه ۱۲ هفته‌ای تمرین استقاماتی کنترل شده و منظم باشد متوسط که ظرفیت عضله اسکلتی را برای استفاده از چربی‌ها افزایش می‌دهد، ممکن است، نقش مهمی در کنترل وزن و کاهش سطح هموسیستئین در زنان سالمند داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: ترکیب‌های بدن، هموسیستئین، سالمند، تمرین، بیماری قلبی- عروقی

فرزانه تقیان\*

فهیمه اسفرجانی\*\*

\* دکترا فیزیولوژی ورزش، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسکان (اصفهان)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

\*\* دکترا فیزیولوژی ورزش، استادیار دانشگاه اصفهان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخ وصول: ۱۳۹۰/۱/۱۸

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۳/۸

شماره ثبت در مرکز کارآزمایی‌های بالینی ایران:  
IRCT201107036939N1

مؤلف مسئول: فرزانه تقیان

پست الکترونیک: f\_taghian@yahoo.com

## مقدمه

زنان سالمند پس از ورود به یائسگی نشان

داده‌اند<sup>(۱۰)</sup>.

مطالعه‌های بالینی بیان می‌کنند که ۵ میکرومول در لیتر افزایش در هموسیستئین برابر تقریباً ۲۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر افزایش در سطح کلسترول تام است. بسیاری از مطالعه‌ها نشان دادند که ارتباط بین سطوح هموسیستئین تام و آترواسکلروزیس حتی قوی‌تر از ارتباط بین آترواسکلروزیس و کلسترول است. از طرفی افزایش غلظت هموسیستئین خود عامل خطرزای مستقل برای عروق کرونر است<sup>(۱۱) و (۱۲)</sup>. روند آترواسکلروز به عنوان یک التهاب مزمن تلقی می‌شود. نشان داده شده است که در محیط‌های آزمایشگاهی هموسیستئین تولید چندین سیتوکاین التهاب‌زا را افزایش می‌دهد<sup>(۱۳)</sup>. عوامل مختلفی از جمله؛ سن، جنس، ژنتیک، دارو و عوامل شیوه زندگی (صرف الکل، سیگار، تغذیه نامناسب، کمبود ویتامین B12 و عدم فعالیت بدنی) بر سطوح هموسیستئین تأثیر دارند<sup>(۱۱)</sup>. میزان هموسیستئین پلاسمایی با افزایش سن افزایش می‌یابد<sup>(۱۴) و (۱۵)</sup>. از عوامل مؤثر بر غلظت بالاتر هموسیستئین تام در افراد مسن‌تر می‌توان به غلظت پایین فولات سرم و افزایش شیوع کمبود ویتامین B12 در نتیجه سوء جذب این ویتامین‌ها از روده‌های افراد مسن اشاره کرد<sup>(۹)</sup>.

1-Waist to hip ratio

2- Low Density Lipoprotein (LDL)

3- High Density Lipoprotein (HDL)

بیماری کرونری قلب اولین و مهم‌ترین علت اصلی مرگ و میر در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می‌باشد<sup>(۱)</sup>. عوامل زیادی در پیدایش بیماری آترواسکلروز دخیل هستند که مهم‌ترین آنها مقاومت انسولین، نسبت بالای دور کمر به باسن<sup>(۱۱)</sup>، اختلال لیپیدها و اکسیداسیون آنها، غلظت‌های نامناسب لیپوپروتئین با دانسیته پایین<sup>(۲)</sup> و لیپوپروتئین با دانسیته بالا<sup>(۳)</sup>، رژیم غذایی نامناسب، کم تحرکی، چاقی، سیگار، فشارخون بالا، تنفس‌های روانی و دگرگونی‌های عوامل التهابی و انعقادی و همچنین افزایش سطح هموسیستئین می‌باشد<sup>(۴)</sup>. هموسیستئین یک اسید آمینه حاوی سولفور، با وزن مولکولی ۱۲۵/۲ دالتون است که در جریان متابولیسم متیونین به وجود می‌آید<sup>(۵)</sup>.

مطالعه‌های اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد، افزایش هموسیستئین به طور مستقل با خطر بیماری‌های قلب و عروق ارتباط دارد و سطح بالای هموسیستئین موجب عوارض متعددی از جمله آترواسکلرر، ترومبوز وریدی و مشکلات متعدد قلبی-عروقی می‌شود<sup>(۶)</sup>. کاهش سطح هموسیستئین باعث کاهش حملات قلبی و سکته می‌شود<sup>(۷-۹)</sup>. برخی مطالعه‌های طولی در زمینه عوامل خطرزای قلبی-عروقی جدید در سالمندان، عمدتاً ارتباط بین سطح هموسیستئین و بیماری‌های قلب و عروق، سکته مغزی و بیماری‌های عروق محیطی را در مردان و

هموسیستئین پلاسمای ترکیبی با ترکیب تمرینات هوایی بدن مدت وجود دارد، اما اطلاعات کافی و جامع در خصوص مکانیسم تأثیر تمرینات هوایی ورزشی بر تغییر هموسیستئین پلاسمای همچنین ترکیب‌های بدن در افراد سالمند ایرانی موجود نیست و از طرفی میزان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی - عروقی در ایران رو به افزایش است، لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ۱۲ هفته تمرین هوایی منتخب بر وزن، درصد چربی، شاخص توده بدن<sup>(۳)</sup>، نسبت دور کمر به باسن و هموسیستئین پلاسمای در زنان ۷۵-۶۰ ساله بود.

### مواد و روش‌ها

این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۸۹ در فرهنگسرای امام خمینی شهر اصفهان انجام شد. به منظور انجام این تحقیق از نمونه‌های در دسترس پس از چند مرحله غربالگری استفاده شد. پس از هماهنگی با سازمان رفاهی- تحریحی شهرداری اصفهان و مسئولان فرهنگسرای امام خمینی، زنان سالمند در محل سالن اجتماعات مرکز گردآوری شده و توضیحات لازم در خصوص انجام تحقیق و هدف آن به ایشان داده شد. تعداد این زنان سالمند ۶۰ نفر بود. سپس فرم رضایت‌نامه بین آنها توزیع گردید و سالمندانی که علاقه‌مند به فعالیت در این تحقیق بودند شناسایی شده و با راهنمایی محقق و همکاری پزشک

1- Vincent et al  
2-Body Mass Index (BMI)

فعالیت بدنی ممکن است با روش‌های مختلف از جمله؛ بهبود ترکیب بدنی، افزایش جذب ویتامین‌ها در روده، افزایش فعالیت آنزیم‌های مربوطه، افزایش نقل و انتقال پروتئین یا گروه متیل و یا از روش‌های ناشناخته دیگر به کاهش هموسیستئین کمک کند<sup>(۱۶)</sup>. فعالیت جسمانی موجب چند تغییر بیوشیمیایی می‌شود که می‌تواند بر مسیر متابولیسم هموسیستئین تأثیر داشته باشد. ورزش‌های بدن مدت و شدید ظرفیت بدن را برای مقابله با رادیکال‌های آزاد و فعال اکسیژن کاهش می‌دهند، در حالی که ورزش و تمرین‌هایی با شدت متوسط می‌تواند، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و دفاع آنتی‌اکسیدانی فیزیولوژیکی را بالا ببرند و موقعه استرس اکسایشی را کاهش دهد<sup>(۱۷)</sup>. وینست و همکاران<sup>(۱۸)</sup> اثر تمرین مقاومتی فزاینده‌ای با ۵۰-۸۰ درصد یک تکرار بیشینه را بر روی ۴۹ سالمند ۷۲-۶۰ ساله در دو گروه با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن انجام دادند و کاهش معنی‌داری در هموسیستئین تمام پلاسمای در گروه دارای اضافه وزن دیده شد، در حالی که در گروه با وزن طبیعی اگر چه کاهش اندکی صورت گرفت، اما این کاهش معنی‌دار نبود<sup>(۱۸)</sup>.

از آنجایی که شروع ورزش در سنین بالا نسبت به عدم پرداختن به آن در این سن، افراد را کمتر در معرض خطر حمله قلبی و مرگ و میرهای ناشی از آن قرار می‌دهد، انجام فعالیت‌های ورزشی در سنین بالا نیز می‌تواند بسیار مؤثر و مفید باشد. علی‌رغم این که شواهدی مبنی بر کاهش سطح

نمونه‌ها با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب‌های بدن<sup>(۱)</sup> مدل ۳ ساخت کشور کره ارزیابی شد. در خصوص اخذ نمونه‌های خونی از آزمودنی‌ها خواسته شد ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش خون فعالیت ورزشی نداشته باشد و همچنین ناشتا بوده و به اندازه کافی استراحت کرده باشند. از هر آزمودنی به میزان ۵ میلی‌لیتر خون گرفته شد. پس از خون‌گیری برای نگهداری نمونه‌ها، لوله آزمایش تا زمان لخته شدن، ثابت قرار گرفت. سپس سرم با استفاده از سانتریفوژ در دمای اتاق جدا شده و در دمای ۷۰- درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. برای اندازه‌گیری سطح هموسیستئین به روش الیزا<sup>(۲)</sup> از کیت آزمایشگاهی هموسیستئین ساخت کشور آلمان استفاده شد. سپس سالماندان در یک برنامه ورزشی سه ماهه شرکت کردند. پس از سه ماه همه متغیرهای فوق الذکر مجدداً اندازه‌گیری شدند.

بعد از اندازه‌گیری‌های اولیه مدت یک هفته زمان به منظور آشنایی سالماندان با استفاده از تردیمیل در نظر گرفته شد. برنامه تمرینی ۳ روز در هفته با محاسبه ضربان قلب هدف و با استفاده از روش کارنوون انجام شد<sup>(۱)</sup>. برنامه تمرینی فراینده از ۲۰ دقیقه در هفتۀ اول با شدت ۵۰- ۵۵ درصد ضربان قلب نخیره شروع و در اواخر ماه سوم تمرین به ۴۵-۶۰ دقیقه با شدت ۶۰-۷۰ درصد ضربان

1- Body Composition Analyzer 3.0

2-Enzyme – Linked Immunosorbent Assay(ELISA)

پرسشنامه‌های سابقه پزشکی و آمادگی برای شروع فعالیت بدنی را به منظور جمع‌آوری اطلاعات زمینه‌ای تکمیل نمودند. پس از تکمیل پرسشنامه پزشکی و اختصاص چک لیست به هر فرد، ارزیابی اولیه شامل بررسی پرونده پزشکی، تست بدنی و بررسی پروفایل خونی بود. افرادی که دارای فشار خون بالاتر از ۱۶۰/۹۰ میلی‌متر جیوه و سطح تری گلیسرید بیشتر از ۴۰۰ میلی‌گرم درصد بودند و همچنین مبتلایان به دیابت، بیماری‌های کبد، بیماری قلبی - عروقی، آرتروز و پوکی استخوان شدید، بیماری‌های کلیوی و یا مشکلات پزشکی و اختلالات ارتوپدیک بودند، حذف شدند.

این افراد هیچ‌گونه دارویی که بتواند بر سطوح هموسیستئین تأثیر بگذارد، مانند؛ داروهای کاهنده چربی خون نظیر؛ استاتین، داروهای ضدصرع و هورمون‌های شبۀ استروژن مصرف نمی‌کردند. همچنین این افراد سیگار نمی‌کشیدند و غیر فعال بودند (فعالیت کمتر از ۲۰ دقیقه در هفته). در ارزیابی ثانویه سالماندان در یک تست ورزشی فراینده روی تردیمیل شرکت کردند. افرادی که پاسخ‌های قلبی عروقی غیرطبیعی نشان دادند، حذف شدند. در نهایت تعداد ۳۰ نفر از زنان ۷۵-۶۰ ساله انتخاب شده و به دو گروه مساوی کنترل و مداخله تقسیم شدند. پس از مراجعه به آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی در ابتداء ترکیب‌های بدنی شامل؛ وزن، درصد چربی، شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به باسن

شد(0.004)، اما در گروه کنترل تغییر معنی‌داری مشاهده نشد(0.44). متغیر شاخص توده بدن پس از ۳ ماه در اثر تمرین هوایی در گروه تجربی کاهش معنی‌داری نشان داد(0.009)، اما در گروه کنترل کاهش معنی‌داری مشاهده نشد(0.51). متغیر نسبت دور کمر به باسن پس از ۳ ماه در اثر تمرین هوایی در گروه تجربی کاهش معنی‌داری داشت (0.009)، ولی در گروه کنترل کاهش معنی‌داری مشاهده نشد(0.21). میزان هموسیستئین پس از ۳ ماه در اثر تمرین هوایی در گروه مداخله کاهش معنی‌داری داشت(0.003)، اما در گروه کنترل کاهش معنی‌داری مشاهده نشد(0.54) (جدول ۱).

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول ۲ نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که با توجه به  $F$  به دست آمده، در اثر تمرین هوایی، بین تغییر وزن ( $p \leq 0.01$ )، درصد چربی( $p \leq 0.02$ )، شاخص توده بدن ( $p \leq 0.02$ ) و نسبت دور کمر به باسن( $p \leq 0.03$ ) در گروه کنترل و مداخله تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در مورد هموسیستئین با توجه به  $F$  مشاهده شده ( $F = 11/20$ ) بین این متغیر در گروه کنترل و مداخله تفاوت معنی‌داری مشاهده می‌شود و کاهش در گروه مداخله به طور معنی‌داری بیشتر است ( $p \leq 0.004$ ).

1-POLAR S-series Toolkit  
2-Statistical Package for Social Sciences  
3-Paired t-Test  
4-Analysis of Co-Variance

قلب ذخیره هر فرد رسید. در این پروتکل تمرینی از روش فزاینده استفاده شد. این برنامه به مدت سه ماه و سه جلسه در هفته انجام شد. برنامه تمرین شامل ۳-۵ دقیقه گرم کردن با حرکاتی از قبیل؛ حرکات کششی، نرمشی و جهشی بود. راه رفتن بر روی تردمیل(مدل T80x ساخت کشور تایوان) بدون شبکه انجام شد. حداکثر ضربان قلب با استفاده از فرمول؛ سن - ۲۲۰ محاسبه شد (۷). به منظور کنترل شدت تمرین حداقل ۲ بار در طول تمرین با استفاده از ضربان سنج ساعتی تولکیت پولار<sup>(۱)</sup> ضربان قلب کنترل و ثبت می‌گردید. در انتهای هر جلسه تمرینی سرد کردن با تمرینات کششی و راه رفتن انجام شد.

داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS<sup>(۲)</sup> و آزمون‌های آماری تی زوجی<sup>(۳)</sup> و تحلیل کوواریانس<sup>(۴)</sup> تجزیه و تحلیل شدند.

#### یافته‌ها

میانگین سنی افراد گروه کنترل و مداخله به ترتیب؛  $68 \pm 4$  و  $69 \pm 3$  سال و میانگین وزنی آنها به ترتیب  $14/62 \pm 15/9$  و  $72/67 \pm 14/6$  کیلوگرم بود. نتایج نشان داد که در اثر تمرین هوایی، در گروه مداخله وزن کاهش یافت(0.001)، در حالی که در گروه کنترل وزن افراد پس از ۳ ماه تغییر معنی‌داری نداشت(0.05). همچنین نتایج نشان داد که در گروه مداخله پس از ۳ ماه تمرین تغییر معنی‌داری در سطح درصد چربی افراد سالم‌نمود دیده

جدول ۱: مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیرهای بررسی شده در گروههای کنترل و مداخله قبل و ۳ ماه بعد از مداخله

متغیر	گروه	پیش آزمون	پس آزمون	سطح معنی داری
وزن (کیلوگرم):	کنترل	۷۲/۶۷±۱۴/۶۲	۷۱/۷۸±۱۵/۱۲	.۰/۳۹
چربی (درصد):	مداخله	۶۸/۳۶±۱۵/۹۰	۶۵/۵۵±۱۲/۹۳	.۰/۰۱
شاخص توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع):	کنترل	۴۰/۳۹±۲/۸۱	۳۹/۸۰±۲/۴۳	.۰/۴۴۵
نسبت دور کمر به باسن:	مداخله	۳۸/۷۳±۴/۱۳	۳۵/۸۱±۴/۸۷	.۰/۰۰۴
هموسيستئين(ميکرومول بر لیتر)	کنترل	۳۱/۲۵±۴/۳۹	۳۱/۲۵±۴/۳۹	.۰/۵۱۴
نسبت دور کمر به باسن:	مداخله	۲۶/۲۹±۴/۱۶	۲۸/۰۴±۲/۶۵	.۰/۰۰۹
هموسيستئين(ميکرومول بر لیتر)	کنترل	۱/۰۲±۰/۰۳	۱/۰۱±۰/۰۰۶	.۰/۲۱۸
مداخله	کنترل	۱±۰/۰۵	۰/۹۴±۰/۰۴	.۰/۰۰۹
هموسيستئين(ميکرومول بر لیتر)	کنترل	۱۸/۴۵±۲/۲۲	۱۹/۱۶±۲/۱۲	.۰/۵۴
مداخله	کنترل	۱۹/۲۶±۱/۹۱	۱۵/۲۷±۲/۶۷	.۰/۰۰۳

جدول ۲: مقایسه نتایج آزمون تحلیل کواریانس متغیرهای مورد بررسی در پس آزمون در گروههای کنترل و مداخله

متغیر	گروه مداخله	گروه کنترل	مجذور میانگین	F آماره	سطح معنی داری
وزن (کیلوگرم)	۶۵/۵۵±۱۲/۹۳	۷۱/۷۸±۱۵/۱۲	۴۹/۷۷	۷/۲۱	.۰/۰۱
چربی (درصد)	۳۵/۸۱±۴/۸۷	۳۹/۸۰±۲/۴۳	۳۱/۰۲	۵/۸۲	.۰/۰۲
شاخص توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع)	۳/۶۵±۲۸/۰۴	۴/۳۹±۲۱/۲۵	۶/۹۳	۶/۲۷	.۰/۰۲
نسبت دور کمر به باسن	۰/۹۴±۰/۰۴	۱/۰۱±۰/۰۰۶	۰/۰۱	۵/۴۶	.۰/۰۳
هموسيستئين(ميکرومول بر لیتر)	۲/۶۷±۱۵/۲۷	۲/۱۲±۱۹/۱۶	۶۸/۱۶	۱۱/۲۰	.۰/۰۰۴

چربی، شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در گروه تجربی پس از ۱۲ هفته تمرین هوایی بود. در یک مطالعه طولی نشان داده شد که افزایش وزن مربوط به سن در حدود ۰/۳ کیلوگرم در سال برای مردان و ۰/۵۵ کیلوگرم در سال برای زنان است. مقایسه در درون گروههای سنی و جنسی نشان می‌دهد که مردان و زنان کم تحرک جوان و مسن نسبت به ورزشکاران جوان یا مسن یا مردان و زنانی که از نظر بدنی فعال هستند، چاقی بدنی کلی بیشتری دارند. یک هدف مهم می‌تواند پیشگیری، کاهش یا دستکاری این تغییر در ترکیب‌های بدنی افراد

بحث و نتیجه‌گیری  
با توجه به این که در مطالعه‌های مختلف نشان داده شده است که تمرین هوایی می‌تواند باعث کاهش عوامل مؤثر در افزایش ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی شود (۱۶-۱۸)، لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر ۱۲ هفته تمرین هوایی بر روی تردیمیل، بر وزن، درصد چربی، شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به باسن و سطح هموسيستئین در زنان سالمند اصفهان بود.

نتایج تحقیق حاضر بیانگر کاهش معنی‌داری در ویژگی‌های پیکرستنجی از قبیل؛ وزن بدن، درصد

نشانه کاهش بیشتر بافت چربی شکمی در مقایسه با بافت چربی زیر جلدی سرینی و رانی باشد(۲۴). در تحقیق حاضر نیز نسبت دور کمر به باسن کاهش یافت که می‌تواند در کاهش خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی-عروقی نقش مهمی داشته باشد.

همچنین، نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، سطح هموسیستئین در گروه مداخله پس از ۱۲ هفته تمرین هوایی به طور معنی داری کاهش یافت، گزارش شده است که افراد چاق در سیستم التهابی افزایش نشان می‌دهند و بیشتر در معرض بیماری‌های قلبی-عروقی قرار می‌گیرند(۲۵). راندو و همکاران<sup>(۳)</sup> نیز اثر یک برنامه تمرینی شش ماهه را بر سطح هموسیستئین زنان چاق با سندروم تخمدان پلی سیستیک مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن بود که تمرین، سبب کاهش سطح هموسیستین می‌شود(۷). این یافته‌ها با نتایج تحقیق حاضر هم خوانی دارد. مدت، شدت و نوع ورزش می‌تواند بر سطح هموسیستئین مؤثر باشد، اگر چه به سطح آمادگی هر شخص نیز بستگی دارد(۱۲). اوکورا و همکاران<sup>(۳)</sup> در تحقیقی نشان دادند، تغییرات در هموسیستئین در اثر تمرین‌های منظم هوایی به طور منفی با خط پایه هموسیستئین ارتباط دارد و در افراد با هموسیستئین بالا در اثر تمرین‌های منظم هوایی کاهش معنی داری در هموسیستئین تا رسیدن به

بزرگ‌سال از طریق تمرین‌های استقامتی باشد(۱۹). اکسایش اسیدهای چرب آزاد در تمرین‌ها با شدت متوسط و بلند مدت که با ۵۰ درصد حداقل اکسیژن مصرفی انجام می‌شوند، ممکن است ۹۰ درصد از متابولیسم اکسیداتیو را تشکیل دهند(۲۰). در اثر فعالیت هوایی به علت افزایش تراکم میتوکندری، ظرفیت آنزیم‌های اکسایشی در عضلات، فعالیت آنزیم‌های زنجیر انتقال الکترون، فعالیت آنزیم‌های دخالت کننده در اکسایش چربی‌ها، خصوصاً آنزیم‌های چرخه بتا اکسیداسیدن و همچنین فعالیت لیپو پروتئین لیپاز و اکسیداسیپون چربی‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر برآثر تمرین هوایی، تراکم گیرنده بتا آدرنرژیک در سطح سلولی بافت چربی و در نتیجه حساسیت آنها در برابر فرآیند لیپولیزی افزایش می‌یابد(۲۱). به نظر می‌رسد که محرک اصلی این روند، توزیع کاتکولامین‌ها و کاهش انسولین در اشر فعالیت هوایی و افزایش اکسایش چربی‌ها باشد(۲۲). معیار اندازه دورکمر به باسن معیار مناسب دیگری برای پیش‌بینی خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی عروقی در افراد می‌باشد(۲۳).

نتایج تحقیق راس و جانسن<sup>(۱)</sup> (۲۰۰۰) نشان داد که کاهش وزن ناشی از فعالیت ورزشی در مردان مسن به کاهش بیشتری در بافت چربی زیر جلدی شکمی نسبت به بافت چربی رانی می‌انجامد(۲۴). از آنجایی که بافت چربی زیر جلدی شکمی در افزایش عوامل خطر متابولیکی، به ویژه مقاومت انسولین به صورت مستقل دخالت دارد(۱۹)، کاهش نسبت دور کمر به باسن، پس از یک برنامه کاهش وزن می‌تواند

1-Ross & Janssen  
2- Randeva et al  
3-Okuara et al

هموسیستئین شود. این در حالی است که تمرین‌ها با فشار پایین در طول دوران زندگی بر کلیه فاکتورهای سلامتی مؤثر می‌باشد<sup>(۳)</sup>.

گک و همکاران<sup>(۴)</sup> (۲۰۰۷) نیز اثر یک جلسه تمرین هوایی زیر بیشینه را بر مردان جوان مورد بررسی قرار دادند و افزایش معنی‌داری در سطح هموسیستئین مشاهده نمودند<sup>(۵)</sup>. نتایج این تحقیق‌ها با یافته تحقیق حاضر مغایر است. به نظر می‌رسد تمرین‌های با شدت بالا باعث افزایش نقل و انتقال گروه متیل می‌شود که محصول هموسیستئین را افزایش می‌دهد. متیونین در ابتدا به S-آدنوزیل متیونین تبدیل می‌شود. وقتی انتقال دهنده‌های گروه متیل به هر طریق، از جمله تمرین‌های شدید افزایش یابند، تولید هموسیستئین افزایش می‌یابد<sup>(۶)</sup>. از دیگر دلایل مغایرت این است که این تحقیق‌ها با شدت بالا و در یک جلسه انجام شده‌اند. نشان داده شد که تمرین‌های شدید و طولانی مدت، متابولیسم پروتئین و غلظت‌های خونی آمینو اسیدهای معین را تغییر می‌دهد و باعث کاهش در سطوح متیونین می‌شود. کاهش در دسترس بودن متیونین، سنتز متیونین را افزایش می‌دهد، بنابراین منجر به انباستگی هموسیستئین می‌شود. در این مسیر مکانیسم نقل و انتقال پروتئین، غلظت هموسیستئین را در طول تمرینات طولانی و شدید افزایش می‌دهد<sup>(۷)</sup>.

1-Vincent et al  
2-Ducan et al  
3-Gelecek et a  
4-Gelecek et al

میزان طبیعی دیده می‌شود<sup>(۸)</sup>. نمازی و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیقی که اثر تمرین مقاومتی دایره‌های کوتاه مدت بر سطح سرمی هموسیستئین و در زنان فعال و غیرفعال را ارزیابی کردند، نشان دادند که غلظت هموسیستئین در همه گروه‌ها کاهش یافت<sup>(۹)</sup>، که با نتیجه تحقیق حاضر همخوانی دارد. احتمالاً دلیل همخوانی نتایج، بلند مدت بودن زمان تمرین در هر دو مطالعه می‌باشد.

نتایج تحقیق حاضر با مطالعه وینسنت و همکاران<sup>(۱۰)</sup> (۲۰۰۶) صرف نظر از نوع تمرین، موافق است. این تحقیق تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطح هموسیستئین را بر زنان چاق و طبیعی سالمند ۷۲-۶۰ ساله مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که سطح هموسیستئین پس از شش ماه تمرین کاهش یافت<sup>(۱۱)</sup>. تمرین‌های هوایی احتمالاً از طریق افزایش جذب ویتامین‌های مؤثر در چرخه هموسیستئین به ویژه در روده افراد سالمند که میزان جذب ویتامین‌های گروه جذب از روده آنها کاهش می‌یابد، به کاهش میزان هموسیستئین و تبدیل هموسیستئین به متیونین و سیستئین کمک می‌کند و از انباستگی آن در خون جلوگیری می‌کند<sup>(۱۱)</sup>.

در مطالعه دونکن و همکاران<sup>(۱۲)</sup> (۲۰۰۴) که بر روی مردان ۴۸ ساله انجام شد، در گروه‌های با تمرین‌های شدید و بسامدهای مقاومت افزایش اندکی در هموسیستئین مشاهده شد، لذا با توجه به مکانیسم احتمالی هموسیستئین می‌توان گفت، تمرین‌های با شدت‌های بالا ممکن است، باعث افزایش سطح

در مجموع این مطالعه نشان داد که فعالیت

بدنی و ورزش می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری

از بیماری‌های قلبی-عروقی ایفا کند. در نتیجه دست

اندرکاران ورزش کشور باید یک برنامه جامع برای

ورزش سالمدان طراحی کنند.

یکی از محدودیت‌های این تحقیق عدم کنترل

دقیق رژیم غذایی سالمدان بود. از آنجایی که تغذیه و

رژیم غذایی نیز یک عامل مؤثر بر تغییرات وزن،

درصد چربی و عوامل خطرزای قلبی-عروقی است،

لذا پیشنهاد می‌گردد در تحقیقات آتی اثر تمرین و

رژیم غذایی بر این متغیرها بررسی گردد. همچنین با

توجه به نتایج این تحقیق توصیه می‌گردد که شرایط

مناسب‌تری در سطح جامعه برای ورزش سالمدان

فراهم آید، تا بتوان هزینه‌های بسیار زیاد درمان را

کاهش داد.

### تقدیر و تشکر

این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی در

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسکان (اصفهان) بود.

بدین‌وسیله از همکاران حوزه پژوهشی و کلیه

سالمدان و کارکنان مجتمع امام خمینی وابسته به

شهرداری اصفهان تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

# Effects of Aerobic Training on Body Composition and Serum Homocysteine in Elderly Women

Taghian F\*,  
Esfarjani F\*\*.

\* Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences ; Islamic Azad University, Khorasan(Isfahan) Branch, Isfahan , Iran.

\*\*Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences , University of Isfahan , Isfahan , Iran

Received:07/04/2011

Accepted:29/04/2011

IRCT ID: IRCT201107036939N1

Corresponding Author: Taghian F  
Email: f\_taghian@yahoo.com

## ABSTRACT:

**Introduction & Objective:** The elevated plasma homocysteine (HCY) has emerged as a novel cardiovascular biomarker. The aim of this study was to determine the effects of a 12 week aerobic training on body composition and levels of serum homocysteine in women aged 60-75.

**Materials & Methods:** The present clinical trial study was conducted at Imam Khomeyni Cultural Center of Isfahan, Iran, in 2010. After medical examination, 30 elderly women with similar age and weight were randomly divided into two groups: control and experimental. Weight, BMI, WHR and body fat percentage were measured using the body composition analyzer. Fasting blood samples were taken. Moreover, homocysteine levels were measured by ELISA. Afterwards, the experimental group executed an aerobic training on treadmill (walking) three times a week for three months. After three months, all variables in both groups were measured once more. The collected data were analyzed by the SPSS software. Paired t-test and analysis of covariance was used to analyze the data.

**Results:** The results showed that a significant decrease in weight, fat percentage, body mass index, waist hip ratio parameters and homocysteine levels in the experimental group was observed, before and after the 12 week exercise period ( $p \leq 0.05$ )

**Conclusion:** According to the results of the present study, regular and controlled aerobic endurance exercise programs of 12 weeks, with moderate-intensity of increased skeletal muscle capacity use of lipids, may play an important role in weight control in obese individuals and decrease their cardiovascular disease risk factors.

**Key words:** body composition, homocysteine, elderly, training

## REFERENCES:

- 1.Cris A. Slentz JA. Houmard JL. Johnson LA. Bateman, Charles. Inactivity , exercise training and detraining, and plasma lipoproteins. STRRIDE: a randomized, controlled study of exercise intensity and amount. *Appl Physiol* 2007;103: 432-42.
- 2.Anne Marie W. Petersen and Bente Karlund Pedersen. The anti-inflammatory effect of exercise. *J Appl Physiol* 2005; 98: 1154.
- 3.Duncan G, Perri M, Atnon S, Limacher M, Martin A, Lovental D, et al. Effect of exercise on emerging and traditional cardiovascular risk factors. *J Ypmed* 2004; 10: 10-6.
- 4.Randy W. Braith KJ. Stewart, Resistance exercise training. Its role in the prevention of cardiovascular disease. *Circulation* 2006; 113: 2642- 50.
- 5.Wald DS, Law M, Morris JK. Homocysteine and cardiovascular disease: evidence on causality from a meta-analysis. *BMJ* 2002; 325: 1202.
- 6.Cai BZ, Gong DM, Liu Y, Pan ZW, Xu CQ, Bai YL, et al. Homocysteine inhibits potassium channels in human atria myocytes. *Clin Exp Pharmacol Physiol* 2007; 34: 851-5.
- 7.Randeva HS, Krzysztof CL, Józef D, Katherine BW, Chris O. Exercise decreases plasma total homocysteine in overweight young women with polycystic ovary syndrome. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism* 2002; 87(10): 4496-501.
- 8.Kamangar F. Investigation of plasma homocysteine concentration effect on men atherosclerosis occurrence, for the degree of common hygiene. *Tehran Univ Med & Hygiene Res Center* 2000; 10: 3-10.
- 9.Fakhr Zadeh H, Ghotbi S, Heshmat R, Ebrahim R, Nory M, Shafaee A, et al. Investigation of effective factors on 25-64 urban population inhabited in population research site of Tehran medic science. *Iranian J Diabet Lipid Disorders* 2005; 5(2): 163-174.
- 10.Ko Kuo H, Sorond FA, Chen JH, Hashmi A, Milberg WP, Lipsitz L A. The role of homocysteine in multisystem age-related problems: A systematic review. *Journal of Gerontology Medical Sciences* 2005;9: 1190-201
11. Manor MM, Joubert LM. Exercise, Nutrition, and homocysteine. *International Journal Of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 2006; 16: 341-61.
- 12.Emine S, Aysen A, Filiz Ö, Ömer Ç. Lipid profile and levels of homocysteine, leptin, fibrinogen and C-reactive protein in hyperthyroid patients before and after treatment. *January Faqs Org Aarticles* 2010; 1:
- 13.Manuela DS, Giuseppe BW, Giuliana S. Association of recreational physical activity with homocysteine, folate and lipid markers in young women. *Eur J Appl Physiol* 2009; 105:111.
- 14.Prerost M, Feldman B, Herbert W. Homocystein, fibrinogen and physical activity in human males with coronary artery disease. *Int J haemato* 1999; 9: 25-30.
- 15.Nygard O, Refsum H, Ueland Per M, Vollset Stein E. Major/lifestyle determinants of plasma total homocysteine distribution: The Hordaland Homocysteine Study. *Am J Clin Nutr* 1998; 67: 263-70.
- 16.Kelley GA, Kelley KS. Effects of exercise and physical activity on homocysteine in adults: a meta- analysis of randomized controlled trials. *Journal of Exercise Physiology* 2008; 11(5): 12-23.
- 17.Clarkson PM. Micronutrients and exercise: antioxidants and minerals. *J Sports Sci* 1995; 13: 11- 24.
- 18.Vincent HK, Cheryl B, Kevin RV. Resistance training lowers exercise-induced oxidative stress and homocysteine levels in overweight and obese older adults. *Obesity* 2006; 14: 1921-30.
- 19.Faramarzi M. Endurance Exercise and Adipose Tissue , Barbara , N. 1<sup>th</sup> ed. Takvir; Tehran; 2008: 210-8.
- 20.Taghian F. Effect of aerobic training on plasma leptin levels in obese women. *Iranian Journal of Research in Sports Science* 2006;11: 44.
- 21.Asgari AR, Mehrani HA. Biochemistry and exercise.1<sup>th</sup> ed. Noorpardazan: Tehran; 2002; 200-5.
- 22.Stich V, Glisezinski I. De Adipose tissue lipolysis is increased during a repeated bout of aerobic exercise . *J App Physiol* 2000;88: 1983 .

- 23 .Christophe Delecluse , et al. Exercise programs for older men: mode and intensity to induce the highest possible health- related benefits. Preventive Medicine 2004; 39: 823-33.
- 24.Ross R, Janssen I. Exercise alone is an effective strategy for reducing obesity and related comorbidities. Exerc Sport Sci Rev 2000; 28: 165-71.
- 25.Ryan AH, Jaume P, Kevin PH, Lawrence DR, Janet PW. The flow-mediated dilation response to acute exercise in overweight active and inactive men. Obesity (Silver Spring) 2008; 16(3): 578-84.
- 26.Okura T, Rankinen T, Gagnon G, Cacan S, Davignon J, Leon A, et al. Effects of regular Exercise on homocysteine concentrations: The HERITAGE Family Study. J Appl Phys 2006; 98: 394-401.
- 27.Namazi A, Agha Alinejad H, Piry M, Rahbarizadeh F. Effect of short long circles resistance training on serum levels of homocysteine and CRP in active and inactive women. Journal of Endocrinology and Metabolism 2010; 12(2): 169-76.
- 28.Gelecek N, Teoman N, Ozdirenc M, Pinar L, Akan P, Bediz C, Kozan O. Influences of acute and chronic aerobic exercise on the plasma homocysteine level. Ann Nutr Metab 2007; 51(1): 53-8.

Archive of SID