

تعیین ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس پونه کوهی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

رزاق محمودی^۱، حسین تاجیک^{۲*}، امیر عباس فرشید^۳، علی احسانی^۴، پیمان زارع^۵، مهران مرادی^۶

^۱ دانشگاه تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، ^۲ دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، ^۳ دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، ^۴ دانشگاه تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، ^۵ دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی اهر، گروه علوم و صنایع غذایی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۲/۲۰ | تاریخ پذیرش: ۹۰/۵/۱۸

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به افزایش مقاومت دارویی میکروارگانیسم‌ها و تمایل به استفاده از نگهدارنده‌های طبیعی، هدف از این مطالعه تعیین ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس پونه کوهی علیه استافیلوکوکوس اورئوس بود.

روش بررسی: در این مطالعه ترکیب‌های شیمیایی اسانس پونه کوهی با استفاده از روش گازکروماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی، فعالیت ضد باکتریایی آن (تعیین حداقل غلظت ممانعت از رشد) علیه استافیلوکوکوس اورئوس به روش میکرودایلوشن و تغییرات مورفولوژی و ساختمان غشاء سلولی این باکتری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره ارزیابی شدند. داده‌ها با آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: آنالیز شیمیایی اسانس پونه کوهی منجر به شناسایی ۲۲ ترکیب با مجموع ۹۵/۳ درصد در آن شد. پولگون (۴/۳۱ درصد)، ۸-۱ سینئول (۸۹/۱۵ درصد)، متوفوران (۸/۱۱ درصد) و سیس ایزو پولگون (۷۴/۹ درصد) ترکیب‌های عمده اسانس را تشکیل می‌دادند. حداقل غلظت ممانعت از رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محدوده ۷۵ تا ۱۲۰۰ میکروگرم در میلی‌لیتر قرار داشت.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد اسانس پونه کوهی از توان ضد میکروبی بسیار بالایی برخوردار است، بنابراین می‌توان از آن در ترکیب با سایر نگهدارنده‌ها جهت محافظت مواد غذایی در مقابل میکروارگانیسم‌های عامل عفونت و مسمومیت بهره جست.

واژه‌های کلیدی: پونه کوهی، اسانس، استافیلوکوکوس اورئوس

*نویسنده مسئول: حسین تاجیک، ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
Email: h.tajik@urmia.ac.ir

میکروبی اسانس‌های گیاهی و ترکیب‌های

مونوتروپینیدهای آنها می‌باشد^(۴).

مسومیت غذایی استافیلولکوکی از مهم‌ترین مسمومیت‌های غذایی به شمار می‌آید، به طوری که از مجموع حدود ۲۶ میلیون مورد کل مسمومیت‌های غذایی گزارش شده در کشور ایالات متحده امریکا ۸/۹ میلیون مورد آن مربوط به استافیلولکوکوس اورئوس بوده که بیش از یک سوم موارد کل مسمومیت‌های غذایی در این کشور است^(۵). به طور کلی، گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که این میکروارگانیسم از مهم‌ترین باکتری‌های بیماری‌زا در ارتباط با صنایع فرآورده‌های شیر و گوشت و بسیاری از مواد غذایی دیگر می‌باشد^(۶). از آنجا که استافیلولکوکوس اورئوس توزیع بسیار گسترده‌ای داشته و حذف کامل آن در بعضی غذاها غیر ممکن است، کنترل رشد آن در غذا ضروری است. بنابراین تلاش برای یافتن نگهدارنده مناسب جهت جلوگیری از رشد این باکتری خواهد بود^(۷).

گیاه پونه کوهی^(۸) از اعضای خانواده لامیناسه^(۹) بوده و به صورت یک گیاه چند ساله می‌باشد. این جنس شامل بیش از ۲۵ گونه است و به صورت وحشی در مناطق مرطوب نواحی مرکزی و جنوب اروپا، جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا می‌روید^(۱۰). از قسمت‌های مختلف این گیاه در ترکیب ادویه جات تجاری به عنوان طعم دهنده در غذا استفاده می‌شود^(۱۱). خصوصیات

1-Mentha longifolia L.

2-Laminaceae

افزایش مقاومت دارویی میکروارگانیسم‌ها و عدم کفایت داروهای شیمیایی معمول مورد استفاده در درمان بیماری‌های عفونی از یک سو و افزایش آکاهی و توجه هر چه بیشتر مصرف کنندگان و متولیان بهداشتی به اثرات مضر نگهدارنده‌های غذایی شیمیایی و سنتیک از سوی دیگر، موجب انجام تحقیق‌های گستردۀ جهت دستیابی به ترکیب‌های طبیعی با دامنه وسیع فعالیت‌های بیولوژی مشتق از منابع گیاهی، حیوانی و میکروبی شده است، تا علاوه بر افزایش ماندگاری غذا از اثرات مضر نگهدارنده‌های شیمیایی مصون باشد^(۱۲). اثرات ضد میکروبی اسانس‌های گیاهی علیه باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در بسیاری از مطالعه‌ها تأیید شده و در بسیاری از موارد این خصوصیات را در ارتباط با حضور اجزای فعال مونوترپین‌ها گزارش نموده‌اند^(۱۳).

مکانیسم عملکردی اسانس‌ها در ارتباط با ترکیب شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی آنها بوده، ولی در تمامی موارد از مکانیسم مشابهی برخوردار نیستند، با وجود این در اغلب موارد تأثیر اسانس‌های گیاهی بر ساختار دیواره سلولی تأیید شده است^(۱۴). ویژگی آبگریزی اسانس‌ها سبب نفوذ آنها در لیپید غشاء سلولی و افزایش نفوذپذیری آن می‌گردد، که این امر سبب اختلال در کلیه فعالیت‌های حیاتی وابسته به غشاء سلولی، خروج یون‌ها، ترکیب‌های حیاتی و در نهایت مرگ سلول خواهد شد^(۱۵). اثرات سمی روی ساختار و عملکرد غشاء به طور کلی توجیه کننده عملکرد ضد

اقتصادی تولید محصولات غذایی و نیز از بهداشت و سلامت آن اطمینان حاصل نمود.

هدف از این مطالعه تعیین ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس پونه کوهی علیه استافیلوكوکوس اورئوس بود.

روش بررسی

این مطالعه تجربی از آبان ماه سال ۱۳۸۹ به صورت مشترک در دانشگاه ارومیه و تبریز آغاز شد، گیاه پونه کوهی پس از جمع آوری به وسیله گروه گیاه‌شناسی پژوهشکده گیاهان دارویی تهران وابسته به جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر صحت نام علمی تأیید شد. به متوجه استخراج اسانس گیاه پونه کوهی، بخش‌های گیاه خشک شده کاملاً آسیاب گردید و با استفاده از یک دستگاه گلونجر به مدت ۳ ساعت روغن آن به روش نقطیزیر با آب، استخراج شد. پس از آبگیری به وسیله سولفات سدیم خشک، تا هنگام تعیین خواص ضد باکتریایی آن و همچنین تشخیص و تعیین ترکیب‌های تشکیل دهنده، اسانس در ظروف شیشه‌ای تیره و در دمای یخچال نگهداری گردید.

نمونه‌های آماده شده به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق شد و مناسب‌ترین برنامه‌ریزی دمایی ستون برای جداسازی کامل ترکیب‌های اسانس به دست آمد. همچنین درصد ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس و شاخص بازداری هر ترکیب محاسبه گردید. سپس اسانس به دستگاه

درمانی گیاه پونه کوهی در برطرف کردن اختلالات گوارشی، استفراغ، بی اشتهايی، کولیت اولسراتیو و اختلالات کبدی به اثبات رسیده است(۱۴ و ۱۳). امروزه خصوصیت ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره بسیاری از گونه‌های گیاه پونه کوهی شامل؛ ممتاز پیپریتا، ممتاز روتوندیفولیا، ممتاز پولگیوم و ممتاز لونگیفولیا ثابت شده است(۱۵ و ۱۶).

اغلب تحقیقات در زمینه اثرات ضد میکروبی اسانس‌ها ابتدا در محیط آزمایشگاهی انجام گرفته و سپس خصوصیات کاربردی آنها در مدل‌های غذایی ارزیابی شده است. لزوم به کارگیری غاظت‌های بالاتر اسانس در غذا در مقایسه با شرایط آزمایشگاهی نشان دهنده پیچیده بودن شرایط رشد در غذا است که می‌تواند اثرات محافظتی روی سلول‌های میکروبی در مقابل ترکیب‌های ضد میکروبی داشته باشد، این امر از یک طرف به دلیل تأثیرات نامطلوب ارگانولپتیکی در غذا و از سوی دیگر به علت اقتصادی نبودن استفاده از یک نگه دارنده به تنها بی در مقاییر زیاد، موجب محدود شدن کاربرد اسانس‌های گیاهی به تنها در مواد غذایی شده است(۱۷ و ۱۸). در جهت تأیید فواید کاربرد محافظت کننده‌ها و ترکیب‌های ضد میکروبی طبیعی، بایستی این ترکیب‌ها به تنها یا با به صورت توأم با سایر فاکتورهای محافظتی مواد غذایی، برای ایجاد اثرات سینرژیستی مورد بررسی قرار گیرند(۱۹).

با توجه به موارد فوق، در صورت استفاده مواد نگهدارنده در یک سیستم ترکیبی می‌توان از ابعاد صرفه

۱۰ درصد در بالاترین غلظت مورد استفاده در این تحقیق (۴۸۰۰ میکروگرم در میلی لیتر) حل گردید، سپس ۶ رقت متواالی از این اسانس به صورت رقت های سریالی در محدوده ۷۵-۴۸۰۰ میکروگرم در میلی لیتر در لوله های آزمایش استریل حاوی ۱۰ میلی لیتر براث تهیه شد.

حداقل غلظت های ممانعت کننده اسانس پونه کوهی بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بر اساس روش میکرو ول دایلوشن^(۴) تعیین شد(۱۷). در هر چاهک میکروپلیت مقدار ۹۵ میکروگرم نوتربینت براث و ۵ میکروگرم از کشت باکتری استاندارد شده با ۵/۰ مک فارلنند اضافه شد. در ادامه ۱۰۰ میکروگرم از محلول های استوک آماده شده اسانس با غلظت های مورد مطالعه به ترتیب از بالاترین غلظت در هر چاهک اضافه شد. لازم به ذکر است که در هر سری آزمایش در هر کدام از فاز های یاد شده، کنترل مثبت و کنترل منفی در نظر گرفته شد. برای تنظیم pH محیط کشت از اسید استیک ۱ نرمال استفاده شد. در ادامه میکروپلیت ها به مدت ۲۰ ثانیه با دور ۳۰۰ دور در دقیقه شیک شده و در دماهای ۱۵، ۲۵ و ۳۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت گرم خانه گذاری شدند. سپس در پایان زمان انکوباسیون (۲۴ ساعت) مقداری حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد و حداقل غلظت کشنده باکتری بر حسب میکروگرم به ازای میلی لیتر

گاز کروماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی نیز تزریق شده و طیف جرمی ترکیب ها به دست آمد. شناسایی ترکیب های اسانس با استفاده از شاخص بازداری و بررسی طیف های جرمی هر یک از اجزای اسانس و مقایسه آنها با طیف های مرجع انجام شد. در این مطالعه دستگاه گازکروماتوگراف از نوع Agilent 6890 با ستون مویینه به طول ۳۰ متر، قطر داخلی ۰/۲۵ میلی متر و ضخامت لایه داخلی ۰/۲۵ میکرومتر از نوع HP-5MS با برنامه دمایی ستون در ابتدا به صورت ۵۰ درجه سانتی گراد با توقف ۵ دقیقه در این دما و سپس افزایش دمای تا ۲۴۰ درجه سانتی گراد با سرعت ۱۵ درجه در هر دقیقه، و افزایش دمای ستون تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳ دقیقه استفاده شد. دمای اتاقک تزریق ۲۹۰ درجه سانتی گراد بود و از گاز هلیوم به عنوان گاز حامل با سرعت جریان ۸/۰ میلی لیتر در دقیقه استفاده شد. طیف نگار جرمی مورد استفاده مدل 5973 Agilent با انرژی یونیزاسیون ۷۰ الکترون ولت و شناساگر EI و دمای منبع یونیزاسیون ۲۲۰ درجه سانتی گراد بود.

ارزیابی حداقل غلظت ممانعت کننده رشد^(۱) این اسانس تحت تأثیر فاکتور های ذکر شده بر روی استافیلوکوکوس اورئوس بر اساس روش توصیف شده گولوس و همکاران^(۲) (۲۰۰۷) انجام شد(۱۷). ابتدا کشت باکتریایی در محیط آبگوشت قلب و مغز^(۳) به مدت ۱۲ ساعت انجام شد، سپس سوسپانسیون باکتریایی با استاندارد ۵/۰ مک فارلنند تنظیم گردید. اسانس گیاه مذکور در محلول دی متیل سولفوکساید

1-Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
2-Gulluce et al
3-Brain Heart Infusion Broth (BHI)
4-Micro-Well Dilution Assay

الكل (استون) در رزيين TAAB embedding قالب‌گيری و سپس در دماي ۷۰ درجه سانتي‌گراد به مدت حداقل ۴۸ ساعت پليميريزه شد. مقاطع با ضخامت ۵۰ نانومتر به وسیله دستگاه اولتراتوم مدل LKB 4801A تهيه شد و دو بار با محلول ۲۰ درصد استات اورانييل در متانول خالص و محلول رينولد (سيترات سديم و نيترات نقره) به مدت ۴۵ دقيقه رنگ آميزي گردید. در نهايىت نمونه به وسیله ميكروسكوب الکترونى گذاره (PHILIPS BIOTWIN 100) در ۷۵ کيلو ولت مورد مشاهده قرار گرفت و الکترون ميكروگراف ها تهيه شد.

داده‌های جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS^(۲) و آزمون آماري آناليز واريанс^(۳) تجزيه و تحليل شدند.

يافته‌ها

بر اساس نتایج حاصله ۲۲ ترکيب از اسانس استخراج شده به وسیله تقطير با آب شناسايي شدند که ۹۵/۳ درصد اسانس را شامل شد. از بين آنها پولگون (۲۱/۵۴ درصد)، ۸-۱ سينئول (۱۵/۸۹ درصد)، متفوفوران (۱۱/۸ درصد) و سيس ايزو پولگون (۹/۷۴ درصد) ترکيب‌های عمده موجود در اسانس گياه را تشکيل دادند (جدول ۱).

1-Transmission Electron Microscope (TEM)
2-Statistical Package for Social Sciences
3-Analysis of Variance(ANOVA)

محاسبه شدند. رشد ميكروبى از طريق بررسى ميزان جذب نوري در طول ۶۰۰ نانومتر ارزيايى شد. جهت تأييد ميزان ۵ ميكروگرم در ميلى لیتر از محتويات چاهک‌های شفاف روی محيط نوترینت آغاز كشت داده شد.

براي ارزيايى تغييرات مورفولوژي و ساختمندانشاي سلولى، باكتري استاقيقلىوكوكوس اورئوس با ميكروسكوب الکترونى گذاره^(۱)، ابتدا باكتري به مدت ۲۴ ساعت در دماي ۳۷ درجه سانتي‌گراد در محيط آبگوشت مغز و قلب گرمخانه‌گذاري شد، سپس سوسپانسيون باكتريابي رشد نموده با استاندارد ۰/۵ مك فارلاند تنظيم شد. ميزان ۱ ميلى لیتر از اين سوسپانسيون به لوله حاوی ۴ ميلى لیتر محيط نوترینت برا ثمتنقل و به مدت ۲۴ ساعت تحت تأثير غلاظت ۳۰۰ ميكروگرم در ميلى لیتر اين اسانس در دماي ۳۷ درجه سانتي‌گراد در شيكر انکوباتور گرمخانه‌گذاري گردید. سپس نمونه باكتريابي پس از برداشت از محيط كشت، به وسیله محلول گلوترآلدهيد ۲/۵ درصد به مدت ۲ ساعت در دماي ۴ درجه سانتي‌گراد فيكس اوليه شد. نمونه با محلول بافر فسفات ۰/۱ (pH=۷/۲) ۲ بار شتتشو داده شد و پلت‌های باكتريابي به كمک سانتريفيوژ با دور پايانين (۳۰۰۰ دور در دقيقه) به مدت ۱۰ دقيقه تهيه شدند. به منظور فيكساسيون ثانويه، نمونه به مدت يك ساعت در محلول تتروكسايد اوسميوم يك درصد قرار داده شد. در ادامه نمونه ۳ بار به وسیله محلول بافر فسفات شتتشو شده و پس از آبگيرى در غلاظت‌های

گسیختگی آن در بسیاری از سلول‌های باکتری تیمار شده با انسان مشهود بود.

بحث

پائین بودن دوز عفونت‌زاویی بسیاری از پاتوژن‌های غذا زاد، نیازمند تحقیقات گسترشده در زمینه ترکیب‌های دارویی جدید با توان باکتری کشی بالا بوده که در جهت نیل به این هدف استفاده از ترکیب‌های روغنی حاصل از گیاهان و ادویه جات جهت تأمین سلامت و بهداشت غذا بسیار حائز اهمیت می‌باشد، در این راستا آگاهی و شناخت مکانیسم‌های عملکردی این ترکیب‌ها، می‌تواند در تشخیص میکروارگانیسم‌های حساس و افزایش کارایی این ترکیب‌ها در سیستم‌های غذایی بسیار مفید و تأثیر گذار باشد(۲۰). هدف از این مطالعه تعیین ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضد میکروبی انسان پونه کوهی علیه استافیلوکوکوس اورئوس بود.

بالاترین ترکیب موجود در انسان پونه کوهی به کار رفته در این مطالعه پولگون بود که اثرات ضد میکروبی آن در مطالعه‌های مختلف گزارش شده است(۲۱-۲۳). در مطالعه صورت گرفته بر روی خصوصیات انسان گیاه متا پیپریتا، ترکیب متول موجود در انسان نقش بسیار مهمی در فعالیت ضد میکروبی آن داشت(۱۷). در مطالعه حاضر نیز این ترکیب با میزان ۷ درصد در انسان حضور داشت.

حداقل غلظت مهارکننده رشد در تیمارهای مختلف ذکر شده در این مطالعه (شرایط مختلف دمایی و pH) در محدوده ۷۵-۱۲۰۰ میکروگرم در میلی‌لیتر قرار داشت. بیشترین میزان ممانعت از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در تیمار دمایی ۸ درجه سانتی‌گراد و pH=۶ به میزان ۷۵ میکروگرم در میلی‌لیتر غلظت انسان مشاهده شد. با کاهش مقایر pH و دما تأثیر ضد میکروبی انسان افزایش یافت. با بالا رفتن دما و pH افزایش همسو در هر دو مورد حداقل غلظت‌های ممانعت از رشد و کشنندگی انسان کاملاً مشهود بود، به گونه‌ای که در تیمار دمایی ۳۵ درجه سانتی‌گراد و pH=۷/۳ میزان حداقل غلظت ممانعت از رشد ۱۲۰۰ میکروگرم در میلی‌لیتر بود(جدول ۲).

در گروه کنترل سلول‌های استافیلوکوکوس اورئوس دارای ساختار مشخص یک باکتری گرم مثبت و به شکل کوکوسی با سطح دیواره سلولی بودند (تصویر ۱). الکترون میکروگراف‌های سلول‌های استافیلوکوکوس اورئوس تیمار شده با انسان آسیب‌های شدید مورفولوژی و نیز غشاء‌های سلولی تخریب شده با نفوذپذیری بالا نسبت به رنگ و هم‌چنین تهی شدن محتويات سلولی و بی‌نظم شدن آن را تأیید نمود(تصاویر ۲ و ۳). هم‌چنین در سلول‌های استافیلوکوکوس اورئوس تیمار شده با انسان برخی از دیواره‌های سلولی به طور کامل از بین رفته و از سلول باکتری جدا شده‌اند(تصویر ۴). نقص و فقدان در بخش‌هایی از دیواره سلولی به همراه تخریب و


جدول ۱: ترکیب‌های شیمیایی اسانس پونه کوهی، زمان بازداری و شاخص بازداری آنها با استفاده از دستگاه کروماتوگراف کازی متصل به طیف نگار جرمی

نام ترکیب	درصد	زمان بازداری(دقیقه)	شاخص بازداری
آلفاپین	۱/۸۶	۱۰/۸۶	۹۲۹
کامفن	۰/۵۷	۱۱/۵۲	۹۵۳
سابین	۰/۵۲	۱۲/۸۱	۹۷۶
۲- بتاپین	۳/۰۷	۱۲/۹۵	۹۸۰
بتامیرسن	۰/۵۰	۱۲/۷۴	۹۹۱
۳- اكتانول	۰/۶۰	۱۲/۹۶	۹۹۳
۱۰۸ سینثول	۱۵/۸۹	۱۵/۸۱	۱۰۳۱
پارامنتا-۳ و ۸ دیئن	۰/۵۴	۱۷/۷۰	۱۰۶۸
ایزوپنتیل-۲-منتیل بوتانوات	۰/۹۱	۱۹/۲۹	۱۰۹۹
پارامنت-۳-ان-۸-ال	۷	۲۱/۶۵	۱۱۴۹
منوفوران	۱۱/۱۸	۲۲/۴۳	۱۱۶۳
سیس ایزو پولگون	۹/۷۴	۲۲/۰۱	۱۱۷۵
بورتئول	۱/۰۱	۲۲/۷۶	۱۱۹۰
نه ایزو دی هیدروکاربئول	۱/۷۸	۲۵/۱۸	۱۲۲۰
پولگون	۳۱/۵۴	۲۶/۲۳	۱۲۴۵
۲- سیکلوهگزان-۱-وان	۳/۸۰	۳۰/۷۷	۱۳۴۲
۱- دسن	۱/۵۸	۳۱/۱۳	۱۳۵۰
پیبریتونون اکساید	۰/۳۴	۳۱/۷۴	۱۳۶۴
سیس جاسمون	۰/۴۰	۳۲/۱۱	۱۳۹۵
۱۰۴- بنزن دی آمین	۰/۳۵	۳۷/۰۲	۱۴۸۹
اسپاتولنول	۰/۵۲	۴۰/۴۵	۱۵۷۵
کاریوفیلن اکساید	۱/۶۰	۴۰/۶۷	۱۵۸۰


جدول ۲: مقایسه نتایج ضد میکروبی اسانس پونه کوهی بر استافیلوکوکوس اورئوس تحت شرایط مختلف دمایی و pH

pH	دما (سانتی گراد)	حداقل غلظت ممانعت کننده (میکرو گرم بر میلی لیتر)	حداقل غلظت کشته باکتری (میکرو گرم بر میلی لیتر)
۶	۲۵	۶۰۰	۲۴۰۰
۷	۱۵	۱۵۰	۶۰۰
۸	۸	۷۵	۱۵۰
۸/۳	۳۵	۱۲۰۰	-*
۹	۱۵	۶۰۰	۲۴۰۰
۹	۸	۳۰۰	۶۰۰


*ممانعت از رشد در حداقل غلظت به کار رفته اسانس مشاهده نشد.




تصویر ۲: گروه تیمار، تغییر شکل طبیعی سلول باکتری، تخریب دیواره سلولی و خروج محتويات آن(میکروسکوپ الکترونی، بزرگنمایی ۵۸۰۰)



تصویر ۱: گروه کنترل، استافیلوكوکوس اورئوس با شکل طبیعی (کوکسی مانند) با دیواره سالم و سطح یکنواخت(میکروسکوپ الکترونی، بزرگنمایی ۵۸۰۰)



تصویر ۳: گروه تیمار، از بین رفتن شکل طبیعی سلول، تخریب کامل ساختار دیواره سلولی و انعقاد محتويات سیتوپلاسمی(میکروسکوپ الکترونی، بزرگنمایی ۵۸۰۰)



تصویر ۴: گروه تیمار، از بین رفتن بخشی از دیواره سلولی، تغییر در دانسیته محتويات سیتوپلاسم سلول باکتری(میکروسکوپ الکترونی، بزرگنمایی ۵۸۰۰)

میکروبی اسانس گیاه پونه کوهی علیه طیف وسیعی از باکتری‌ها از جمله؛ گونه‌های مختلف استافیلوكوکوس، پسودوموناس، باسیلوس و اشرشیا کلی و نیز برخی از گونه‌هایی قارچی از قبیل؛ آسپرژیلوس، فوزاریوم و پنی سیلیلوم مشخص شده است(۱۷).

با توجه به نتایج به دست آمده به وسیله بستی و همکاران^(۲۰۰۷) در ارزیابی تأثیر اسانس

بررسی اثرات باکتری کشی اسانس متا لونگیفولیا علیه میکرواگانیسم‌های اشرشیا کلی، استافیلوكوکوس اورئوس و کاندیدا آلبیکانس نشان داد که نقش ترکیب ۸ و ۱ سینئول در این زمینه بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشد(۲۴). در مطالعه حاضر نیز بر اساس نتایج حاصل ترکیب ۸-۱ سینئول با ۱۵/۸۹ درصد یکی از ترکیب‌های عمده موجود در اسانس بوده که می‌تواند در زمینه فعالیت ضد میکروبی آن نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. توان بالای ضد

1- Basti et al

صدمات کمتر و خفیف در استافیلولوکوکوس اورئوس و میکروکوکوس لوთئوس ۲۴ ساعت بعد از تیمار با اسانس مشاهده گردید(۲۷). اثرات اسانس آویشن شیرازی و نیسین علیه باکتری‌های سالمونلا تیفی موریوم و استافیلولوکوکوس اورئوس در یک مدل سیستم غذایی به همراه تأثیرات آنها بر مورفولوژی و ساختمان دیواره سلولی باکتری‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مطالعه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده این اسانس از فعالیت ضد میکروبی مناسبی علیه هر دو باکتری برخوردار بوده، به گونه‌ای که در بررسی تصاویر میکروسکوپی الکترونی نیز تخریب دیواره سلولی، خروج محتویات سیتوپلاسمی و حتی انعقاد بخشی از آن مشاهده شده است، که این یافته‌ها مؤید فعالیت ضد میکروبی اسانس آویشن شیرازی می‌باشد(۲۸).

در مطالعه انجام شده به وسیله رسولی و همکاران (۲۰۰۶) خصوصیات ضد قارچی اسانس برخی گونه‌های آویشن بر روی آسپرژیلوس نیجر از طریق تعیین حداقل غلظت ممانعت از رشد و بررسی تغییرات مورفولوژی و ساختار سلولی به وسیله میکروسکوپ الکترونی ارزیابی شد، نتایج نشان دهنده تغییرات بسیار شدید و گستردۀ هیف‌ها، دیواره سلولی، غشای سیتوپلاسمی و محتویات این قارچ بود که مؤید توان بالای ضد میکروبی این اسانس می‌باشد(۲۹).

1-Atomic Force Microscope(AFM)
2-Hafedh et al

آویشن شیرازی، pH و دما روی سالمونلا تیفی موریوم و استافیلولوکوکوس اورئوس مشخص شد که فعالیت مهاری اسانس با کاهش pH در تیمارهای مختلف دمایی افزایش می‌یابد، یافته‌های این مطالعه نشان داد که اثرات ضد میکروبی اسانس در pH های مختلف به کار رفته به هنگام کاهش دمای گرمخانه گذاری به ترتیب از ۳۵ به ۲۵ و ۱۵ افزایش می‌یابد. بیشترین خاصیت مهار رشد در دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد به صورت ترکیبی در تیمارهای مختلف pH و غلظت‌های اسانس مشاهده شد(۲۵). در این تحقیق نیز با کاهش pH و دما قدرت ضد میکروبی اسانس علیه باکتری استافیلولوکوکوس اورئوس افزایش یافت که این امر می‌تواند در ارتباط با تأثیر مستقیم pH پایین روی حلالیت بهتر اسانس روغنی در فاز چربی غشای سلولی باکتری باشد(۲۶).

فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه پونه کوهی علیه برخی میکوارگانیسم‌های پاتوژن و نیز بررسی مورفولوژی ساختاری این ارگانیسم‌ها تحت تأثیر اسانس به طریق میکروسکوب نیروی اتمی^(۱) به وسیله هافده و همکاران^(۲۰) ارزیابی گردید. در بررسی‌های صورت گرفته بر روی مورفولوژی و دیواره سلولی باکتری‌های پاتوژن تحت تأثیر غلظت‌های حداقل غلظت ممانعت از رشد این اسانس، صدمات و آسیب‌های شدید مشاهده شد که این خود دلیلی بر توان بالای ضد میکروبی اسانس می‌باشد، صدمات شدید و بزرگی در سلول‌های باکتری‌ای اشرشیاکلی و سالمونلا تیفی موریوم در مقایسه با

از طریق بررسی‌های میکروسکوب الکترونی گذاره آسیب‌ها و صدمات بسیار شدید را تأیید کرده و همچنین نشان می‌دهند که احتمالاً اگزوپلی ساکاریدهای موجود در غشاء خارجی سلول حل گردیده و به بیرون ترشح شده و یا غشاء سیتوپلاسمیک و پپتیدوگلیکان تغییر یافته و از حالت طبیعی خارج شده است (۲۹ و ۳۰).

نتیجه‌گیری

نتایج به دست آمده در بخش تعیین حداقل غلظت ممانعت از رشد و نیز تغییرات مشاهده شده در بررسی‌های مورفولوژی و ساختمان دیواره سلولی با استفاده از میکروسکوب الکترونی گذاره نشان دهنده توان بالای ضد میکروبی اسانس پونه کوهی علیه استافیلوکوکوس اورئوس می‌باشد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر استفاده از اسانس این گیاه می‌تواند در جهت محافظت از غذا و کنترل میکروارگانیسم‌های عامل فساد و پاتوژن، به جای نگهدارنده‌های شیمیایی و مصنوعی و نیز کنترل بیماری‌های میکروبی انسان و گیاهان در ترکیب با سایر نگهدارنده‌های طبیعی مورد توجه و بررسی بیشتری قرار گیرد.

تقدیر و تشکر

این مطالعه با همکاری مشترک دانشکده‌های دامپزشکی دانشگاه ارومیه و تبریز انجام شد.

در مورد نحوه عمل اسانس‌ها در مرگ باکتری‌های بیماری‌زا چنین اظهار شده است که یکی از ویژگی‌های مهم این مواد و ترکیب‌های آن خاصیت آب گریزی است که سبب می‌شود در بخش‌های لبپیدی دیواره سلولی و میتوکندریایی باکتری توزیع شده و موجب تغییر و تخریب ساختمان و نفوذپذیری بیشتر آنها گردد (۳۰). به دنبال آن بخش زیادی از یون‌ها و دیگر محتویات حیاتی سلول به بیرون تراویش می‌نماید که در نهایت منجر به مرگ باکتری می‌شود (۳۱). همچنین این ترکیب‌ها قادر به ایجاد اختلال در عملکرد آنزیم‌های متصل به غشاء سلولی بوده که نهایتاً منجر به ایجاد نقص در سنتز بسیاری از ترکیب‌های پلی ساکاریدی دیواره سلولی و ممانعت از رشد سلول و مورفوژن آن خواهد شد (۳۲). در مطالعه حاضر بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی‌های میکروسکوب الکترونی گذاره تغییر حالت طبیعی مورفولوژی و ساختار دیواره سلولی باکتری کاملاً مشهود بود. در حالی که در نمونه کنترل دیواره سلولی ظاهری طبیعی داشت. تغییر در ضخامت دیواره سلولی، گسیختگی و ایجاد حالت حفره در بخش‌هایی از آن وجود داشت. این نتایج در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته بر روی خصوصیات ضد میکروبی اسانس‌ها و نیز بررسی‌های میکروسکوپی مورفولوژی و ساختمان دیواره سلولی گزارش شده است. تغییرات مشاهده شده در مورفولوژی و ساختمان سلولی این باکتری در حالتهای قبل و بعد از تیمار با اسانس پونه کوهی

REFERENCES:

1. Abad MJ, Ansuategui M, Bermejo P. Active antifungal substances from natural sources. *Archivoc* 2007;7: 116-145.
2. Hausner M, Wuertz S. High rates of conjugation in bacterial biofilms as determined by quantitative *in situ* analysis. *Appl Environ Microbiol* 1999; 65: 3710-13.
3. Burt S. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods- a review. *Int J Food Microbiol* 2004; 94: 223-53.
4. Morris JA, Khettry A, Seitz EW. Antimicrobial activity of aroma chemicals and essential oils. *J Am Chem Soc* 1979; 56: 595-603.
5. Knobloch K, Pauli A, Iberl B. Antibacterial activity and antifungal properties of essential oil components. *J Essent Oils Res* 1988; 1: 119-28.
6. Palmer AS, Steward J, Fyfe L. The potential application of plant essential oils as natural preservatives in soft cheese. *Food Microbiology* 2001; 18: 463-70.
7. Gill AO, Holley RA. Disruption *E. Coli*, *Listeria monocytogenes* and *Lactobacillus sakei* cellular membranes by plant oil aromatics. *Int J Food Microbiol* 2006; 108: 1-9.
8. Ultee A, Kets EPW, Alberda M. Adaptation of the food-borne pathogen *Bacillus cereus* to carvacrol. *Arch Microbiol* 2000; 174(4): 233-8.
9. Ultee A, Bennik HJ, Moezelaar R. The phenolic hydroxyl group of carvacrol is essential for action against the food-borne pathogen *Bacillus cereus*. *Applied And Environmental Microbiology* 2002; 68: 1561-8.
10. Lambert RJW, Skandamis PN, Coote P. A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol. *J Appl Microbiol* 2001; 91: 453-62.
11. Jay MJ. Modern Food Microbiology. 7th ed. An Aspen Publication:Texas; 2005; 323,441-6.
12. Normanno G. Coagulase-positive *Staphylococci* and *Staphylococcus aureus* in food products marketed in Italy. *International Journal of Food Microbiology* 2005; 98: 73-9.
13. Nunez M, Rodriguez JL, Garcia E, Gaya P, Medina M. Inhibition of *Listeria monocytogenes* by enterocin 4 during the manufacture and ripening of Manchego cheese. *Journal of Applied Microbiology* 1997; 83: 671-7.
14. Blackburn CW, Peter JM. Foodborne Pathogens, Hazard, risk analyses and control, food protection 2002; 8: 385-90.
15. Lange BM, Croteau, R. Genetic engineering of essential oil production in mint. *Current Opinion in Plant Biotechnology* 1999; 2: 139-44.
16. Moreno L, Bello R, Primo-Yufera E, Esplugues J. Pharmacological properties of the methanol extract from *Mentha suaveolens* Ehrh. *Phytotherapy Research* 2002; 16: 10-13.
17. Gulluce M, Sahin F, Sokmen M, Ozer H, Daferera D, Sokmen A, et al. Antimicrobial and antioxidant properties of the essential oils and methanol extract from *mentha longifolia* L ssp. *longifolia* *Food Chem* 2007; 103: 1449-56.
18. Codd LE. The genus *Mentha*. *Flora of Southern Africa* 1985; 28(4): 107-11.
19. Daferera DJ, Ziosoglou BN, Polissiou MG. The effectiveness of plant essential oils on the growth of *Botrytis cinerea*, *Fusarium* sp. and *Clavibacter michiganensis* subsp. *Michiganensis* *Crop Protection* 2003; 22, 39-44.
20. Kaur C, Kapoor HC. Anti-oxidant activity and total phenolic content of some Asian vegetables. *International Journal of Food Science and Technology* 2002; 37(2): 153-61.
21. Arques JL, Rodriguez E, Gaya P, Medina M, Nunez M. Effect of combinations of high pressure Treatment and bacteriocin producing lactic acid bacteria on survival of *listeria monocytogenes* in raw milk cheese. *International Dairy Journal* 2005; 15: 898-900.
22. Zhang CY, Yam KL, Chikindas ML. Effective control of *Listeria monocytogenes* by combination of nisin formulated and slowly released in to a broth system. *International Journal of Food Microbiology* 2004; 90: 22-5.
23. LopezMalo A, Alzamora SM, Argaiza A. Vanillin and Ph synergistic effect on mold growth. *J Food Sci* 1998; 63: 143-6.
24. Gill AO, Holley RA. Disruption of *E coli*, *Listeria monocytogenes* and *Lactobacillus sakei* cellular membranes by plant oil aromatics. *Int J Food Microbiol* 2006; 108: 1-9.
25. Basti AA, Misagh A, Khaschabi D. Growth response and modelling of the effects of *Zataria multiflora* Boiss. essential oil, pH and temperature on *Salmonella typhimurium* and *Staphylococcus aureus*. *LWT- Food Science and Technology* 2007; 40(6): 973-81.

- 26.Karaman I, Sahin F, Gulluce M, Ogutcu H, Sengul M, Adiguzel A. Antimicrobial activity of aqueous and methanol extracts of *Juniperus oxycedrus* L. Journal of Ethnopharmacology 2003; 85, 231–5.
- 27.Hafedh H, Fethi BN, Emira N, Mejdi S, Emira N, Amina B. Effect of *Mentha longifolia* L. ssp *longifolia* essential oil on the morphology of four pathogenic bacteria visualized by atomic force microscopy. African Journal of Microbiology Research 2010; 4 (11):1122-7.
- 28.Moosavi MH, Basti AA, Misaghi A, Salehi TZ, Abbasifar R, Mousavi H, et al. Effect of Zataria multiflora Bioss. Essential oil and nisin on salmonella typhimurium and staphylococcus aureus in a food model system and on the bacterial cell membranes. Food Research International 2008; 41(2008): 1050-7.
- 29.Rasooli I, Rezaei MB, Allameh A. Growth inhibition and morphological alterations of *Aspergillus niger* by essential oils from *Thymus eriocalyx* and *Thymus x-porlock*. Food Control 2006 17; 359–64.
- 30.Sikkema J, De Bont JAM, Poolman B. Mechanisms of membrane toxicity of hydrocarbons. Microbiol Rev 1995; 59: 201-22.
- 31.Carson CF, Mee BJ, Riley TV. Mechanism of action of *melaleuca alternifolia* (tea tree) oil on *Staphylococcus aureus* determined by time-kill, lysis, leakage and salt tolerance assays and electron microscopy. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2002; 46(6): 1914-20.
- 32.Hammer KA, Carson CF, Riley TV. Antifungal effects of *Melaleuca alternifolia* (tea tree) oil and its components on *candida albicans*, *candida glabrata* and *saccharomyces cerevisiae*. J Antimicrob Chemother 2004; 53, 1081–5.

Phytochemical Properties of *Mentha longifolia* L. Essential Oil and its Antimicrobial Effects on *Staphylococcus aureus*

Mahmodi R¹, Tajik H^{2*}, Farshid AA³, Ehsani A², Zaree P⁴, Moradi M⁵

¹Department of Food Hygiene & Aquatics, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran,
²Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran,
³Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran, ⁴Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran, ⁵Department of Food Science & Technology, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran

Received: 22 March 2011 Accepted: 21 Sep 2011

Abstract

Background & Aim: Due to the side effects of chemical and synthetic preservatives, consumers have recently become more eager to use foods containing natural preservatives from plants, animals and microbial sources. In the present study, biochemical composition and antibacterial effects (MIC) of *Mentha longifolia* L. essential oil against *Staphylococcus aureus* have been evaluated.

Methods: In this experimental study, the biochemical composition and antibacterial properties of this essential oil was determined by the Gas chromatography/ mass spectrophotometer (GC/MS) and micro dilution method respectively. The morphological and membrane changes of the bacterial cell under the effect of this essential oil were evaluated by transmission electron microscopy. The collected data was analyzed by the SPSS software using ANOVA.

Results: The chemical analysis of the essential oil by Gas chromatography/ mass spectrophotometer (GC/MS) revealed the presence of 22 substances (95.30%), mainly including Pulegon (31.54%), 1,8 Cineol (15.89%), Menthoforan (11.8%) and Cis- Isopulegon (9.74%). Minimum inhibitory concentration of the essential oil determined under different temperature and pH values showed to be in the range of 75-1200 µg/ ml.

Conclusion: The MIC results and membrane cell damage observed in the electron microscopy evaluation indicated that this essential oil have a high antibacterial activity. Therefore, this essential oil can be combined with other agents for the preservation of foods against pathogenic and toxigenic microorganisms.

Key words: *Mentha longifolia* L., Essential oil, *Staphylococcus aureus*, Electron microscopy.

*Corresponding Author: Tajik H, Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
Email: h.tajik@urmia.ac.ir