

خون

فصلنامه علمی پژوهشی

پاییز ۸۳ دوره ۱ شماره ۱

شیوع خون کمیاب Oh (بمبئی) در میان سه جمعیت متفاوت

در شهر تهران در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲

نادر روان پرور^۱، شهرام سمیعی^۲، گوهرتاج اسدی^۳، مهناز صاحب جمعی^۴، پروین لطفی^۵، داود طاهریان^۶

چکیده سابقه و هدف

آنتی ژن H به عنوان مولکول پیشرو در ساخته شدن آنتی ژن A و B عمل می کند. افرادی که روی سطح گلبول قرمی شان آنتی ژن A و B وجود ندارد دارای آنتی ژن H بسیار قوی می باشند. بعضی مواقع شرایطی رخ می دهد که گلبول قرمی فقط یک فرد در هر یک میلیون نفر، فاقد آنتی ژن های A، B و H باشد. به این افراد فنوتیپ بمبئی Oh گفته می شود. چون افراد Oh در زمان نیاز به تزریق خون فقط باید از خون خود استفاده نمایند لذا ضروریست قبل از نیاز به تزریق خون، این افراد شناسایی شوند.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی است. جهت تعیین وجود یا عدم وجود آنتی ژن H، ۲۱۷۸ نفر از سه قشر مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. قشر اول هندوها ساکن تهران به تعداد ۱۰۰ نفر، قشر دوم ۷۸ نفر از افراد فامیل دو خانواده که در میان آنها فرد Oh شناخته شده بود. قشر سوم ۲۰۰۰ نفر از کسانی که جهت اهداء خون مراجعه نموده بودند. گروه خون همگی O بود.

از هر نفر ۱۰ سی سی خون به عنوان نمونه اخذ گردید گلبول های هر نمونه سه بار با سرم فیزیولوژی شسته شده سپس رقت ۵٪ تهیه شد. نمونه ها با آنتی سرم H لکتین با استفاده از روش لوله و لام مجاور و پس از نیم ساعت انکوباسیون، پدیده آگلوتیناسیون با چشم و میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به کمک نرم افزار minitab تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

در بین یکصد نفر از جمعیت هندوها فنوتیپ بمبئی مشاهده نشد. در گروه دوم از بین ۷۸ نفر وابستگان درجه اول دو خانواده که در آنها شناخته شده بود، فنوتیپ بمبئی دیده نشد. فقط در میان ۲۰۰۰ نفر از اهداکنندگان خون که همگی O بودند، یک نفر فنوتیپ بمبئی Oh مشاهده گردید.

نتیجه گیری

محدودیت تعداد هندوها ساکن تهران که مورد آزمایش قرار گرفتند باعث عدم شناسایی Oh جدید شد. عدم شناسایی Oh جدید در گروه دوم شاید یک مساله اتفاقی بود. ولی شناسایی یک نفر Oh در بین ۲۰۰۰ نفر از اهداکنندگان می توانست خیلی معنی دار باشد.

کلمات کلیدی: آنتی ژن H، فنوتیپ بمبئی، اهداکننده خون

-
- ۱ مؤلف مسؤول : کارشناس آزمایشگاه - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
 - ۲ کارشناس ارشد بیوشیمی - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
 - ۳ کارشناس انتقال خون - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
 - ۴ کاردان آزمایشگاه - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
 - ۵ کارشناس آزمایشگاه - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
 - ۶ کارشناس انتقال خون - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

مقدمه

آنتری ژن‌های گروههای خون ABO، H، P، I، Lewis در ساختمان مولکول‌های کربوهیدرات قرار دارند. این مولکول‌ها حامل قندهایی هستند که تعیین کننده نوع آنتری ژن می‌باشند. آنتری ژن‌ها از فعالیت گلیکوزیل ترانسفرازهایی ناشی می‌شود که قندهای اختصاصی به آن اضافه می‌گردد (۱).

تشخیص قطعی فنوتیپ بمبئی Oh با عدم ایجاد واکنش آگلوتیناسیون سلول‌های این افراد با عصاره لکتین^۱ یا آنتری سرم H، بدلیل عدم وجود آنتری ژن H در سطح گلبول‌های قرمز می‌باشد.

چون در سرم افراد فنوتیپ بمبئی Oh آنتری بادی H بسیار قوی وجود دارد لذا با O cell نیز ایجاد واکنش آگلوتیناسیون نموده که در شناسایی افراد Oh قابل استفاده می‌باشد.

در گروههای خون بسیار نادر A و B که آنتری ژن آنها وابسته به ژن‌های اختصاصی از لوکوس ABO بوده و با آنتری سرم‌های A و B ممکن است واکنش بسیار ضعیفی را ایجاد نمایند، آنتری ژن H قابل جدا شدن بوده و مقدار بسیار کمی آنتری ژن A و B را با خود حمل می‌کند، سلول‌های این افراد با آنتری H لکتین بدون واکنش هستند. به این نوع گروههای پارابمبئی و یا Ah، Bh و ABh اطلاق می‌گردد (۵,۶).

با توجه به آنتری بادی H در سرم افراد فنوتیپ بمبئی Oh و ایجاد آگلوتیناسیون بسیار قوی با خون‌های گروه H و نادر بودن افراد نامبرده، اتوترانسفیوژن در این افراد امری ضروری می‌باشد (۷). شناسایی افراد Oh باید قبل از نیاز به تزریق خون انجام گیرد.

هدف از این بررسی و پژوهش، یافتن افراد جدید Oh به منظور ذخیره طولانی مدت این نوع گروه خون کمیاب در بخش انجامد سازمان انتقال خون تهران و تامین خون مورد نیاز افراد فنوتیپ بمبئی Oh در کشور است. مطالعات قبلی در یک قشر خاص مانند خانواده یک فرد شناخته شده Oh و یا در بین اهداکنندگان معمولی

سیستم H دارای دو نوع ژن H و h است، مطالعات فامیلی نشان داده است که محل قرار گرفتن Se و Hh روی کروموزوم ۱۹ می‌باشد. کلیه افرادی که روی سطح گلبول قرمزشان آنتری ژن A و B وجود دارد فاقد آنتری ژن H هستند مگر در موقع خیلی نادر و استثنایی که مقدار کمی آنتری ژن H روی گلبول قرمز باقی می‌ماند (۲).

به این ترتیب با آنتری سرم‌های موجود ۴ نوع گروه خون O، AB، B و A تشخیص داده می‌شود که مقدار آنتری ژن H جدا شده روی گلبول قرمز به ترتیب زیر کاهش پیدا می‌کند :

$O > A_2 > B > A_2 B > A_1 > A_1 B$
در خون بعضی از افراد شرایط بسیار استثنایی رخ می‌دهد که گلبول‌های قرمزشان فاقد آنتری ژن‌های A، B، H باشند که این افراد Oh یا فنوتیپ بمبئی Oh نامیده می‌شوند (۳). این نوع گروه خون که برای اولین بار در بمبئی هندستان کشف گردید به دلیل عدم وجود آنتری ژن‌های فوق، دارای آنتری بادی A، B و H در سرم بوده و واکنش‌های بسیار قوی را ایجاد می‌نماید. Oh به دنورهایی اطلاق می‌شود که فنوتیپ آنها در گروه بندی

شد (تعیین گروه به روش سلولی). جهت تعیین وجود یا عدم وجود آنتیزن H در سطح گلوبول‌های قرمز روش زیر انجام گرفت:

سلول‌های هر نمونه ۳ بار با سرم فیزیولوژی ۰/۹٪ شسته شد. توسط نرمال سالین ایزوتونیک از سلول‌ها، رقت ۵٪ تهیه شد. یک قطره از آنتی سرم H لکتین (بیوتست آلمان) را روی لام و یا داخل لوله ریخته و یک قطره نیز از سوسپانسیون تهیه شده به آن اضافه نمودیم. قطره‌ها را به‌آرامی با هم مخلوط و به مدت ۳۰ دقیقه در حرارت ۲-۸ درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار دادیم. پس از نیم ساعت پدیده آگلوتیناسیون را با چشم یا میکروسکوپ بررسی نمودیم. آنتی بادی گروه‌های خونی و H جزو آنتی بادی‌های سرد بوده و درجه حرارت مناسب جهت تشخیص آنها، ۴ درجه می‌باشد ولی در ۳۷ درجه هم فعالیت دارند و اغلب آنها از نوع IgM می‌باشند.

به منظور تایید قطعی وجود یا عدم وجود آنتیزن H در نمونه‌های یاد شده، سرم کلیه نمونه‌ها با مخلوط چند cell O شناخته شده مجاور گردید و همچنین از یک کترل منفی که فاقد آنتیزن H بوده و شناخته شده بود، به عنوان شاهد آزمایش استفاده شد، چون آنتیزن روی سطح گلوبول قرمز قرار دارد و در برخورد با آنتی بادی تظاهرات ثانوی مختلفی مانند آگلوتیناسیون می‌نماید لذا این پدیده در گروه‌های خونی و H بسیار شدید بوده و با چشم قابل رویت می‌باشد ولی با این حال به منظور دقت در عمل، پدیده آگلوتیناسیون با میکروسکوپ بررسی گردید. در این مطالعه سن، جنسیت و بقیه اختصاصات فردی و حتی Rh نمونه‌ها به دلیل عدم اهمیت آنها مورد توجه قرار نگرفت.

تجزیه و تحلیل آماری

با توجه به مطالعه‌ای که بر روی ۲۰۰۰ اهداکننده به طور تصادفی انجام گرفت فرضیه ذیل مورد بررسی قرار گرفت: فرضیه صفر: نسبت تعداد افراد دارای گروه خون O بمیزان در ایران برابر ۱۰^{-۶} می‌باشد.

فرضیه مقابل: نسبت تعداد افراد دارای گروه خون O بمیزان در ایران برابر ۱۰^{-۶} نمی‌باشد.

انجام گرفته است (۸۹ و ۸۰). این مطالعه بر روی تلفیقی از ۳ قشر خاص انجام پذیرفته به این امید که Oh بیشتری در جامعه شناسایی شود.

مواد و روش‌ها

مطالعه انجام شده توصیفی است. در این مطالعه ۳ قشر مورد مطالعه قرار گرفتند:

۱- با توجه به این که فنوتیپ بمیزان Oh در میان هندوها بیشتر از ایرانیان یافت می‌شود لذا ۱۲۲ نفر هندوها ساکن تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. از این تعداد ۲۲ نفر (۱۸٪) دارای گروه خون A، B و AB بودند که از مطالعه حذف گردیدند و مطالعه روی ۱۰۰ نفر (۸۲٪) باقیمانده که O بودند انجام گرفت.

۲- در بین دو خانواده که Oh در میان آنها شناخته شده بود و قابل دسترسی بودند، از ۱۴۸ نفر (۴۸٪) از وابستگان درجه یک افراد که احتمال انتقال ژن H در میان آنها وجود داشت، نمونه‌گیری انجام شد و ۷۰ نفر از آنها که دارای گروه‌های خون A، B و AB بودند حذف و مطالعه بر روی ۷۸ نفر باقیمانده (۵۲٪) که O بودند ادامه یافت.

۳- قشر سوم ۲۰۰۰ نفر از دنورهایی بودند که با گروه خون O جهت اهدا خون مراجعه و به طور اتفاقی انتخاب شده بودند. این گروه تقریباً (۸۴٪) کل افراد را تشکیل می‌دادند.

از ۳ قشر مختلف جمعاً ۲۱۷۸ نفر بررسی شدند. از هر نفر ۱۰ سی سی خون به عنوان نمونه اخذ گردید. سرم کلیه نمونه‌ها با استفاده از سانتریفیوز با دور R.P.M ۲۵۰۰ به مدت ۵ دقیقه از سلول جدا شد. سرم نمونه‌ها با سلول‌های شناخته شده A، B و AB مجاور و پدیده واکنش آگلوتیناسیون به وسیله چشم و یا میکروسکوپ مشاهده گردید (تعیین گروه به روش سرمی).

سلول‌های جدا شده هر نمونه به روش لوله و لام تعیین گروه شدند، به این ترتیب که یک قطره از سلول هر نمونه با یک قطره از آنتی سرم‌های موجود A، B و AB روی لام و یا در لوله مجاور گردیدند. عدم ایجاد واکنش آگلوتیناسیون به وسیله چشم و یا میکروسکوپ بررسی

گروه سوم ۲۰۰۰ نفر از اهداکنندگانی بودند که در آزمایشات مربوط به Back typing و Cell typing، گروه خون O در آنها مشخص شده بود. در بین این تعداد، ۱ نفر فاقد آنتیژن‌های A، B و H در سطح گلbul قرمز و دارای آنتی‌بادی A، B و H در سرم بود که به عنوان فرد جدید دارای فنوتیپ بمبئی Oh شناخته شد.

بحث

آنتیژن‌های A، B و H در هفته‌های پنجم یا ششم جنبینی بر سطح گلbul‌های قرمز قابل تشخیص هستند. این آنتیژن‌ها در سن ۲ تا ۴ سالگی تکامل پیدا نموده و مانند بالغین واکنش کامل نشان می‌دهند. این خاصیت آنتیژنی در حالت طبیعی برای تمام عمر بدون تغییر و ثابت باقی می‌ماند.

با توجه به ساختمان شیمیایی و خاصیت آنتیژنی، شاید به جرات بتوان گفت که آنتیژن H یکی از آنتیژن‌های بسیار مهم است که عدم وجود آن در گروه بسیار نادری از افراد جامعه، بانک خون و مراکز تزریق خون بیمارستان‌ها را دچار مشکلات فراوانی نموده است (۱۰).

طبق آمارهای موجود در ایران از هر یک میلیون نفر یک نفر فاقد آنتیژن H در سطح گلbul‌های قرمز است که به این افراد فنوتیپ بمبئی Oh گفته می‌شود. این آمار در کشور هندوستان در هر یکصد هزار نفر، یک نفر را نشان می‌دهد (۱۱). همسایگی و نزدیکی کشور ایران به کشورهای هند، پاکستان و افغانستان مبین این موضوع است که فنوتیپ مذکور در شهرهای مختلف ایران متفاوت است و به نظر می‌رسد در استان خراسان تعداد آنها باید بیشتر باشد. در این پژوهش ۳ قشر مختلف مورد بررسی قرار گرفتند، در حالی که ۲ قشر از آنها از گروه انتخاب شده‌ای بودند و به نظر می‌رسید که از بین آنها Oh جدیدی پیدا شود ولی چنین نشد در صورتی که در قشر سوم که ۲۰۰۰ نفر از افراد معمولی جامعه بودند یک نفر Oh مشاهده گردید. البته شاید این مساله اتفاقی باشد که از بین دو خانواده Oh شناخته شده، هیچ فرد جدیدی یافت نگردید.

با استفاده از آزمون فرض میانگین بر روی نسبت‌ها این فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل‌های انجام شده به کمک نرم افزار آماری Minitab به قرار زیر است:

Test Of P = 0.000001 VS P NOT = 0.000001
Sample X N Sample P 95.0% CI
1 1 2000 0.000500 (0.000013, 0.002783)
Exact P = 0.002

با توجه به نتیجه به دست آمده ($P = 0.002$) در صورتی که میزان خطای نوع اول را برابر ۰.۰۵ در نظر بگیریم می‌توان فرض صفر را رد کرد و فرض مقابله را پذیرفت. نسبت به دست آمده از این تحقیق برابر ۰.۰۰۰۵ می‌باشد که در صورت پذیرفتن فرض مقابله می‌توان نتیجه گرفت که نسبت تعداد افراد دارای گروه خون O بمبئی در ایران برابر 10^{-6} نیست.

یافته‌ها

مجاور نمودن سرم کلیه نمونه‌ها با سلول‌های شناخته شده A، B و AB منجر به ایجاد پدیده آگلوتیناسیون قوی گردید که نشان دهنده گروه خون O است.

نتیجه مجاورت سلول‌های کلیه نمونه‌ها به روش لام یا لوله با آنتی سرم‌های A، B و AB، عدم ایجاد آگلوتیناسیون بود که تأیید گروه خون O جهت نمونه‌ها می‌باشد.

در مجاورت آنتی سرم H لکتین با سوسپانسیون ۰.۵ گلbulی در کلیه نمونه‌ها به جز یک مورد، واکنش آگلوتیناسیون قوی مشاهده گردید.

در مجاورت سرم کلیه نمونه‌ها با مخلوط چند O cell شناخته شده، فقط یک مورد آگلوتیناسیون قوی مشاهده شد. در بین ۱۰۰ نفر از قشر هندوها که همگی فاقد آنتیژن A و B روی سطح گلbul‌های قرمز بودند هیچ‌کدام فاقد آنتیژن H نبوده و فنوتیپ بمبئی Oh در بین آنها شناخته نشد.

در گروه دوم که تعداد ۷۸ نفر از وابستگان درجه اول ۲ خانواده شناخته شده Oh مورد بررسی قرار گرفت، هیچ‌کدام فاقد آنتیژن H در سطح گلbul‌های قرمز نبودند ولی فاقد آنتیژن‌های A و B بوده و در گروه خون O قرار داشتند.

لنداشتایندر سال ۱۹۰۰ پدیده ایزو آگلوتیناسیون و در نتیجه گروههای خونی شامل A، B، AB و O (فاقد آنتیزن A و B میباشد) را کشف نمود.

بر طبق قانون لنداشتاینر هر فردی که در سطح گلبول قرمز فاقد آنتیزن های فوق باشد، آنتیبادی آن را حتماً در پلاسما خواهد داشت. بنابراین گروه خون A دارای آنتیزن A در گلبول قرمز و آنتیبادی B در پلاسما خواهد بود و گروه AB دارای آنتیزن های A و B در سطح گلبول قرمز بوده و فاقد آنتیبادی در پلاسما میباشد و گروه خون O نیز فاقد آنتیزن و دارای آنتیبادی A و B در پلاسما است (۱۲).

فرانانی گروههای فوق در سفید پوستان به ترتیب O (٪.۴۵)، A (٪.۱۱)، B (٪.۴۰) و AB (٪.۴) میباشد. این فنوتیپ ها به صورت ژنتیکی AA و AO و BB و BO و یا AB از والدین، به شکل موروثی به کودکان منتقل میشود.

جهت گروه خون A زیر گروههایی نیز کشف شده است که فرآورده گلیکوزیل ترانسفرازها میباشند و با اهمیت ترین آنها A_1 و A_2 به ترتیب ٪.۸۰ و ٪.۲۰ گروه A را تشکیل میدهند. زیرگروههای دیگر A عبارتند از: A_m ؛ A_w ؛ A_x ؛ A_3 ؛ A_y ؛ A_{el} . جهت گروه خون B نیز زیرگروههایی به شکل زیر کشف گردیده است: B_{el} ، B_m ، B_w ، B_x ، B_3 . این زیرگروهها بسیار کمیاب بوده و ممکن است در هر ده هزار نفر فقط یک نفر B_3 باشد. آنتیزن H در بیشتر افراد گروه O وجود داشته و خواصی مانند آنتیزن A و B دارد. فنوتیپ های نقص گلبول قرمز، بسیار کمیاب بوده و ممکن است فاقد تمام یا قسمتی از آنتیزن H باشند.

در سال ۱۹۵۲ Bhende در بمبئی هندوستان گروه خون غیر طبیعی سه مرد را که همگی دارای گروه خون O بوده ولی فاقد آنتیزن H بودند، گزارش نمود. سرم این سه نفر دارای آنتیبادی H بود. این فنوتیپ کمیاب بعدها به فنوتیپ بمبئی یا Oh معروف شد. در بروز فنوتیپ

با توجه به مطالعات قبلی و آمارهای ارایه شده در این زمینه ۳۷/۵۷٪ گروه خون O در ایران وجود دارد که نشانگر وجود احتمالی Oh نسبتاً زیادی میباشد.

تا کنون ۳ نفر Oh در تهران، یک نفر در روبار، ۴ نفر در استان خراسان و ۲ نفر در استان اصفهان شناسایی گردیده است. در یکی از بررسی های فامیلی که در خانواده Oh شناخته شده در اصفهان انجام گرفته، ۳ نفر جدید شناخته شده است. با توجه به اطلاعات کم افراد جامعه نسبت به Oh و کم اهمیت جلوه دادن این نوع گروه خون حتی در نزد افرادی که به عنوان فرد شناخته شده اند، متأسفانه در حال حاضر فقط به ۴ مورد از گروه خون فوق دسترسی داریم. شاید لازم بود که در این مطالعه تعداد زیادی از افراد جامعه مورد بررسی قرار میگرفتند ولی محدودیت ها مانع از این کار شد. با توجه به اهمیت موضوع موارد زیر به عنوان پیشنهاد مطرح میگردد:

- ۱- اطلاعات کافی در مورد گروههای نادر خون از جمله فنوتیپ بمبئی Oh در اختیار افراد جامعه گذاشته شود.
- ۲- انجام دادن تست cell O در مورد تمام خون هایی که به پایگاه های انتقال خون سراسر کشور اهدا میگردد، زیرا کم هزینه ترین و راحت ترین روشی که میتوان فنوتیپ بمبئی Oh را شناسایی کرد، مجاور نمودن سرم خون ها با cell O که از مخلوط نمودن چند نمونه گروه خون O بدست میآید است. چون O cell مخلوط شده دارای آنتیزن H بسیار قوی است و اگر فردی Oh باشد در سرم این شخص نیز آنتیبادی H بسیار قوی وجود دارد، در نتیجه مجاور نمودن آنتیزن H با آنتیبادی H، واکنش آگلوتیناسیون قوی تشکیل خواهد شد و به این ترتیب فرد Oh شناخته میشود.

آنتیزن های سیستم های گروه خونی H، B و A به صورت محلول در مایعات بدن بعضی از افراد که آنان را ترشح کننده^۱ میnamند وجود دارد. ولی در افراد بمبئی، H برازی وجود ندارد. لذا از طریق برازی نیز افراد بمبئی قابل شناسایی هستند. آنتیزن های محلول در آب را نمیتوان به روش آگلوتیناسیون شناسایی کرد بلکه باید از روش رسوب^۲، به وجود آنها پیبرد.

نتیجه گیری

- با توجه به تحقیق انجام شده، نتایج زیر بدست آمد:
- ۱- لازم است اطلاعات کافی در مورد گروههای نادر خونی در اختیار افراد جامعه گذاشته شود.
 - ۲- جهت شناسایی افراد Oh بمبئی، نسبت به کلیه خونهای اهدایی به پایگاههای انتقال خون سراسر کشور، بهتر است تست O cell انجام شود.
 - ۳- در این مطالعه یک فرد جدید Oh شناخته شد که در گروه سوم ۰/۰۵ درصد و در کل جمعیت ۰/۰۴۲۲ درصد را شامل می‌شد.
 - ۴- با توجه به نتیجه بدست آمده ($P=0.002$), نسبت تعداد افراد Oh بمبئی در ایران برابر 10^{-6} نیست.

تشکر و قدردانی

بدینوسایله از زحمات سرکار خانم دکتر سیما حقیقی بهجهت پیگیری یکی از افراد دارای گروه خون Oh و آقای مهندس پیام روان پرور نسبت به تجزیه و تحلیل آماری تشکر و قدردانی می‌گردد.

بمبئی، ژنوتایپ فرد از نظر هموزیگوت و یا هتروزیگوت بودن اهمیت زیادی دارد، فردی که از نظر آل h هموزیگوت بوده و دارای ژنوتایپ hh می‌باشد، فنوتیپ بمبئی را بروز می‌دهد (۱۲).

گلبولهای قرمز Oh با آنتی H، A، B یا AB آگلوتینه نمی‌شوند و هیچ نوع آنتی ژنی اعم از A، B و H در سطح گلبول قرمز قابل جدا شدن نیست.

گلبولهای قرمز Oh معمولاً به صورت گروه Le (a^+b^-) می‌باشند، البته ممکن است به شکل Le (a^-b^-) هم باشند ولی هیچ‌گاه دارای Leb نخواهد بود. سرم این افراد همیشه به طور اختصاصی شامل A، B و H خواهد بود.

Levine و همکارانش فنوتیپ Ah را در مورد زنی از اهالی چکسلواکی به کار برداشتند که گلبولهای قرمز وی فاقد آنتی ژن H بوده و به وسیله آنتی سرم A نیز آگلوتینه می‌شدن. به این ترتیب بعدها Bh و ABh نیز شناخته شد. این نوع گروه خون به پارا بمبئی معروف شد و ضمن این که گلبولهای قرمز نقص H دارند، دارای فنوتیپ غیرترشحی نیز می‌باشند (۱۲).

منابع

- 1- Cartron JP, Mulet C, Bauvois B, Rahuel C, Salmon C. ABH and Lewis glycosyltransferases in human red cell lymphocytes and platelets. Rev Fr Transfus . 1980 Jul; 23 (3) : 271-82.
- 2- Ogasawara K, Yobe R, Uchikawa M, et al. Molecular genetic analysis of variant phenotypes of the ABO blood group system. Blood 1996 ; 88 : 2732 – 7
- 3- Davey RJ , Tourault MA , Holland PV. The clinical significance of Anti-H in an individual with the Oh (Bombay) phenotype . Transfusion. 1978 Nov-Dec ; 18(6) : 738-42
- 4- Le Pendu J , Gerard G , Vitrac D , Juszczak G, et al. H-deficient blood groups of Reunion island. II. Differences between Indians (Bombay phenotype) and whites (Reunion phenotype). Am J Hum Genet. 1983 May ; 35(3) : 484 – 96.
- 5- Lin - chum , Broad berry RE. Blood transfusion in the Para-Bombay phenotype . Br J Haematol. 1990 Aug ; 75(4) : 568-72.
- 6- Mathai J, Sulochana PV, Sathyabhamas. Para Bombay Phenotype -a case report . Indian J Pathol Microbiol 1997 Oct ; 40(4) : 553-4.
- 7- Vengelen-Tyler V(ed): Technical Manual, 13th ed. Bethesda, Md, American Association of Blood Banks ,1999.
- 8- Chakrabortys, Bhatia VN, Mukherjee B, Chartaboty JK, Panda SN, Ganguly A. Bombay O group blood (oh phenotype) in two subjects in a family at Calcutta . Indian J Pathol Microbiol . 1994 Dec ; suppl : S26.
- مؤیدی، ب، ”انتقال خون ، کاربرد بالینی و روش‌های آزمایشگاهی ” انتشارات نشاط ، اصفهان ، پائیز ۱۳۶۸
- افتخاری، م، ”آمار مقدماتی پخش گروههای خونی در ایران ” انتقال خون و فراورده های آن . گزارش سمینار مشهد، انتشارات سازمان انتقال خون تهران صفحه ۱۸ – ۳۰ ، اردیبهشت ۱۳۶۲
- 11- Das PK, Nair SC, Harris VK, Rose D, Mammen JJ, Bose YN, Sudarsa A. Distribution of ABO and RH-D blood groups among blood do in a tertiary care centre in South India. Trop Doct 2001 Jan ; 31(1): 47-8.
- 12- Daniels G, Human Blood Groups, Second edition, Uk, Blackwell, Science, Ltd, 2002; 40 – 70

The survey of prevalence of rare Bombay (Oh) blood group among 3 different population in Tehran (1381-1382)

Ravanparvar N.¹, Samiee S.¹, Asadi G.¹, Sahebjamee M.¹, Lotfi P.¹, Taherian D.¹

¹Iranian Blood Transfusion Organization- Research Center

Abstract

Background and Objectives

H antigen is a precursor to A and B antigens. Person who lacks A and B antigens has a strong expression of H antigen. In 1 per million population, Bombay phenotype (lack of A, B, H antigens) is observed, because this group should just experience autologous transfusion. Accurate identification of such people is highly recommended.

Materials and Methods

2178 persons from 3 different population were selected. One group was Indian population of Tehran (100), 78 persons from 2 families with Bombay phenotype history, and the third group(2000) was selected as volunteer donors. All of them have O group phenotype. 10cc of whole blood was taken from each subject. Red blood cells washed 3 times with saline and finally samples with 5% dilution were prepared. Each sample was treated with H-Lectin anti-sera, and after 30 minutes agglutination was detected with naked eye and microscope.

Results

Only 1 subject among donors had Bombay phenotype.

Conclusions

Limitation in Indian population in Tehran caused hinderance in detection of new cases of Bombay phenotype. At the end, detection of 1 Bombay phenotype among 2000 donors seems very significant.

Key words: H antigen, Bombay phenotype, 3 different population

Correspondence: Ravanparvar N., B.S, IBTO-Research Center- Tehran
Tel.: (+9821) 8283542; Fax: (+9821) 8288555
Email: parvan2001@yahoo.com