

خون

دوره ۴ شماره ۱ بهار ۸۶ (۹-۱)

میزان باز سایتومگالوویروس و پیگیری آن در گیرندگان پیوند مغز استخوان آلوزنیک مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی

نرگس عبیدی^۱، دکتر حمید الله غفاری^۲، دکتر احمد قره باخیان^۳، دکتر کامران علی مقدم^۴، دکتر مهدی دهقان^۵،
دکتر اردشیر قوامزاده^۶، دکتر احمد رضا شمشیری^۷

چکیده سابقه و هدف

CMV به عنوان مهم‌ترین پاتوژن ویروسی در دریافت کنندگان پیوند مغز استخوان آلوزنیک و بافت جامد می‌باشد. بر اساس مطالعات سروایپدمیولوژی، شیوع آن در کشورهای مختلف ۳۰-۱۰۰ درصد است. پیشرفت بیماری CMV تنها در ۲۰-۲۵ درصد از گیرندگان پیوند مغز استخوان اتفاق می‌افتد. به دلیل تشابه عالیم بیماری CMV و پیوند در دریافت کنندگان پیوند مغز استخوان و متفاوت بودن درمان این دو، لازم است با استفاده از روش Real-Time PCR(RQ-PCR) ، میزان باز CMV را در گیرندگان پیوند مغز استخوان بررسی نمود.

مواد و روش‌ها

مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود. کلیه گیرندگان پیوند مغز استخوان آلوزنیک که خود یا دهنده آن‌ها آلوده به CMV بوده و روش آنتی‌ژنیا آن‌ها مثبت بود، به ترتیب مراجعه، مورد مطالعه قرار گرفتند. ۵۱ گیرنده پیوند مغز استخوان به شکل هفتگی به مدت ۱۰۰ روز پیگیری شدند. بر روی ۴۱۵ نمونه خون کامل جمع‌آوری شده از آن‌ها، این ویروس با دو روش RQ-PCR و آنتی‌ژنیا بررسی گردید. برای تهیه استاندارد UL83 مربوط به پروتئین pp65 گلوبن شد و در این روش از پروب تکمن برای Real-Time PCR استفاده گردید. نتایج دو روش با هم ارتباط معنی داری داشتند ($r = 0.169$). برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم‌افزار SPSS ۱۱/۳ و آزمون‌های t test (t)، من ویتنی (Mann-whitney)، کای دو (Chi-square) و اسپیرمن (Spearman) استفاده شد.

یافته‌ها

گستره تشخیصی RQ-PCR ، RQ-PCR 2×10^5 cells copies: $2 \times 10^1 - 15 \times 10^7$ بود. از ۹۳ نمونه مثبت، ۸۱ نمونه دارای میزان کمی بالاتر از آستانه ($1/4 \times 10^5$ cells copies: 2×10^5) بودند. اولین نتیجه مثبت در مقایسه با آنتی‌ژنیا، ۱۳ روز زودتر بود. زمان لازم برای منفی شدن RQ-PCR بعد از درمان ۱۶ preemptive روز بود.

نتیجه‌گیری

نتایج ما نشان داد که نتایج منفی RQ-PCR بعد از درمان preemptive ، شاخص مناسبی برای تعیین موفقیت درمان و زمان قطع درمان می‌باشد. واکنش CMV در بیماران تحت مطالعه، به نوع داوری سرکوب کننده ایمنی بستگی داشت.

کلمات کلیدی: سایتومگالوویروس، پیوند مغز استخوان، PCR

تاریخ دریافت : ۱۵/۵/۷

تاریخ پذیرش : ۸۶/۱/۱۸

- کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
- مؤلف مسؤول : PhD ایمونوژنیک - استادیار مرکز تحقیقات خون، انکولوژی و پیوند مغز استخوان بیمارستان دکتر شریعتی - صندوق پستی ۱۴۱۱۴ PhD ایمونوهماتولوژیالینی - استادیار مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
- فرق تخصص هماتولوژی انکولوژی - استادیار مرکز تحقیقات خون، انکولوژی و پیوند مغز استخوان بیمارستان دکتر شریعتی
- فرق تخصص هماتولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- فرق تخصص هماتولوژی انکولوژی - استاد مرکز تحقیقات خون، انکولوژی و پیوند مغز استخوان بیمارستان دکتر شریعتی
- آمار حیاتی - مرکز تحقیقات خون، انکولوژی و پیوند مغز استخوان بیمارستان دکتر شریعتی PhD -۷

مقدمه

داروهای ضد ویروسی از جمله گان سیکلولویر، از بیماری CMV در مدت سه ماه بعد از پیوند ممانعت کرده و تقریباً ۵۰-۷۰ درصد از بیماری و مرگ و میر ناشی از آن را کاهش می‌دهند(۱۱، ۸). ولی سمیت مربوط به این داروها(ganciclovir، Foscarnet، cidofovir) به عنوان مشکل عملده‌ای باقی مانده است(۱۴). از آن جایی که این عوامل میلوتونکسیک و نفروتوکسیک بوده و باعث نوتروپنی طولانی مدت و استعداد به عفونت‌های فرصت طلب و ثانویه(قارچی و باکتریایی) می‌شوند و از طرفی پیشرفت بیماری CMV تنها در ۲۰-۲۵ درصد از بیماران رخ می‌دهد، پس استفاده اختصاصی و کوتاه مدت از این عوامل، در بیماران با خطر بالا، از عوارض جانبی آن می‌کاهد(۱۵، ۱۳، ۵، ۱). این مستلزم وجود مارکرهای شناسایی جهت پیش‌گویی حمله CMV و استفاده از روش‌های سریع، دقیق، حساس و اختصاصی برای تشخیص بیماران با خطر بالا می‌باشد(۱۶، ۱۲). البته باید در نظر داشت که همیشه تشخیص CMV به تنهایی، تعیین کننده نیاز به درمان نبوده و عالیم بالینی نیز لازم می‌باشد(۱۷). در این تحقیق هدف ما بررسی میزان بار سایتومگالوویروس با استفاده از دو روش Real-Time PCR و آنتی‌ژنیا در گیرندگان پیوند مغز استخوان آلوژنیک مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بود.

مواد و روش‌ها

مطالعه انجام شده از نوع توصیفی(Cross-sectional) بود. کلیه گیرندگان پیوند مغز استخوان آلوژنیک که خود یا دهنده آن‌ها آلوده به CMV بوده و روش آنتی‌ژنیا آن‌ها مثبت بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران به ترتیب مراجعه انتخاب و به صورت هفتگی به مدت ۱۰۰ روز بعد از پیوند پیگیری شدند(۱۳، ۱۸).

از نمونه‌های مختلف مثل خون کامل، پلاسمما، ادرار، آسپیراسیون و لاواز ریه، مغز استخوان، مایع مغزی - نخاعی، مایع آمنیوتیک، شستشوی گلو، مایع منی و بیوپسی بافت می‌توان استفاده نمود(۱۹، ۱۸، ۲). مناسب‌ترین نمونه برای تعیین CMV DNA، نمونه خون کامل یا لکوسیت‌ها می‌باشد(۲۰، ۲۱). در این تحقیق از ۳-۵ میلی‌لیتر خون

CMV به عنوان مهم‌ترین پاتوژن ویروسی در گیرندگان allogenic (bone marrow and solid organ transplant recipients می‌باشد(۱-۳). بر اساس مطالعات سروایپدمیولوژی، شیوع سرمی آن در کشورهای مختلف می‌تواند تا ۱۰۰٪ باشد(۴). واکنش‌های ویروسی در ۵۰٪ از گیرندگان پیوند مغز استخوان(BMT) آلوژنیک رخ می‌دهد و ممکن است منجر به پیشرفت بیماری CMV شود. عفونت ناشی از این ویروس، یکی از شایع‌ترین عوارض بعد از پیوند بوده و مهم‌ترین عامل از کار افتادگی و مرگ و میر پس بعد از پیوند مغز استخوان می‌باشد(۵-۷).

CMV در افراد سالم توسط سیستم ایمنی به خصوص سیستم ایمنی سلولی کتلرل می‌شود ولی در افراد با نقص یا ضعف سیستم ایمنی(مثل افراد پیوندی) افزایش یافته و باعث ویرمی و نهایتاً ایجاد بیماری می‌شود(۵). پیشرفت بیماری CMV تنها در ۲۰-۲۵ درصد از بیماران پیوندی رخ داده و می‌تواند باعث افزایش استعداد به هپاتیت، عفونت‌های گوارشی، پنومونی، آنسفالیت، رتینیت، انتروکولیت، رد پیوند و در نهایت مرگ بیماران گردد(۱۰-۱۴). چنین عالیمی در بیماری رد پیوند(GVHD) حاد نیز رخ می‌دهد(۱۱). ارزیابی‌های اولیه برای تشخیص عفونت فعال CMV بعد از شروع عالیم می‌باشند ولی با پیشرفت تکنولوژی می‌توان قبل از آن، عفونت را تشخیص داد(۲). به دلیل تشابه بیماری CMV و GVHD در گیرندگان BMT و متفاوت بودن درمان این دو، پس با این روش می‌توان تشخیص را آسان نمود.

دو روش اساسی برای جلوگیری از تولید بیماری CMV در این گروه بیماران استفاده می‌شود:


- تجویز داروی مؤثر ضد ویروسی، در تمام بیمارانی که در خطر فعال شدن مجدد CMV می‌باشند که به پروفیلاکسی عمومی معروف است.
- استفاده از داروهای ضد ویروسی، فقط در اشخاص دارای واکنش ویروسی قبل از وقوع بیماری، که آن را درمان بازدارنده(preemptive therapy) گویند(۱۲، ۱۳).

خون

دوره ۴، شماره ۱، بهار ۸۶

حساسیت کار و احتمال از دادن نمونه‌ها در حین پی‌گیری، از ۵۱ بیمار استفاده شد. ۸ بیمار به دلیل نگرفتن پیوند و یا فوت بلاfaciale پس از پیوند، کنار زده شدند و نهایتاً ۴۳ بیمار به صورت هفتگی به مدت ۱۰۰ روز بعد از پیوند پی‌گیری شدند. در مجموع بر روی ۴۱۷ نمونه آزمایش انجام شد.

کامل به همراه ضد انعقاد EDTA استفاده شد. با توجه به مطالعات مشابه انجام شده، امکانات موجود، مطالعه پایلوت و فرمول‌های آماری باید ۲۹ گیرنده پیوند مغز استخوان که خود یا دهنده آن‌ها آلوده به CMV بوده و روش آنتی‌ژنیا آن‌ها مثبت بود، صرف نظر از سن و جنس و نوع بیماری زمینه به ترتیب مراجعه انتخاب می‌شدند. برای بالا رفتن



شکل ۱: الف - CMV PCR - بر روی نمونه‌های DNA استخراج شده، ستون ۱ و ۲ نمونه بیمار CMV^+ ، ستون ۳ کنترل مثبت، ستون ۴ کنترل منفی و ستون ۵ سایز مارکر. ب - β_2 -میکروگلوبولین بر روی نمونه‌های DNA استخراج شده، ستون ۱-۳ نمونه بیمار، ستون ۴ کنترل منفی و ستون ۵ سایز مارکر. ج - مراحل کلیونیگ - د - نمودار استاندارد با رقت‌های 10^7 - 10^4 copies/ μl . ذ - منحنی استاندارد با رقت‌های 10^7 - 10^4 .

جدول ۱: توالی نوکلئوتیدی آغازگرها و پروب PCR، شرایط و مواد مورد نیاز جهت انجام PCR و Real-Time PCR

آغازگرها و پروب	Master Mix	PCR شرایط	RQ-PCR شرایط
CMV-RT-F-5- GCAGCCACGGGATCGTACT-3 CMV- RT-R-5- GGCTTTACCTCACACGAGCATT-3 CMV- PROB-5-FAM- CGCGAGACCGTGAACTGCG-TAMRA-3	Buffer 10X, MgCl ₂ 50Mm, dNTP mix 10mM, CMV-F 10µM, CMV-R 10µM, Taq Polymerase 5u/µl	دنا توراسیون در دمای ۹۵°C برای ۴ دقیقه (دمای ۹۵°C) برای ۳۰ ثانیه، دمای ۶۰°C برای ۳۰ ثانیه و دمای ۷۲°C برای ۴۰ ثانیه) برای ۴۰ ثانیه (برای ۴۰ ثانیه) برای ۷ دقیقه سیکل، دمای ۷۲°C برای ۷ دقیقه	دنا توراسیون در دمای ۹۵°C برای ۴ دقیقه - (دمای ۹۵°C) برای ۳۰ ثانیه، دمای ۶۰°C برای ۳۰ ثانیه و دمای ۷۲°C برای ۴۰ ثانیه) برای ۷ دقیقه

1-FAM : 6-Carboxy fluorescein

2-TAMRA : 6-Carboxy tetra methyl rhodamine

استفاده شد. در این Derivative Maximum Method روش به طور خودکار تعداد سیکل Cross Point هر نمونه مشخص گردید Cross point هر نمونه نقطه‌ای است که در آن سیکل وارد فاز لگاریتمی شده و اندازه‌گیری کمی نهایی در این نقطه با مقایسه point های نمونه‌ها نسبت به منحنی استاندارد به دست می‌آید(شکل ۱، د، ذ). در تجزیه و تحلیل نهایی اطلاعات از نرم‌افزار SPSS ۱۱/۳ و آزمون‌های t، منویتنی، کای دو و اسپیرمن استفاده شد.

: استخراج DNA به دو روش جوشاندن و استفاده از کیت کیاژن استخراج گردید(۲۲). جهت بررسی وجود DNA نمونه‌های استخراج شده، PCR برای β_2 میکروگلوبولین برای همه نمونه‌ها باید مثبت بوده و منفی بودن این آزمایش به منزله عدم وجود DNA در نمونه است و انجام آزمایش PCR بر روی نمونه مربوطه ارزشی ندارد(شکل ۱، ب)(۲۲).


یافته‌ها

نمونه به طور هم زمان، با هر دو روش Real-Time PCR و آنتی‌ژن‌میا، pp65 مثبت بودند، ۷۴ نمونه با روش Real-Time PCR مثبت ولی با روش آنتی‌ژن‌میا منفی بودند. در ۳۲۹ نمونه نیز، CMV با هر دو روش منفی باقی ماند. بین تمام نتایج به دست آمده با آنتی‌ژن‌میا و Real-Time PCR ارتباط معنی داری مشاهده شد ($p < 0.01$) (شکل ۱، ج). ۱۲ نمونه دارای آنتی‌ژن‌میا بالاتر از (cc: ۰/۱۶۹ cells). cut off (≥ 20 positive cells : 2×10^5 cell) ۸۱ نمونه دارای Real-Time PCR بالاتر از مقدار ($\geq 1/4 \times 10^3$ copies cut off) بودند.

با توجه به نمودار «الف» در شکل ۲، میانگین میزان سلول‌های مثبت با روش آنتی‌ژن‌میا، در تمامی بیماران طی مدت پی‌گیری در هفته پنجم شروع به افزایش کرد، بین هفته‌های ۸ و ۹ به حداقل رسید و پس از آن کاهش یافت.

: RQ-PCR بر روی نمونه‌های DNA استخراج شده، با استفاده از آغازگرها و پروب مندرج در جدول ۱، CMV PCR انجام شد(شکل ۱، الف و جدول ۱). جهت تهیه استاندارد CMV RQ-PCR، قطعه هدف با استفاده از کیت InsT/Aclone™ PCR Product Cloning Kit فرمانتاز، کلون گردید (شکل ۱، ج). پس از استخراج پلاسمید، تعیین غلظت و محاسبه تعداد کپی آن، نهایتاً Real-Time PCR با استفاده از رقت‌های مختلف استاندارد راهاندازی و برای نمونه‌های بیماران انجام گرفت.

نتیجه نهایی در این روش به صورت اندازه‌گیری کمی مطلق، از طریق محاسبه تعداد کپی CMV DNA در نمونه بیمار به دست آمد. برای تحلیل اطلاعات در دستگاه Light Cycler از برنامه نرم‌افزاری دستگاه به نام Second



شکل ۲- الف: نمودار توزیع فراوانی نتایج آنتی‌ژنیا pp65 در جمعیت تحت مطالعه. ب- نمودار توزیع فراوانی نتایج Real-Time PCR در جمعیت تحت مطالعه. ج- نمودار توزیع فراوانی نتایج آنتی‌ژنیا با Real-Time PCR

CMV در بیماران پس از پیوند، ۲۰-۲۵ درصد به دست آمد(۲۳). در ۱۶/۳٪ کل بیماران مورد مطالعه و در ۳۰/۴٪ بیماران با میزان بالای بار CMV DNA، درمان preemptive انجام شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که بین نیاز به درمان preemptive و بالا بودن بار CMV DNA ارتباط معنی‌داری مشاهده شد($p < 0.007$). این ارتباط به این معناست، در بیمارانی که درمان preemptive داشتند، میزان CMV DNA بالا است، آن‌ها افراد پرخطری برای بیماری CMV می‌باشند و به توجه بیشتری نیاز دارند. از طرفی در افرادی که درمان preemptive داشتند، میزان CMV DNA کاهش یافته و به صفر رسیده و تنها در ۲ بیمار میزان CMV DNA دوباره بالا رفته که با درمان مجدد میزانش کاهش یافته است. در حالی که میزان آن در بیمارانی که درمان preemptive نگرفته بودند، همواره بالا بوده و هیچ‌گاه به صفر نرسید.

با توجه به نمودار «ب» در شکل ۲، میانگین میزان CMV DNA در تمامی بیماران طی مدت پی‌گیری در هفته سوم شروع به افزایش نمود، در هفته پنجم به حداقل رسید و پس از آن کاهش یافت. در برخی از بیماران این میزان دوباره افزایش یافت.

با توجه به نمودار «ج» در شکل ۲، میانگین فاصله زمانی که Real-Time PCR توانسته زودتر از آنتی‌ژنیا مثبت شود، ۱/۸ هفته بود. یعنی ۱/۸ Real-Time PCR هفته (۱۳ روز) زودتر از آنتی‌ژنیا مثبت شد.

بحث

در ۱۸/۶٪ از کل بیماران مورد مطالعه و در ۲۶/۱٪ بیماران دارای افزایش بار CMV DNA، علایم بیماری مشاهده شد. پس نتایج ارزیابی CMV فاکتوری برای پیش‌گویی بیماری CMV، قبل از وقوع علایم بالینی آن است. در مطالعه یائو میزان بروز بیماری

نیست زیرا گاهی باعث تجویز نابجا و اضافی درمان preemptive می‌شود، در صورتی که بیمار به این درمان نیازی نداشته است. ولی نتایج منفی این روش بعد از درمان preemptive، شاخص مناسبی جهت نشان دادن موفقیت درمان و تعیین زمان قطع آن می‌باشد. پس روش-Real-Time PCR برای پی‌گیری پاسخ به درمان مفید است. چنین نتیجه‌ای در تحقیق لیمایه و گولت به دست آمد. آن‌ها از این روش برای پی‌گیری پاسخ به درمان بیماران استفاده نمودند(۲۵، ۲۶).

اولین نتیجه مثبت روش Real-Time PCR، ۱۳ روز زودتر از روش آنتیژنیا pp65 به دست آمد. در حالی که، در تحقیق گریسلی، روش PCR Real-Time PCR، ۱۵ روز زودتر از ارزیابی آنتیژنیا مثبت شد(۲۷). لروئز و همکاران این مدت زمان را ۸ روز محاسبه نمودند(۶). منگل و همکاران با روش PCR Real-Time، واکنش CMV را در ۳ بیمار ۱۰ روز زودتر از روش آنتیژنیا شناسایی نمودند(۲). لیمایه با روش Real-Time PCR این واکنش را ۱۳ روز زودتر از ارزیابی آنتیژنیا تشخیص داد(۲۵). در مطالعه یاکوشیجی این مدت زمان ۵ روز محاسبه شده است. گواوین و همکاران این مدت زمان را ۱۱/۲۵ روز ارزیابی نمودند(۲۹).

در طی مطالعه، بیماری CMV در دو بیمار پیشرفت کرد. در حالی که روش آنتیژنیا در این دو هم چنان منفی باقی مانده بود ولی میزان CMV آن‌ها با روش Real-Time PCR، به طور پیشرونده‌ای افزایش یافت. چنین نتیجه‌ای در مطالعه بیوپین نیز به دست آمد(۱). در مطالعه‌ای که او انجام داد، بیماری CMV در یکی از بیماران پیشرفت کرد در حالی که ارزیابی آنتیژنیا او منفی باقی ماند و روش Real-Time PCR آن بیمار ۱۰ روز قبل از مرگش مثبت شد. در تحقیق لروئز و همکاران نیز CMV PCR پلاسمای ۲ کودک مبتلا به بیماری CMV (یکی مبتلا به پنومونیای CMV و دیگری مبتلا به گاستریت CMV) مثبت بود در حالی که آنتیژنیا آن‌ها هم چنان منفی باقی مانده بود(۶).

میانگین فاصله زمانی مورد نیاز برای منفی شدن ارزیابی Real-Time PCR بعد از تجویز درمان preemptive، در

میزان بقای بیماران با درمان preemptive، ۱۰۰٪ و در بیماران بدون درمان preemptive، ۹۱٪ بود. هیچ مقاومت دارویی در بیماران دیده نشد. هر چند در ۲ بیمار پس از قطع درمان با گان سیکلوفیر، بار CMV DNA افزایش یافت.

در ۱۹٪ بیماران تحت مطالعه، میزان CMV DNA بعد از پیوند، افزایش نشان داد. منذز و توماس نیز نتیجه مشابه‌ای به دست آوردند. میزان افزایش CMV DNA در بیماران مورد مطالعه آن‌ها بعد از پیوند، ۲۰-۲۵ درصد بود که باعث پیشرفت بیماری CMV در این بیماران گردید(۳، ۸).

با توجه به مطالب به دست آمده، در ۷ نمونه به طور هم زمان، CMV در هر دو روش Real-Time PCR و آنتیژنیا pp65 مثبت شد، در ۷۴ نمونه، CMV با روش Real-Time PCR مثبت ولی با روش آنتیژنیا منفی شد. در ۳۲۹ نمونه نیز، CMV با هر دو روش منفی باقی ماند. ۱۲ نمونه دارای آنتیژنیا بالاتر از cut off (cells)cut off: 2×10^5 Positive cells: ≥ 20 باشد در حالی که ۸۱ نمونه دارای نتیجه Real-Time PCR بالاتر از مقدار cut off (cell)cut off: 2×10^5 Copies: $2 \times 10^3 \geq 1 / 4 \times 10^3$ بودند. این میزان cut off، با توجه به تحقیق منگل و همکارانش که مشابه این مطالعه بود، به دست آمد(۲۰). میزان cut off برای روش آنتیژنیا، بر اساس معیار مورد نظر در مرکز و با توجه به تحقیق بلاتک می‌باشد(۲۴). بین نتایج مثبت بالاتر از cut off به دست آمده با روش آنتیژنیا pp65 و روش Real-Time PCR، ارتباط معنی‌داری مشاهده شد ($p < 0.001$).

بین تمام نتایج به دست آمده با آنتیژنیا و Real-Time PCR ارتباط معنی‌داری مشاهده شد ($p < 0.012$). از طرفی بین نتایج مثبت بالاتر از cut off به دست آمده با روش آنتیژنیا pp65 و روش Real-Time PCR، ارتباط معنی‌داری مشاهده شد ($p < 0.001$).

تعداد نتایج مثبت بیماران با روش آنتیژنیا ۳۶ تا و با روش Real-Time PCR ۹۳ تا بود. این نشان داد که روش Real-Time PCR دارای حساسیت بالایی برای تشخیص CMV DNA بوده است. البته حساسیت بالا به تنها یکی کافی

.(۲۵) به دست آمد(۳۵۰-۵۰ copies/ml)

نتیجه‌گیری

هر دو روش با هم ارتباط معنی‌داری داشتند. مثبت شدن زودهنگام RQ-PCR و نیز نتایج منفی دیرهنگام RQ-PCR بعد از درمان preemptive، شاخص مناسبی برای تعیین موفقیت درمان و زمان قطع درمان می‌باشد. CMV از آن جایی که در برخی بیماران میزان کپی DNA، با روش Real-Time PCR بالاتر از cut off بوده ولی هیچ عالیم بالینی از بیماری CMV در آن‌ها دیده نشد و نیازی به درمان preemptive نداشتند، پس لازم است علاوه بر نتایج Real-Time PCR، عالیم بالینی نیز در نظر گرفته شود.

بیماران تحت مطالعه ۱۶ روز(۷-۱۶ روز) بود. این در حالی است که در مطالعه لروئر این فاصله زمانی ۲۸ روز به دست آمد(۶).

حد پایین تشخیص CMV DNA با روش Real-Time PCR 2×10^5 copies cell، حد بالایی آن 2×10^5 copies cell: 15×10^7 copies cell به دست آمد. یعنی با این روش، قادریم میزان 2×10^5 copies cell: 15×10^7 copies cell: 13×10^7 copies در هر اندازه‌گیری نماییم. البته کمترین میزان CMV DNA در هر واکنش، 10 copies/capillary در تحقیق ماقیداً، حد حساسیت PCR در تحقیق لیمایه، حدداشت بار 20 copies/wells در پلاسما به طور متوسط 700 copies/ml CMV در پلاسما به طور متوسط <50 copies/ml و حداقل آن 5×10^7 copies/ml)

References:

- Boivin G, Belanger R, Delage R, Beliveau C, Demers C, Goyette N, et al. Quantitative analysis of cytomegalovirus (CMV) viremia using the pp65 antigenemia assay and the cobas amplicor CMV monitor PCR test after blood and marrow allogeneic transplantation. *J Clin Microbiol* 2000; 38: 4356-60.
- Mengelle C, Pasquier C, Rostaing L, Sandres-Saune K, Puel J, Berges L, et al. Quantitation of human cytomegalovirus in recipients of solid organ transplants by real-time quantitative PCR and pp65 antigenemia. *J Med Virol* 2003; 69: 225-31.
- Mendez JC, Espy MJ, Smith TF, Wilson JA, Paya CV. Evaluation of PCR primers for early diagnosis of cytomegalovirus infection following liver transplantation. *J Clin Microbiol* 1998; 36: 526-30.
- Piiparinen H. Quantitative PCR in the diagnosis and monitoring of human cytomegalovirus infection in organ transplant patients. Helsinki: Helsinki University Printing House; 2004: 1-72.
- Razonable RR, Paya CV, Smith TF. Role of the laboratory in diagnosis and management of cytomegalovirus infection in hematopoietic stem cell and solid-organ transplant recipients. *J Clin Microbiol* 2002; 40:746-52.
- Leruez-Ville M, Ouachee M, Delarue R, Sauget AS, Blanche S, Buzyn A, et al. Monitoring cytomegalovirus infection in adult and pediatric bone marrow transplant recipients by a real-time PCR assay performed with blood plasma. *J Clin Microbiol* 2003; 41: 2040-6.
- Griscelli F, Barrois M, Chauvin S, Lastere S, Bellet D, Bourhis JH. Quantification of human cytomegalovirus DNA in bone marrow transplant recipients by real-time PCR. *J Clin Microbiol* 2001;4362.
- Thomas DE. Hematopoietic cell transplantation. In: Blume KG, Forman SJ, Appelbaum FR, editors. *Cytomegalovirus infection*. 3rd ed. J.A: Zaiz; 2004: 700-26.
- Patel R, Paya CV. Cytomegalovirus infection and disease in solid organ transplant recipients. In: Bowden RA, Ljungman P, Paya CV, editors: *Transplant infections*. Washington: Lippincott-Raven; 1999: 229-44.
- Griffiths PD, Clark DA, Emery VC. Herpesviruses in transplant recipients. *J of Antimicrobial Chemotherapy* 2000; 45: 29-43.
- Boeckh M, Leisenring W, Riddell SR, Bowden RA, Huang ML, Myerson D, et al. Late cytomegalovirus disease and mortality in recipients of allogeneic hematopoietic stem cell transplants:importance of viral load and T-cell immunity. Clinical observations, interventions, and therapeutic trials. *Blood* 2003; 101(2): 407-14.
- Nitsche A, Steuer N, Schmidt CA, Landt O, Ellerbrok H, Pauli G, et al. Detection of human cytomegalovirus DNA by real-time quantitative PCR. *J Clin Microbiol* 2000;2734-7.
- Solano C, Munoz I, Gutierrez A, Farga A, Prosper F, Garcia-Conde J, et al. Qualitative plasma PCR assay (AMPLICOR CMV Test) versus pp65 antigenemia assay for monitoring cytomegalovirus viremia and guiding preemptive stem cell transplantation. *J Clin Microbiol* 2001; 3938-41.
- Boeckh M, Boivin G. Quantitation of cytomegalovirus: methodologic aspects and clinical applications. *J Clin Microbiol Rev* 1998;11: 533-54.
- Machida U, Kami M, Fukui T, Kazuyama Y, Kinoshita M, Tanaka Y, et al. Real-time automated PCR for early diagnosis and monitoring of cytomegalovirus infection after bone marrow transplantation. *J Clin Microbiol* 2000; 38: 2536-42.
- Tong CY, Cuevas L, Williams H, Bakran A. Use of laboratory assays to predict cytomegalovirus disease in renal transplant recipients. *J Clin Microbiol* 1998; 36:

2681-5.

- 17- Li H, Dummer JS, Estes WR, Meng S, Wright PF, Tang YW. Measurement of human cytomegalovirus loads by quantitative real-time PCR for monitoring clinical intervention in transplant recipients. *J Clin Microbiol* 2003; 41: 187-91.
- 18- "http://www.specialtylabs.com/default.htm"
- 19- "http://hhv6.com/diagnostic-virals-cmv_assay.htm"
- 20- Mengelle C, Sandres-Saune K, Pasquier C, Rostaing L, Mansuy JM, Marty M, *et al.* Automated extraction and quantification of human cytomegalovirus DNA in whole blood by real-time PCR assay. *J Clin Microbiol* 2003; 41:3840-5.
- 21- Sia IG, Wilson JA, Espy MJ, Paya CV, Smith TF. Evaluation of the Cobas amplicor CMV monitor test for detection of viral DNA in specimens taken from patients after liver transplantation. *J Clin Microbiol* 2000; 38: 600-6.
- 22- McPherson MJ, Moller SG, Beynon R, Howe C. PCR (The basics from background to bench). Cambridge: Bios Scientific Publishing Ltd; 2000: 701-726.
- 23- Xiao Y, Shi K, Mao X. Detection of cytomegalovirus antigens and virus DNA in the peripheral blood after organ transplantation. *Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi* 1999;13(3) : 287-90.
- 24- Blank BS, Meenhorst PL, Weverling GJ, Stout-Zonneveld AA, Pauw W, Mulder JW, *et al.* Quantitative pp65-antigenemia assay for the prediction of human cytomegalovirus disease in HIV-infected patients. *AIDS* 1999; 13(18): 2533-9.
- 25- Limaye AP, Huang ML, Leisenring W, Stensland L, Corey L, Boeckh M. Cytomegalovirus (CMV) DNA load in plasma for the diagnosis of CMV disease before engraftment in hematopoietic stem-cell transplant recipients. *J Infe Dis* 2001; 183:377-82.
- 26- Gault E, Michel Y, Dehee A, Belabani C, Nicolas JC, Garbarg-Chenon A. Quantification of human cytomegalovirus DNA by real-time PCR. *J Clin Microbiol* 2001; 39: 772-5.
- 27- Griffiths PD. Tomorrow's challenges for herpesvirus management: potential applications of valacyclovir. *J Infe Dis* 2002; 186 suppl 1:131-7.
- 28- Yakushiji K, Gondo H, Kamezaki K, Shigematsu K, Hayashi S, Kuroiwa M, *et al.* Monitoring of cytomegalovirus reaction after allogenic stem cell transplantation: comparision of an antigenemia assay and quantitative real - time PCR. *Bone Marrow Transplantation* 2002; 29 (7): 599-606.
- 29- Gouarin S, Vabret A, Gault E, Petitjean J, Regeasse A, Hurault de Ligny B, *et al.* Quantitative analysis of CMV DNA load in whole blood of renal transplant patients using real-time PCR assay. *J Clin Virol* 2004; 29(3): 194-201.

CMV detection and monitoring in Bone Marrow Transplant (BMT) recipients by Real-Time PCR (RQ-PCR)

Obeidi N.² (MS), Ghaffari H.¹ (PhD), Gharehbaghian A.² (PhD), Alimoghaddam K.¹ (MD), Dehghan M.³ (MD), Ghavamzadeh A.¹ (MD), Shamshiri A.¹ (PhD)

¹Hematology-Oncology & BMT Research Center, Shariati Hospital

²Iranian Blood Transfusion Organization-Research Center

³Hematology-Oncology & BMT Research Center, Shiraz University of Medical Sciences

Abstract

Background and Objectives

Cytomegalovirus (CMV) is an important pathogen in patients undergoing bone marrow transplantation. The prevalence of CMV varies from 30-100% in different countries as shown by seroepidemiological studies. Only 20-25% of patients develop CMV disease. Because of the similarity between CMV and GVHD and the different therapies required, detection of viral load will be effective in patients' survival.

Materials and Methods

51 recipients of BMT were monitored for 100 days post-BMT during which the samples were collected weekly. The Real-Time PCR was developed for quantitation of CMV viral DNA, using TaqMan technology. For generation of standard curve, UL83 gene from CMV was cloned into a plasmid using a T/A cloning procedure. RQ-PCR assay was preformed in parallel with pp65 antigenemia assay on 415 samples.

Results

The results obtained by both techniques were significantly correlated ($p<0.01$). We could detect $13 \times 10^1 - 15 \times 10^7$ (CMV DNA copies/ 2×10^5 cells) by RQ-PCR method. About 76% of patients developed at least one episode of CMV reactivation. First positive result of RQ-PCR appeared 13 days earlier than of pp65 antigenemia. After preemptive therapy, 16 days were required to achieve negative result by RQ-PCR.

Conclusions

Both assays were highly correlated; however, RQ-PCR was more sensitive than the antigenemia assay. After preemptive therapy, negative results of RQ-PCR were the best indicator to determine the endpoint of treatment and its success.

Key words: Cytomegalovirus (CMV), Bone Marrow Transplant (BMT), PCR.

SJIBTO 2007; 4(1): 1-9

Received: 29 July 2006

Accepted: 7 Apr. 2007

Correspondence: Ghaffari H. PhD of Genetics, BMT-Research Center of Shariati Hospital. P.O.Box: 14114, Tehran, Iran. Tel: (+9821)84902665; Fax: (+9821)88004140. E-mail: shghaffari2000@yahoo.com