

خون

دوره ۴ شماره ۸۶ (۲۶۴-۲۵۹)

ارتباط میزان هموسیستئین خون و احتمال ابتلا به بیماری‌های ترومبوز عروقی

محمد رضا دیهیم^۱، دکتر فرهاد رازجو^۲، دکتر مهتاب مقصودلو^۳، مریم عابدینی^۴

چکیده سابقه و هدف

ترومبوزهای عروقی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین عوامل مرگ و میر در دنیا مطرح هستند. یکی از علل مهم آتروترومبوز، هموسیستئینی می‌باشد که با تغییر در مورفولوژی عروق، کاهش و یا از دست دادن عملکرد آنتیترومبوتیک آندوتیالی عروق، سبب فعل شدن مسیر انعقاد خون و مهار فیبرینولیز می‌گردد و تماماً این عوامل می‌توانند در ایجاد آتروترومبوز نقش داشته باشند. در این طرح سعی شده است با اندازه‌گیری میزان هموسیستئین خون در بیماران ایرانی مبتلا به ترومبوز عروقی در مقایسه با گروه شاهد (افراد بدون علامت و فاقد سابقه فامیلی آتروترومبوز) نقش این آمینواسید در ابتلا به ترومبوز بررسی گردد.

مواد و روش‌ها

تحقیق به روش مورد - شاهدی (case-control) انجام گرفت. در این تحقیق ۱۰۰ نفر بیمار مبتلا به ترومبوز عروقی به عنوان گروه مورد و ۶۸ نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند. سپس از گروه بیمار و کنترل با شرایط ناشتا نمونه خون در لوله‌های حاوی ضد انعقاد EDTA گرفته شد که جهت اندازه‌گیری هموسیستئین پلاسما به روش الیزا با استفاده از کیت IBL به آزمایشگاه انتقال یافت. هم چنین پرسشنامه‌ای در رابطه با بعضی متغیرهای زمینه‌ای (سن، جنس، دفعات ترومبوز، محل ترومبوز و ...) با رضایت خود بیماران تکمیل گردید. سپس داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نگارش ۱۱ وارد رایانه شد و افراد دو گروه از نظر متغیرهای زمینه‌ای به کمک آزمون‌های Chi-square و t-test مقایسه گردیدند. odds ratio تعیین و فاصله اطمینان با احتمال ۹۵٪ در جامعه برآورد گردید.

یافته‌ها

بر طبق نتایج به دست آمده، میانگین هموسیستئین در گروه مورد $18/4 \pm 23/85$ میکرومول در لیتر و در گروه کنترل $11/48 \pm 3/4$ میکرومول در لیتر بود که این اختلاف در میزان هموسیستئین بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود. افزایش چشمگیری در میزان هموسیستئین در گروه ترومبوتیک نسبت به گروه شاهد دیده شد. بر طبق همین نتایج ۴۸ نفر (۴۸٪) از بیماران ترومبوز با هیپرهموسیستئینی همراه بودند و این در صورتی است که فقط ۱۲ نفر (۱۷٪) از افرادی که در گروه کنترل بودند هیپرهموسیستئینی داشتند. طبق نتایج به دست آمده همبستگی متوسطی بین متغیر سن و افزایش میزان هموسیستئین وجود داشت.

نتیجه‌گیری

میزان odds ratio = ۲/۷۲ نشان‌دهنده این است که هموسیستئین می‌تواند به عنوان یک عامل خطر برای ابتلا به ترومبوز مطرح باشد. به همین دلیل به نظر می‌رسد اندازه‌گیری میزان هموسیستئین در بیمارانی که سابقه آترواسکلروز، ترومبوز یا بیماری‌های عروقی را داشته و یا در خانواده درجه یک خود یکی از این بیماری‌ها را داشته‌اند امری ضروری می‌باشد. هم چنین کاهش هموسیستئین با مصرف مکمل‌های فولات، B₁₂ و B₆ می‌تواند در جهت پیشگیری از ترومبوز در افراد با ریسک بالا و هم چنین در جهت بهبود وضعیت بیماری امری مهم و ضروری تلقی شود.

کلمات کلیدی: هموسیستئین، ترومبوز وریدی، عامل خطر

تاریخ دریافت: ۱۷/۲/۸۶

تاریخ پذیرش: ۳/۱/۸۶

۱- مؤلف مسؤول: کارشناس ارشد بیوشیمی - مریم مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

۲- متخصص پاتولوژی - استادیار مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

۳- متخصص پزشکی اجتماعی - استادیار مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

۴- کارشناس علوم آزمایشگاهی - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

مقدمه

هموسيستئين اسید آmine‌ای از گروه آمينواسیدهای سولفوره می‌باشد که طی متابولیسم متیونین تشکیل می‌شود. در صورت اختلال در مسیر متابولیکی هموسيستئین، میزان آن در خون افزایش یافته‌که اصطلاحاً به آن هموسيستئینی (Homocysteinemia) گویند که یکی از علل مهم آتروترومبوز محسوب می‌شود^(۱). هر چند افزایش هموسيستئین مشابه مصرف سیگار، افزایش کلسترول و فشار خون به عنوان یکی از عوامل خطر جهت ابتلا به بیماری‌های عروقی محسوب می‌شود، لیکن میزان این خطر در بین افراد سیگاری و مبتلایان به فشار خون به مراتب بیشتر می‌باشد^(۲). هیپرهموسيستئینی با تغییر در مورفولوژی عروق، کاهش و یا از دست دادن عملکرد آنتی ترومبوتیک آندوتیال عروق، سبب فعل شدن مسیر انعقاد خون و مهار فیرینولیز گردیده و در این رابطه بیشترین آسیب عروقی با اکسیداسیون هموسيستئین مرتبط است^(۳).

مواد و روش ها

تحقیق به روش مورد شاهدی انجام شد. روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت پرسشنامه‌ای و آزمایشی بود و افرادی که با تشخیص پزشک دارای ترومبوز عروقی بودند به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. از بین همکاران شاغل در آزمایشگاه که از نظر سن و جنس با گروه مورد یکسان بوده و فاقد هر گونه سابقه ترومبوز در خود و یا در خانواده درجه اولشان بودند، گروه کنترل انتخاب شدند. پرسشنامه در رابطه با خصوصیات فردی از قبیل سن، جنس، سابقه ترومبوز، محل ترومبوز، سابقه خانوادگی ترومبوز، مصرف سیگار و سابقه اختلالات ارشی ترومبوتیک با رضایت خود بیماران تکمیل گردید. سپس از بیماران و گروه کنترل با شرایط ناشتا، نمونه خون در لوله‌های حاوی ضد انعقاد EDTA گرفته شد و جهت اندازه‌گیری هموسيستئین پلاسمما به آزمایشگاه انتقال یافت و تا زمان انجام آزمایش در فریزر -20°C نگهداری گردید. کیت آلمان IBL Axis homocysteine EIA از کمپانی IBL آلمان جهت اندازه‌گیری هموسيستئین پلاسمما تهیه گردید. اساس اندازه‌گیری هموسيستئین در این روش بر مبنای الیزا بود، ابتدا هموسيستئین متصل به پروتئین توسط دی‌تیو تریتول

یکی از مهم‌ترین دلایل ابتلا به هیپرهموسيستئینی کمبود ویتامین‌های B_{12} و اسید فولیک به عنوان کوفاکتور در متابولیسم هموسيستئین است که در این موارد کمبود ویتامین‌های B_{12} ، اسید فولیک، B_6 و کاهش فعالیت آنزیمی سبب مهار تجزیه هموسيستئین شده و به دنبال آن غلظت داخل سلولی هموسيستئین افزایش می‌یابد. با خارج شدن هموسيستئین از داخل سلول و ورود آن به پلاسمما، هیپرهموسيستئینی ایجاد می‌شود. طی آمارهای ارایه شده در اروپا سالانه حدود ۴ میلیون نفر بر اثر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و ترومبوز جان خود را از دست می‌دهند که این امر بار مالی زیادی را در بخش بهداشت و درمان به خصوص در جوامع در حال توسعه تحمیل می‌نماید^(۳).

اندازه‌گیری میزان هموسيستئین خون جهت تشخیص و درمان هیپرهموسيستئینی در گروه پرخطر(سابقه خانوادگی ترومبوز و بیماری‌های عروقی، فشار خون بالا، افزایش LDL کلسترول خون، کمبود ویتامین‌های B_{12} و فولات و افراد سیگاری) و هم چنین بیمارانی که دچار بیماری‌های عروقی و ترومبوز شده‌اند بسیار حائز اهمیت

خون

دوره ۴، شماره ۴، زمستان ۸۶

۳۸ نفر(٪۲۰) و در جمعیت زنان گروه مورد فقط ۱۰ نفر(٪۲۱) دچار هیپرهموستئینی بودند که این اختلاف در میزان ابتلا به هیپرهموستئینی بین دو جنس مرد و زن درگروه مورد از نظر آماری معنی دار بود (p<0.001). طبق نتایج به دست آمده، همبستگی متosteپی بین متغیر سن و افزایش میزان هموستئین وجود داشت ($r=0.05$, p=0.02). در جدول ۱ اطلاعات مربوط به میزان هموستئین در دو گروه مورد و شاهد به تفکیک جنسیت نشان داده شده است.

جدول ۱: نتایج مربوط به میزان هموستئین به تفکیک جنسیت در دو گروه مورد و شاهد

هموستئین نرمال (بالاتر از ۱۵ میکرومول در لیتر)	هیپرهموستئینی (۵-۱۵ میکرومول در لیتر)	گروه مورد	گروه شاهد
(٪۲۱) ۱۰	(٪۲۹) ۱۶	مردان	مردان
(٪۴۸) ۴۸	(٪۷۸) ۳۶	زنان	زنان
(٪۲۰) ۸	(٪۸۰) ۳۲	مجموع	مجموع
(٪۱۴) ۴	(٪۸۵) ۲۴		
(٪۱۷) ۱۲	(٪۸۲) ۵۶		

۲۰ نفر(٪۲۰) از بیماران، مبتلا به ترمبوز ورید عمقی(Deep Venous Thrombosis) نفر(٪۲۷)، ترمبوز عروق مغزی، ۳۴ نفر(٪۳۴) مبتلا به ترمبوز عروق چشم و ۱۵ نفر(٪۱۵) نیز مبتلا به ترمبوز ریه، مزانتر و پورتال بودند. ۱۹ نفر(٪۵۵/۹) از مبتلایان به ترمبوز عروق چشم، ۱۱ نفر(٪۴۰/۷) از مبتلایان به ترمبوز عروق مغزی و ۸ نفر(٪۴۰) از مبتلایان به افزایش میزان هموستئین خون همراه بودند(نمودار ۱). Odds ratio = ۲/۷۲

طی بررسی انجام شده میزان هموستئین خون همراه بودند(نمودار ۱).

افزایش هموستئین می تواند به عنوان یک عامل خطر برای ابتلا به ترمبوز محسوب گردد.

به هموستئین آزاد(free homocysteine) تبدیل شده و سپس توسط آنزیم S-آدنوزیل هموستئین هیدرولاز(SAH) به S-آدنوزیل-L-هموستئین تبدیل گردید. در واکنش بعدی که در واقع یک روش رقابتی سنجش اینمی(Immunoassay) می باشد، هموستئین موجود در پلاسمما با هموستئین متصل به پلیت الیزا برای اتصال به آنتی بادی مونوکلونال هموستئین با یکدیگر به رقابت پرداختند. در مرحله بعدی با اضافه شدن سوبسترا و آنتی بادی نشاندار به HRP، واکنش فعالیت پراکسیداز در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازه گیری شد. در این واکنش مقدار جذب نوری با غلظت هموستئین نسبت معکوس دارد. داده های جمع آوری شده از پرسشنامه و نتایج حاصل از آزمایش ها با استفاده از نرم افزار SPSS نگارش ۱۱ وارد رایانه گردید و افراد دو گروه از نظر متغیرهای زمینه ای به کمک آزمون های کای دو و t-test مقایسه شدند. سپس odds ratio تعیین و فاصله اطمینان با احتمال ۹۵٪ در جامعه برآورد گردید.

یافته ها

در این مطالعه ۴۶ خانم مبتلا به ترمبوز با میانگین سنی 35 ± 13 سال و ۵۴ مرد با میانگین سنی 38 ± 38 سال و ۵۴ مرد با میانگین سنی 13 سال، جمعاً ۱۰۰ نفر به عنوان گروه مورد(case) و ۲۸ خانم با میانگین سنی 35 ± 13 سال و ۴۰ مرد با میانگین سنی 36 ± 10 سال جمعاً ۶۸ نفر به عنوان گروه شاهد(افراد سالم بدون سابقه ترمبوز) مورد بررسی قرار گرفتند. در جمعیت مورد مطالعه ۱۲ نفر(٪۱۳) از بیماران سابقه قبلی ترمبوز را داشته و ۱۲ نفر(٪۱۲) نیز دارای سابقه خانوادگی ترمبوز بودند. میانگین هموستئین در گروه مورد $18/4 \pm 8/2$ و در گروه شاهد $23/85 \pm 4/11$ در گروه مورد نسبت به گروه شاهد دیده بود که این اختلاف بین میانگین هموستئین در دو گروه از نظر آماری معنی دار بود و افزایش چشمگیری در میزان هموستئین در گروه مورد نسبت به گروه شاهد دیده می شد(p<0.001).


۴۸ نفر(٪۴۸) از بیماران گروه مورد(افراد مبتلا به ترمبوز) و ۱۲ نفر(٪۱۷) در گروه شاهد مبتلا به هیپرهموستئینی بودند. در جمعیت مردان گروه مورد،

(Mild hyperhomocysteinemia) قرار داشتند. اين امر نشان می دهد که هيپرهموسيستيني متوسط به عنوان فاكتور خطر ابتلا به ترومبوز مطرح بوده و از شایع ترين عللي است که ممکن است با عوامل تغذيه اي يعني کمبود ويتامين هاي B₁₂ و فولات همراه باشد(۸). قسمت عمده هموسيستين توسيط فولات و ويتامين B₁₂ در حضور آنزيم متيونين سنتاز به متيونين تبديل می شود و کمبود ويتامين هاي B₁₂ و فولات يکی از عواملی است که سبب مهار تجزие هموسيستين شده که به دنبال آن افزایش غلظت هموسيستين را در خون

(hyperhomocysteinemia) همراه خواهد داشت. نتایج به دست آمده از اين مطالعه نشان داد که هيپرهموسيستيني می تواند به عنوان فاكتور خطر بسیار مهم و مستقل در جهت ابتلا به ترومبو Zahای عروق چشم، عروق مغزی و ترومبو Zahای عروق عميق (DVT) مطرح باشد و افزایش ريسک ابتلا به ترومبو Zah را در افراد بالا برد. نتایج به دست آمده از اين مطالعه مشابه نتایجي بود که گروهی از محققان در ارتباط با افزایش هموسيستين در ترومبو Zah عروق چشمی، عروق مغزی و مبتلایان به DVT مطرح کرده اند(۹-۱۲).

افزایش هموسيستين در افراد با عملکردي نظير تحرير آندوتيلial عروق، افزایش پراكسيداسیون لیپیدها و تغييراتی که بر روی مسير انعقاد خون می گذارد همگی از عواملی بوده که می توانند باعث ترومبو Zah عروق شوند(۳).

با توجه به میزان odds ratio که در این مطالعه ۲/۷۲ به دست آمده، افزایش هموسيستين می تواند به عنوان يک عامل خطر برای ابتلا به ترومبو Zah مطرح باشد. نتایجي که در مطالعه بوشی و همكارانش به دست آمده نشان دهنده odds ratio=۱/۸ بود که خطر ابتلا به بيماري هاي عروق کرونر را در ارتباط با افزایش هموسيستين مطرح نمود(۱۳). به همين دليل به نظر مى رسد اندازه گيری میزان هموسيستين در بيماراني که سابقه آترواسکلروز، ترومبو Zah و يا بيماري هاي عروقی را داشته و يا در خانواده درجه يك خود يکی از اين بيماري ها را داشته اند امری ضروري می باشد. هم چنين توصيه به مصرف مكمel هاي فولات، B₆ و B₁₂ با کاهش سطح هموسيستين می تواند در جهت



نمودار ۱: توزيع هيپرهموسيستيني در بيماران ترومبوتك تحت مطالعه به تفكيك محل ترومبو Zah

بحث

ترومبوآمبولي يکی از علل شایع مرگ و میر در دنيا می باشد(۵،۳). آمبولي می تواند در نتيجه ترومبو Zah های مختلف که در ارگان ها رخ می دهد ايجاد گردد. از شایع ترين ترومبو Zah ها می توان از ترومبو Zah های عروق مغزی و يا ترومبو Zah های عروق محيطي نام برد. در اين راستا افزایش ميزان هموسيستين می تواند به عنوان يک عامل خطر مستقل در جهت ابتلا به بيماري هاي عروقی و ترومبو Zah مطرح باشد. اين امر ممکن است به علت نقص زننگي و يا به صورت اكتسابي اتفاق افتد، اگر چه هنوز مشخص نمی باشد که آيا خود هموسيستين، متابوليت هاي مرتبط و يا يک كوفاكتور می تواند در ابتلا به ترومبوآمبولي نقش داشته باشد. هر چند که ارتباط بين هموسيستين و آتروترومبوژنر کاملاً شناخته نشده است با اين حال هيپرهموسيستيني می تواند درصد عامل خطر را در جهت ابتلا به ترومبو Zah تشکيل دهد(۶،۱-۳).

نتایج به دست آمده از اين مطالعه با نتایج به دست آمده از مطالعه لين و همكارانش مطابقت داشت و نشان می داد که جمعیت مردان در معرض خطر بيشتری در جهت ابتلا به ترومبو Zah نسبت به زنان قرار دارند(۷). هم چنين بر طبق نتایج به دست آمده نشان داده شد که افزایش ميزان هموسيستين با افزایش سن در بيماران نسبت مستقيمه داشته و افراد با سن بالاتر بيشتر در معرض خطر ابتلا به ترومبو Zah و هيپرهموسيستيني می باشنند.

بر طبق یافته های به دست آمده از اين مطالعه، ۲۴/۶ درصد از افراد دچار ترومبو Zah که با افزایش هموسيستين خون همراه بودند، در گروه هيپرهموسيستيني متوسط

مستقل در جهت ابتلا به ترومبوزهای عروقی مطرح باشد. پیشنهاد می‌شود جهت بررسی ارتباط بین دفعات ترومبوز و سابقه خانوادگی ترومبوز با افزایش میزان هموسیستئین و هم‌چنین اندازه‌گیری سطح ویتامین‌های B_{12} و فولات و ارتباط آن با هیپرهموسیستئینی در افراد مبتلا به ترومبوز و تاثیر کمبود این ویتامین‌ها در افزایش خطر ابتلا به ترومبوز مطالعاتی در سطح وسیع‌تر با تعداد بیشتری بیمار انجام گردد.

تشکر و قدردانی

از مساعدت و همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، معاونت فنی و کنترل کیفی سازمان و مدیریت فنی آزمایشگاه تشخیص طبی و هم‌چنین کلیه همکاران شاغل در بخش بیوشیمی تشکر و قدردانی می‌گردد.

پیشگیری از ترومبوز در افراد با ریسک بالا و هم‌چنین در جهت بهبود وضعیت بیماری امری مهم و ضروری تلقی شود. در مطالعه‌ای که مقدسان و همکارانش انجام دادند مشخص شد که می‌توان با کاهش ۵ میکرومول در لیتر هموسیستئین، خطر نسبی ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را در حدود ۱۵ درصد در جمعیت عمومی و ۲۵ درصد در گروه‌های پرخطر کاهش داد(۱۴). سن، جنسیت و علی‌که باعث کاهش سطح ویتامین‌های B_{12} و فولات می‌شود همگی از عواملی هستند که می‌توانند بر روی میزان سطح هموسیستئین تاثیرگذار باشند(۱۵).

نتیجه‌گیری

نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش میزان هموسیستئین در خون می‌تواند به عنوان فاکتور خطر

References :

- 1- Fowler B. Homocysteine an independent risk factor for cardiovascular and thrombotic disease. Ther UMSCH, 2005;62(9):641-6.
- 2- Lahey JM, Tune M, Kearney J, Madlinsk B, Koo H, Jhonsen RN. Laboratory evaluation of hypercoagulable status in patients with central retinal vein occlusion who are less than 56 years of age. Ophthalmology 2002;109: 126-31.
- 3- McCully KS. Homocysteine and vascular disease. Nat Med 1996;2:386-9.
- 4- Ghandehari K, Moud ZI. Incidence and etiology of ischemic stroke in Persian young adults. Acta Neurol Scand 2006;113(2):121-4.
- 5- Eptein FH. Homocysteine and atherothrombosis, mechanism of disease. New Eng. Journal of Med 1998; 1042-50.
- 6- Key NS, McGlenen RC. Hyperhomocysteinemia and thrombophilia. Arch Pathol Lab Med 2002;126 (11):1367-75
- 7- Lin JS, Shen MC, Chang WG, Tsay W, Wong YC, Lin BB, et al. Age, sex and vitamin status affect plasma level of homocysteine, but perhomocysteinemia is possibly not an important risk factor venous thrombophilic in Taiwanse, Chinese. Br J Haematol 2002;117(1):159-63.
- 8- Diaz De Tuesta, Ribo M, Belinchon O, Marcheni PJ, Bruseas MJ. Low levels of vitamin B_{12} and venous thromboembolic disease in elderly men. Journal internal medicine 2005;258 (3): 244-9.
- 9- Hansen L, Kristesen HL, Bek T, Ingerslen J. Markers of thrombophilia in retinal vein thrombosis. Acta ophtalmol Scand 2000;78(5): 523-6.
- 10- Sottolotta G, Oriana V, Latella C, Luise F, Piromalli A, Raminez F. Role of hyperhomocysteinemia in retinal vascular occlusion disease. Clin APP Thrombosis Hemost 2007;13(1):104-7.
- 11- Martinelli I, Battaglioli T, Pedotti P, Cattaneo M. Hyperhomocysteinemia in cerebral vein thrombosis. Blood 2003;102(4):1363-66.
- 12- Qiul, Yank SK, Sang YH. Hyperhomocysteinemia and deep vein thrombosis. Zhongguo Xue Bao 2003;25.
- 13- Boushey CJ, Beresford SAA, Omenn GS, Motulsky AG. A quantitative assessment of plasma homocysteine as a risk factor for vascular disease. JAMA 1995;274: 1049-57.
- 14- Moghadasian MH, McMamus BM, Frohlich JJ. Homocysteine and coronary artery and disease clinical evidence and genetic and metabolic background. Arch Inter Med 1997;157.
- 15- Ho CH. The influence of age, sex, vitamin B_{12} , folate levels and methylenetetrahydrofolate reductase C677T genetic mutations on plasma homocysteine. Haematologica 2000;85(10):1051-4.

Correlation between plasma total homocysteine concentration and the risk of thrombosis

Deyhim M.R.¹(MS), Razjou F.¹(MD), Maghsudlu M.¹(MD), Abedini M.¹(BS)

¹Iranian Blood Transfusion Organization - Research Center

Abstract

Background and Objectives

Venous thrombosis is one of the important causes of morbidity and mortality all over the world. Elevated plasma homocysteine is known as a cause of vein morphology changes and endothelial dysfunction which lead to platelet activation, fibrinolysis inhibition and finally atherothrombosis. In this study, we evaluated the role of homocysteine in atherothrombosis as compared to the control group with no history of thrombosis.

Materials and Methods

In this case control study, 100 patients with arterial thrombosis (54 men and 46 women) as the case group and 68 as control (40 men and 28 women) were involved. Blood samples were taken in the EDTA-located tube and transported to the laboratory for fasting plasma homocysteine to be measured by ELISA kits. Some data such as age, sex, thrombosis history, and familial thrombosis history were taken from the patients through a questionnaire. We measured fasting plasma homocysteine in both case and control groups by ELISA method. The statistical analysis was performed by SPSS statistical software using T-Test and Chi-square; odds ratio was also calculated.

Results

The average rates of homocysteine in the case and control group were 23.85 ± 18.4 and 11.48 ± 3.4 $\mu\text{mol/lit}$ respectively showing statistical significance. The hyperhomocysteinemia frequency in the case group was 48%, whereas 17.6% in the control. A significant difference was also observed in the frequency of hyperhomocysteinemia between male (70.4%) and female (21.7%) in the case group. There was a moderate correlation between homocysteine level and age in the case group.

Conclusions

According to the achieved odds ratio (2.72), hyperhomocysteinemia is an independent risk factor for thrombosis. It means that homocysteine measurement should be determined in thrombosis-affected or high risk patients. Dietary supplementation with low doses of folate and vitamin B₁₂ should be considered in affected persons.

Key words: Homocysteine, Venous thrombosis, Risk factor

SJIBTO 2008; 4(4): 259-264

Received: 2 May 2007

Accepted: 23 Jan 2008

Correspondence: Deyhim M.R., MS of Biochemistry. Iranian Blood Transfusion Organization - Research Center. P.O.Box:14665-1157, Tehran, Iran. Tel: (+9821)88601599; Fax: (+9821)88601599
E-mail: mrdeyhim@yahoo.com