

# خون

فصلنامه علمی پژوهشی  
دوره ۷ شماره ۴ زمستان ۸۹ (۲۳۴-۲۲۷)

مقاله پژوهشی

## مقایسه اثر درمان ترکیبی دفروکسامین و دفیریپرون با دفروکسامین به تنها بی در بیماران تالاسمی مازور

حسین کرمی<sup>۱</sup>، مهرنوش کوثریان<sup>۲</sup>، حسن ابوالقاسمی<sup>۳</sup>، فربیا رشیدی قادر<sup>۳</sup>، کوروش وحید شاهی<sup>۳</sup>، مژده دبیریان<sup>۳</sup>، حسن کرمی<sup>۴</sup>، محمد رضا مهدوی<sup>۵</sup>، الهه یوسفی<sup>۶</sup>، رضا علیزاده نوابی<sup>۷</sup>، علی طالع<sup>۸</sup>، سهیلا شاه محمدی<sup>۹</sup>

### چکیده

#### سابقه و هدف

اضافه بار آهن به ویژه در قلب، مهمترین علت مرگ و میر بیماران تالاسمی مازور می‌باشد. شلاتورترایی یکی از روش‌های درمانی مهم این بیماران است. این مطالعه به منظور مقایسه اثرات درمان ترکیبی دفروکسامین با دفیریپرون و دفروکسامین به تنها بی در بیماران تالاسمی مازور استان مازندران انجام شد.

#### مواد و روش‌ها

در یک کارآزمایی بالینی، بیماران تالاسمی مازور با فریتین سرم بیش از ۳۰۰۰ ng/ml به دو گروه تقسیم و از نظر سن، جنس، فریتین سرم و LVEF همسان سازی شدند. به گروه اول دفروکسامین به تنها بی و به گروه دوم ترکیبی از دفیریپرون و دفروکسامین داده شد. بیماران هر ماه معاینه فیزیکی شده و فریتین سرم، متوسط هموگلوبین، ALTAST و LVEF از ۶ ماه قبل از مطالعه و سپس در هر مراجعته اندازه‌گیری و ثبت شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t و کایدو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

#### یافته‌ها

۵۰ بیمار در هر گروه در مدت  $6/2 \pm 28/5$  ماه بی‌گیری شدند. فریتین سرم در گروه‌های دفروکسامین و ترکیبی به ترتیب  $1400 \pm 4100$  ng/ml و  $1700 \pm 4500$  ng/ml در طی ۶ ماه قبل از شروع مطالعه بود که به ترتیب به  $3800 \pm 1400$  ng/ml و  $4600 \pm 2200$  ng/ml در پایان درمان کاهش یافت ( $p < 0.05$ ). فقط ۳ بیمار مبتلا به لوکوبنی قابل برگشت و ۱۰ بیمار دچار حالت تهوع در گروه درمان ترکیبی شدند.

#### نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که درمان ترکیبی، دارای اثر بهتری در کاهش فریتین سرم است. به علاوه می‌تواند LVEF را بهبود بخشد.

**کلمات کلیدی:** دفروکسامین، دفیریپرون، تالاسمی مازور، حجم ضربه‌ای بطنی، فریتین

تاریخ دریافت: ۱۱/۹/۱۱

تاریخ پذیرش: ۲۶/۱/۱۹

- ۱- مؤلف مسؤول: فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان - استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مرکز تحقیقات تالاسمی - صندوق پستی: ۴۸۱۵۸-۳۴۴۷۷
- ۲- فوق تخصص غدد کودکان - استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مرکز تحقیقات تالاسمی
- ۳- فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان - استاد مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران و دانشگاه علوم پزشکی بقیه...
- ۴- فوق تخصص قلب کودکان - استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
- ۵- متخصص کودکان - استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مرکز تحقیقات تالاسمی
- ۶- متخصص قلب و عروق - استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
- ۷- فوق تخصص گوارش کودکان - استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
- ۸- دکترای علوم آزمایشگاهی - استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مرکز تحقیقات تالاسمی
- ۹- پزشک عمومی - دانشگاه علوم پزشکی مازندران
- ۱۰- متخصص کودکان - دانشگاه علوم پزشکی مازندران
- ۱۱- کارشناس ارشد بیهوشی - دانشگاه علوم پزشکی مازندران و پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بوعلی سینا ساری

**مقدمه**

تالاسمی شایع ترین اختلال ژنتیکی تک ژنی در دنیاست که در کشورهای حوزه مدیترانه، مناطقی از شمال و غرب آفریقا، خاورمیانه، شبه قاره هند و جنوب شرقی آسیا بسیار شایع است(۱-۳). شیوع ژن بتا تالاسمی در شمال کشور ایران و اطراف دریای مازندران بیشترین درصد(حدود ۱۰٪)، در اصفهان ۸٪، در مناطق جنوبی کشور ۱۰-۸٪ و در سایر مناطق ۴-۸٪ است(۴). بیماران تالاسمی مژوز نیاز به تزریق خون منظم دارند و این امر می‌تواند منجر به رسوب آهن اضافی در بافت‌ها و ارگان‌های مختلف بدن شده و در نهایت به ارگان‌ها و بافت‌ها صدمه وارد گردد. مهم‌ترین علت مرگ و میر در بیماران تالاسمی مژوز، تجمع آهن در اعضای مختلف بدن به خصوص قلب می‌باشد(۵-۷). جهت جلوگیری از این موضوع، بیماران بایستی از داروی آهن‌زدا برای برداشت آهن اضافی استفاده کنند. دفروکسامین مهم‌ترین و اصلی‌ترین داروی آهن‌زدا و یک داروی نجات‌دهنده حیات برای بیماران تالاسمی مژوز از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون بوده است(۸). دفریپرون از روز ۱۹۸۳ در سترس بیماران قرار گرفته است(۹-۱۱). دفریپرون در مقایسه با دفروکسامین موجب کاهش قابل توجه سطح فریتین سرم، کاهش بار آهن کبد و قلب و افزایش دفع ادراری آهن می‌گردد(۱۲، ۱۱، ۵).

در سال‌های اخیر، استفاده متناوب از درمان‌های ترکیبی و داروهای آهن‌زدا به عنوان روش‌های برتر آهن‌زدایی مورد توجه محققین قرار گرفته است(۱۳-۱۵). با توجه به کمبود و گرانی داروی دفروکسامین در ایران، عدم تحمل بیماران در مصرف دوز مورد نیاز دارو، عوارض این دارو و با عنایت به این که عوارض قلبی بیماران با درمان دفروکسامین بهبود قابل توجهی نیافته است، این مطالعه با هدف بررسی اثرات مفید درمان ترکیبی دفروکسامین و دفریپرون در مقایسه با درمان با دفروکسامین به تنهایی، کاهش دوز مصرفی داروی دفروکسامین، کاهش عوارض قلبی و در نتیجه تحمل بهتر بیماران تالاسمی مژوز مراجعت کننده به مرکز تحقیقات تالاسمی ساری انجام شد(۱۶، ۱۷).

## مواد و روش‌ها

این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی در بخش تالاسمی بیمارستان بوعلی سینا ساری از زمستان ۱۳۸۴ تا زمستان ۱۳۸۶ بر روی بیماران تالاسمی مژوزی که با آزمایش الکتروفورز هموگلوبین، بیماری آن‌ها اثبات شده انجام گرفته است. کلیه بیماران به تزریق خون مکرر نیاز داشتند و مشکلی در میزان تزریق خون آن‌ها وجود نداشت. محدوده سنی آن‌ها بین ۳۰-۵ سال و سطح فریتین آن‌ها بیشتر از ng/ml ۳۰۰۰ بود. پس از کسب موافقت و رضایت کبی از بیمار یا والدین آن‌ها، بیماران به طور تصادفی به دو گروه ۵۰ نفره تقسیم شدند و این دو گروه از لحاظ سن، جنس، سطح فریتین و میزان برون ده قلبی (EF: Ejection Fraction) مشابه سازی شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران شامل سن، جنس، سن اولین ترانسفیوژن، شروع دفروکسامین، مدت مصرف داروی آهن‌زدای تزریقی و هم چنین زمان طحالبرداری در فرم اطلاعاتی ثبت شد. سپس ۵۰ نفر از بیماران با دفروکسامین تزریقی (دفروکسامین) ساخت کارخانه نوارتیس به تنهایی با دوز mg/kg ۶۰-۵۰ در روز، ۵ بار در هفته تحت درمان قرار گرفتند و ۵۰ نفر از بیماران تحت درمان ترکیبی دفریپرون خوراکی ساخت کارخانه آپوتکس با دوز mg/kg ۷۵-۵۰ در روز، ۵ بار در هفته و دفروکسامین تزریقی با دوز mg/kg ۳۵-۳۰ در روز، ۴ بار در هفته قرار گرفتند. بیماران هر ماه یک بار ویزیت و معاینه شدند و در مورد نحوه درمان، اثرات مثبت و عوارض احتمالی مورد سؤال قرار گرفتند. سطح فریتین و میانگین هموگلوبین بیماران از ۶ ماه قبل از شروع مطالعه و سپس در هر مراجعه توسط دستگاه Electronic counter (T-890) و به روش استاندارد اندازه‌گیری و ثبت شد. بروند ده قلبی بیماران توسط فوق تخصص قلب و با استفاده از اکوکاردیوگرافی به روش سیمپسون با دستگاه Ving med ۸۰۰ در هر مراجعه ارزیابی و ثبت شد. لازم به ذکر است که بررسی کننده از رژیم دارویی بیمار بی اطلاع بود. میزان فریتین بیماران، به روش Immuno Radiometric Assay (IRMA) و با استفاده از کیت RADIM ایتالیا و در یک آزمایشگاه معتبر انجام شد. آنزیم‌های کبدی ALT و AST بیماران توسط دستگاه (۷۰۴) هیتاچی با کیت پارس

شروع مطالعه، میانگین فریتین ۶ ماه قبل از شروع مطالعه و میانگین بروند ده قلبی (EF) ۶ ماه قبل از شروع مطالعه در دو گروه درمان با دفروکسامین به تنها یی و گروه درمان ترکیبی با دفروکسامین و دفریپرون، اختلاف معنی داری نداشت (جدول ۱). در گروه درمانی دفروکسامین به تنها یی، ۶ بیمار (۱۲٪) و گروه درمان ترکیبی، ۹ بیمار (۱۸٪) مبتلا به دیابت بودند ( $p < 0.04$ ). ۹ بیمار (۱۸٪) در گروه دفروکسامین به تنها یی و ۱۲ بیمار (۲۴٪) در گروه درمان ترکیبی مبتلا به کاردیومیوپاتی بودند ( $p < 0.05$ ). ۱ نفر (۰٪) هایپوتیروئیدی داشت که در گروه دفروکسامین به تنها یی بود و ۱ نفر (۰٪) هایپوپاراتیروئیدی داشت که در گروه درمان ترکیبی قرار داشت. در گروه درمان دفروکسامین به تنها یی، ۶ نفر (۱۲٪) و در گروه درمان ترکیبی ۱۰ نفر (۲۰٪) دیگوکسین مصرف می کردند.

میانگین سطح فریتین در پایان مطالعه در گروه درمان ترکیبی به طور معنی داری کمتر از گروه درمان با دفروکسامین به تنها یی بود ( $p < 0.04$ ). هم چنان میانگین میزان EF در پایان مطالعه در گروه درمان ترکیبی به طور معنی داری بیشتر از گروه درمانی دفروکسامین به تنها یی بود ( $p < 0.04$ ) (جدول ۲).

در گروه درمان با دفروکسامین به تنها یی، میانگین سطح

آزمون و به روش IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) اندازه گیری و ثبت گردید و سپس تأثیر درمان دو شیوه درمانی دفروکسامین به تنها یی و دفروکسامین و دفریپرون با هم، با یکدیگر مقایسه شد. معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم رضایت بیماران و والدین برای شروع درمان دفریپرون، حساسیت به دفروکسامین و حساسیت به دفریپرون بود. میانگین مدت زمان مطالعه  $6/2 \pm 28/5$  ماه بود. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS ۱۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای مقایسه متغیرهای کمی از آزمون های آماری T-test و repeated measurements مستقل مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون آماری مجدور کا استفاده شد.

## یافته ها

در گروه درمانی دفروکسامین به تنها یی، ۲۱ نفر (۴۲٪) مرد و ۲۹ نفر (۵۸٪) زن و در گروه درمان ترکیبی دفروکسامین و دفریپرون، ۲۸ نفر (۵۶٪) مرد و ۲۲ نفر (۴۴٪) زن بودند. طحال برداری ۱۶ نفر (۳۲٪) در گروه درمانی دفروکسامین به تنها یی و ۳۰ نفر (۶۰٪) در گروه درمان ترکیبی، انجام شده بود. میانگین سن بیماران، سن تشخیص بیماری تالاسمی، سن اولین تزریق خون، سن طحال برداری، میانگین مدت مصرف دفروکسامین قبل از

جدول ۱: مشخصات بیماران تالاسمی ماذور مورد مطالعه به تفکیک دو گروه

p value	درمان ترکیبی	دفروکسامین به تنها یی	متغیر
۰/۲	۲۲ ± ۵/۲ سال	۲۱ ± ۵/۵ سال	سن در هنگام مطالعه
۰/۹	۱۲/۹ ± ۱۴ ماه	۱۳/۱ ± ۱۲/۹ ماه	سن تشخیص تالاسمی
۰/۵	۲۱/۳ ± ۱۸/۴ ماه	۱۶/۴ ± ۱۳/۶ ماه	سن اولین ترانسفیوژن
۰/۰۹	۱۳/۸ ± ۷/۵ سال	۱۰/۱ ± ۵ سال	سن انجام طحال برداری
۰/۴	۱۶/۴ ± ۴/۹ سال	۱۵/۶ ± ۴/۶ سال	مدت زمان مصرف دفروکسامین
۰/۰۳	۳۵/۸ ± ۴/۱	۳۹ ± ۷/۲	دوز دفروکسامین (mg/kg/d)
-	۲۸/۵ ± ۶/۲ ماه	-	مدت مصرف دفریپرون
-	۴۹/۱ ± ۱۷/۶	-	دوز دفریپرون (mg/kg/d)
۰/۰۱	۵۲/۴ ± ۶/۱	۴۸ ± ۱۱/۶	وزن (کیلو گرم)
۰/۰۲	۸/۷ ± ۱	۹/۱ ± ۰/۷	میانگین هموگلوبین ۶ ماه قبل از شروع مطالعه (gr/dl)
۰/۲	۴۵۰۰ ± ۱۷۰۰	۴۱۰۰ ± ۱۴۰۰	میانگین فریتین ۶ ماه قبل از شروع مطالعه (ng/ml)
۰/۵	۶۸/۱ ± ۷/۱	۶۹/۱ ± ۴/۵	میانگین بروند ده قلبی (EF) ۶ ماه قبل از شروع مطالعه (%)

جدول ۲: تاثیر درمان ترکیبی دفروکسامین با دفریپرون و دفروکسامین به تنها بی در بیماران تالاسمی مژور

P value	درمان ترکیبی	دفروکسامین به تنها	دوره	پارامتر
۰/۳۴	۸/۷ ± ۱	۹ ± ۰/۶	۶ ماهه اول	Hemoglobin (gr/dl)
۰/۵۲	۸/۸ ± ۰/۹	۹ ± ۰/۶	۶ ماهه دوم	
۰/۴۶	۸/۹ ± ۱	۱۰/۶ ± ۱۱/۳	۶ ماهه سوم	
۰/۷۲	۹ ± ۰/۹	۹ ± ۰/۸	۶ ماهه چهارم	
۰/۶۸	۴۲۱۷ ± ۱۴۵۶	۴۲۷۵ ± ۱۷۷۷	۶ ماهه اول	
۰/۱۹	۳۷۲۱ ± ۱۵۱۲	۴۱۲۴ ± ۱۵۵۹	۶ ماهه دوم	
۰/۲۵	۴۰۲۸ ± ۱۵۲۸	۴۱۹۰ ± ۲۰۳۲	۶ ماهه سوم	Ferritin (ng/ml)
۰/۰۴	۳۸۰۰ ± ۱۴۰۰	۴۶۰۰ ± ۲۲۰۰	۶ ماهه چهارم	
۰/۴۲	۶۸/۵ ± ۶/۸	۶۹/۳ ± ۵/۱	۶ ماهه اول	
۰/۸۳	۶۹/۱ ± ۴/۹	۶۹/۱ ± ۵/۹	۶ ماهه دوم	
۰/۴۷	۶۹ ± ۴/۷	۶۸/۷ ± ۶/۱	۶ ماهه سوم	
۰/۰۴	۶۹ ± ۴	۶۶ ± ۶	۶ ماهه چهارم	
۰/۰۸	۶۳ ± ۳۶/۹	۸۳/۶ ± ۶۲	۶ ماهه اول	EF (%)
۰/۲۵	۴۶/۷ ± ۲۸/۸	۵۱/۷ ± ۲۸/۱	۶ ماهه دوم	
۰/۳۱	۴۴/۸ ± ۳۸/۱	۵۰/۵ ± ۴۱/۹	۶ ماهه سوم	
۰/۴۱	۳۶/۶ ± ۲۲/۵	۴۱ ± ۲۲/۳	۶ ماهه چهارم	
۰/۰۲	۷۴/۳ ± ۴۲/۳	۱۴۰/۲ ± ۱۵۱/۶	۶ ماهه اول	
۰/۱۶	۶۵/۸ ± ۵۱/۳	۷۳/۸ ± ۵۶/۱	۶ ماهه دوم	
۰/۰۹	۶۷ ± ۸۶/۸	۸۴ ± ۶۹/۲	۶ ماهه سوم	ALT (IU/ml)
۰/۱۳	۳۷/۳ ± ۲۷/۷	۵۰ ± ۴۲/۴	۶ ماهه چهارم	

### بحث

در مطالعه حاضر میانگین سطح فریتین در پایان مطالعه در گروه درمان ترکیبی دفروکسامین و دفریپرون، به طور معنی داری کمتر از گروه درمان با دفروکسامین به تنها بی بود. از طرفی در گروه درمان با دفروکسامین به تنها بی، میانگین سطح فریتین در پایان مطالعه در مقایسه با ۶ ماه قبل از شروع مطالعه کاهش معنی داری داشت ( $p < 0.05$ ). در طول مدت تحقیق، ۱۱ نفر (۲۲٪) از بیماران در گروه درمان ترکیبی دچار عارضه گوارشی شدند در حالی که در هیچ یک از بیماران در گروه درمان با دفروکسامین به تنها بی، عوارض گوارشی گزارش نگردید. یک نفر (۲٪) در گروه درمانی دفروکسامین به تنها بی و ۲ نفر (۴٪) در گروه درمان ترکیبی دچار عارضه پوستی شدند. هیچ کدام از بیماران در گروه درمان ترکیبی قبل از شروع داروی دفریپرون لکوپنی نداشتند، ولی بعد از شروع درمان، ۲ نفر (۴٪) دچار لکوپنی شدند.

فریتین در پایان مطالعه در مقایسه با ۶ ماه قبل از شروع مطالعه افزایش معنی داری نداشت، ولی در گروه درمان ترکیبی، میانگین سطح فریتین پس از طی دوره ۲۴ ماه در مقایسه با ۶ ماه قبل از شروع مطالعه کاهش معنی داری داشت ( $p < 0.05$ ).

در طول مدت تحقیق، ۱۱ نفر (۲۲٪) از بیماران در گروه درمان ترکیبی دچار عارضه گوارشی شدند در حالی که در هیچ یک از بیماران در گروه درمان با دفروکسامین به تنها بی، عوارض گوارشی گزارش نگردید. یک نفر (۲٪) در گروه درمانی دفروکسامین به تنها بی و ۲ نفر (۴٪) در گروه درمان ترکیبی دچار عارضه پوستی شدند. هیچ کدام از بیماران در گروه درمان ترکیبی قبل از شروع داروی دفروکسامین به تنها بی نداشتند، ولی بعد از شروع درمان، ۲ نفر (۴٪) دچار لکوپنی شدند.

آهن زدا، سبب بهبود معنی داری در کسر جهشی بطن بیماران شده بود (۲۰).

میزان شیوع عوارض گوارشی ناشی از درمان ترکیبی و درمان با دفروکسامین به تنها یک، اختلاف معنی داری نشان نداد که این مطالعه با مطالعه پنگ و همکاران که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ در تایوان انجام شد، مطابقت دارد (۲۱). در گروهی که تحت درمان ترکیبی قرار گرفتند در ۵ بیمار در هفته اول درمان، عوارض گوارشی به صورت تهوع و استفراغ شدید گزارش شد. چنین نتیجه ای در مطالعه انجام شده توسط کتابمیس و همکاران که در سال ۲۰۰۶ در یونان انجام شده بود، گزارش شده در مطالعه یونان، عوارض گوارشی، شایع ترین عارضه جانی بود که به خصوص در هفته اول درمان ایجاد شده بود (۱۸).

از جمله عوارضی که حین مصرف داروهای آهن زدا خوراکی بروز می کند، عارضه گوارشی می باشد که در٪ ۲۰ بیماران مورد مطالعه در این تحقیق که درمان ترکیبی دریافت نموده اند، مشاهده شد. هم چنین در مطالعه کتابمیس و همکاران شایع ترین عوارض جانی مشاهده شده در درمان ترکیبی، عوارض گوارشی بود که در٪ ۲۰ بیماران گزارش شده بود و این نتیجه با مطالعه حاضر مطابقت کامل دارد (۱۸). در مطالعه دار و همکاران، ۶ بیمار از ۹۱ بیمار دریافت کننده درمان ترکیبی، دچار عوارض گوارشی شده بودند (۱۹).

در مطالعه حاضر میانگین AST و ALT بیماران در کسانی که دفروکسامین به تنها یک دریافت می کردند، بیشتر از کسانی است که درمان ترکیبی دریافت می کردند و در مطالعه های مشابه این بررسی صورت نگرفته است. می توان علت این تفاوت را به میزان AST و ALT قبل از شروع درمان بیماران نسبت داد. در گروهی که درمان ترکیبی دریافت می کردند، تا پایان مطالعه ۲ بیمار (٪ ۴) دچار لکپنی شدند که با کم کردن دوز دارو، عارضه برطرف شد و هیچ مورد آگرانولوسیتوز گزارش نشد. این مطالعه با مطالعه انجام شده توسط کتابمیس و همکاران در سال ۲۰۰۶ در یونان، در این مورد هم خوانی ندارد. در مطالعه یونان میزان آگرانولوسیتوز ۴/۲ مورد در ۱۰۰ بیمار در سال بود (۱۸).

کشور یونان انجام شده بود، ۴۳ بیمار بتا تالاسمی به مدت یک سال تحت درمان با دفیریپرون ۴ روز در هفته یا درمان ترکیبی دفیریپرون و دفروکسامین برای ۳ روز در هفته قرار گرفتند که هر دو روش درمان بعد از گذشت یک سال سبب کاهش معنی داری در سطح فریتین سرم شده بودند (۱۸).

در مطالعه ای که توسط دار و همکاران در کشور عمان انجام شده بود، ۹۱ بیمار بتا تالاسمی مژوزر که تحت درمان با دفروکسامین برای چندین سال بودند، تحت درمان اضافی با آهن زدای خوراکی دفیریپرون قرار گرفتند. مطابق نتایج تحقیق فوق، در یک دوره کوتاه مدت ۶ ماهه، درمان ترکیبی سبب کاهش قابل ملاحظه و معنی دار سطح فریتین بیماران در مقایسه با زمانی که فقط تحت درمان با دفروکسامین به تنها یک بودند، شد (۱۹).

هم چنین در مطالعه اوریگا و همکاران در ایتالیا نیز فریتین ۵۰ بیمار از ۵۵ بیمار تالاسمی مژوزر که برای حداقل ۱۲ ماه تحت درمان ترکیبی بودند، کاهش معنی داری یافته بود (۲۰). در مطالعه پنگ و همکاران که بر روی ۱۱۴ بیمار بتا تالاسمی مژوزر در کشور تایوان انجام شده بود، گزارش گردید که هر سه رژیم درمانی دفروکسامین به تنها یک، دفیریپرون به تنها یک و درمان ترکیبی دفروکسامین و دفیریپرون، سبب کاهش معنی داری در سطح فریتین سرم می شود (۲۱).

در مطالعه حاضر میانگین میزان برونده قلبی (EF) در پایان مطالعه در گروه درمان ترکیبی به طور معنی داری بیشتر از گروه درمانی دفروکسامین به تنها یک بود. به عبارت دیگر درمان ترکیبی تاثیر بیشتری در بهبود عملکرد قلب بیماران مورد بررسی داشته و این مساله در مطالعه های دیگر نیز مورد تائید قرار گرفته است. در مطالعه دار و همکاران نیز که برونده قلب به وسیله کسر جهشی (EF) ارزیابی شده بود، بعد از درمان ترکیبی به مدت یک سال به طور قابل توجهی بهبود یافته بود (۱۹). هم چنین در مطالعه کتابمیس و همکاران نیز برونده قلب بیماران تحت درمان ترکیبی بهبود یافته بود (۱۸). در مطالعه اوریگا و همکاران، از ۱۸ بیمار مبتلا به تالاسمی مژوزر که به خاطر بیماری قلبی تحت درمان قرار داشتند، درمان ترکیبی داروهای

سطح آهن ادرار و نمونه‌گیری بافت کبد از مصادیق دیگر تجمع آهن در بیماران است که می‌تواند در مطالعه‌های دیگر به آن پرداخته شود.

### تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران به جهت حمایت مالی و از بیماران تالاسمی شرکت‌کننده در این پژوهش تشکر و قدردانی می‌گردد. نویسنده‌گان مقاله اعلام می‌نمایند که هیچ‌گونه تصاد منافع در نگارش این مقاله وجود ندارد. این تحقیق با شماره IRCT138810203032N1 در مرکز بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران به ثبت رسیده است.

### نتیجه‌گیری

نتایج این تحقیق نشان داد که درمان ترکیبی دفروکسامین و دفریپرون، تاثیر بهتری در کاهش سطح فربین و بهبود عملکرد قلب خواهد داشت و می‌تواند در بیماران تالاسمی مازور مورد استفاده قرار گیرد. از محدودیت‌های مطالعه این بود که چون تحقیق بر روی نمونه انسانی انجام شد، دادن داروی دفریپرون به تنها یکی به گروهی از بیماران مشکل بود و امکان تجویز دارو در گروه‌ها به صورت مورد شاهدی وجود نداشت. محدودیت دیگر عدم دسترسی به روش ارزیابی میزان آهن بافت بود که بهتر است به جای فربین سرم و اکوی قلبی، از<sup>\*</sup> MRI استفاده شود. امکان فوق در زمان انجام مطالعه در استان وجود نداشت. ارزیابی

### References :

- 1- Akay A, Dragomir A, Yardimci A, Canatan D, Yesilipek A, Pogue BW. A data-mining approach for investigating social and economic geographical dynamics of beta-thalassemia's spread. IEEE Trans Inf Technol Biomed 2009; 13(5): 774-80.
- 2- Olivieri NF, Brittenham GM. Iron-chelating therapy and the treatment of thalassemia. Blood 1997; 89(3): 739-61.
- 3- Lorey FW, Arnopp J, Cunningham GC. Distribution of hemoglobinopathy variants by ethnicity in a multiethnic state. Genet Epidemiol 1996; 13(5): 501-12.
- 4- Habibzadeh F, Yadollahie M, Merat A, Haghshenas M. Thalassemia in Iran; an overview. Arch Iran Med 1998; 1: 27-33.
- 5- Tanner MA, Galanello R, Dessi C, Smith GC, Westwood MA, Agus A, et al. A randomized, placebo-controlled, double-blind trial of the effect of combined therapy with deferoxamine and deferiprone on myocardial iron in thalassemia major using cardiovascular magnetic resonance. Circulation 2007; 115(14): 1876-84.
- 6- Lekawannijit S, Chattipakorn N. Iron overload thalassemic cardiomyopathy: iron status assessment and mechanisms of mechanical and electrical disturbance due to iron toxicity. Can J Cardiol 2009; 25(4): 213-8.
- 7- Borgna-Pignatti C, Rugolotto S, De Stefano P, Zhao H, Cappellini MD, Del Vecchio GC, et al. Survival and complications in patients with thalassemia major treated with transfusion and deferoxamine. Haematologica 2004; 89(10): 1187-93.
- 8- Smith RS. Iron excretion in thalassaemia major after administration of chelating agents. Br Med J 1962; 2 Kontoghiorghes GJ, Aldouri MA, Sheppard L, (5319): 1577-80.
- 9- Hoffbrand AV. 1,2-Dimethyl-3- hydroxypyrid - 4- one, an orally active chelator for treatment of iron overload. Lancet 1987; 1(8545): 1294-5.
- 10- Kontoghiorghes GJ, Aldouri MA, Hoffbrand AV, Barr J, Wonke B, Kourouclaris T, et al. Effective chelation of iron in beta thalassaemia with the oral chelator 1,2-dimethyl-3-hydroxypyrid-4-one. Br Med J (Clin Res Ed) 1987; 295(6612): 1509-12.
- 11- Barman Balfour JA, Foster RH. Deferiprone: a review of its clinical potential in iron overload in beta-thalassaemia major and other transfusion-dependent diseases. Drugs 1999; 58(3): 553-78.
- 12- Kontoghiorghes GJ, Neocleous K, Kolnagou A. Benefits and risks of deferiprone in iron overload in Thalassaemia and other conditions: comparison of epidemiological and therapeutic aspects with deferoxamine. Drug Saf 2003; 26(8): 553-84.
- 13- Kontoghiorghes GJ. Future chelation monotherapy and combination therapy strategies in thalassemia and other conditions. comparison of deferiprone, deferoxamine, ICL670, GT56-252, L1NALL and starch deferoxamine polymers. Hemoglobin 2006; 30(2): 329-47.
- 14- Cohen AR, Galanello R, Piga A, De Sanctis V, Tricca F. Safety and effectiveness of long-term therapy with the oral iron chelator deferiprone. Blood 2003; 102(5): 1583-7.
- 15- Hoffbrand AV, Cohen A, Hershko C. Role of deferiprone in chelation therapy for transfusional iron overload. Blood 2003; 102(1): 17-24.
- 16- Gabutti V, Piga A. Results of Long-term iron chelating therapy. Acta Haematol 1996; 95(1): 26-36.
- 17- Borgna-Pignatti C, Rugolotto S, De Stefano P, Piga A, Di Gregorio F, Gamberini MR, et al. Survival and disease complications in thalassemia major. Ann N Y Acad Sci 1998; 850: 227-31.
- 18- Kattamis A, Ladis V, Berdousi H, Kelekis NL, Alexopoulou E, Papasotiriou I, et al. Iron chelation treatment with combined therapy with deferiprone and

- deferoxamine: a 12-month trial. *Blood Cells Mol Dis* 2006; 36(1): 21-5.
- 19- Daar S, Pathare AV. Combined therapy with deferoxamine and deferiprone in beta thalassemia major patients with transfusional iron overload. *Ann Hematol* 2006; 85(5): 315-9.
- 20- Origlia R, Bina P, Agus A, Crobu G, Defraia E, Dessì C, *et al.* Combined Therapy with deferiprone and deferoxamine in thalassemia major. *Haematologica* 2005; 90(10): 1309-14.
- 21- Peng CT, Wu KH, Wu SF, Liang DC, Yang CP, Jang RC, *et al.* Deferiprone or deferoxamine vs. combination therapy in patients with beta-thalassemia major: a case study in Taiwan. *Hemoglobin* 2006; 30 (1): 125-30.

Archive of SID

*Original Article*

## Deferiprone plus deferoxamine versus deferoxamine iron chelation in beta thalassemia major

Karami H.<sup>1</sup>, Kosaryan M.<sup>1</sup>, Abolghasemi H.<sup>2,3</sup>, Rashidighader F.<sup>1</sup>, Vahidshahi K.<sup>1</sup>, Dabirian M.<sup>1</sup>, Karami H.<sup>1</sup>, Mahdavi M.R<sup>1</sup>, Yousefi E.<sup>1</sup>, Alizadeh Navaei R.<sup>1</sup>, Tale A.<sup>1</sup>, Shah Mohammadi S.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Thalassemia Research Center, Bouali Sina Hospital, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>2</sup>Research Center of Iranian Blood Transfusion Organization, Tehran, Iran

<sup>3</sup>Baghiatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

<sup>4</sup>Research and Development Branch, Bouali Sina Hospital, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

### **Abstract**

#### **Background and Objectives**

Iron overload especially in heart is one of the most important causes of death among patients with major thalassemia. Chelation therapy is one of the main therapeutic methods in these patients. This study was done to compare the therapeutic effects of deferoxamine (DFO) and deferiprone combination therapy with deferoxamine alone in the patients of Mazandaran, Iran.

#### **Materials and Methods**

In this clinical trial, major thalassemia patients with serum ferritin >3000 ng/ml were divided into two groups and matched based on age, sex, serum ferritin levels and cardiac systolic function (LVEF). First group received DFO alone and second group received combination therapy of deferiprone and deferoxamine. The patients were physically examined every month; serum ferritin, mean Hb, AST, ALT, and LVEF also started to be measured 6 months prior to the study and subsequently at every visit. Data were analyzed using t-test and  $\chi^2$  test.

#### **Results**

There were fifty patients in each group in single and combination therapy groups. Duration of F/U was  $28.5 \pm 6.2$  months. Serum ferritin levels in single and combination therapy groups were  $4100 \pm 1400$  and  $4500 \pm 1700$  ng/ml during 6 months before the study, respectively; the levels decreased to  $4600 \pm 2200$  and  $3800 \pm 1400$  ng/ml at the end of treatment, respectively ( $p<0.05$ ). Only 3 patients had leukopenia and 10 had nausea in combination therapy group.

#### **Conclusions**

The study showed that the combination therapy has a better effect on decreasing the serum level ferritin. Moreover, it can improve LVEF.

**Keywords:** Deferoxamine, Deferiprone, Thalassemia major, Ventricular ejection fraction, Ferritins

*Sci J Iran Blood Transfus Org 2011; 7(4): 227-234*

Received: 2 Dec 2009

Accepted: 18 Oct 2010

**Correspondence:** Karami H., MD. Pediatrics Hematologist Oncologist. Assistant Professor of Thalassemia Research Center, Bouali Sina Hospital, Mazndaran University of Medical Sciences.

P.O.Box: 48158-38477, Sari, Iran. Tel: (+98151) 2233010-16; Fax : (+98151) 2234506

E-mail: [karami\\_oncologist@yahoo.com](mailto:karami_oncologist@yahoo.com)