

خون

فصلنامه انتقال خون
دوره ۷ شماره ۴ زمستان ۸۹ (۲۷۱-۲۶۶)

مقاله کوتاه

رابطه میزان پذیرش یا معافیت و مشخصات فردی داوطلبان اهدای خون در مشهد

علی وفایی نجار^۱، شهین سعیدی نجات^۲، حبیب... اسماعیلی^۳، دلارام صیادپور زنجانی^۴، ریحانه بازرگانی^۵

چکیده سابقه و هدف

سلامت خون و فرآوردهای خونی به سلامت عمومی اهداکنندگان، شیوع بیماری‌های منتقله از راه خون در آن‌ها، حساسیت آزمایش‌های غربالگری و از همه مهم‌تر انتخاب اهدا کننده سالم و دارای شرایط اهدای خون از طریق مشاوره و معاینه بستگی دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین میزان پذیرش یا معافیت بر اساس مشخصات فردی داوطلبان اهدای خون است.

مواد و روش‌ها

مطالعه انجام شده از نوع توصیفی مقطعی و جامعه پژوهش، ۱۰۴۷ داوطلب اهدای خون در سال ۱۳۸۷ بودند. در این مطالعه توزیع فراوانی سن، جنس، شغل و وضعیت تأهل اهداکنندگان بررسی گردید. رابطه بین خصوصیات دموگرافیک فرد با نتیجه مشاوره و معاینه پزشک و آزمایشگاه بررسی و توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های کای دو و t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پافته‌ها

از ۱۰۴۷ داوطلب اهدای خون، ۳/۸۸٪ به عنوان اهداکننده پذیرفته شدند. معافیت از اهدای خون با جنسیت، وضعیت تأهل، نوع اهدا کننده (بار اول، مستمر، با سابقه) و وضعیت اشتغال ارتباط معنادار داشت ($p < 0.01$).

نتیجه‌گیری

دقت و کیفیت در معاینه‌های اولیه اهداکنندگان خون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و لازم است در انتخاب داوطلبان مجرد و دارای مشاغل آزاد با توجه به احتمال بیشتر آلودگی ویروسی، دقیق بیشتری مبذول گردد.

کلمات کلیدی: اهداکنندگان خون، انتقال خون، خصوصیات دموگرافیک، ایران

تاریخ دریافت: ۱۱/۱/۱۱
تاریخ پذیرش: ۱۶/۱/۱۹

- ۱- دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- ۲- مؤلف مسئول: پزشک عمومی و MPH - دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد - صندوق پستی: ۹۱۳۷۶۷۳۱۱۹
- ۳- دکترای تخصصی آمار زیستی - دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- ۴- متخصص آسیب‌شناسی - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران و پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون خراسان رضوی
- ۵- پزشک عمومی - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران و پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون خراسان رضوی

مقدمه

ویروس‌های هپاتیت B، C، HIV با انجام آزمایش به تهایی کافی نمی‌باشد و راهکارهای دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد^(۱). در مطالعه‌ای که توسط ابوالقاسمی و همکاران در تهران انجام شد، ۱۶۳۴۱۸ نفر داوطلب اهدای خون در سال ۱۳۷۸ مورد بررسی قرار گرفتند که ۳۰۶۹۶ نفر (۱۸/۷۸٪) به دلیل تماس نامطمئن جنسی (۱۵/۷٪)، مصرف دارو (۱۲/۴٪)، فشار خون پایین (۱۱/۵٪)، حجامت (۷/۸٪) و عفونت تنفسی (۵/۳٪) از اهدای خون معاف شدند. در این مطالعه شایع‌ترین علت معافیت از اهدای خون در گروه سنی زیر ۲۵ سال، روابط جنسی نامطمئن بود^(۲). در بررسی مطالعه‌های داخلی، رابطه بین عوامل دموگرافیک اهداکنندگان با میزان آلودگی ویروسی بررسی شد^(۳، ۴) ولی مطالعه‌ای که عوامل دموگرافیک اهداکنندگان را با معافیت یا پذیرش مقایسه کند مشاهده نشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین میزان پذیرش یا معافیت و مشخصات فردی داوطلبان اهدای خون در مراکز انتقال خون مشهد طراحی شد.

مواد و روش‌ها

این پژوهش، یک مطالعه توصیفی مقطعی با نمونه‌گیری خوش‌های دو مرحله‌ای بود. تعداد ۱۰۴۷ داوطلب اهدای خون از بین بانک اطلاعات کلیه مراجعین مراکز ثابت و سیار انتقال خون مشهد در سال ۱۳۸۷ انتخاب شدند، به طوری که در مرحله اول ۳۰ روز از سال به طور تصادفی به عنوان سرخوشه انتخاب گردید، سپس به طور تصادفی از هر یک از این روزها ۳۵ نمونه انتخاب شد.

متغیرهای این مطالعه شامل سن، جنس، شغل، وضعیت تأهل، تحصیلات، نتایج آزمایش خون و دفعات اهدا در اهداکنندگان بود. اطلاعات مربوط به افراد پس از استخراج بر اساس گروه اهدا کننده (معاف موقت و معاف دائم)، عوامل دموگرافیک و نتایج آنالیز آزمایشگاهی به روش الایز، با نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۱/۵ در رایانه ثبت گردید و داده‌ها با به کارگیری آزمون‌های کای دو و χ^2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در همه آزمون‌ها سطح معنی‌داری ۰/۰۵ بود.

هدف نهایی تمامی مراکز انتقال خون، تامین خون سالم و کافی برای بیماران می‌باشد. برای نیل به این هدف، تمامی افراد مراجعه کننده برای اهدای خون به سه دسته کلی اهدا کنندگان حرفه‌ای، جایگزین و داوطلب بدون چشم‌داشت مادی تقسیم می‌شوند. بهترین نوع اهداکنندگان، افراد داوطلب هستند و در بین آنان نیز کسانی که سابقه اهدای خون داشته‌اند، احتمال اهدای خون سالم بالاتری دارند.

افراد مراجعه کننده برای اهدای خون ابتدا طی مشاوره و معاينه پزشك مشتمل بر اندازه‌گيری هموگلوبین خون، سابقه آلودگی ویروسی، رفتارهای پرخطري که می‌تواند سلامتی خون را به خطر بياندازد، سابقه ابتلا به بيماري‌ها و مصرف دارو، انگيزه فرد از اهدای خون و تعداد دفعات اهدا، وضعیت سلامت عمومی، سوابق جراحی، بيماري‌های قلب و عروق و ریوی، بيماري‌های خونریزی‌دهنده، سابقه سرطان، بارداری، شیردهی، سقط و ... قرار می‌گيرند^(۱). سپس به سه گروه اهدا کننده، کسی است موقت و معاف دائم تقسیم می‌شوند. اهداکننده، کسی است که پس از مشاوره و معاينه، اجازه اهدای خون را دریافت کند. معافیت دائم شرایط متعددی دارد ولی به صورت خلاصه در این مقاله منظور از فرد معاف دائم، شخصی است که به دلیل احتمال به خطر افتادن سلامتی فرد اهداکننده خون (از جمله ابتلا به بيماري‌های مزمن، مصرف دارو یا جراحی‌هایی مانند قلب باز، سرطان و...) با احتمال به خطر اندختن دریافت کننده فرآورده‌های خونی، تا پایان عمر از اهدای خون معاف باشد. معاف موقت کسی است که به دلیل شرایط فردی یا احتمال انتقال آلودگی، تا زمان مشخصی از اهدای خون معاف باشد.

افراد اهدا کننده به واحد خون‌گیری معرفی و خون‌های اهدایی تحت آزمایش‌های مختلف از جمله HCV Ab، HCV Ab و RPR، HBs Ag و HIV Ab بر روی خون‌های اهدایی HCV VI/II حال حاضر آزمایش بر روی خون‌های اهدایی استان خراسان (شمالی، رضوی و جنوبي) که از شیوع بالای ویروس برخوردار بوده و چند استان دیگر در کشور انجام می‌گیرد. با این حال به علت وجود دوره پنجره، شناسایی

یافته‌ها

بار اول و ۴۳۸ نفر (۴۱/۸۳) اهداکننده با سابقه در بین این افراد وجود داشت (جدول ۱).

از بین ۱۰۴۷ نفر بر اساس نتایج مصاحبه و مشاوره پزشکان، ۸۶۵ نفر (۸۲/۶٪) اهداکننده خون و ۱۸۲ نفر (۱۷/۴٪) معاف دائم یا موقت شناخته شدند. بر اساس نتایج آزمایش‌های غربالگری بر روی ۸۶۵ نفر که خون اهدای داشتند، ۱۳ نفر (۱/۵٪) در آزمایش‌های غربالگری بدون داشتن نتایج آزمایش‌های تاییدی، مثبت بودند که ۷

در بین ۱۰۴۷ داوطلب اهدای خون، ۹۶۲ نفر (۹۱/۸۹٪) مرد و ۸۵ نفر (۸/۱۱٪) زن بودند. از نظر وضعیت تأهل، ۸۱۰ نفر متاهل (۷۷/۳۶٪) و به جز دو مورد مطلقه، مابقی مجرد و از نظر سطح تحصیلات اکثر موارد زیر دیپلم و دیپلم بودند. در بررسی اهداکنندگان بر اساس شغل، مشاغل آزاد در درجه اول و سپس مشاغل دولتی، کارگر، روحانی و دانشجو قرار داشتند. ۶۰۹ نفر (۵۸/۲٪) اهداکننده

جدول ۱: نتیجه معاینه بر حسب عوامل دموگرافیک داوطلبان اهدای خون در مشهد در سال ۱۳۸۷

عنوان	نتیجه معاینه	تعداد کل	اهداکنندگان						عنوان	
			معاف شدگان			اهداکنندگان				
			معاف دائم	معاف موقت	درصد	درصد	معاف دائم	معاف موقت		
جنس	مرد	۹۶۲	۸۱۲	۹۱/۸۸	۸۴/۴۰	۱۲	۱/۲۴	۱۴/۳۴	۱/۱۷	
		۸۵	۸/۱۲	۸/۱۲	۶۲/۳۵	۱	۳۶/۴۷	۳۶/۴۷		
	مجرد	۲۳۴	۲۲/۳۵	۲۲/۳۵	۷۳/۹۳	۴	۲۴/۳۵	۲۴/۳۵	۱/۷۰	
		۸۱۰	۷۷/۳۶	۷۷/۳۶	۶۹۰	۹	۱۳/۷۰	۱۱۱		
	متاهل	۲	۰/۱۹	۰/۱۹	۱	۰	۰	۰	۰/۱۱	
		۱	۰/۰۹	۰/۰۹	۱	۰	۰	۱۰۰		
تأهل	نامشخص	۳۱	۲/۹۶	۲/۹۶	۲۶	۱	۱۲/۹۰	۴	۱/۲۲	
		۶۰	۵/۷۳	۵/۷۳	۴۰	۱	۳۱/۶۶	۱۹		
	بیکار	۳۷۹	۳۶/۱۹	۳۶/۱۹	۳۰۷	۵	۱۷/۶۷	۶۷	۱/۳۲	
		۲۹۱	۲۷/۷۹	۲۷/۷۹	۲۵۷	۴	۱۰/۳۰	۳۰		
	خانه‌دار	۲۲	۲/۱۰	۲/۱۰	۱۹	۰	۱۳/۶۳	۳	۰/۰	
		۱۰	۰/۹۵	۰/۹۵	۱۰	۰	۰	۱۰۰		
	آزاد	۹۶	۹/۱۶	۹/۱۶	۶۷	۰	۳۰/۲۰	۲۹	۱/۲۶	
		۶۰	۵/۷۳	۵/۷۳	۴۰	۱	۳۱/۶۶	۱۹		
	کارمند	۳۷۹	۳۶/۱۹	۳۶/۱۹	۳۰۷	۵	۱۷/۶۷	۶۷	۱/۳۷	
		۲۹۱	۲۷/۷۹	۲۷/۷۹	۲۵۷	۴	۱۰/۳۰	۳۰		
	بازنشسته	۲۲	۲/۱۰	۲/۱۰	۱۹	۰	۱۳/۶۳	۳	۰/۰	
		۱۰	۰/۹۵	۰/۹۵	۱۰	۰	۰	۱۰۰		
شغل	کارگر	۱۵	۱/۴۳	۱/۴۳	۱۳	۲	۱۰/۷۵	۱۷	۱/۲۶	
		۱۵۸	۱۵/۰۹	۱۵/۰۹	۱۳۹	۲	۸۷/۹۷	۱۷		
	کشاورز	۱۰	۰/۹۵	۰/۹۵	۱۰	۰	۰	۰	۰/۰	
		۹۶	۹/۱۶	۹/۱۶	۶۷	۰	۳۰/۲۰	۲۹		
	محصل	۶۰۹	۵۸/۱۶	۵۸/۱۶	۵۷۶	۸	۲۰/۵۲	۱۲۵	۱/۳۱	
		۶۰۹	۴۱/۸۳	۴۱/۸۳	۳۸۹	۵	۱۰/۰۴	۴۴		
	با سابقه	۴۳۸	۴۱/۸۳	۴۱/۸۳	۴۳۸	۱/۱۴	۱۰/۰۴	۴۴	۱/۱۴	
		۶۰۹	۵/۷۳	۵/۷۳	۴۰	۰	۳۱/۶۶	۱۹		
	ابتدايی	۱۵	۱/۴۳	۱/۴۳	۱۳	۰	۱۳/۳۳	۲	۰/۰	
		۳۹۱	۳۷/۳۴	۳۷/۳۴	۳۳۰	۴	۱۴/۵۷	۵۷		
تحصیلات	زیر دیپلم	۳۶۴	۳۴/۷۶	۳۴/۷۶	۳۰۵	۴	۱۵/۱۰	۵۵	۱/۰۹	
		۳۶۴	۳۴/۷۶	۳۴/۷۶	۳۰۵	۴	۱۵/۱۰	۵۵		
	دیپلم	۲۴۹	۲۲/۷۸	۲۲/۷۸	۱۹۴	۴	۲۰/۴۸	۵۱	۱/۶۰	
		۲۴۹	۲۲/۷۸	۲۲/۷۸	۱۹۴	۱	۱۴/۲۸	۴		
	لیسانس	۲۸	۲/۶۷	۲/۶۷	۲۳	۱	۱۴/۲۸	۴	۳/۵۷	
		۲۸	۰/۵۷	۰/۵۷	۲۳	۰	۰	۰		
	فوق	۲۶۸	۲/۶۷	۲/۶۷	۲۸	۰	۰	۰	۳/۵۷	
		۲۶۸	۰/۵۷	۰/۵۷	۲۸	۰	۰	۰		
جمع	۱۰۴۷	۱۰۰	۸۶۵	۸۶۵	۸۲/۶۲	۱۴/۱۶	۱۴/۱۶	۱۳	۱/۲۴	
	۱۰۴۷	۱۰۰	۶۰۹	۶۰۹	۸۲/۶۲	۱۴/۱۶	۱۴/۱۶	۱۳	۱/۲۴	

خون غیر قابل قبول برای اهدای خون (کمتر از ۹۰/۵۰ و بالاتر از ۱۸۰/۱۰۰) بود. لذا به نظر می‌رسد که معافیت زنان بیشتر جهت حفظ سلامت اهداکننده بوده است. مواردی مانند مصرف دارو و حجامت، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند که از موارد معافیت به علت حفظ سلامت گیرنده خون می‌باشد. سایر عوامل مانند مشکل در رگ‌گیری و عارضه حین یا بعد از اهدا مطرح نشده بود.

در مطالعه فعلی، میزان مثبت شدن به علت ویروس‌های هپاتیت B، C و HIV در دو جنس تفاوتی نداشت. در حالی که در مطالعه‌های شراییر و زو میزان مثبت شدن در مردان بیشتر بود(^{۶، ۵}). لذا تکرار مطالعه با جمعیت بالاتری از زنان توصیه می‌شود.

در بررسی موجود، کمترین مراجعین، افراد کشاورز و کارگران بودند ولی نتایج نمونه‌های سرمی، میزان سلامت آزمایشگاهی خون را در کشاورزان بیشتر از دیگران نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد جذب داوطلبان روستایی از طریق ارسال تیم‌های سیار به روستاهای و سایر راهکارهای تشویقی ممکن، می‌تواند در افزایش مشارکت این گروه در اهدای خون نقش مؤثری داشته باشد.

در بررسی بین وضعیت تأهل و نتایج معاینه‌ها و مشاوره‌ها بر حسب اهدا یا معافیت دائم یا موقت، نتایج نشان داد که میزان معافیت دائم و موقت در متاهلین به نسبت مجردين کمتر است که می‌تواند به دلیل کاهش رفتارهای پرخطر در این گروه باشد. لذا تدوین راهکارهای برای تشویق داوطلبان متاهل برای تکرار اهدای خون پیشنهاد می‌گردد. افراد مطلقه از میزان معافیت بالاتری به میزان ۵۰٪ برخوردار شده‌اند که می‌تواند به دلیل افزایش رفتارهای پرخطر در این گروه و سایر مسایل زمینه‌ای باشد. این میزان، با آمارهای کشوری همانگی دارد(^۷). گرچه با توجه به محدودیت تعداد افراد مطلقه، تکرار مطالعه با تخصیص همین گروه هدف پیشنهاد می‌گردد.

از نظر سابقه اهدا، اهداکننده با سابقه در بین افراد و ۴۳۸ نفر(۴۱/۸۳)، اهداکننده با این این افراد مشاهده شد. با افزایش دفعات و کاهش فواصل اهدا، از میزان آلدگی ویروسی کاسته می‌شود که با نتایج مطالعه‌های خارجی مشابه در امریکا، اسپانیا، کامرون،

نفر در آزمایش Anti-HTLVII/II ، ۳ مورد در Ag و ۳ مورد در Anti-HCV مثبت گزارش شدند. کلیه این آزمایش‌ها به روش آنزیم ایمنواسی (ELISA) انجام شده بود که نشان‌دهنده موارد واقعی مثبت برای این عوامل عفونت‌زا نمی‌باشد.

میزان معافیت در اهداکنندگان با سابقه تقریباً دو برابر کمتر از اهدا کنندگان بار اول می‌باشد که تفاوت آنها معنی‌دار است(^{۰/۰۰۱}). میزان معافیت موقت در زنان اهدا کننده(۴۷/۳۶٪) بیش از مردان(۳۴/۱۴٪) می‌باشد(^{۰/۱}). در مقایسه نتایج آزمایشگاهی خون‌های اهدایی با وضعیت تأهل، ۱۸/۸۵٪ متاهلین و ۷۳/۹۳٪ مجردين قابلیت ترانسفوزیون داشتند(^{۰/۰۱}). در رابطه با شغل و نتایج آزمایشگاهی، ۱۰۰٪ خون‌های اهدایی در کشاورزان از نظر ویروس‌های هپاتیت B، C و HIV و HTLVII/II منفی بودند. لذا به نظر می‌رسد اشتغال به کار کشاورزی در بین اهداکنندگان، عاملی مثبت در سلامت خون باشد. بین نوع شغل فرد اهداکننده و میزان منفی شدن آزمایش‌های ویروسی تفاوت معنی‌داری وجود داشت(^{۰/۰۱}).

بحث

معاینه‌های اولیه‌ای که توسط پزشک از داوطلب اهدای خون انجام می‌شود، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و لازم است که با دقیق و کیفیت انجام شود. در این نوع شرح حال و معاینه، توجه به عوامل دموگرافیک در انتخاب داوطلب ضروری است.

در مطالعه حاضر، میزان معافیت دائم و موقت ۳۸/۱۷٪ بود که با نتایج مطالعه ابوالقاسمی(۷۸/۱۸٪) مطابقت دارد ولی از نتایج مطالعه‌های مشابه در خارج از کشور بیشتر است(^۲). میزان مراجعه مردان، ۳۱/۱۱٪ برابر زنان می‌باشد و میزان معافیت موقت زنان ۵۴/۲٪ برابر آقایان است. در آمار مطالعه‌های داخل کشور ۸۸٪ اهداکنندگان مرد بودند(^۳). مقایسه نسبت جنسی در اهداکنندگان نشان می‌دهد که میزان معافیت موقت در زنان نسبت به جمعیت مرد، بیش از مردان می‌باشد که با نتایج مطالعه‌های مشابه مطابقت دارد(^{۴-۶}). شایع ترین علل معافیت در زنان، در رتبه اول هموگلوبین کمتر از ۱۲/۵ و در رتبه دوم، فشار

نتیجه‌گیری

با توجه به نقش عوامل زمینه‌ای و شیوه زندگی در اهدای خون و بالاتر بودن آلودگی‌های ویروسی در افراد مجرد و دارای مشاغل آزاد، در مصاحبه اولیه پزشک دقت در وضعیت تأهل، اشتغال، نوع اهداکننده و انگیزه فرد برای اهدای خون الزامی است. هر چند با توجه به مشاهده موارد معافیت دائم به علت آلودگی به ویروس، انجام آزمایش‌های ویروسی بر روی خون‌های اهدایی با همان دقت و تأکید مورد نیاز است.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله نویسنده‌گان مقاله از همکاری پایگاه منطقه‌ای آموزشی خراسان رضوی که در جمع آوری اطلاعات و تدوین آن نهایت مساعدت را مبذول نمودند، تشکر و قدردانی می‌نمایند.

فیلیپین، تایلند و سایر شهرهای کشور از قبیل زاهدان، کرمان، اصفهان، شیراز و همدان مطابقت دارد(۴، ۵، ۶، ۷). این رابطه می‌تواند به دلیل افزایش آگاهی اهداکنندگان از شرایط اهدای خون و آموزش‌های هنگام مشاوره قبل از اهدا باشد که احتمال رفتارهای پرخطر را کاهش داده است(۷). هم چنین سطح پاییندی به عقاید مذهبی فرد اهداکننده با هدف کسب ثواب اخروی در اهدای خون نیز مطرح است که از محدودیت‌های مطالعه فعلی بوده و نیاز به بررسی تکمیلی دارد.

علت عدم تایید خون اهدایی به تفکیک عامل آن در اکثریت موارد، سروولوزی مثبت HTLV6 می‌باشد که در مطالعه‌های کشوری نیز مطرح شده است(۸، ۹). لذا به نظر می‌رسد، هر چند در آمارهای جهانی از آلودگی‌هایی شامل HIV و HCV بحث شده است ولی در مشهد نیز می‌تواند عامل قابل توجهی باشد.

References :

- Rahgozar S, Pourfathollah A. [Education, selection and protection of blood donors]. Iranian Blood Transfusion Organization-Research Center; 2002.
- Abolghasemi H, Pour Molk Ara D. [Clinical Application of Blood Components]. Tehran: Salemi Publication; 2000. p.11-7.
- Masaeli Z, Jaberi MR, Maghsudlu M. A comparison of seroprevalence of blood-born infections among regular, sporadic and first-time blood donors in Isfahan. Sci J Iran Blood Transfus Org 2006; 2(7): 301-7. [Article in Farsi]
- Kasraian L, Torab-Jahromi SA. Study of Confidential Self-exclusion Cases in Shiraz Regional Blood Transfusion Center. Daneshvar, Scientific-Research Journal of Shahed University 2008; 75(15): 71-8. [Article in Farsi]
- Schreiber GB, Sanches AM. Increasing blood availability by changing donation pattern. Transfusion 2003; 43(50): 591-7.
- Zou S, Notari EP, Stramer SL, Wahab F, Musavi F, Dodd RY. Patterns of age and sex- specific prevalence of major blood-borne infections in United States blooddonors, 1995 to 2002. Transfusion 2004; 44(11): 1640-7.
- Reich P, Roberts P. A randomized trial of blood donor recruitment strategies. Transfusion 2006; 46(7): 1069-71.
- McKeever T, Sweeney MR, Staines A. An investigation of the impact of prolonged waiting times on blood donors in Ireland. Vox Sang 2006; 90(2): 113-8.
- Schreiber GB, Schlumpf KS, Glynn SA, Wright DJ, Tu Y, King MR. The bane of our existence and other barriers to donating. Transfusion 2006; 46(4): 545-53.
- Yanase Y, Ohida T, Kaneita Y, Agamag DM, Leano PS, Gill CJ. The prevalence of HIV, HCV and HBV among filipino blood donors and overseas work visa applicants. Bull World Health Organ 2007; 85 (2) : 131-7.

Short Communication

Correlation between demographic factors and deferral rate of voluntary blood donors in Mashad

Vafaei Najar A.¹, Saeidi Nejat Sh.¹, Esmaeili H.², Sayadpour Zanjani D.^{3,4}, Bazargani R.^{3,4}

¹Health and Management Department, Faculty of Health, Mashad University of Medical Sciences, Mashad, Iran

²Biostatistics Department, Faculty of Health, Mashad University of Medical Sciences, Mashad, Iran

³Research Center of Iranian Blood Transfusion Organization, Tehran, Iran

⁴Mashad Regional Educational Blood Transfusion Center, Mashad, Iran

Abstract

Background and Objectives

General health of blood donors, prevalence rate of transfusion transmitted infections in blood donors, sensitivity of screening tests, and most importantly appropriate selection of blood donors through counselling and physical examination are important factors for blood safety to be ensured. Therefore, the aim of this study was to investigate the correlation between demographic factors and deferral rate of potential blood donors.

Materials and Methods

This was a cross-sectional study conducted on 1047 voluntary blood donors in 2008 in which frequency distribution of age, gender, education, occupation, and social status were studied. The correlation between demographic factors and the results of medical counseling and screening tests was evaluated.

Results

Out of 1047 blood donors under study, 88.3% were found to be eligible in medical counseling and examination. There were significant differences between deferral rate of volunteers and gender ($p<0.01$), marital status ($p<0.01$), frequency rate of blood donation ($p<0.001$), and occupation status ($p<0.01$).

Conclusions

Appropriate medical counseling and examination is very important in blood donor selection. It is also necessary to be more careful in screening process of donors who have a single status and those who have private jobs.

Key words: Blood Donors, Blood Transfusion, Demographic Factors, Iran
Sci J Iran Blood Transfus Org 2011; 7(4): 266-271

Received: 2 Nov 2009

Accepted: 7 Nov 2010

Correspondence: Saeidi Nejat Sh., MD, MPH. Health and Management Department, Faculty of Health, Mashad University of Medical Sciences.
P.O.Box: 9137673119, Mashad, Iran. Tel: (+98511)8544633; Fax : (+98511) 8517505
E-mail: Saeedish1@mums.ac.ir