

## رابطه آنتیژن‌های لکوستی انسان با آسم آلرژیک

ابراهیم علیجانی<sup>۱</sup>، دکتر مهدی شکرآبی<sup>۲</sup>، ملیحه کم‌گویان<sup>۳</sup>، دکتر صبا عرشی<sup>۴</sup>، محمد جعفری‌مدرک<sup>۵</sup>

### چکیده

سیستم اصلی سازگاری بانتنی (MHC) به دلیل نقش زیست‌شناسنامه وسیع و گسترده آن در سیستم ایمنی بسیار مورد توجه بوده است. آنتیژن‌های این مجموعه بانتنی که در انسان تحت عنوان آنتیژن‌های لکوستی انسانی (HLA) خوانده می‌شوند، در پاسخ‌های ایمنی نقش مهم و در خور توجهی دارند، و ژنوم مربوط به این مجموعه به عنوان ژن‌های کنترل کننده پاسخ‌های ایمنی مطرحند. از طرف دیگر رابطه قوی و مستحکم بین پاره‌ای از بیماری‌های با واسطه ایمنی (نظیر بیماری‌های خودادیمی) و سیستم MHC تأیید شده است. رابطه بیماری‌های آلرژیک و آنتیژن‌های HLA نیز از جمله مواردی است که مورد توجه بوده است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه آسم آلرژیک و آنتیژن‌های سیستم HLA در ۱۰۰ فرد بیمار (گروه آزمایشی) و ۱۰۰ فرد سالم به عنوان گروه شاهد انجام پذیرفته است. آزمایش HLA-Typing به روش استاندارد N.I.H (میکرونفوستیوتوكسیسیتی) برای تعیین آنتیژن‌های کلاس یک افراد انجام و سپس به منظور بررسی‌های آماری با محاسبه فراوانی آنتیژنی و فراوانی ژنی در دو گروه مورد مطالعه، اختلافات مشاهده شده با آزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند آنتیژن‌های A19، A2، A11، AW19 و A29 گروه آنتیژن‌های HLA-A و آنتیژن B51 از آنتیژن‌های HLA-B در دو گروه مورد بررسی به طور معنادار با یکدیگر اختلاف دارند ( $P < 0.05$ ). با توجه به نتایج حاضر مشخص گردید که بین بیماری آسم آلرژیک و برخی از آنتیژن‌های HLA کلاس یک، رابطه معنی‌دار وجود دارد.

**واژه‌های کلیدی :** HLA Typing، آسم، آتوپیک، آلرژیک، MHC

۱- کارشناس ارشد، نشانی: زاهدان، میدان مشاهیر، دانشگاه علوم پزشکی و فرمانات بهداشتی - درمانی زاهدان، دانشکده پزشکی، گروه ایمنی‌شناسی و فرون‌شناسی  
تلفن: ۰۳۱۵۰۰۱۰۰۰۰

۲- گروه ایمنی‌شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی و فرمانات بهداشتی - درمانی ایران

۳- کارشناس ارشد، پیش‌پیوند سازمان انتقال فون ایران، تهران

۴- پیش‌پیوند ایمنی‌شناسی و آلم‌تری، پیمانستان امیرالمؤمنین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی و فرمانات بهداشتی - درمانی ایران

۵- کارشناس ارشد، گروه آنکل‌شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و فرمانات بهداشتی - درمانی زاهدان

ثرستون (۱۲) و موریس (۱۳) در انگلستان ، لی-پی کی در چین (۱۴) و موفات در استرالیا (۱۵) عدم رابطه سیستم HLA با بیماری آسم را گزارش کردند ، در حالی که در مطالعاتی که از سوی آپوستولاکیس در یونان (۱۱) ، گریاس - دلیما در برزیل (۱۶) ، هانگ (۱۷) ، گاؤ (۱۸) و گاؤ در چین (۲۰) ، آگویلار - آنجلس در مکریک (۲۱) ، ینگ - چو در تایوان (۲۲) و دیگر کشورها صورت گرفته است ، رابطه بین آنتیژن‌های HLA با بیماری آسم نشان داده شده است . مجموعاً با توجه به گزارش‌های متعدد که در بعضی از موارد با یکدیگر متناقض نیز می‌باشد و نظر به این نکته که بررسی‌هایی از این دست در ایران گزارش نشده بود ، برای انجام پژوهش حاضر اقدام شد .

## مواد و روش‌ها

این مطالعه یک مطالعه مورد - شاهدی است که گروه مورد ، متشکل از ۳۰ فرد بیمار (۱۷ زن و ۱۳ مرد) مبتلا به بیماری آسم آلرژیک بود که بنا به تایید متخصصین بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) تهران به بیماری‌های مرتبط با سیستم HLA نظیر بیماری‌های خودایمنی ، بیماری‌های عفونی ، بیماری‌های تنفسی ، غددی ، روماتیسمی ، روان‌پریشی و غیره مبتلا نبودند . گروه شاهد نیز از ۱۰۰ فرد کاملاً سالم ، متشکل از ۵۰ زن و ۵۰ مرد تشکل شده بود .

از هریک از افراد فوق ۱۰ میلی‌لیتر خون وریدی در شرایط استریل گرفته ، پس از هپارینه کردن آن با ۰/۱۵ میلی‌لیتر هپارین ۵۰۰۰ واحد ، سوسپانسیون لنفوسيتی با استفاده از فایکول هایپایک جدا شده سپس با استفاده از روش میکرونفوسيتوکسیسیته به روش استاندارد N.I.H آنتیژن‌های HLA در سطح لنفوسيت‌ها مشخص شدند (۲۳-۲۵) . پس از مشخص شدن نوع آنتیژن‌های HLA در سطح لنفوسيت‌های هر فرد ، فراوانی آنتیژنی و فراوانی ثانی

## مقدمه

آسم یکی از بیماری‌های مزمن ریوی است که هر از چند گاهی به علت حملات برونکواسپاسم و تنگ شدن مجرای تنفسی ، منجر به ایجاد اشکال در تنفس بیمار می‌گردد . این بیماری همچنین به عنوان شایع‌ترین بیماری مزمن دوران کودکی شناخته شده و در دهه‌های اخیر میزان مرگ و میر ناشی از آن افزایش یافته است (۱) . نکته مهم و قابل توجه در رابطه با این بیماری نقش انکارناپذیر مکانیسم‌های ایمنی شناختی در علت‌شناسی این بیماری می‌باشد . در بسیاری از بیماران مبتلا به آسم زمینه‌های افزایش حساسیت نوع یک به صورت‌های مختلف مشاهده می‌شود و در آسیب‌زاوی بیماری نیز واکنش‌های حساسیتی (آلرژی) نقش عمده‌ای دارند (۲ و ۳) . آسم به ویژه در کودکان (بیش از ۹۰ درصد) و در بالغین (بیش از ۵۰ درصد) با آلرژی همراه است . در این حالت بیماران پس از تماس با عامل حساسیتی (آلرژنی) که به آن حساسند ، دچار حملات آسم می‌گردند (۴) .

مطالعات انجام شده نشان‌دهنده همراهی سیستم اصلی سازگاری بافتی<sup>۱</sup> (MHC) با پارهای از بیماری‌ها به ویژه بیماری‌های خودایمنی<sup>۲</sup> (۶۵) و همچنین بیماری‌های آلرژیک نظیر آسم می‌باشد (۷ و ۸) . در حالی که در پاره‌ای از مطالعات انجام شده رابطه‌ای بین آسم آلرژیک و آنتیژن‌های لکوسیتی انسان<sup>۳</sup> (HLA) گزارش نگردیده است (۹ و ۱۰) . در بررسی‌های دیگر رابطه این بیماری با آنتیژن‌های MHC نشان داده شده است ، به طوری که در برخی گزارش‌های منتشر شده رابطه آسم آلرژیک با آنتیژن‌های MHC کلاس یک (۱۱) و در پژوهش‌های دیگر رابطه آن با مولکول‌های کلاس دو بیان گردیده است (۴) .


<sup>۱</sup> Major Histocompatibility Complex (MHC)

<sup>۲</sup> Autoimmune

<sup>۳</sup> Human Leucocyte Antigen (HLA)

جدول ۱: درصد فراوانی آنتیژن‌های HLA کلاس یک در بیماران آسمی آلرژیک و افراد سالم

بیمار	سالم	HLA آنتیژن	بیمار	سالم	HLA آنتیژن
۲۶	۳۲	B5	۱۳/۳	۲۳	A1
۷/۶	۵	B7	* ۷/۶	۳۳	A2
۱۳/۳	۶	B8	۲۶	۱۸	A3
۱۰	۸	B13	۲۰	۲۴	A9
۷/۶	۹	B14	۲۰	۱۵	A10
۷/۶	۳	B17	* ۱۰	۲۸	A11
۳/۳	۱۰	B18	* ۳/۳	۲۸	Aw19
۲۳	۱۲	B21	۶	۱	A23
۲۰	۷	B22	۲۶	۲۲	A24
۷/۶	۱۱	B27	۳/۳	۱	A25
۳۰	۳۳	B35	۲۳	۱۵	A26
۱۶	۱۰	B44	۳۰	۱۲	A28
۳/۳	۵	B49	۱۳/۳	۵	A29
*	۷	B50	۳/۳	۷	A32
* ۳/۳	۲۳	B51	۳/۳	۱۰	Cw2
۶۶	۶۶	Bw4	۲۳	۹	Cw3
۹۰	۷۴	Bw6	۳۶/۶	۳۹	Cw4
			۷/۷	۲	Cw5

 $P<0.005 *$ 

نمودار ۱: درصد فراوانی آنتیژن‌های HLA کلاس یک در بیماران آسمی و افراد سالم

طبقه بندی این بررسی مشخص شد که بین بیماری آسم آلرژیک و آنتیژن‌های HLA کلاس یک A2، A11، Aw19 و B51 رابطه معنی‌دار وجود دارد. نتایج نشان دادند که احتمالاً وجود این آنتیژن‌ها می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در ابتلاء به بیماری آسم آلرژیک داشته باشد. از میان این آنتیژن‌ها محتمل است که آنتیژن A2 (PF=۰/۲۶) <sup>۱</sup> بیشترین

بیماران و افراد شاهد محاسبه شد. با استفاده از آزمون آماری کایدو و آزمون دقیق فیشر اختلافات فراوانی‌های مشاهده شده بررسی شد.

#### یافته‌ها

نتایج بررسی توزیع فراوانی آنتیژن‌های HLA کلاس یک در بیماران مبتلا به آسم آلرژیک و افراد شاهد در جدول ۱ آمده است.

در این مطالعه مشخص شد که فراوانی آنتیژن‌های A2 با  $P<0.005$ ، A11 با  $P<0.005$  و Aw19 با  $P<0.005$  در گروه آنتیژن‌های HLA-A و آنتیژن B51 با  $P<0.025$  از گروه آنتیژن‌های HLA-B در افراد بیمار در مقایسه با افراد شاهد دارای تفاوت معنی‌دار می‌باشد. یافته‌های بدست آمده نشان دادند که میزان بروز آنتیژن‌های فوق در افراد بیمار در مقایسه با افراد سالم کاهش نشان می‌دهد (نمودار ۱).

<sup>۱</sup> protective factor (PF)

می باشد. هرچند در این مطالعات و من جمله مطالعه حاضر نتایج تاحدودی همخوانی ندارند، نباید فراموش کرد که این مطالعات در کشورهای مختلف و مناطق جداگانه‌ای صورت گرفته‌اند که هم از نظر ژنتیکی و شرایط محیطی و نیز از نظر عوامل آلرژی‌زا که در این مناطق شایع هستند با یکدیگر اختلاف دارند.

با توجه به این که عوامل ایمونوژنیکی مداخله کننده در آسیب‌زاوی بیماری آسم بسیار ناهمگن هستند، در جستجوی نقش HLA در بیماری، همگنی افرادی که مورد بررسی قرار می‌گیرند باید تاحد ممکن حفظ شود. این همگنی عواملی چون جنس، سن، نژاد، ژنتیک، ارتباط فامیلی، نوع جمعیت مورد مطالعه و عوامل دیگری را که به عنوان عوامل مداخله کننده می‌شناسیم دربر می‌گیرد. از این رو لازم است که در انتخاب بیماران و نیز تعداد آنها نهایت دقت و توجه مبذول گردد.

تعیین HLA با روش سرولوژی با استفاده از مجموعه‌ای از آنتی‌بادی‌هایی که آلل‌های مختلف را مشخص می‌کنند، ممکن است باعث تعیین مولکول‌های واقعی که با بیماری رابطه دارند نشود. زیرا آلل تعیین شده به روش سرولوژیک ممکن است خانواده‌ای از آلل‌های مختلف HLA مشابه هم باشند که اختلاف جزئی با یکدیگر در بنیان‌های پلی‌مورف داشته باشند. چنین اختلافاتی را می‌توان با روش‌های مولکولی دقیق‌تر نظری تعیین توالی نوکلئوتیدها (واکنش زنجیره پولی‌مری<sup>۱</sup> یا PCR) مشخص کرد.

نقش بازدارندگی را در ابتلا به این بیماری ایفاء می‌کند. مطالعه حاضر برای نخستین بار در ایران صورت گرفته است. پژوهش‌هایی مشابه که در سایر کشورها انجام شده‌اند، اغلب نتایج ضد و نقیضی را در این زمینه منتشر ساخته‌اند. یک بررسی صورت گرفته در میان بیماران نروژی و دانمارکی، شیوع هاپلوتیپ‌های A1 و B8 را مشخص ساخت (۲۶ و ۲۷). در حالی که مطالعه انجام شده روی سفیدپوستان آمریکایی افزایش A2 و کاهش B8 را مطرح نموده است (۲۸).

نتایج بدست آمده در تحقیقات مشابهی که از سوی افراد مختلف در چین صورت گرفته است همخوانی چندانی با یکدیگر نداشته‌اند. وانگ و همکارانش افزایش فراوانی آنتی‌ژن‌های A9، A10، Bw61 و Bw62 و کاهش فراوانی آنتی‌ژن A3 را در بیماران چینی گزارش کردند که تنها آفزایش فراوانی آنتی‌ژن Bw61 در کار آنها دارای ارزش آماری بود (۲۹). در بررسی‌هایی که از سوی سیه (۳۰)، گاؤ (۱۸) و گیو (۲۰) در چین انجام گرفت رابطه این بیماری با آنتی‌ژن‌های HLA-D در کودکان مبتلا به آسم گزارش شد. در یونان نیز بررسی وجود این رابطه، کاهش آنتی‌ژن‌های B5 و B35 را در بیماران مورد مطالعه نشان داده است (۱۱). در حالی که چنین تحقیقاتی رابطه مثبت یا منفی بین بیماری آسم آлерژیک و آنتی‌ژن‌های سیستم HLA را مطرح نموده‌اند، پژوهش‌های دیگری بر عدم هرگونه رابطه بین بیماری فوق و آنتی‌ژن‌های این سیستم صحه گذاشته‌اند (۱۴ و ۱۵).

بهر حال آنچه از مطالعه پژوهش‌های فوق مشخص می‌شود وجود شواهدی از همراهی آنتی‌ژن‌های HLA با بیماری آسم

<sup>۱</sup> Polymerase Chain Reaction (PCR)

## منابع

- 1)E.R.Mc Fadden, Jr. Braun wald E, eds. Harrison's Principals of Internal Medicine. Vol 2. 15th edition. New York: Mc Graw Hill. 2001; pp: 1456-1462.
- 2)Patterson R, Grammer LC, Greenberger PA. Allergic Diseases diagnosis and Management. 5th edition. New York: Lippincott – Raven. 1997; pp: 467-535.
- 3)Howell WM, Standring P, Warner JA, Warner JO. HLA classII genotype, HLA-DR B cell surface expression allergen specific IgE production in atopic and non-atopic members of asthmatic family pedigrees. Clin Exp Allergy. 1999; 29(4): 35-38.
- 4)Woszczek G, Kowalski ML, Borowiec M. Association of asthma and total IgE level with human leukocyte antigen –DR in patients with grass allergy. Eur Respir J. 2002; 20(1): 79-785.
- 5)Kolostova K, Cerna M, Andel M. Association of HLA molecules with auto-immune disease. Cas Lek Cesk. 2002; 141(24): 755-762.
- 6)Ebringer A, Wilson C. HLA molecules , bacteria and autoimmunity. J Med Microbiol. 2000; 49(4): 305-311.
- 7)Jeal H, Draper A, Jones M, Harris J, Welsh K, Taylor AN, Cullinan P. HLA association with occupational sensitization to rat lipocalin allergen: A model for other animal allergies? J Allergy Clin Immunol. 2003; 111(4): 795-799.
- 8)Gurgenidze GV, Gamkrelidze AG, Gotua MA. Study of the HLA and IgE system in healthy persons and patients with allergies of the respiratory tract. Ter Arkn. 1988; 60(1): 54-56.
- 9)Brady RE, Glovsky MM, Opelz G, Terasaki P, Malish DM. The association of an HLA asthma-associated haplotype immediate hypersensitivity in familial asthma. J Immunogenet. 1981; 8(6): 509-517.
- 10)Caraballo LR, Hernandez M. HLA haplotype segregation in families with allergic asthma. Tissue Antigens. 1990; 35(4):182-186.
- 11)Apostolakis J, Toumbis M, Konstantopoulos K, Kamaroulias D, Anagnostakis J, Georgoulias V, Fessas P, Zervas J. HLA antigen and asthma in Greeks. Respir Med. 1996; 90(4): 201-204.
- 12)Turton CW, Morris L, Buckingham JA, Lawler SD, Turner-Warwick M. Histocompatibility antigen in asthma : population and family studies. Thorax. 1979; 34(5): 670-676.
- 13)Morris MJ, Faux JA, Ting A, Morris PJ, Lane DJ. HLA-A, B and C and HLA- DR antigens in intrinsic and allergic asthma. Clin Allergy. 1980; 10(2): 173-179.
- 14)Li-PK, Lai CK, Poon AS, Ho AS, Chan CH, Lai KN. Lack of association between HLA-DQ and –DR genotypes and asthma in southern Chinese patients. Clin Exp Allergy. 1995; 25(4): 323-331.
- 15)Moffatt MF, Schou C, Faux JA, Abecasis GR, James A, Musk AW, Cookson WO. Association between quantitative traits underlying asthma and the HLA-DRB1 locus in a family-based population sample. Europ. J Hum Genet. 2001; 9(5): 341-346.
- 16)Gerbasi-DeLima M, Gallo CA, Daher S, Sole D, Naspritz CK. HLA antigens in asthmatic children. Pediatr Allergy Immunol. 1997; 8(3): 150-152.
- 17)Huang LS, Hsieh KH, Liu SY. HLA and childhood asthma (author's transl). Zhonghua Min Guo Wei Sheng Wu Ji Mian Yi Xue Za Zhi. 1981; 14(2): 102-106.
- 18)Gao J, Lin Y, Qiu C. HLA-DRB alleles polymorphism in susceptibility to asthma Beijing Chinese. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 1998; 78(8): 591-594.
- 19)Gao J, Lin Y, Qiu C, Liu Y, Ma Y, Gao J, Liu J. Relationship between HLA-DQA1, -DQB1-genes polymorphism and susceptibility to bronchial asthma among Northern Hans. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2002; 82(6): 379-383.
- 20)Guo X, Ni P, Li L. Association between asthma and the polymorphism of HLA-DQ genes. Zhonghua Jie He Hu Xi Za Zhi. 2001; 24(3):139-141 [abstract].
- 21)Aguilar-Angeles D, Delgado-Ochoa D. HLA and bronchial asthma. Neumol Cir Torax. 2001; 60(2): 28-30.
- 22)Lin YC, Lu CC, Su HJ, Shen CY, Lei HY, Guo YL. The association between tumor necrosis factor,

HLA-DR alleles, and IgE-mediated asthma in Taiwanese adolescents. Allergy. 2002; 57(9): 831-834.

23)Terasaki P, Park MS. Micro Droplet Testing for A-B-C and D-antigens. Am J Clin Pathol. 1976; 62: 103-120.

۲۴) کم گویان ، ملیحه. سیستم HLA و روش تشخیص آنتی ژن های آن. چاپ اول. تهران. سازمان انتقال خون ایران . ۱۳۷۲ . صفحه .۵۷

25)Thomas M .Williams Human Leukocyte Antigen Gene Polymorphism and the Histocompatibility Laboratory. JMD. 2001; No:3.

26)Thorsby E, Lie SD. Relationship between HLA system and susceptibility to disease. Transplant Proc. 1971; 3(2): 1305-1308.

27)Ostergaard PA, Eriksen J. Association between HLA-A1, B8 in children with extrinsic asthma and IgA deficiency. Eur J Pediatr. 1979; 131(4): 263-270.

28)Rachelefsky G, Park MS, Siegel S, Terasaki PI, Katz R, Saito S. Strong association between B-Lymphocytes group 2 specificity and asthma. Lancet. 1976; 13(2): 1042-1044.

29)Wang WX, Yang SZ, Chui XW, Zhang HL. Association of HLA – Bw61 with -asthma in the Chinese. Tissue Antigens. 1988; 32(4): 215-217.

30)Hsieh KH. Association of HLA – DQw2 with Chinese childhood asthma. Tissue Antigens. 1991; 38: 181-182.