

تأثیر آرد جو بر کاهش زردی نوزادان

اعظم محسن زاده^۱، طاهره جوادی^۲، فاطمه یاری^۳ کوروش شاه کرمی^۴

- ۱- مریب متخصص کودکان - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
- ۲- کارشناس ارشد آموزش پرستاری - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
- ۳- کارشناس ارشد مامائی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
- ۴- پژوهش عمومی

یافته / دوره هفتم / شماره ۱۲ / تابستان ۸۴ / مسلسل ۱۵

چکیده

دریافت مقاله: ۱۴/۰۷/۰۸. پذیرش مقاله: ۱۴/۰۷/۰۸

* مقدمه: هیپربیلیروبینمی مشکل شایع نوزادان است که حدود ۶۰٪ نوزادان پره ترم (نارس) در هفته اول تولد به آن مبتلا می شوند. با توجه به آن که عده نسبتاً کثیری از مردم لرستان به طور سنتی از آرد جو برای درمان هیپربیلیروبینمی استفاده می کنند و در موارد بسیاری نوزاد را به پزشک ارجاع نمی دهند ، هدف از این مطالعه، آن بود که در صورت موثر بودن آرد جو برای درمان هیپربیلیروبینمی، به عنوان یکی از شیوه های طب سنتی به جامعه پزشکی ارائه گردد و در صورت موثر نبودن به مردم استان اعلام و عوارض ناشی از زردی شدید احتفار داده شود.

* مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمائی بالینی کنترل شده روی ۹۰ نوزاد رسیده (ترم) با سطح بیلیروبین ۱۵mg/dl به بالا طی مدت یکسال (۱۳۸۳) در بخش نوزادان بیمارستان شهید مدنی خرم آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، انجام شد. نوزادان به ترتیب در دو گروه ۴۵ نفره مورد و شاهد تقسیم شدند. در گروه مورد ، علاوه بر فتوترایپی ، آرد جو نرم و صاف شده روی تمام بدن نوزاد بجز دور ناف و صورت پاشیده شد. در گروه شاهد ، نوزادان فقط تحت درمان با فتوترایپی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و تست های آزمایشگاهی بود.

* یافته ها: از ۹۰ نوزاد مورد مطالعه، ۶۲ نفر (۶۸/۹٪) پسر و ۲۸ نفر (۲۱/۱٪) دختر بودند. مدت زمان بستره در گروه مورد در اکثر موارد (۴۴/۴٪) ۲ روز با میانگین ۷/۲ روز و در گروه کنترل (۳۳/۳٪) ۴ روز با میانگین ۳/۷ روز بود. حداکثر مدت زمان بستره شدن در گروه مورد ۴ روز و در گروه شاهد ۷ روز بود. بین میانگین مدت زمان بستره در گروه تفاوت آماری معنی داری وجود داشت ($P < 0.001$). تفاوت آماری معنی داری بین میانگین بیلی رویین در دو گروه آزمایش و کنترل طی ۲۴ ساعت پس از بستره وجود داشت ($p < 0.05$) و مدت زمان بستره در گروه آزمایش کوتاهتر از گروه کنترل بود.

* نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده آرد جو همراه با فتوترایپی مؤثرتر از فتوترایپی به تنها بود؛ اما باید به مردم آگاهی داده شود که در صورت ابتلای نوزاد به زردی حتما تحت درمان پزشکی قرار گیرند و آرد جو به تنها درمان قابل اعتمادی نیست.

واژه های کلیدی: زردی، فتوترایپی، آرد جو

مقدمه

وکلستیرامین از موادی هستند که عنوان درمانهای کمکی نیز در کاستن زردی نوزادان از آنها استفاده می‌شود (۲,۹). بین مردم لرستان این اعتقاد وجود دارد که پاشیدن آرد جو بر روی پوست نوزاد مبتلا به زردی موجب کاهش و رفع زردی می‌شود. علت آن را طبیعت سرد آن می‌دانند. با توجه به آن که عده نسبتاً کثیری از مردم لرستان به طور سنتی از آرد جو برای درمان زردی نوزادی استفاده می‌کنند و در موارد بسیاری نوزاد را به پزشک ارجاع نمی‌دهند، هدف از این مطالعه آن بود که در صورت موثر بودن به عنوان یکی از شیوه‌های طب سنتی به جامعه پزشکی ارائه گردد و در صورت موثر نبودن به مردم لرستان اعلام و عوارض ناشی از زردی شدید اخطار داده شود.

مواد و روش‌ها

این مطالعه به روش کارآزمائی بالینی کنترل شده طی مدت یک سال از مرداد ۸۲ لغاًیت مرداد ۸۳ در بخش نوزادان بیمارستان شهید مدنی خرم آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. در این مطالعه ۹۰ نوزاد رسیده با وزن بیش از ۲۵۰۰ گرم و سن حاملگی مساوی یا بیش از ۳۸ هفته، با سطح بیلیروبین mg/dl ۱۶ و بالاتر مورد بررسی قرار گرفتند. طرح تحقیقاتی در کمیته اخلاق دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. پس از بستری شدن نوزادان واجد شرایط ورود به مطالعه، ابتدا طرح تحقیقی برای والدین توضیح داده شد و در صورت موافقت آنها و با کسب اجازه نامه کتبی از ایشان به ترتیب در دو گروه آزمایش (۴۵ نفر) و کنترل (۴۵ نفر) قرار گرفتند.

در گروه آزمایش، علاوه بر فتوترابی، آرد جو نرم و صاف شده روی تمام بدن نوزاد بجز دور ناف و صورت پاشیده شد. در گروه کنترل، نوزادان فقط تحت درمان با فتوترابی قرار گرفتند. در صورتی که علت زردی، کمبود آنزیم G6PD، عفونت و سپتی سمی، بیماریهای متابولیک

هیپربیلیروبینمی مشکل شایع نوزادان است که حدود ۶۰٪ نوزادن رسیده و ۸۰٪ نوزادان نارس در هفته اول تولد به آن مبتلا می‌گردند (۱). بیلیروبین فرآورده نهایی ناشی از کاتابولیسم هم (Hem) می‌باشد. تخریب گلوبولهای قرمز باعث آزاد شدن هم از هموگلوبین می‌شود. هیپربیلیروبینمی غیرکنژوگه در انسان بدون در نظر گرفتن سن به معنای افزایش سطح بیلیروبین غیر مستقیم در سرم بیش از $1/5$ میلی گرم در دسی لیتر است (۲). این حالت به خصوص در نوزادان تازه متولد شده شایع است. پس از تولد بیشترین میزان بیلیروبین تولید شده، توسط کبد برداشت می‌شود که در نوزادان تازه متولد شده به علت نایاب غذای بودن کبد و سیستم گوارشی، قادر به دفع سریع بیلیروبین نبوده و دچار هیپربیلیروبینمی و زردی طی چند روز اول تولد می‌گرددند که اکثر این زردیها فیزیولوژیک می‌باشند (۴,۳).

عواملی مثل دیابت مادر، نژاد (آسیایی)، نارسی، داروها (وبیتامین k)، ارتفاع، پلی سیتمی، جنس مذکر، تریزومی ۲۱، کبودی جلدی، سفال هماutom، القای زایمان با اکسی توسین و محرومیت از کالری باعث تشدید این زردی می‌شوند و نوزاد را نیازمند به اقدامات درمانی می‌نماید. به طور کلی در ۷-۶٪ از نوزادان رسیده بیلیروبین غیر مستقیم بیش از $12/9 mg/d$ و در حدود ۳٪ از آنها بیش از $15 mg/dl$ است (۱).

برای پیشگیری از عوارض ناشی از افزایش بیلیروبین، نوزادان مبتلا به زردی نیاز به مراقبتهای پزشکی دارند. هدف از درمان، جلوگیری از رسیدن غلظت بیلیروبین غیر مستقیم به سطحی است که در آن ممکن است سمیت عصبی رخ دهد. متدائلترین روش درمانی، فتوترابی و در موارد شدیدتر، تعویض خون است (۵). تاکنون داروهای متعددی مانند متالوپورفیرینهای، فنوباربیتال، ایمیون گلوبولین و ریدی و کلوفیبرات پیشنهاد شده است (۶,۷,۸). ذغال فعال، آگار

نوزاد ۵۶ (%) ماحصل زایمان طبیعی و ۳۴ نوزاد ۳۵ (%) ماحصل سزارین بودند . سن شروع زردی در نوزاد ۲ روزه (۰.۴۳/۱) ، ۲۹ نوزاد ۳ روزه (۰.۳۲/۲) ، ۱۲ نوزاد ۴ روزه (۰.۱۳/۳) ، ۱۰ نوزاد ۵ روزه (۰.۱۱/۱) ، ۲ نوزاد ۶ روزه (۰.۲/۲) و ۲ نوزاد ۹ و ۱۰ روزه (۰.۲/۲) بود. مدت زمان بستری در اکثریت گروه آزمایش (۰.۴۴/۴) ۴۸ ساعت و در اکثریت گروه کنترل (۰.۳۳/۳)، ۹۶ ساعت (۰.۴) روز بود.

میانگین طول مدت بستری در گروه آزمایش ۲/۷ روز (حداکثر ۴ روز با انحراف معیار ۰/۸۹) و در گروه کنترل ۳/۷ روز (حداکثر ۲ و حداقل ۷ روز با انحراف معیار ۰/۲۳) بود.

مقایسه بین مدت زمان بستری دو گروه با تی تست انجام شد. تفاوت آماری معنی داری وجود داشت ($p < 0.001$) (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱- میانگین طول مدت بستری در دو گروه آزمایش و کنترل						
معیار	بر حسب روز	بر حسب روز	مدت بستری	حداکثر طول	میانگین طول	گروه مورد
۰/۹	۲/۷	۴	۱	۴	۲/۷	گروه آزمایش
۱/۲	۳/۷	۷	۲	۷	۳/۷	گروه کنترل

میانگین بیلی روبین توتال در هنگام بستری ، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از شروع درمان در دو گروه آزمایش و کنترل توسط تی تست باهم مقایسه شدند. بیلی روبین توتال در ابتدای پذیرش و بستری در دو گروه با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشت؛ اما طی ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از بستری شدن معنی دار بود (جدول شماره ۲).

در بین فامیل و بستگان ۹۰ نوزاد تحت مطالعه، ۵۱ خانواده قبل نوزاد مبتلا به زردی داشته که ۴۳ خانواده (۰.۸۴/۳) برای درمان آنها از آرد جو استفاده کرده بودند.

و انسداد مجاري صفراوي و بيماريهاي هموليتيك (ناسازگاري Rh و ABO) بود، بيمار از مطالعه حذف مي شد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي بود شامل: وزن ، سن ، رتبه تولد در خانواده ، مدت بستری تا زمان ترخيص ، روش درمان (فتوراپي همراه با آرد جو ، فتوتراپي به تنهائي) ، اطلاع ، اعتقاد و استفاده خانواده از آرد جو برای درمان زردی در ساير كودكان خانواده و فامييل و تست هاي آزمایشگاهی شامل: گروه خون، تست كومبس، سطح آنزيم G6PD ، اندازه گيري سطع بيليروبين (توتال، مستقيم، غير مستقيم) طي بدو پذيرش و پس از آن روزانه در شيفت صبح بود. برای جلوگیری از عوامل مخدوش کننده از دستگاههای فتوتراپي بيسان برای هردو گروه استفاده شد. تمام نوزادان به صورت روزانه از نظر بروز عوارض به طور كامل تحت معاینه فيزيکي قرار گرفتند.

اطلاعات پرسشنامه توسط نرم افزار SPSS V. 9.0 تجزيه و تحليل آماري شد. بيليروبين توتال در زمانهای مختلف تقریباً دارای توزيع طبیعی بود و با توجه به حجم نمونه کافی در هر دو گروه (۴۵ نفر) از آزمون آماري تی مستقل استفاده شد.

يافته ها

۹۰ نوزاد شامل ۴۵ نوزاد گروه آزمایش و ۴۵ نوزاد گروه کنترل تحت مطالعه قرار گرفتند. از ۹۰ نوزاد ۶۲ نفر (۰.۶۸/۹) پسر و ۲۸ نفر (۰.۳۱/۱) دختر بودند. از نظر گروه خونی نوزاد، ۴۱ نفر (۰.۴۵/۶) گروه خونی A، ۲۶ نفر (۰.۲۸/۹) O، ۱۵ نفر (۰.۱۶/۷) B و ۸ نفر (۰.۰۸/۹) AB داشتند. ۸۶ نفر (۰.۹۵/۶) مثبت و ۴ نفر (۰.۰۴) Rh منفي بودند. از نظر رتبه تولد ۶۰ نوزاد (۰.۶۶/۷) فرزند اول خانواده بودند و مابقی فرزند دوم تا هشتم خانواده بودند که کمترین رتبه تولد ۲ نفر (۰.۲/۲) ، فرزند هشتم خانواده بودند.

جدول شماره ۲- مقایسه میانگین بیلی روین توتال، مستقیم و غیر مستقیم دردو گروه آزمایش و کنترل

مقادیر P	گروه آزمایش ۴۵ نفر	گروه کنترل ۴۵ نفر	انحراف معیار (میانگین دامنه تغییرات)	انحراف معیار (میانگین دامنه تغییرات)	مقادیر بیلیروین (میلی گرم در صد)
۰/۱۶	۱۹/۵ ± (۳/۷)	۱۹/۵ ± (۳/۲)			بیلیروین بد پذیرش
۰/۰۱	۰/۲۲ ± (۰/۲)	۱/۵۰ ± (۱/۳)			مستقیم
۰/۳۴	۱۸/۸۵ ± (۳/۶۳)	۱۸/۵۰ ± (۳/۲۵)			غیر مستقیم
۰/۹۲	۱۷/۳ ± (۳/۳۰)	۱۵/۲ ± (۳/۲۲)			بیلیروین پس از ۲۴ ساعت
۰/۰۲	۰/۷ ± (۰/۳)	۰/۹ ± (۰/۶)			مستقیم
۰/۷۲	۱۶/۶۱ ± (۳/۰۵)	۱۴/۳۷ ± (۳/۱۳)			غیر مستقیم
۰/۶۲	۱۴/۹ ± (۲/۹)	۱۳/۶ ± (۲/۶)			بیلیروین پس از ۴۸ ساعت
۰/۰۸	۲/۹ ± (۰/۰۵)	۰/۹ ± (۰/۴)			مستقیم
۰/۱۶	۱۶/۵۰ (۳/۰۵)	۱۲/۸۳ ± (۲/۵۳)			غیر مستقیم
۰/۰۴	۱۲/۵ ± (۳)	۱۲/۵ ± (۳/۲)			بیلیروین پس از ۷۲ ساعت
۰/۳۶	۰/۶ ± (۰/۳)	۰/۸ ± (۰/۴)			مستقیم
۰/۹۴	۱۲/۸۴ ± (۲/۹۳)	۱۱/۷۷ ± (۳/۰۷)			غیر مستقیم

بورگت^۳ در بیمارستان کودکان شهر پاریس در مطالعه کنترل شده ای با استفاده از فقط یک دوز داروی کلوفیبرات در نوزادان مبتلا به زردی، کاهش معنی داری در سطح بیلی روین غیر مستقیم نسبت به گروه کنترل مشاهده کردند (۶،۷).

در تحقیقی که ایرانپور و همکاران در مشهد انجام دادند، نیز اثر کلوفیبرات بر کاهش زردی نوزادان رسیده بررسی شد. در این مطالعه تجربی، دو گروه نوزاد زرد رسیده و هر گروه شامل ۳۰ نفر انتخاب شد. به گروه آزمایش در شروع درمان با فتوترایپی یک دوز داروی کلوفیبرات (۱۰۰ mg/kg) به صورت خوارکی داده شد و گروه کنترل فقط تحت درمان با فتوترایپی قرار گرفت. بیلیروین طی ساعتهای مختلف اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیلیروین توتال سرم پس از ۱۲، ۲۴ و ۴۸ ساعت در گروه مورد به طور کاملاً معنی داری نسبت به گروه کنترل کمتر بود. همچنین نیاز به فتوترایپی در گروه مورد بطور کاملاً معنی داری کمتر بود (۱۲).

ذغال فعال، آگار و کلستیرامین، مواد خوارکی غیرقابل جذبی هستند که احتمالاً با اتصال به بیلی روین در روده یا با کاهش چرخه انتروهپاتیک منجر به کاهش جذب روده ای بیلی روین و در نتیجه کاهش سطح سرمی آن می شود (۲،۹).

بحث

هدف از درمان در زردی نوزادان بدون توجه به علت، جلوگیری از رسیدن غلظت بیلیروین غیر مستقیم به سطحی است که در آن سمیت عصبی ممکن است رخ دهد. متداولترین روش درمانی، فتوترایپی و در صورت عدم موفقیت یا زردی شدید، تعویض خون است (۵،۱۰). تاکنون داروهای متعددی نیز پیشنهاد شده است تا ضمن اثر بخشی بیشتر فتوترایپی، مدت زمان بستری در بیمارستان و موارد تعویض خون کاهش یابد. این داروها شامل متالوپورفیرین ها، فنوباربیتال، کلو فیبرات و ایمنوگلوبولین وریدی هستند (۸). مزوپورفیرین (snmp) داروئی است که تاثیر آن در کاهش تولید بیلیروین نوزادان در سالهای اخیر ثابت شده است. این دارو مهار کننده کاتابولیسم Hem است (۱۱).

داروی فنوباربیتال باعث القای آنزیم های کبدی می گردد و در درمان زردی دوره نوزادی بجز در مورد سندروم کریگلر - نجار نوع غالب که می تواند نقش کمک کننده داشته باشد در سایر موارد زردی نوزادان کاربرد بالینی ندارد (۸).

داروی کلوفیبرات نیز که القاکننده آنزیم کبدی گلوكورونیل ترانسفراز است می تواند در افزایش دفع بیلیروین مؤثر واقع شود. گابیلان^۱ در بیمارستان آستوان شهر کلامارت فرانسه و

کاهش دهنده کلسترول جو به علت وجود ماده بتا گلوکان^۲ در الیاف این گیاه است (۱۶).

در تهیه داروهایی ساخته شده از جو، از دانه جو به عنوان ماده ای که دارای قدرت جادوئی است، نام بردۀ شده است. دانه جو حاوی آلکالوئیدها، بتاکاروتین^۳، فلاونوئید^۴، مواد معدنی، ویتامین های B1، B2، D، E، B1، گلوتون، ترکیبات استروئیدی^۷، اسیدهای چرب اشبع و گیاهی^۶، گلوتن، ترکیبات استروئیدی^۷، اسیدهای چرب اشبع و نشاسته می باشد. دانه جو دارای قدرت التیام برای بدن و بخصوص پوست می باشد و به منظور التیام بافت در بیماریهای مانند خشکی شدید پوست، پسوریازیس، اکزما، و غیره از جو استفاده می شود . برای درمان ضایعات پوستی از پودر جو (آرد جو) استفاده می گردد . در صنعت داروسازی از دانه جو، ترکیبات و فراورده های مختلفی تهیه می گردد از جمله ترکیب آن با آب معدنی ، شیر ، ویتامین C که به صورت کرم، ژل و سرم تهیه می شوند و از آنها به عنوان آنتی اکسیدان در برابر اشعه ماوراء بخش و به منظور شادابی و جوانی پوست ، ضد پیری ، ضد التهابات پوستی، جلوگیری از صدمه پوستی ناشی از شیون کردن ، ترمیم پوست و رشد کلازن و فیبرهای پوستی استفاده می کنند.

نتیجه گیری

تفاوت آماری معنی داری بین میانگین بیلیروبین در دو گروه آزمایش و کنترل طی ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از بستره وجود داشت و مدت زمان بستره در گروه آزمایش کوتاهتر از گروه کنترل بود. لذا می توان نتیجه گرفت آرد جو همراه با فتوترایی مؤثرتر از فتوترایی است. اما باید به مردم آگاهی داده شود که در صورت ابتلاء نوزاد به زردی حتما تحت درمان پزشکی قرار گیرند و آرد جو به تنها ی دارمان قابل اعتمادی نیست.

در تحقیقی که در سال ۱۹۹۳ توسط کاگلایان^۱ و همکاران در ترکیه انجام شد، برتری آگار خوارکی و فتوترایی بر فتوترایی به تنها ی دارمان نوزادی به اثبات رسید (۱۳).

نبوی زاده در پژوهشی که در دانشگاه یاسوج انجام داد ، نقش عصاره گیاه کاسنی را در کاهش بیلیروبین خون نوزادان بررسی کرد. مقداری از عصاره پنج گیاه شاتره ، کاسنی ، شیر خشت ، عناب ، ترنجبین که بوسیله تقطیر هیدرولیکی تهیه شده بودند، به ۱۰۰ از سرم نوزادان با هیپر بیلیروبینی اضافه شد. میزان بیلیروبین اندازه گیری شده با گروه کنترل مقایسه گردید. نتایج نشان داد که تنها عصاره گیاه کاسنی به طور معنی داری باعث پایین آوردن بیلیروبین غیر مستقیم سرم می گردد (۱۴).

طی سالیان متمادی داروهای طبیعی خصوصا گیاهان داروئی اساس و حتی در برخی موارد تنها طریق درمان محسوب می شدند و در عین حال مواد اولیه موجود در آنها در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار می گرفت . مواد اولیه و مؤثری که در گیاهان به صورت ذخیره موجود است ، پیوسته به عنوان موادی غیر قابل جایگزین مورد استفاده بوده و خواهد بود (۱۵).

در رابطه با تاثیر آرد جو بر کاهش زردی نوزادان رسیده، مطالعات مشابهی انجام نشده است و در مطالعه ما مشاهده شد که ۲۴ ساعت پس از بستره کاهش قابل ملاحظه ای در بیلی روبین توتال ایجاد گردید. این نتایج نشان می دهند که آرد جو در کاهش بیلی روبین غیر مستقیم مؤثر می باشد، اما مکانیسم تاثیر آن باید مورد بررسی قرار گیرد.

جو، گیاهی است با طبیعت سرد و خشک که در طب سنتی جوشانده آن برای درمان تب، کم خونی ، بیماریهای کبدی به ویژه هپاتیت و به عنوان مدر در بیماریهای کلیوی و قلبی مورد استفاده قرار می گیرد. جو در مکانیسم ساخت کلسترول در کبد دخلت دارد و LDH کلسترول را که مضر بوده و به رگهای قلب آسیب می رساند، کاهش می دهد. به عقیده نیومن خاصیت

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Gellayan | 5. Linoleic Acid |
| 2. Beta glucan | 6. Phyto Chemicals |
| 3. beta carotene | 7. Steroidal Compounds |
| 4. flavonoid | |

References

1. Behrman RE. Nelson Text book of pediatrics, 17th ed , Saunders, 2004
2. Fanaroff AA, Martin RJ, Neonatal, perinatal medicine,Disease of the fetus and infant.7th ed, Mosbey, 2002
3. Bhutani VK, Johnson LH. Newborn Jaundice and kernicterus: Healthsocietal perspectives.Indian J ped 2003 May; 70(5): 407-16
4. Dennery PA, Seidman DS, Stevenson k: Neonatal hyperbilirubinemia in the healthy term newborn. American Academy of pediatrics, 1994 Oct; vol 94, N4:1-14
5. Dennery PA, Seidman DS, Stevenson DK. Neonatal hyperbilirubinemia. The New England Journal of medicine 2001 Feb; 344 (8): 581-590
6. Bourget-Broise I, Quinquis-Desmarais V. Pharmacokinetic of clofibrate in Jaundiced newborn infant at term. Arch ped 1995 Aug; 2(8): 722-8
7. Gabilan JC, Benattar C, Lindenbaum A. Clofibrate treatment of neonatal Jaundice. Ped 1990 Oct; 8(6): 1292-4
8. Dennery PA. Pharmacological intreventions for the treatment of neonatal Jaundice. Semin Neonatal. 2002 Apr; 7(2): 111-9
9. Suresh GK, Martin CL, Soll RF. Treatment of unconjugated hyperbilirubinemia in neonats. The cachrane library ,issuse,oxford: update software, 2003
10. Johnson LH, Brown AK, Bhutani VK. System –based approach to management of neonatal Jaundice and prevention of Kernicterus. J ped 2002; 140: 386-397
11. Kappos A, Drummond GS, Valaes T. A single dose of sn mesoporphyrin prevents development of severe hyperbilirubinemia in G6PD deficient newborns. Ped 2001; 108:25
- 12- ایرانپور ر، محمدزاده ا، فرهت ا. اثر کلوفیرات بر کاهش زردی نوزادان رسیده. مجموعه مقالات همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران. بیست و پنجمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب، سال ۱۳۸۳، ص: ۸۵-۹۵
13. Caglayan S, Candemir H, Aksit S. Superiority of agar and phototherapy combination in the treatment of neonatal hyperbilirubinemia. Ped 1993 Jul; 92(1): 86-89
- 14- نبوی زاده س ح، یزدان پناه ش. نقش عصاره گیاه کلسنی در پایین آوردن بیلی رویین خون نوزادان . خلاصه مقالات پانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان . مهر ۱۳۸۲، ص: ۲۷۳
- 15- ولاغ ژ، استودولا ژ. گیاهان داروئی. (ترجمه : ساعد زمان) تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۹
- 16- شفیع زاده ف. گیاهان داروئی لرستان . دانشگاه علوم پزشکی لرستان : حیان ۱۳۸۲