

مقایسه میزان β HCG سرم در خانم‌های باردار مبتلا به پره اکلامپسی نسبت به خانمهای باردار با فشار خون طبیعی

سپهیلا اکبری^۱، فاطمه جنانی^۲، فرحتناز چنگاوی^۳، مریم ایازی^۳، معصومه غفارزاده^۱

۱- استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۲- مریبی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی

۳- متخصص زنان و زایمان

یافته / دوره هفتم / شماره ۱۰ و ۱۱ / پاییز و زمستان ۱۴۰۰ / مسلسل ۶۱

چکیده

دربافت مقاله: ۱۷/۸/۱۷، پذیرش مقاله: ۱۷/۸/۱۷

* مقدمه: پره اکلامپسی به عنوان یک علت مهم پریناتال مرتالیتی و مریبیدیتی در جهان باقی مانده است و همراه با خونریزی و عفونت، تریاد عوامل مرگبار مادران را تشکیل می‌دهند. فاکتورهای متعددی جهت تشخیص زودرس این عارضه و یا تعیین شدت و وحامت این بیماری مشخص شده است. از آنجایی که اختلال تروفوبلاستی یکی از اتبولوزی‌های مطرح شده در این بیماری می‌باشد بر آن شدیدم که میزان β HCG سرم را که منعکس‌کننده میزان فعالیت تروفوبلاست می‌باشد در خانمهای باردار با فشار خون طبیعی و پره اکلامپسی خفیف و شدید تعیین نماییم.

* مواد و روش‌ها: این مطالعه مقایسه‌ای بر روی ۷۵ خانم حامله کننده به بیمارستان عسلیان که از نظر سنی و گروایتی تقریباً همسان بودند انجام شد. خانمهای حامله در سه گروه ۲۵ نفری با فشار خون طبیعی پره اکلامپسی خفیف و پره اکلامپسی شدید قرار گرفتند. سطح سرمی β HCG به روش ELISA در هر سه گروه اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه شد.

* یافته‌ها: میزان β HCG در خانمهای حامله با فشار خون طبیعی 2123 ± 18572 واحد در لیتر بود و میزان آن در خانمهای حامله با پره اکلامپسی خفیف 6558 ± 23962 و در خانمهای حامله مبتلا به پره اکلامپسی شدید 4634 ± 59220 بوده است. بر اساس آزمون آماری کروسکال-والیس سطح β HCG در گروه پره اکلامپسی شدید با دو گروه دیگر تفاوت آماری معنی‌دار نشان می‌دهد ($p < 0.001$) اما بین دو گروه با فشار خون طبیعی و پره اکلامپسی خفیف تفاوت معنی‌دار وجود نداشت.

* نتیجه گیری: سطح β HCG در خانمهای پره اکلامپسی شدید بیشتر از خانمهای با فشار خون طبیعی و یا مبتلا به پره اکلامپسی خفیف بوده است. بنابراین افزایش β HCG می‌تواند شدت وحامت بیماری را نشان دهد اما در مورد تشخیص زودرس بیماری ارزش چندانی ندارد.

واژه‌های کلیدی: پره اکلامپسی، هورمون گنادوتropیین جفتی، حاملگی، β HCG، فشار خون

آدرس مکاتبه: خرم آباد، بیمارستان زنان عسلیان

مقدمه

اختلالات پر فشاری خون حین بارداری شایع هستند و یکی از اجزای سه گانه تریاد مرگبار برای مادران را تشکیل می‌دهند. یعنی به همراه خونریزی و عفونت مسئول تعداد زیادی از موارد مرگ مادران هستند. پره اکلامپسی عامل $\%18$ از همه مرگ‌های مادران است و میزان آن را غالباً حدود ۵ تا ۱۰ درصد بیان می‌کنند^(۱). با این وجود پاتوژن آن بدرستی مشخص نشده است و جزء مهمترین مشکلات حل نشده مامایی است^(۲). از طرفی پره اکلامپسی یک اختلال تروفوبلاستی است و ختم حاملگی و خروج جفت موققیت آمیزترین درمان قطعی آن است^(۳،۱).

β HCG^(۱) یکی از هورمونهای اصلی جفت است که از سلول‌های سن سیشیوتروفولاست ترشح می‌شود^(۴) و انداره‌گیری آن می‌تواند انعکاسی از تغییر پاسخ ترشحی جفت در پره اکلامپسی باشد. در این رابطه مطالعه‌ای در استانبول ترکیه بر روی ۸۰ خانم مبتلا به پره اکلامپسی خفیف تا شدید و فشار خون مزمن و مقایسه آن با ۲۵ خانم باردار نرموتانسیو انجام گرفت که ارتباط مستقیمی را بین سطح β HCG و شدت وخامت پره اکلامپسی نشان داد^(۵). همچنین در یک مطالعه در چین که در سال ۲۰۰۰ بر روی ۱۴۲ خانم نرموتانسیو در مقایسه با ۴۳ خانم مبتلا به PIH انجام گرفت ارتباط مستقیمی بین شدت پره اکلامپسی و میزان β HCG پیدا کردند در حالیکه این ارتباط بین میزان HPL و شدت پره اکلامپسی وجود نداشت^(۶). برخلاف تحقیقات فوق، تحقیقات دیگری وجود دارد که این رابطه را تأیید نکردند از جمله در یک مطالعه در سال ۲۰۰۰ در لندن ارتباط بین HCG و PIH تأیید نشد^(۷).

به منظور یافتن ارتباط بین سطح β HCG و پره اکلامپسی مطالعه‌ای در بیمارستان عسلیان خرم‌آباد انجام گرفت و میزان β HCG در خانم‌های حامله با فشارخون طبیعی

و خانم‌های حامله مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به این بیمارستان اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه شدند.

مواد و روش ها

این تحقیق یک مطالعه مقایسه‌ای بوده است که از اردیبهشت ۸۳ تا بهمن ۸۳ در بیمارستان زنان عسلیان خرم‌آباد انجام شده است تعداد کل نمونه‌های مورد پذیرش ۷۵ نفر بودند که در سه گروه ۲۵ نفری خانم‌های باردار با فشار خون طبیعی، خانم‌های باردار مبتلا به پره اکلامپسی خفیف و خانم‌های باردار مبتلا به پره اکلامپسی شدید تقسیم شدند.

هر سه گروه از نظر سن، پاریتی و سن حاملگی تقریباً همسان بودند و معیارهای پذیرش خانم‌های باردار در سنین ۳۰ - ۱۸ سالگی، گراوید I و II و با سن حاملگی ۳۸ - ۲۸ هفته بودند و معیارهای خروج از مطالعه در هر سه گروه چندقلوی سبقه دیابت، فشار خون مزمن و بیماری‌های داخلی بوده است:

گروه I: شامل خانم‌های حامله که به علت درد زایمان، زایمان زودرس و پارگی کیسه آب به بیمارستان مراجعه کرده بودند و فشار خون طبیعی داشتند.

گروه II: خانم‌های حامله مبتلا به پره اکلامپسی خفیف با فشار خون بیش از $140/90$ و پروتئینوری کمتر از $+2$ و عدم وجود علائم پره اکلامپسی شدید.

گروه III: خانم‌های حامله مبتلا به پره اکلامپسی شدید که معیارهای ورود به این گروه علائم پره اکلامپسی خفیف همراه با یک یا چندی از علائم زیر شامل:

$$1-\text{فشار خون} \leq 160/110$$

۲- سر درد، سرگیجه، تاری دید، درد اپی گاستر.

۳- اختلالات کلیوی (پروتئینوری $>+2$ +)، الیگوری به معنای

$$\text{حجم ادرار} \text{ کمتر از } 400\text{cc}/24\text{h}$$

۴- افزایش آنزیم‌های کبدی

1. Human Chorionic Gonadotropin (HCG)

۶- پولمونری ادما

۵- تشنج

۷- IUGR (اختلال رشد داخل رحمی)

۸- ترومبوسیستوپنی

۹- اختلال انعقادی.

برای همه بیماران پرسشنامه‌ای شامل اطلاعات زیر تکمیل شد: سن، سن حاملگی، تعداد حاملگی، تعداد فرزند زنده، سقط مرده‌زایی، فشار خون، آلبومین ادرار، پلاکت خون، ادم و در موارد پره اکلامپسی شدید سر درد، سرگیجه، تاری Cr و BUN (کراتینین) سپس برای هر یک از بیماران $^{2\text{CC}}$ خون لخته جهت اندازه‌گیری β HCG به آزمایشگاه ارسال شد. خون سانتریفوژ شده و سرم آن جدا و فریز گردید و در زمان مناسب به روش ELISA میزان β HCG در نمونه‌ها چک شد. کلیه متغیرهای کمی بصورت میانگین و انحراف معیار نشان داده شده و سپس تجزیه و تحلیل آماری توسط SPSS و تست‌های آماری آنالیز واریانس، کای اسکور و کروسکال والیس انجام گردید و $p < 0.05$ سطح معنی دار تلقی گردید.

یافته ها

تعداد کل نمونه‌ها ۷۵ مورد و تعداد نمونه‌ها در هر سه گروه با فشار خون طبیعی(I) و پره اکلامپسی ضعیف (II) و پره اکلامپسی شدید (III) ۲۵ مورد بوده است. میانگین سنی گروه ها $25/46 \pm 3/5$ سال بوده، میانگین سن حاملگی بطور متوسط $37/08 \pm 2/16$ ، میانگین فشار خون سیستولیک به طور متوسط $139/6 \pm 26$ ، میانگین فشار خون دیاسیستولیک بطور کلی $104/4 \pm 13/2$ و میانگین سطح β HCG بطور کلی

3443 ± 33920 بوده است. جدول شماره ۱ میانگین فشار خون

β HCG را در گروههای مختلف نشان می‌دهد.

برای مقایسه میانگین β HCG و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در سه گروه آزمون کروسکال - والیس انجام شد و میانگین‌های فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در سه گروه از نظر آماری یا همدیگر تفاوت معنی داری داشتند ($p < 0.05$). در مورد HCG سطح هورمون در گروه شدید با دو گروه دیگر تفاوت آماری معنی داری داشت ($p < 0.01$) اما بین گروه نرموتاسینو و پره اکلامپسی خفیف تفاوت معنی دار نبود.

پروتئینوری در گروه I دیده نشد در گروه II: ۵٪ و در گروه III: ۱۸٪ پروتئینوری +۱، ۱۲٪ پروتئینوری +۲ و ۸٪ پروتئینوری +۳ داشتند. ادم در گروه I، ۳۲٪ در گروه II: ۵٪ ادم +۱، ۱۲٪ ادم +۲ و در گروه III: ۲۸٪ ادم +۱، ۶٪ ادم +۲ و ۸٪ ادم +۳ داشتند.

سابقه مرده‌زایی در گروه I: ۴٪، در گروه II: ۴٪ و در گروه III صفر درصد بود.

فرزنده زنده در گروه I: ۴۴٪، در گروه II: ۲۰٪ و در گروه III: ۳۲٪ بود. تشنج در گروه III: ۸٪ بود. اختلال رشد داخل رحمی در گروه III: ۱۲٪ بود. ترومبوسیستوپنی ۱ مورد (۴٪) بوده و اختلال کبدی وجود نداشت. سابقه سقط در گروه I، ۴٪ در گروه II: ۸٪ و در گروه III: ۸٪ بود.

جدول شماره ۱- میانگین فشار خون و سطح β HCG در سه گروه

P. value	نرموتانسیو N=۲۵	پراکلامپسی خفیف N=۲۵	پره اکلامپسی شدید N=۲۵	گروه
NS	۳۷/۷۶	۳۷/۱۶	۳۶/۳۲	میانگین سن حاملگی
NS	۲۱/۵۶	۲۴/۸۸	۲۱/۴۴	میانگین سن مادر
P < .۰۵	۱۰۶/۸۰	۱۴۴/۸۰	۱۶۷/۲۰۰	میانگین فشار خون سیستولیک
P < .۰۵	۷۱/۶۰۰	۹۲/۰۰	۱۴۹/۶۰۰	میانگین فشار خون دیاستولیک
P < .۰۰۱	۱۸۵۷۲ ± ۲۱۲۳	۲۳۹۶۸ ± ۶۵۵۸	۵۹۲۲۰ ± ۴۶۴۴	سطح β HCG

HCG و ET در آنها اندازه‌گیری شد و نشان داده شد که سطوح ET و HCG بطور مشخص در خانم‌های مبتلا به پره اکلامپسی بالاتر بود. بنابراین افزایش آنها می‌تواند پیشنهاد کننده یک اختلال فونکسیونل در سلول‌های جفت باشد که می‌تواند منجر به آسیب سلول‌های اندوتیال شود (۸).

در یک مطالعه مورد شاهدی که در سال ۱۹۹۸ در سوئد انجام شد با اندازه‌گیری UGP^۱ که متابولیت ادراری HCG است و بر روی ۱۸ خانم مبتلا به پره اکلامپسی ادراری HCG در چین سطح β HCG در گروه نرموتانسیو وجود دارد. این نتایج هیپوپرفیوژن جفتی را به عنوان یک اتیولوژی پره اکلامپسی مطرح می‌سازد (۹).

در یک بررسی در استانبول در سال ۲۰۰۴ مقایسه سطح β HCG در ۸۰ خانم مبتلا به پره اکلامپسی خفیف، پره اکلامپسی شدید، فشار خون Superimposed و فشار خون مزمن با ۲۵ خانم حامله با فشار خون طبیعی صورت گرفت، سطح β HCG در خانم‌های با پره اکلامپسی خفیف $17/000 \text{ mIU}/\text{ml}$

در خانم‌های با پره اکلامپسی شدید $49/000 \text{ mIU}/\text{ml}$ و در

خانم‌های با فشار خون Superimposed حدود $41000 \text{ mIU}/\text{ml}$

و در خانم‌های مبتلا به فشار خون مزمن $12558 \text{ mIU}/\text{ml}$ و در

بحث

در مطالعه‌ای که در بیمارستان عسلیان خرم‌آباد انجام دادیم میزان β HCG در سه گروه خانم‌های حامله نرموتانسیو، پره اکلامپسی خفیف و پره اکلامپسی شدید در سه ماهه سوم اندازه‌گیری شد و مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که سطح هورمون β HCG در گروه پره اکلامپسی شدید با دو گروه دیگر تفاوت معنی‌داری دارد ($P < 0.001$) اما بین گروه نرموتانسیو و گروه مبتلا به پره اکلامپسی خفیف علیرغم آنکه میزان β HCG در گروه پره اکلامپسی خفیف بیشتر از گروه نرموتانسیو بود اما از نظر آماری تفاوت معنی‌دار نبود.

در مطالعه‌ای در چین سطح HPL^۲ و HCG در ۱۴۲ خانم حامله با فشار خون طبیعی و ۴۳ خانم مبتلا به پره اکلامپسی مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط مستقیمی بین سطح HCG و درجه پره اکلامپسی وجود داشت، در صورتیکه بین سطح HPL و درجه پره اکلامپسی ارتباطی دیده نشد و به این نتیجه رسیدند که سطح β HCG می‌تواند انعکاسی از درجه اختلال فعالیت تروفوبلاست جفتی در پره اکلامپسی باشد و به عنوان یک ایندکس در تعیین پره اکلامپسی می‌تواند استفاده شود (۶).

در یک مطالعه در بیمارستان شانتوا^۳ ارتباط اندوتلین HCG، (ET) با پره اکلامپسی مورد بررسی قرار گرفت در این مطالعه ۳۲ خانم با پره اکلامپسی و ۱۷ خانم با فشار خون طبیعی در زمان ترم با یکدیگر مقایسه شدند و سطوح

1. Human placenta Lactogen (HPL)

2. Shantoa

3. Urinary – Gonadotropin Peptide (UGP)

رو به افزایش می‌رود، بنابراین اندازه‌گیری β HCG نمی‌تواند به عنوان یک علامت زودرس جهت تعیین پیش‌آگه‌ی و شناخت زودرس بیماری باشد بلکه در موارد شدید بیماری به عنوان یک فاکتور و خامت بیماری می‌تواند مطرح باشد.

در خاتمه پیشنهاد می‌شود که این طرح در سطح وسیعتری و بر روی نمونه‌های مختلف و بیشتری صورت گیرد تا درجه اعتبار آن افزایش یابد.

خانم‌های با فشار خون طبیعی mLu/mL ۹۶۴۷ گزارش شد. محققین به این نتیجه رسیدند که میزان β HCG در خانم‌هایی با پره اکلامپسی شدید بطور مشخص بیشتر از سایر گروه‌ها بود (۵).

نتیجه گیری

به نظر می‌رسد که سطح β HCG در موارد شدید بیماری که پرفیوژن جفتی دچار اختلال شده است و آسیب سلول‌های تروفوبلاست شدید باشد به علت اختلال فعالیت سلول‌های جفتی

References

1. Cuningham, Donald M, Honkins L. Williams obstetrics U.S.A, applaton long, 21th edition, 2001: 596
2. Chauit, Daniel W, Brin I. Elevated serum Human chorionic gonadotropin as evidence of secretory response in sever preeclampsia, *Obstetrics & Gynecology*. 1994; 170(4): 1135-8
3. Thomas P, Dufy MD. Hypertensive disorder in pregnancy, Gerad N, Burrow (a.n). *Medical complications during pregnancy*, America, saunders, 1999: 55
4. Bererischke K, Raufmonn P. *Pathology of Human placenta*, 4th Edition, New York, springer, 2000: 549-556
5. Gurbuz A, Karceteke A, Mengulluoglu M. Can serum HCG values be used in differential diagnosis pregnancy complicated by hypertension? *Obstetrics & Gynecology*, Istanbul, Turkey, 2004; 23(1): 1-12
6. Zhonghua Fu, Chan K, Zhi Z. Clinical significans of B-HCG and HPL in serum of normal pregnancies and patients with pregnancy induced hypertension? *Obst & Gyn*, 2000 Nov; 35 (11): 648- 50
7. Aquiling M, Thorpe R, Ellis P. Horrington K. Correlation between second trimester maternal serum Inhibin & HCG for predictcn of pre-eclampsia placenta, 2000; 21 (5-6): 487-92
8. Zhonghua Fu, Chan K, Zhi Z. Levels of endothelin and B-HCG and their relationship in patients with pregnancy induced hypertension. *Obst Gyn* 1998 Nov; 33(11): 661-3
9. Williams MA, Luthy DA, Zingheim RW, Zebelmon AM, sorensen TK, Resta RG. Urinary gonadotropin peptide levels in preeclamptic and normotensive pregnant women. Results from a pilot case- control study. *Gyneoal & obstetric Invest*. 1998; 45(1): 24-8