

بررسی میزان شیوع انگل‌های گوارشی در بیماران HIV مثبت و ایدزی شهرستان خرم آباد سال 1385

شیرزاد فلاحتی^۱, ابراهیم بادپروا^۱, حسین نهروانیان^۲, علی چگنی شرفی^۳, فرزاد ابراهیم زاده^۴

۱- مری, گروه انگل شناسی, دانشکده پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۲- دکتری انگل شناسی پزشکی, انتستیتو پاستور ایران

۳- کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی

۴- مری, گروه آمار, دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی لرستان

یافته / دوره نهم / شماره 2 / تابستان 86 / مسلسل 32

چکیده

دربافت مقاله: 86/1/29، پذیرش مقاله:

۱ مقدمه : انگل‌های گوارشی از مهمترین عوامل بیماریهای روده ای در افراد مبتلا به ویروس HIV هستند. این پاتوزنهایکی از علل اصلی مرگ و میر در این بیماران به شمار می روند. مطالعات اندکی در مورد شیوع این انگلها در افراد HIV مثبت و مبتلا به ایدز در ایران انجام شده است. بنابراین برای تعیین میزان شیوع این پاتوزنهای فرصت طلب در بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز ساکن شهرستان خرم آباد مطالعه ای بر روی 306 نفر از این بیماران انجام گرفت.

۲ مواد و روشها : پس از انتخاب نمونه ها پرسشنامه های طراحی شده، تکمیل گردید و از هر فرد 3 نمونه مدفع گرفته شد. بر روی هر نمونه دو تکنیک گسترش مستقیم و تغليظ فرماليين - اتر و دو روش رنگ آمیزی اسید فست اصلاح شده (کینيون) و تربکروم اصلاح شده انجام گرفت. در ضمن جهت توصیف و تحلیل آماری داده ها از جداول توزیع فراوانی و آزمون استقلال کای-دو و نیز آزمون مستقل t استفاده شد.

۳ یافته ها : پس از انجام آزمایشها مشخص شد که شیوع انگل‌های گوارشی در بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز شهرستان خرم آباد در سال 1385 بطور کلی 22/5 % بوده که این میزان در بیماران مبتلا به ایدز به وضوح بالاتر بوده است. در ضمن نشان داده شد که بین متغیرهای مرکزی نمونه گیری، گروه سنی، میزان تحصیلات، شغل، نوع عالائم گوارشی، وضعیت ابتلا به HIV و ایدز و آنودگی به انگل‌های گوارشی ارتباط معنی داری وجود دارد. لازم به ذکر است که میان متغیر وضعیت ابتلا به HIV و ایدز و نوع انگل گوارشی نیز ارتباط معنی داری وجود داشت.

۴ بحث و نتیجه گیری : شیوع نسبتاً بالای انگل‌های گوارشی در بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز شهرستان خرم آباد لزوم اجرای برنامه های پیشگیری، غربالگری، تشخیص به موقع و درمان بیماران را ایجاب می کند.

۵ واژه های کلیدی: انگل‌های گوارشی - بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز، خرم آباد، 1385

آدرس مکاتبه: خرم آباد، کمالوند، مجتمع دانشگاه علوم پزشکی پردیس، دانشکده پزشکی

پست الکترونیک: shfupdate@gmail.com

مقدمه

بیماران مبتلا به ایدز (30 نفر) به روش سرشماری انتخاب شدند. پس از انتخاب نمونه ها پرسشنامه های طراحی شده که حاوی متغیرهای مختلفی در مورد بیماران بود توسط همکاران طرح تکمیل گردید. از هر فرد مورد مطالعه سه نمونه مدفعه در ظروف پلاستیکی مخصوص حاوی فیکساتور¹ SAF گرفته شد و بر روی هر نمونه دو تکنیک روتین انگل شناسی، گسترش مستقیم و تغلیظ فرمالین- اتر جهت تشخیص تخم و لارو کرم ها و کیست تک یاخته ها و دو روش رنگ آمیزی اسید فست اصلاح شده، مطابق روش گارسیا (8) و تری کروم اصلاح شده به روش رایان (9) جهت تشخیص اووسیست کوکسیدیا ها و اسپور میکروسپوریدیاها انجام شد. برای محاسبه نهایی شیوع از جداول و نمودار های توصیفی مختلف (آمار های توصیفی) استفاده شد. ارتباط بین وجود انواع انگل های گوارشی و متغیر های مختلف نیز با آزمون استقلال کای دو بررسی شد، جهت تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از نرم افزارهای SPSS 15 و SPSS plus 2000 استفاده شد.

یافته ها

به منظور بررسی شیوع انگلهاهای گوارشی در بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز شهرستان خرم آباد در سال 1385 مطالعه ای مقطعی صورت گرفت که یافته های آن بصورت زیر می باشد: 64/1 % نمونه ها از مرکز حاج صدیق، 19/6 % از مرکز علی آباد و 16/3 % از مرکز گل سفید انتخاب شده بودند. در مجموع 90/2 % بیماران HIV مثبت و 9/8 % در مرحله ایدز قرار داشتند. شایعترین گروههای سنی بیماران به ترتیب عبارت بودند از: گروه سنی 35-30 سال (29/4 %)، گروه سنی 29-26 سال (25/2 %)، 6/5 سال (14/1 %)، 41-45 سال (14/1 %) و سرانجام گروه سنی 20-25 سال (5/9 %).

96/4 % بیماران مرد و فقط 3/6 % از آنان را زنان تشکیل می دادند، 7/8 % بیماران بیسوساد، 65/4 % دارای تحصیلات ابتدایی یا راهنمایی، 25/2 % دارای تحصیلات متوسطه و فقط 1/6 % از آنان

انگلهاهای گوارشی مرگ و میر بسیار بالایی را در افراد HIV مثبت و ایدزی ایجاد می کنند (1) هر چند آسودگی به ویروس HIV در خاور میانه شیوع بالایی ندارد (2) عفونت در این منطقه به سرعت در حال انتشار و توسعه است (3) آسودگی به ویروس HIV طی سه سال گذشته در ایران دو برابر شده است، اولین مورد HIV در ایران در سال 1981 و اولین مورد ایدز 6 سال بعد در سال 1987 گزارش شد. در سال 2002 حدود 3000 مورد HIV مثبت و 400 مورد ایدز در ایران وجود داشت (5). در دسامبر 2003، 5780 مورد بیمار HIV مثبت در ایران شناسایی شدند هر چند کارشناسان بسیاری عقیده داشتند که تعداد واقعی بیماران بین 30000 تا 40000 مورد بوده است (3). ابتلا به ویروس HIV باعث تضعیف سیستم ایمنی میزبان شده و لذا انواع پاتوژن های فرصت طلب مانند انگلها در فرد ایجاد بیماری می کنند که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع خدمات جدی متوجه میزبان شده و حتی می تواند منجر به مرگ بیمار شود. از جمله این پاتوژن های فرصت طلب می توان انگل های فرصت طلبی از جمله توکسپلاسم، کریپتوسپوریدیوم پارووم، ایزوسپورابلی، استرونزیلوبیوس استرکورالیس و... نام برد (6). ایدمیولوزی انگل های گوارشی در بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز در ایران هنوز به طور دقیق بررسی نشده است (7). همچنین به منظور بررسی شیوع این پاتوژن های گوارشی طی یک مطالعه مقطعی بر روی 306 نفر از افراد HIV مثبت و ایدزی شهرستان خرم آباد انجام گرفت.


مواد و روشها

همه بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز شهرستان خرم آباد در سال 1385 که تحت بررسی سه مرکز مبارزه با بیماری های واگیر شهرستان خرم آباد شامل مرکز حاج صدیق، علی آباد و گل سفید) 670 نفر بودند که در این مطالعه 276 نفر از افراد HIV مثبت به روش نمونه گیری در دسترس و کلیه

1. Sodium Acid acetic Formaldehyde

سرانجام نتایج آزمایش‌های انگل شناسی حاکی از آن بود که شیوع کلی انگل‌های گوارشی در بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز شهر خرم‌آباد در سال 1385، ۲۲/۵٪ بوده است که این میزان در بیماران ایدزی ۵۰٪ و در بیماران HIV مثبت ۱۹/۶٪ بوده است (CI: ۱۷/۶ - ۲۷/۴). در ضمن شایعترین انگل‌های گوارشی مشاهده شده به ترتیب عبارت بودند از: ژیاردیا لامبیا (۳۴/۲٪)، بلاستوسیس تیس هومینیس (۱۹/۲٪)، آنتاموبا کولای (۱۶/۴٪)، کریپتوسپوریدیوم پارووم (۸/۲٪)، هایمنولپس نانا، انواع میکروسپوریدیاها و یداموبا بوچلی (۵/۵٪)، ایزوسپورا بلی (۲/۷٪) و سرانجام استرورنژیلوئیدس و تخم انواع تنیا (۱/۴٪) (نمودار شماره ۱)

دارای تحصیلات دانشگاهی بودند، ۷۰/۹٪ بیماران دارای شغل آزاد، ۲۴/۲٪ بیکار و ۴/۹٪ بیماران خانه دار، یا دارای سایر مشاغل بودند. بیشترین علائم گوارشی مشاهده شده در کل بیماران به ترتیب عبارت بودند از: نفخ و کرامپ (۴۱/۵٪)، بدون علامت (۳۴/۶٪)، اسهال خفیف (۱۹/۳٪) و اسهال شدید (۴/۶٪). میانه مدت زمان بیماری به طور کلی ۲۴/۷ ماه بوده که از ۰/۷ تا ۶۷/۷ ماه متغیر بوده است. لازم به ذکر است در بیماران مبتلا به ایدز میانه فاصله زمانی بین ورود به مرحله ایدز و نمونه گیری ۵/۷ ماه بوده که از ۱ روز تا ۴۹/۴ ماه متغیر بوده است. در ضمن میانه فاصله زمانی تشخیص بیماری تا ورود به مرحله ایدز ۲۰/۶ ماه بوده است که از ۴/۱ تا ۴۶/۲ ماه متغیر بوده است. و



نمودار شماره ۱- توزیع فراوانی انگل‌های گوارشی در بیماران HIV مثبت و ایدزی شهرستان خرم‌آباد در سال 85

داری وجود دارد ($p=0/002$) بطوریکه شیوع انگل‌های گوارشی از ۱۸/۵٪ در بیماران دارای تحصیلات ابتدایی و متوسطه تا ۸۰٪ در بیماران دارای تحصیلات دانشگاهی متغیر است.

نتایج آزمون استقلال کای-دو نشان می‌دهد که بین متغیر شغل و نتیجه آزمون انگل شناسی ارتباط معنی داری وجود دارد ($p=0/002$) بطوریکه شیوع انگل‌های گوارشی از ۲۰/۷٪ در بیماران دارای شغل آزاد تا ۲۴/۳٪ در بیماران بیکار متغیر است. نتایج آزمون دقیق فیشر نشان می‌دهد که میان جنسیت بیمار و نتیجه آزمایش انگل شناسی ارتباط معنی داری وجود ندارد ($p=0/532$). نتایج آزمون استقلال کای-دو نشان می‌دهد که میان نتیجه آزمایش‌های انگل شناسی و نوع

نتایج آزمون استقلال کای-دو نشان می‌دهد که بین مرکز نمونه گیری و نتیجه آزمون انگل شناسی ارتباط معنی داری وجود دارد ($p<0/001$) بطوریکه شیوع انگل‌های گوارشی از ۱۴/۸٪ در مرکز حاج صدیق تا ۴۶/۷٪ در مرکز علی آباد متغیر است. نتیجه آزمون استقلال کای-دو نشان می‌دهد که بین متغیر گروه سنی و نتیجه آزمون انگل شناسی ارتباط معنی داری وجود دارد ($p=0/025$) بطوریکه شیوع انگل‌های گوارشی از ۵۷/۱٪ در گروه سنی ۵۰-۵۵ سال تا ۱۴٪ در گروه سنی ۴۰-۴۵ سال متغیر است (جدول ۱).

نتایج آزمون استقلال کای-دو نشان می‌دهد که بین متغیر سطح تحصیلات و نتیجه آزمون انگل شناسی ارتباط معنی

جدول شماره 2 - توزیع فراوانی بیماران به تفکیک نتیجه آزمایش‌های انگل شناسی و نوع علائم گوارشی

مجموع	نتیجه آزمایش		نوع علائم گوارشی
	-	+	
106	80	26	بدون علامت
%100	%75/5	%24/5	
59	39	20	اسهال خفیف
%100	%66/1	%33/9	
127	112	15	نفخ و کرامپ
%100	%88/2	%11/8	
14	6	8	اسهال شدید
%100	%42/9	%57/1	
306	237	69	مجموع
%100	%77/5	%22/5	

جدول شماره 3 - توزیع فراوانی بیماران به تفکیک نتیجه آزمایش‌های انگل شناسی و وضعیت ابتلاء به HIV/AIDS

مجموع	نتیجه آزمایش		وضعیت بیماری HIV/AIDS
	-	+	
276	222	54	HIV+
%100	%80/4	%19/6	
30	15	15	AIDS
%100	%50	%50	
306	237	69	مجموع
%100	%77/5	%22/5	

جدول شماره 4- جدول توصیفی مدت زمان تشخیص بیماری به تفکیک نتیجه آزمایش

میانه استاندارد	انحراف میانگین	نتیجه آزمایش	تعداد
24/7333	11/91934	-	237
23/2667	14/64394	+	69
24/7167	12/59257	مجموع	306

نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان می دهد که با 92 % اطمینان می توان اظهار داشت که مدت زمان تشخیص بیماری در انواع انگل‌های گوارشی متفاوت است ($p=0/08$). (جدول شماره 5).

علائم گوارشی ارتباط معنی داری وجود دارد ($P<0.001$) بطوریکه شیوع انگل‌های گوارشی از 11/8 % در بیماران دارای نفخ و کرامپ تا 57/1 % در بیماران دارای اسهال شدید متغیر است (جدول شماره 2).

نتایج آزمون دقیق فیشر نشان می دهد که بین نتیجه آزمایش های انگل شناسی و مرحله بیماری HIV/AIDS ارتباط معنی داری وجود دارد ($p<0/001$) بطوریکه شیوع انگل‌های گوارشی در بیماران HIV مثبت 50 % و در بیماران مبتلا به ایدز 19/6 % بوده است (جدول شماره 3).

نتایج آزمون مستقل t نشان می دهد که بین موارد آلوده به انگل و غیر آلوده از نظر میانگین مدت زمان تشخیص بیماری تفاوت معنی داری وجود ندارد. هرچند با 74 درصد اطمینان می تواند ارتباط داشته باشد (p=0/261) (جدول شماره 4).

جدول شماره 1 - توزیع فراوانی بیماران به تفکیک گروه سنی و نتیجه آزمایش انگل شناسی


ردۀ های سنی (سال)	نتیجه آزمایش		مجموع
	-	+	
20 – 25	9	9	18
%100	%50	%50	
26 – 30	62	15	77
%100	%80/5	%19/5	
31 – 35	18	72	90
%100	%80	%20	
36 – 40	12	32	44
%100	%72/7	%27/3	
41 – 45	6	37	43
%100	%86	%14	
46 – 50	4	16	20
%100	%80	%20	
51 – 55	4	3	7
%100	%57/1	%42/9	
56 – 60	1	6	7
%100	%14/3	%85/7	
مجموع	69	237	306
	%22/5	%77/5	%100

جدول شماره 5- جدول توصیفی مدت زمان تشخیص بیماری به تفکیک نوع انگل گوارشی

نوع انگل گوارشی	میانگین	تعداد	انحراف استاندارد	میانه	دامنه
ژیاردهای لامبیا	24/9600	25	14/37006	23/1000	53/40
پلاستوسیسیس تیس هومینیس	23/2857	14	13/99867	24/5667	44/67
آناتاموبا کولای	26/2528	12	13/96261	25/0000	45/27
کریپتوسپوریدیوم پارووم	42/4722	6	16/46906	39/3500	41/90
هایمنولپیس نانا	21/6500	4	15/00051	16/7000	33/00
انواع میکروسپوریدیاها	29/1667	4	14/85897	30/8333	32/73
یداموبا بوچلی	24/4333	4	12/65713	18/9000	26/73
استرونزیلولئیدس استرکورالیس	46/4667	1	0	46/4667	/00
ایزوپسپورا بلی	48/5167	2	19/72828	48/5167	27/90
تخم تنیا	27/1498	1	0	17/5667	/00
مجموع	27/1498	73	15/13983	24/7667	66/70

گوارشی و وضعیت ابتلا به HIV/AIDS ارتباط معنی داری وجود دارد ($P<0.001$) یعنی به عبارت بهتر انواع خاصی از انواع انگل‌های گوارشی مختص مرحله ایدز بوده اند (نمودار 2)

نتایج آزمون مقایسه دوبه دوی Sidak نشان می‌دهد که از نظر مدت زمان تشخیص بیماری می‌توان انگل‌های گوارشی را به دو دسته زیر تقسیم نمود و سرانجام نتایج آزمون استقلال کای - دو نشان می‌دهد که بین نوع انگل



نمودار شماره 2- توزیع فراوانی انگل‌های گوارشی در بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز به تفکیک مرحله بیماری

20-25 سال (25/2%) و کمترین بیماران در گروه 26-30 سال (%5/9) قرار داشتند که این امر حاکی از آن است که اکثر افراد بین سنین 35-45 سال بالاترین ریسک را برای ابتلا به ویروس HIV و ایدز دارند و تمرکز نیروها و گروههای پیشگیری، بهداشتی بیشتر باید بر روی این گروه از افراد جامعه باشد خوشبختانه جوانان زیر 25 سال کمتر در معرض ابتلا به بیماری بوده اند. بیشترین افراد مورد مطالعه در این طرح را مردان تشکیل می‌دادند که می‌تواند بدلیل مراجعه بیشتر

بحث و نتیجه گیری

اکثر بیماران مورد مطالعه در این طرح را افراد HIV مثبت تشکیل می‌دادند (90/2%) در حالیکه تعداد کمی از نمونه‌ها در مرحله ایدز قرار داشتند (9/8%) طبیعتاً تعداد واقعی بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز شهرستان خرم‌آباد خیلی بالاتر بوده و این تنها آمار افرادی است که جهت دریافت دارو به مراکز کنترل بیماریهای واگیر دار مراجعه می‌کنند. بیشترین افراد مورد مطالعه در گروههای سنی 31-35 سال (29/4%) و

به تضعیف شدید سیستم ایمنی کار زیادی نمی توان انجام داد. نتایج حاصله از این طرح لزوم انجام مطالعات بیشتر در این زمینه و متغیرهای مرتبط را می طلبد. انجام آزمایشهای غربالگری، تشخیص افراد آلوده، تجویز داروهای مناسب از اهم برنامه هایی است که باید در مراکز کنترل بیماریهای واگیربرای کلیه بیماران بخصوص افراد HIV مثبت و مبتلا به ایدز انجام شود.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از معاونت محترم آموزشی و پژوهشی، پرسنل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بخصوص سرکار خانم سکینه باجلان و همچنین پرسنل مراکز کنترل بیماران ایدزی شهرستان خرم آباد تشکر و قدردانی می نمایم.

مردان به مراکز کنترل بیماری جهت درمان و دریافت دارو باشد.

آمار بدست آمده از طرح نمایانگر بالاتر بودن شیوع انگلهاهای گوارشی در بیماران مبتلا به ایدز بوده و لزوم مراقبتهای بیشتر در این بیماران را می نمایاند. همچنین این نتایج نشان می دهد که برخی انگلهاهای گوارشی از جمله کریپتوسپوریدیوم و ایزوسپورا مختص بیماران مبتلا به ایدز بوده و در واقع انگلهاهای فرصت طلبی هستند که تنها در افراد دارای نقص سیستم ایمنی ایجاد بیماری می کنند. دوره کوتاه میان ابتلا به ویروس HIV و ورود به مرحله ایدز در بیماران مورد مطالعه نمایانگر مراجعه دیر این بیماران به مراکز مخصوص و و خامت اوضاع بیماران است چرا که اکثر افراد زمانی به این مراکز مراجعه می کنند که از زمان ابتلا آنان به ویروس HIV خیلی گذشته و به مرحله ایدز بسیار نزدیک شده اند و طبیعتاً برای درمان و کنترل بیماریهای این افراد با توجه

References

1. Chaisson RE, Gallant JE, Keruly JC, Moore RD. Impact of opportunistic disease on survival in patients with HIV infection. AIDS, 1998; 12: 29-33
2. Grant AD, De Cock KM. The growing challenge of HIV/AIDS in developing countries. Br. Med. Bull. 1998; 54: 369-381
3. World Health Organization, Three times as many people living with HIV/AIDS in middle East, West Asia than three years ago. Daily HIV/AIDS Rep. 2003; 10: 38-41
4. Center for disease control and prevention: HIV/STD/TB prevention news update. 2003: 7
5. Khoshnood K, Alaei A, Varzi S, Mohraz M, Meamar AM, Hadighi R, et al. Innovative approaches to AIDS in Iran. Jpn. Jour. Infec. Dis. 2005; 51: 213-220
6. HIV/AIDS in Iran. Center for disease control disease and prevention. 2005
7. Management and planning organization(I.R.I.) Iran. Statistical Year Book. The organization, Tehran. 2003: 224-226
8. Markell EK, Voge M. Macroscopic and microscopiv examination of fecal specimens.In Med. Par. 1993: 441-445
9. Rayan NJ, Sutherland G, Coughlan K. A new trichrome-blue stain for detection of Micrisporidial species in urine, stool and nasopharyngeal specimens. Jou. Cli. Mic. 1993; 31: 3264-3269