

مقایسه ریزگردانی تکایستگاهی و چندایستگاهی فرین‌های دما و بارش (مطالعه موردي: سواحل جنوبی دریای خزر)

روح الله اوجی*

استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

(دریافت: ۹۶/۳/۳۰، پذیرش نهایی: ۹۶/۸/۲)

چکیده

به منظور مقایسه ریزگردانی تکایستگاهی و چندایستگاهی فرین‌های دما و بارش، عملکرد روش‌های تکایستگاهی نگاشت چندکی (SSQ) و مازول چندایستگاهی بسطیافته (ModExDs)، در شبیه‌سازی اقلیمی ۵ ایستگاه سینوپتیک سواحل جنوبی دریای خزر مورد آزمون قرار گرفت. پیش‌بینی شونده‌های این پژوهش، سری زمانی فرین‌های دما و بارش روزانه طی دوره آماری (۱۹۶۱-۲۰۱۳) است که ۳۰ سال به منظور آموزش و ۲۳ سال جهت اعتبارسنجی مدل، در نظر گرفته شد. از متغیرهای بزرگ‌مقیاس جوی آرشیو داده‌های واکاوی (NCEP) نیز به عنوان پیش‌بینی کننده استفاده شد. با به کارگیری ۲۷ شاخص فرین اقلیمی، عملکرد این روش‌ها در حساسیت به ناهنجاری‌های بزرگ‌مقیاس جوی و نیز توانمندی آن در بازنمونه برداری توزیع داده‌های مشاهداتی در دوره اعتبارسنجی، به ترتیب با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و کولموگروف-امسیرنوف، مورد آزمون قرار گرفت. به منظور ارزیابی کلی مدل، از روش ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که رویکرد ریزگردانی تکایستگاهی با گذراندن به ترتیب ۴۸/۶۳ و ۴۸/۹ درصد و رویکرد چندایستگاهی نیز با موفقیت در ۴۸/۹ و ۳۳/۳ درصد از آزمون‌های کولموگروف-امسیرنوف و همبستگی پیرسون و نیز آزمون ترکیبی، در ریزگردانی داده‌های واکاوی، نتایج نسبتاً قابل قبولی را ارائه دادند. روش‌های مورد بررسی، شاخص‌های دما را بهتر از شاخص‌های بارش، ریزگردانی کردند. در مجموع، عملکرد روش ریزگردانی چندایستگاهی، بهویژه در ریزگردانی شاخص‌های دما، بهتر از روش تکایستگاهی بود. در حالت کلی، هر دو روش نتایج بهتری در گرگان و عملکرد ضعیف‌تری در رشت نشان دادند.

واژه‌های کلیدی: ریزگردانی آماری، سواحل جنوبی خزر، فرین‌های دما و بارش، مقایسه عملکرد.

۱. مقدمه

یک نقطه (تک ایستگاه) محاسبه می‌گردد، در حالی که در ریزگردانی چندایستگاهی، مدل مورد نظر، قادر به ریزگردانی همزمان برای چند ایستگاه در منطقه یا چند متغیر خواهد بود؛ بنابراین رویکرد مذکور را می‌توان روشی چند متغیره از لحظه پیش‌بینی کننده‌ها دانست که روشی برای به حداقل رساندن خطای در بین ایستگاه‌ها و متغیرهای است. با استفاده از روش‌هایی چون: مسائل بهینه‌سازی و بازنمونه برداری مقادیر ایستگاه‌ها از میانگین ریزگردانی شده منطقه‌ای و غیره، تبدیل مدل‌های تک ایستگاهی به چندایستگاهی امکان پذیر است (برگر، ۱۹۹۶). رویکرد ریزگردانی چندایستگاهی بعلت به کارگیری همزمان همه ایستگاه‌های منطقه مورد مطالعه و نیز امکان حفظ روابط بین ایستگاهی از جمله همبستگی بین ایستگاهی و غیره در مطالعات منطقه‌ای مقبولیت

روش‌های آماری ریزگردانی، به دلایل مختلفی (از قبیل: امکان اجرا در کامپیوترهای شخصی، سادگی، قابلیت بسط مدل توسط کاربر متخصص و ...) در مطالعات گوناگون بیشتر از روش‌های دینامیکی استفاده شده‌اند؛ به نحوی که روش‌های متعدد قطعی و تصادفی با رویکردهای متفاوت تک‌ایستگاهی و چندایستگاهی در تحقیقات مختلف سراسر دنیا توسعه پیدا کرده‌اند. هریک از این روش‌ها نقاط ضعف و قوت متعددی دارند که به کارگیری آن‌ها در زمینه خاصی مطلوب می‌کند. در روش‌های ریزگردانی تک‌ایستگاهی، رابطه رفتار متغیر اندازه‌گیری شده در یک ایستگاه با رفتار متغیر یا متغیرهای پیش‌بینی کننده بزرگ‌مقیاس جوی در یک نقطه یا در یک محدوده مشخص، در نظر گرفته می‌شود. از این رو خروجی مدل‌های ریزگردانی تک‌ایستگاهی، فقط برای

است که به منظور تولید توابع توزیع تجمعی متغیرهای اقلیمی سطح زمین، با به کار گیری پیش‌بینی کننده‌های بزرگ مقیاس، توسعه داده شد (مایکلانجلی و همکاران، ۲۰۰۹). این روش جهت ریزگردنی سرعت باد در سراسر فرانسه به کار رفت. نتایج نشان‌دهنده کاهش آنومالی‌های آتی باد در اغلب ایستگاه‌های هواشناسی از ۱ درصد در جنوب تا ۹ درصد در شمال منطقه بود. روش ریزگردنی بسط‌یافته نیز توسط برگر (۱۹۹۶) جهت ریزگردنی متغیرهای اقلیمی روزانه و به خصوص برای مواردی که متغیرهای مذکور از توزیع نرمال تبعیت نمی‌کنند، ابداع شد. این روش توسط محققان مختلف (برگر و همکاران، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۳؛ اوجی، ۱۳۹۲؛ سونیر و همکاران، ۲۰۱۲) در ریزگردنی فرین‌های اقلیمی مورد استفاده قرار گرفته است. برگر و همکاران (۲۰۱۲)، پنج روش ریزگردنی آماری تک‌ایستگاهی و چندایستگاهی شامل ریزگردنی آماری رگرسیونی اتوماتیک، تصحیح بایاس تفکیک مکانی، شبکه‌های عصبی رگرسیون کوانتما، تری جن، و ریزگردنی بسط‌یافته (ایکس‌دی‌اس) را به منظور شیوه‌سازی مقادیر حدی غرب کانادا، ارزیابی کردند. در این مطالعه، مدل ریزگردنی ایکس‌دی‌اس، بهترین نتیجه را در بین مدل‌های به کار گرفته شده به خود اختصاص داد و بی‌سی‌اس‌دی و روش شبکه عصبی به ترتیب در جایگاه بعدی قرار گرفتند. آن‌ها در پژوهش دیگری، مدل‌های منتخب یعنی ایکس‌دی‌اس و بی‌سی‌اس‌دی را برای ریزگردنی مقادیر حدی غرب کانادا استفاده کردند که مبنای برنامه‌ریزی تغییرات اقلیمی آتی غرب کانادا گشته است (برگر و همکاران، ۲۰۱۳). سونیر و همکاران (۲۰۱۵) در پژوهشی تحت عنوان مقایسه روش‌های ریزگردنی آماری جهت به تصویر کشیدن فرین‌های بارش اروپا، هشت روش مشهور ریزگردنی شامل چهار روش بر مبنای عامل تغییر، سه رویکرد تصحیح اربی و ایکس‌دی‌اس را بررسی و مقایسه کردند؛ به نحوی که روش‌های مذکور جهت ریزگردنی خروجی ۱۵ مدل منطقه‌ای اقلیمی در ۱۱ حوضه آبریز اروپا به کار گرفته

بیشتری در مقایسه با سری‌های شاخص تک‌ایستگاهی دارند (هارپمن و ویلبی، ۲۰۰۵؛ هیلوک و همکاران، ۲۰۰۶؛ خلیلی و همکاران، ۲۰۱۱؛ برگر و همکاران، ۲۰۱۲؛ اوجی، ۱۳۹۲؛ فرجزاده و همکاران، ۱۳۹۶). به کار گیری و ارزیابی روش‌های ریزگردنی آماری با رویکردهای ریزگردنی تک‌ایستگاهی و چندایستگاهی به منظور شبیه‌سازی متغیرهای اقلیمی در دوره‌های آتی در دنیا مرسوم است (برگر و همکاران، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳؛ مارون، ۲۰۱۳؛ سونیر و همکاران، ۲۰۱۵؛ خلیلی و ون نگوین، ۲۰۱۶؛ وندال و همکاران، ۲۰۱۷). با وجود این، به دلیل پیچیدگی توصیف دقیق مقادیر مشاهداتی و نیز روابط فضایی بین متغیرها و مکان‌ها، از ریزگردنی چندایستگاهی کمتر استفاده شده است (خلیلی و همکاران، ۲۰۱۳، چن و همکاران، ۲۰۱۷). در مطالعات متعدد داخلی نیز (دهقانی پور و همکاران، ۱۳۹۰؛ کوهی و همکاران، ۱۳۹۱؛ قرمزچشم و همکاران، ۱۳۹۳)، رویکرد تک‌ایستگاهی ریزگردنی با استفاده از روش‌های مختلف به کار گرفته شده‌اند و در مطالعاتی (رضایی و همکاران، ۱۳۹۴؛ سبحانی و همکاران، ۱۳۹۴؛ جعفرزاده و همکاران، ۱۳۹۵؛ فرجزاده و همکاران، ۱۳۹۶) مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. اگرچه رویکرد چندایستگاهی ریزگردنی در مطالعات محدودی در کشور (اوجی، ۱۳۹۲؛ فرجزاده و همکاران، ۱۳۹۶) استفاده شده است، ولی به‌طور کلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

پژوهش حاضر به ارزیابی عملکرد روش‌های ریزگردنی نگاشت چندکی و ریزگردنی بسط‌یافته به ترتیب با رویکردهای تک‌ایستگاهی و چندایستگاهی در ریزگردنی مقادیر حدی دما و بارش سواحل خزری می‌پردازد. رویکرد نگاشت چندکی، مدت زمان زیادی است که شناخته شده است (برای مثال مراجعه شود به پانفسکی و بریر، ۱۹۵۸؛ حداد و رستنفلد، ۱۹۹۷). در مطالعات مختلف از رویکردهای توسعه‌یافته آن استفاده شده است. یکی از این رویکردها، روش ریزگردنی آماری با نام تبدیل-تابع توزیع تجمعی (سی‌دی‌اف‌تی)

چندکی و ایکس‌دی اس نیز در بین روش‌های مورد بررسی قرار داشتند. نتایج این بررسی نشان داد که چنانچه ریزگردانی آماری به منظور ارائه تصویر آتی منطقه‌ای از قبیل برنامه‌ریزی و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم در حوضه آبریز و ... مدنظر باشد، استفاده از روش‌های چندایستگاهی بهتر از روش‌های تک ایستگاهی است. در حالی که در صورت نیاز به بررسی نقطه‌ای در یک یا چند ایستگاه به طور مجزا، نتایج روش‌های تک ایستگاهی مناسب‌تر بود؛ بنابراین در تمامی مطالعات مذکور به انتخاب و استفاده درست از روش‌های ریزگردانی آماری تاکید شده است.

شده. نتایج با توجه به روش مورد استفاده، فصل مورد بررسی و از حوضه‌ای به حوضه دیگر تاحد زیادی متفاوت بود. آنالیز واریانس میانگین گروهی خروجی مدل‌های منطقه‌ای و روش‌های ریزگردانی، نشان داد که حداقل ۳۰ درصد تا تقریباً نیمی از واریانس به‌واسطه ریزگردانی آماری حاصل می‌شود. اوجی (۱۳۹۲) در پژوهشی به منظور ارزیابی عدم قطعیت روش‌های تک ایستگاهی و چندایستگاهی در غرب میانی ایران، طیف وسیعی از روش‌های تک ایستگاهی و چندایستگاهی را بررسی و آزمون کرد که روش‌های ریزگردانی تک ایستگاهی انطباق

جدول ۱. شاخص‌های حدی اقلیمی دما و بارش تیم کارشناسی شاخص‌ها و آشکارسازی شاخص‌ها (زنگ و همکاران، ۲۰۱۱).

نام شاخص	شناخت	تعریف	واحد
مجموع سالانه بارش روزهای مرطوب	PRCPTOT	مجموع سالانه بارش روزهای مرطوب (بارش ۱ میلی‌متر و بیشتر)	میلی‌متر
تعداد روزهای دارای بارش ۱۰ میلی‌متر و بیشتر در سال	R10	تعداد روزهای دارای بارش سنگین	روز
تعداد روزهای دارای بارش ۲۰ میلی‌متر و بیشتر در سال	R20	تعداد روزهای دارای بارش خیلی سنگین	روز
روزهای خیلی مرطوب	R95p	بیش از ۹۵ درصد از مجموع بارش سالانه	میلی‌متر
روزهای بی‌نهایت مرطوب	R99p	بیش از ۹۹ درصد از مجموع بارش سالانه	میلی‌متر
تعداد روزهای دارای بارش بیش از ۲۵ میلی‌متر	R25	روزهای دارای بارش بیش از ۲۵ میلی‌متر	روز
حداکثر بارش روزانه	RX1day	حداکثر بارش روزانه در ماه	میلی‌متر
مقدار حداکثر بارش ۵ روز متوالی	Rx5day	حداکثر بارش ۵ روز متوالی در ماه	میلی‌متر
شاخص ساده شدت بارش روزانه	SDII	مجموع بارش ماهانه تقسیم بر روزهای مرطوب دارای بارش ۱ میلی‌متر و بیشتر	میلی‌متر/روز
روزهای مرطوب متوالی	CWD	تعداد روزهای متوالی دارای بارش ۱ میلی‌متر و بیشتر	روز
روزهای خشک متوالی	CDD	تعداد روزهای متوالی دارای بارش کمتر از ۱ میلی‌متر	روز
دامنه دمایی	DTR	میانگین ماهانه اختلاف بین دمایی حداقل و حداکثر	°C
طول فصل رشد	GSL	روزهای بین اولین و آخرین روز از حداقل ۶ روز گرم	روز
طول دوره سرد	CSDI	حداقل ۶ روز متوالی دارای دمای حداقل کمتر از صدک دهم	روز
روزهای یخبندان	FD	تعداد روزهای دارای دمای حداقل کمتر از صفر	روز
روز یخی (انجماد)	ID	تعداد روزهای دارای دمای حداقل کمتر از صفر	روز
شب‌های سرد	TN10p	درصد روزهای دارای دمای حداقل کمتر از صدک دهم	%
شب‌های گرم	TN90p	درصد روزهای دارای دمای حداقل بیش از صدک نوتم	%
حداقل دمای حداقل روزانه	TNn	حداقل مقدار ماهیانه دمای حداقل روزانه	°C
حداکثر دمای حداقل	TNx	حداکثر مقدار ماهیانه دمای حداقل روزانه	°C
روزهای تابستانی	SU	تعداد روزهای دارای دمای حداکثر بیش از ۲۵ درجه سانتی‌گراد	روز
شب‌های حاره‌ای	TR	تعداد روزهای دارای دمای حداقل بیش از ۲۰ درجه سانتی‌گراد	روز
روزهای سرد	TX10p	درصد روزهای دارای دمای حداکثر کمتر از صدک دهم	%
روزهای گرم	TX90p	درصد روزهای دارای دمای حداکثر بیش از صدک نوتم	%
حداقل دمای حداکثر	TXn	حداقل مقدار ماهیانه دمای حداکثر روزانه	°C
حداکثر دمای حداکثر	TXx	حداکثر مقدار ماهیانه دمای حداکثر روزانه	°C
طول دوره گرم	WSDI	حداقل ۶ روز متوالی دارای دمای حداکثر بیش از صدک نوتم	روز

فضای مدل گردش عمومی اختصاص می‌دهد. ایده اصلی این روش برای ریزگردنی مقدار بزرگ مقیاس x ، انتخاب یک مقدار محلی x_G بر اساس فرض زیر است:

$$F_S(X_S) = F_G(x_G) \quad (1)$$

که برابر است با

$$x_S = F_S^{-1}(F_G(x_G)) \quad (2)$$

به نحوی که F_S^{-1} از $[0,1]$ تعریف شده و تابع عکس F_S است. با به کارگیری رابطه^۳ برای داده‌های شبیه‌سازی شده دوره زمانی جدید (مثل دوره اعتبار سنجی و یا آینده)، امکان ایجاد سری زمانی در مقیاس محلی را فراهم می‌آورد. به هر حال این روش، اطلاعات توزیع مجموعه داده‌های مدل‌سازی شده برای آینده را به حساب نمی‌آورد. برای غلبه بر این مشکل بالقوه، یک رویکرد ریزگردنی احتمالاتی جدید با بسط نگاشت چندکی ارائه شده است (مایکلانجلی و همکاران، ۲۰۱۰). همچنان که ذکر شد، روش‌های تک‌ایستگاهی نگاشت چندکی، با به کارگیری معادلی از تابع تبدیل تناسب، به ریزگردنی و یا اصلاح خروجی تابع توزیع تجمعی (سی‌دی‌اف) متغیر بزرگ اقلیمی مقیاس می‌پردازد؛ یعنی بر اساس یک سی‌دی‌اف نماینده متغیر بزرگ مقیاس (دارای وضوح مکانی پایین) و سی‌دی‌اف معادل آن در مقیاس محلی (مثالاً مدل‌سازی شده در ایستگاه هواشناسی)، مدل مذکور با یافتن یک تبدیل ریاضی، امکان تبدیل از سی‌دی‌اف بزرگ مقیاس به مقیاس محلی را فراهم می‌آورد؛ بنابراین با دادن یک سی‌دی‌اف بزرگ مقیاس، سی‌دی‌اف محلی جدیدی بر اساس این تبدیل، ریزگردنی می‌شود (اوچی، ۱۳۹۲).

این روش با رویکردهای متفاوتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد که برای این پژوهش، روش نگاشت چندکی با برونیابی دلتا استفاده می‌شود. روش ریزگردنی نگاشت چندکی، بر اساس رویکردی از تصحیح اریبی روش نگاشت چندکی استوار است که گامی از روش تفکیک

در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی عملکرد روش‌های مذکور، شاخص‌های فرین اقلیمی (زنگ و همکاران، ۲۰۱۱)، مورد استفاده قرار می‌گیرند. توانایی ریزگردنی مدل، در (الف) پاسخ به آنومالی‌های بزرگ مقیاس اقلیمی و (ب) بازتویید سری زمانی دارای توزیعی مشابه با داده‌های مشاهداتی، به ترتیب با به کارگیری آزمون‌های معناداری همبستگی پرسون و کولموگروف-اسمیرنوف، مورد سنجش قرار گرفته و در پایان، ترکیبی از دو مورد فوق برای آزمون کلی مدل استفاده می‌شود (برگر و همکاران، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳؛ فرج‌زاده و همکاران، ۲۰۱۵ و ۱۳۹۶).

۲. روش تحقیق

پژوهش حاضر، با به کارگیری دو رویکرد تک‌ایستگاهی و چندایستگاهی قطعی ریزگردنی آماری به ترتیب تحت عنوان روش نگاشت چندکی و روش ریزگردنی بسط‌یافته که در ادامه به تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود، انجام گرفت.

۲-۱. روش تک‌ایستگاهی نگاشت چندکی

(اس‌اس‌کیو) (Single-site Quintile Mapping (SSQ)) رویکرد انطباق چندکها یا نگاشت چندکی، یکی از روش‌های شناخته شده ریزگردنی تک‌ایستگاهی است. F_S در این مدل، نشان‌دهنده تابع توزیع تجمعی یک متغیر تصادفی اقلیم به عنوان پیش‌بینی شونده مشاهداتی در ایستگاه هواشناسی مورد نظر برای دوره کالیبره مدل، و F_G نیز تابع توزیع تجمعی متغیر پیش‌بینی کننده خروجی مدل‌های گردش عمومی یا داده‌های واکاوی در ایستگاه مورد نظر با دوره زمانی مشابه است. به منظور ساده‌سازی در این متن، فرض می‌شود که پیش‌بینی کننده و پیش‌بینی شونده، متغیر اقلیمی مشابهی (مثل فرین دما یا مقدار بارش) باشد (x)، $F_S(x)$ و $F_G(x)$ غیرخطی بوده و به X احتمال کمتر و یا برابر با مقدار داده شده به x یعنی $F(x) = \Pr(X \leq x)$ را به ترتیب در داده‌های واقعی و

است. این روش، بهمنظور مقایسه و هماهنگی چندک‌ها، فقط مقادیر بزرگ‌مقیاس شیوه‌سازی شده را در سی‌دی‌اف تاریخی، به تصویر می‌کشد و با استفاده از روندزدایی به حل این مسئله می‌پردازد (فرج‌زاده و همکاران، ۲۰۱۵).

۲-۲. روش چندایستگاهی ریزگردانی بسط‌یافته (ایکس‌دی‌اس) (Modular Expanded Downscaling (ModExDs))

روش ریزگردانی بسط‌یافته (ایکس‌دی‌اس) یک تکنیک پیش‌بینی است که متغیرهای اقلیم محلی را براساس الگوهای بزرگ‌مقیاس جوی، به تصویر می‌کشد. ایکس‌دی‌اس ابتدا با هدف پیش‌بینی جوی معرفی شد (برگر، ۱۹۹۶)، اما اخیراً از آن در مطالعات تغییر اقلیم استفاده شده است (برای نمونه برگر و چن، ۲۰۰۵؛ دابلر و همکاران، ۲۰۱۲؛ برگر و همکاران، ۲۰۱۳؛ اوچی، ۱۳۹۲؛ سونیر و همکاران، ۲۰۱۵). این روش، بر مبنای یک رابطه رگرسیون خطی چندمتغیره بین پیش‌بینی کننده‌های y (میدان‌های چندمتغیره عناصر جوی) و پیش‌بینی شونده‌های X (متغیرهای محلی مثل بارش یک حوضه) استوار بوده و به واسطه شرط جانبی که کواریانس بین متغیرهای محلی (ایستگاه‌های هواشناسی) را حفظ می‌کند، بسط داده می‌شود:

$$XDS = \underset{Q}{\operatorname{argmin}} \|xQ - y\|,$$

$$\text{subject to } Q'x'xQ = y'y \quad (3)$$

رابطه فوق بدین معناست که ماتریس Q که خطای $xQ - y$ را کمینه می‌کند، از بین آن‌هایی جستجو می‌شود که کواریانس محلی را حفظ می‌کنند ($Q'x'xQ = y'y$). فرض بر این است که با استفاده از این روش، برآورد مقادیر حدی در مقایسه با مدل‌های رگرسیون خطی مرسوم، بهبود یابد. برای اطلاعات بیشتر، به برگر و همکاران (۲۰۰۹) مراجعه شود. کد این روش از طریق آدرس (<https://gitlab.com/xds/xds>) در دسترس است که در محیط اکتاو قابل اجراست. پژوهش حاضر با

فضایی تصحیح اریبی (بی‌سی‌اس‌دی) است (وود و همکاران، ۲۰۰۲). این روش مستقیماً و بدون تفکیک مکانی و زمانی به ریزگردانی مقادیر روزانه می‌پردازد (برگر و همکاران، ۲۰۱۳). مقادیر نگاشت چندکی در یک جدول جستجو، از طریق درونیابی بین نقاط یک نمودار چندک-چندک حاصل از داده‌های مشاهداتی و شیوه‌سازی شده در یک دوره مشابه، استخراج می‌شوند. نگاشت چندکی، روشنی مستقیم برای ریزگردانی است؛ به نحوی که پیش‌بینی کننده، مقدار شیوه‌سازی شده توسط مدل گردش عمومی در نزدیک ترین نقطه شبکه‌بندی شده به ایستگاه مورد نظر به عنوان متغیر پیش‌بینی شونده است. نگاشت چندکی، بر روی دامنه‌ای از مقادیر تاریخچه‌ای مدل گردش عمومی و مشاهداتی تعریف می‌شود. چنانچه مقدار شیوه‌سازی شده، خارج از محدوده مقادیر مشاهداتی قرار گیرد، بروندیابی ضرورت می‌یابد. روشنی ساده برای استخراج داده از روش "تغییر دلتا" هملت و همکاران (۲۰۱۰) به عاریه گرفته شده است. بروندیابی بارش، با استفاده از ضرب تغییرات نسبت حداکثر و حداقل مقادیر شیوه‌سازی شده به مقادیر مشاهداتی، انجام می‌گیرد. برای مثال چنانچه مقدار بارش شیوه‌سازی شده یک مدل گردش عمومی، ۱۰ درصد بزرگ‌تر از مقادیر دوره تاریخچه‌ای باشد، مقدار چندک نگاشت شده، به مقداری که ۱۰ درصد از بیشترین مقادیر مشاهده در مقادیر ثبت شده باشد، تنظیم می‌گردد. تغییرات دما، حالت افزایشی داشته و مقدار تغییرات، با داده‌های شیوه‌سازی شده، جمع‌zده می‌شود. بهمنظور جلوگیری از بروندیابی تکراری، تغییرات زمانمند سناریوهای آتی مدل گردش عمومی، با روند زدایی قبل از نگاشت چندکی و افزایش روند مقادیر اولیه به مقدار شیوه‌سازی شده، حفظ می‌گردد. روش نگاشت چندکی قادر به ایجاد چندک‌های محلی خارج از محدوده مشاهدات تاریخچه‌ای نیست. این می‌تواند یکی از مسائل بحث برانگیز در متون ریزگردانی باشد؛ بنابراین در روش کیوام‌دی به عنوان یکی از روش‌های توسعه یافته این مدل، به طرق مختلف در پی فائق‌آمدن بر این مشکل


شده و آزمون‌های همگنی مذکور برای هر سری زمانی، قبل و بعد از بازسازی آن‌ها به کار گرفته شد. به‌منظور ارزیابی صحت و همگنی داده‌های مشاهداتی، از بسته نرم‌افزار آر اچ تست وی ۳ (ونگ و فنگ، ۲۰۱۰) بر اساس روش آزمون‌های ماکسیمال پنالایزد تی واف (ونگ و همکاران، ۲۰۰۷؛ ونگ، ۲۰۰۸) که در یک الگوریتم آزمون نمایی برگشتی نهادینه شده است (اوچی، ۱۳۹۲) استفاده شد. در این پژوهش، ابتدا روش‌های انطباق چندکی و ریزگردانی بسط‌یافته با استفاده از متغیرهای بزرگ مقیاس جوی آرشیو داده‌های واکاوی مراکز ملی پیش‌بینی زیست‌محیطی (ان‌سپ) (کلنی و همکاران، ۱۹۹۶) با وضوح $2/5 * 2/5$ درجه و نیز سری زمانی مشاهداتی سی‌ساله آموزش داده شد. اعتبارسنجی مدل نیز بر این اساس برای یک دوره آماری بیست‌وسه‌ساله انجام گرفت.

استفاده از ماثرول ایکس‌دی‌اس (کن، ۲۰۱۳) در محیط نرم‌افزار آر به اجرا درآمده است.

۳. منطقه مورد مطالعه و اطلاعات مورد نیاز

پژوهش حاضر به مطالعه تغییرات مقادیر حدی دما و بارش سواحل جنوبی دریای خزر می‌پردازد. منطقه مذکور که از طرف شمال و جنوب، به ترتیب توسط دریای خزر و رشته کوه البرز احاطه شده است (شکل ۱)، عمدتاً در طبقه‌بندی‌های مختلف اقلیمی کشور، منطقه معتدل خزری نامیده می‌شود. ایستگاه سینوپتیک رشت، از لی، رامسر، بابلسر و گرگان (جدول ۲)، با دارایی‌بودن سری زمانی بیش از نیم قرن (۱۹۶۱-۲۰۱۳)، شرایط نسبتاً مطلوبی برای این پژوهش فراهم می‌آورد.

بازسازی داده‌های مفقود با استفاده از روش انتساب نزدیک‌ترین همسایگی متوالی K (کیم و بی، ۲۰۰۸) انجام



شکل ۱. منطقه مورد مطالعه.

جدول ۲. ایستگاه‌های مورد مطالعه.


نام ایستگاه	عرض جغرافیایی (°)	طول جغرافیایی (°)	ارتفاع (m)	(°C) دما	(mm) بارش
انزلی	۳۷,۴۶	۴۹,۴۶	-۲۶,۲	۱۶,۲	۱۸۴۲,۲
بابلسر	۳۶,۷۲	۵۲,۶۵	-۲۱	۱۶,۸	۸۹۳,۱
گرگان	۳۶,۸۵	۵۴,۲۷	۱۳	۱۷,۸	۵۸۴,۲
رامسر	۳۶,۹	۵۰,۴۶	-۲۰	۱۶,۲	۱۲۲۱,۵
رشت	۳۷,۲	۴۹,۶۵	۳۶,۷	۱۶,۲	۱۳۴۰,۱

شبیه‌سازی شده برای شاخص‌های بارش در این ایستگاه، شباهت بیشتری به شاخص‌های حاصل از داده‌های مشاهداتی دارد.


با توجه به شکل ۳ نتایج آزمون توزیع، بهتر از آزمون همبستگی بوده است. به نحوی که تعداد شاخص‌هایی که توزیع آن‌ها با موفقیت شبیه‌سازی شده‌اند، بیشتر از آزمون همبستگی است. از بین شاخص‌های مربوط به دما، شاخص‌های دامنه دمایی، روزهای یخ‌بندان، شب‌های سرد، شب‌های گرم و حداقل دمای حداقل، در هر دو روش مورد بررسی در تمام منطقه، غیر از ایستگاه گرگان، عملکرد ضعیفی ارائه کرده‌اند. در حالی که، در شبیه‌سازی توزیع شاخص‌های بارش، عملکرد نسبتاً مطلوبی را در منطقه ارائه کرده‌اند. به لحاظ توزیع فضایی، نتایج ایستگاه ارزلی، ضعیف‌تر از ایستگاه‌های دیگر بوده است؛ در حالی که این نتایج برای ایستگاه گرگان به طور قابل توجهی بهتر از سایر ایستگاه‌های است.

۴. نتایج و بحث


بررسی نتایج حاصل از همبستگی شاخص‌های فرین دما و بارش مشاهداتی دوره اعتبارسنجی با شاخص‌های حاصل از ریزگردانی داده‌های واکاوی (شکل ۲) نشان می‌دهد که هر دو روش مورد بررسی در شبیه‌سازی شاخص‌های مربوط به دما، موفق‌تر عمل کرده‌اند. به طوری که مقادیر شاخص‌های روزهای یخ‌بندان، طول فصل رشد، شب‌های سرد، شب‌های گرم، روزهای گرم، شب‌های حاره‌ای و حداقل دمای حداکثر، تقریباً در تمام منطقه به خوبی شبیه‌سازی شده‌اند. در بین شاخص‌های مربوط به بارش، مقادیر ریزگردانی شده مقادیر حداکثر بارش ۵ روز متوالی و تعداد روزهای دارای بارش خیلی سنگین، به وسیله هردو روش، تقریباً در کل منطقه فاقد همبستگی معنادار با مقادیر مشاهداتی بودند. به لحاظ توزیع فضایی شاخص‌های شبیه‌سازی شده نیز ایستگاه ارزلی، نسبتاً متفاوت‌تر از ایستگاه‌های دیگر بوده است؛ چراکه مقادیر



شکل ۲. آزمون مقایسه همبستگی شاخص‌های فرین دما و بارش مشاهداتی و شبیه‌سازی شده با استفاده از دو روش SSQ و ModExDs طی دوره اعتبارسنجی (۱۹۹۱-۲۰۱۳).



شکل ۳. آزمون مقایسه توزیع شاخص‌های فرین دما و بارش مشاهداتی و شبیه‌سازی شده با استفاده از دو روش SSQ و ModExDs طی دوره اعتبارسنجی (۱۹۹۱–۲۰۱۳).



شکل ۴. آزمون ترکیبی ارزیابی روش‌های SSQ و ModExDs بر اساس شاخص‌های فرین دما و بارش طی دوره اعتبارسنجی (۱۹۹۱–۲۰۱۳).


چند ایستگاهی بسط یافته، عملکرد مطلوب‌تری ارائه کرده است. به لحاظ توزیع فضایی نیز نتایج بدست آمده برای ایستگاه‌گرگان، بهتر از ایستگاه‌های دیگر است. همچنان که در شکل ۵ مشاهده می‌شود، نمودار

نتایج آزمون ترکیبی (شکل ۴) حاکی از آن است که تعداد اندکی از شاخص‌ها (شاخص فصل رشد و روزهای گرم) توسط هر دو روش در سراسر منطقه به خوبی شبیه‌سازی شده‌اند. در مجموع، روش ریزگردانی


نمی‌شود. نتایج حاصل از محاسبه میانگین خطای مطلق مقادیر مشاهداتی و پیش‌بینی شده (شکل ۶)، نشان می‌دهد که خروجی روش‌های مختلف در ایستگاه‌های منطقه تا حد زیادی متغیر است. این شاخص در آمار به‌منظور اندازه‌گیری تفاوت بین دو متغیر پیوسته استفاده می‌شود. در ارزیابی روش‌های ریزگردانی، هرچه مقدار این شاخص کمتر باشد، نشان‌دهنده اعتبار بیشتر مدل مورد بررسی است. به دلیل نوسان بیشتر بارش از دما، نتایج معیار مذکور برای بارش غالباً بیشتر از دما است. همچنان که در شکل ۶ نیز نمایان است، بیشترین مقدار آن برای بارش ایستگاه ازولی و سپس رامسر و رشت است. نکته جالب توجه در این زمینه، پایین بودن میانگین خطای مطلق بارش ایستگاه گرگان است که نتایج آن در شاخص‌های فرین بارش این ایستگاه به خوبی مشخص است. در بین فرین‌های دما، مقادیر معیار مذکور برای حداکثر دما، بیش از حداقل آن است که این مسئله به احتمال زیاد حاکی از تغییرات بیشتر دمای حداکثر طی سال‌های اخیر است؛ چراکه امکان تأثیرپذیری نسبتاً زیاد این عنصر از جزیره حرارتی شهرها دور از انتظار نیست. به طور کلی، نتایج این دو معیار نشان می‌دهد که عملکرد روش چندایستگاهی به ویژه در ریزگردانی دما، بهتر از روش تکایستگاهی بوده است.

پراکندگی همبستگی متقاطع مقادیر مشاهداتی و شبیه‌سازی شده طی دوره اعتبارسنجی نشان می‌دهد که نتایج حاصل از ریزگردانی در منطقه، تا حد زیادی بر هم منطبق بوده و دامنه متغیری از همبستگی بین ۰-۴۰٪ تا ۱۰٪ می‌کنند. همچنان که مشاهده می‌شود، پراکندگی نقطاط عمدتاً در دو ربع اول و سوم نمودار است که حاکی از غلبه همبستگی زیاد (در ربع اول و سوم نمودار) است که به نوعی نشان‌دهنده خوشبندی این توزیع فضایی است. به‌طوری که با افزایش همبستگی متقاطع پیش‌بینی شونده‌ها، مقادیر همبستگی همبستگی متقاطع پیش‌بینی کننده‌ها نیز افزایش می‌یابد و بر عکس. همچنین می‌توان گفت که اگرچه هر دو روش مورد بررسی نتایج تقریباً مشابهی از همبستگی متقاطع را به نمایش گذاشته‌اند، روش ریزگردانی بسط‌یافته توزیع مناسب‌تری را در مقایسه با خط برازش به نمایش گذاشته است.

بررسی ضریب همبستگی (شکل ۶) بین مقادیر مشاهداتی و شبیه‌سازی شده در دوره اعتبارسنجی نشان می‌دهد که این ضریب برای فرین‌های دما در تمام ایستگاه‌ها در حد بسیار مطلوب (نژدیک به ۱) است. در حالی که همبستگی مجموع بارش ایستگاه‌ها در حدود ۰/۵ است. در مجموع، تفاوت فاحشی بین روش‌های مورد استفاده مشاهده




شکل ۵. نمودار همبستگی متقاطع مقادیر مشاهداتی و شبیه‌سازی شده با استفاده از SSQ و ModExDs طی دوره اعتبارسنجی (۱۹۹۱-۲۰۱۳).



شکل ۶. نمودار همبستگی پرسون (چپ) و میانگین خطای مطلق (راست) مقادیر مشاهداتی و شبیه‌سازی شده ایستگاه‌های مورد بررسی طی دوره اعتبارسنجی (۱۹۹۱-۲۰۱۳).

داده‌ایی فراتر از دامنه تغییرات داده‌های مشاهداتی نیستند. اگرچه در به کارگیری روش‌های مورد استفاده در این پژوهش (برون‌یابی دلتا، روندزدایی و افزودن روند و ...) تلاش شده تا حد ممکن، این نقیصه پوشش داده شود. با بررسی نمودارهای مربوط به بارش، مشخص می‌شود که این مسئله در شبیه‌سازی مقادیر بارش، نمود بیشتری به خود می‌گیرد؛ به نحوی که ریزگردانی مقادیر حداکثر بارش‌ها کاملاً از محور ترسیم شده فاصله می‌گیرند. از این رو مقایسه نمودارهای چندک-چندک ایستگاه‌های مختلف، آشکار می‌سازد که ضعیف‌ترین نتیجه ریزگردانی بارش، مربوط به ایستگاه انزلی و بهترین نتیجه از آن گرگان است؛ بنابراین می‌توان اذعان نمود که روش‌های مذکور در منطقه مرطوب‌تر، عملکرد ضعیف‌تری را در مقایسه با منطقه خشک‌تر ارائه نموده‌اند.


نمودار Q-Q (شکل ۷) به مقایسه چندک‌های مشاهداتی (در محور افقی) و چندک‌های پیش‌بینی شده (در محور عمودی) در دوره اعتبارسنجی می‌پردازد. خطی بودن نقاط نشان می‌دهند که داده به صورت معمولی توزیع یافته است. فاصله‌گرفتن داده‌ها در دو انتهای نمودار، حاکی از وجود مقادیر پرت عدم انطباق داده‌ها با توزیع مورد نظر است. همچنان که در شکل ۷ نیز به تصویر کشیده شده است، هر دو روش در ریزگردانی فرین‌های دما، عملکرد بهتری به نمایش گذاشته‌اند. با وجود این، دامنه انتهای پایینی دمای حداقل و بالایی دمای حداکثر، به خوبی بر محور ترسیم شده منطبق نیستند. این مسئله حاکی از ارائه عدم قطعیت در شبیه‌سازی حداقل دمای حداقل و نیز حداکثر دمای حداکثر است. با توجه به ویژگی روش‌های قطعی روش‌های ریزگردانی آماری، این مسئله تا حدودی عادی به نظر می‌رسد؛ چرا که این روش‌ها قادر به برونویابی



شکل ۷. نمودار چندک-چندک روش‌های تکایستگاهی و چندایستگاهی در بازنمونه برداری فرینهای دما و بارش دوره اعتبارسنجی منطقه موردمطالعه.

فصل رشد، شب‌های سرد، شب‌های گرم، روزهای گرم، شب‌های حاره‌ای و حداقل دمای حداکثر) در مقایسه با شاخص‌های بارش نتایج بهتری در منطقه ارائه نمودند و برخی از شاخص‌ها به خوبی شیوه‌سازی نشاند (مقدار حداکثر بارش ۵ روز متوالی و تعداد روزهای دارای بارش خیلی سنگین). سطح موفقیت روش‌های مورد بررسی در ریزگردانی فرینهای دما و بارش براساس شاخص‌های استاندارد در دوره اعتبارسنجی منطقه، به طور خلاصه در شکل ۸ به تصویر کشیده شده است.

۵. نتیجه‌گیری
در مجموع با توجه به آنچه که در بخش پیشین بررسی شد، نتایج این پژوهش با تأیید تحقیقات پیشین (برگر و همکاران، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳؛ خلیلی و همکاران، ۲۰۱۳؛ اوچی، ۱۳۹۲؛ سونیر و همکاران، ۲۰۱۵) نشان داد که عملکرد روش ریزگردانی چندایستگاهی، به دلیل افزایش همگنی تغییرات متغیر موردنرسی بین ایستگاه‌ها، بهتر از روش تکایستگاهی است. همچنان که انتظار می‌رفت، ریزگردانی شاخص‌های حدی دما (شاخص‌های روزهای یخ‌بندان، طول



شکل ۸ درصد موفقیت روش‌ها در ریزگردانی شاخص‌های فرین بر مبنای آزمون‌های توزیع، همیستگی و ترکیبی، به نفیکیک ایستگاه‌های مورد بررسی.

زمینه عدم قطعیت ریزگردانی اشاره شد، با توجه به نیاز به پیش‌بینی تغییرات آتی اقلیم مناطق مختلف کره زمین، روش‌های متعدد آماری در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته و دارای مقبولیت جهانی‌اند. نکته‌ای که در این زمینه حائز اهمیت است، آگاهی از مسئله عدم قطعیت موجود در خروجی این روش‌ها، تلاش در مدیریت عدم قطعیت مذکور و ارائه هرگونه پیش‌بینی و برنامه‌ریزی بر این اساس است.

مراجع

- اوچی، ر.، ۱۳۹۲، تحلیل عدم قطعیت روش‌های تک ایستگاهی و چند ایستگاهی در ریزگردانی مقادیر حدی دما و بارش غرب میانی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
- جعفرزاده، ا.، خاشعی، ع. و شهیدی، ع.، ۱۳۹۵، ارزیابی دو روش ریز مقياس نمایی آماری LARS-WG و SDSM در برآورد تغییرات پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردي: دشت بیرون‌جند). مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، دوره ۲۳، شماره ۴، صفحه ۳۰۹-۳۲۲.
- دهقانی پور، ا.ح.، حسن‌زاده، م.ج.، عطاری، ج. و عراقی‌نژاد، ش.، ۱۳۹۰، ارزیابی توانمندی مدل SDSM در ریز مقياس نمایی بارش، دما و تبخیر) مطالعه موردي: ایستگاه سینوبوتیک تبریز (یازدهمین

همچنان که مشاهده می‌شود در مجموع، روش ریزگردانی تک ایستگاهی نگاشت چند کی، موفق به گذراندن حدود ۲۹ درصد و روش چند ایستگاهی بسط یافته موفق به گذراندن $\frac{33}{3}$ درصد از آزمون ترکیبی در منطقه شده‌اند که نتایج مورد قبولی در این زمینه است. این در حالی است که نتایج به دست آمده برای ایستگاه‌های منطقه تا حد زیادی متغیر است؛ به نحوی که این موفقیت بر اساس روش چند ایستگاهی برای ایستگاه گرگان به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، در حالی که بر اساس هر دو روش در ایستگاه رشت به حدود ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. این بدین معنی است که عدم قطعیت ناشی از ریزگردانی، به حدود ۵۰ درصد می‌رسد؛ بنابراین بایستی در ارائه تصویر آتی از اقلیم منطقه بر اساس سناریوهای مختلف که خود منشأ عدم قطعیت دیگری است که در تحقیقی مجزا به آن پرداخته خواهد شد، مدنظر قرار گیرد؛ چرا که در غیر این صورت، پیش‌بینی‌ها تا حد زیادی غیر واقعی جلوه خواهد نمود و از اعتبار مطالعات خواهد کاست. اگرچه ارزیابی یک روش ریزگردانی آماری بر اساس شاخص‌های فرین دما و بارش، تا حدودی سخت گیرانه به نظر می‌رسد، ولی با توجه به اینکه بر اساس استانداردهای جهانی، بایستی تأثیرات تغییر اقلیم آتی هر منطقه را در شدت و مدت فرین‌ها در منطقه جستجو کرد، ناگزیر به چنین ارزیابی‌هایی هستیم. در پایان، با وجود تمام مواردی که در

چندایستگاهی مدل آماری اس‌دی‌اس‌ام با استفاده از شاخص‌های حدی دما و بارش (مطالعه موردنی: غرب میانی ایران)، فیزیک زمین و فضای دوره، ۴۳، شماره ۱، ۲۰۸-۱۹۳.

فرمز چشم، ب.، رسولی، ع. ا.، رضائی‌بنفسه، م.، مساح‌بوانی، ع. ر. و خورشید‌دوست، ع. م.، ۱۳۹۳، بررسی اثر عوامل مورفو-اقلیمی بر دقیقت ریزمقیاس گردانی مدل SDSM، نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد ششم، شماره ۲، ۱۵۵-۱۶۴.

کوهی، م.، موسوی بایگی، م.، فرید حسینی، ع. ر.، ثابی نژاد، ح. و جباری نوقابی، م.، ۱۳۹۱، ریزمقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش در حوضه کشف رود، نشریه پژوهش‌های اقلیم‌شناسی، سال سوم، شماره ۱۲، ۳۵-۵۳.

Bürger, G., 1996, Expanded downscaling for generating local weather scenarios. *Clim. Res.*, 7, 111-128.

Bürger, G. and Chen, Y., 2005, Regression-based downscaling of spatial variability for hydrologic applications, *J. Hydrol.*, 311, 299-317, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2005.01.025.

Bürger, G., Murdock, T. Q., Werner, A. T., Sobie, S. R. and Cannon, A. J., 2012, Downscaling Extremes—An Intercomparison of Multiple Statistical Methods for Present Climate, *J. Clim.*, 25, 4366-4388, DOI: 10.1175/JCLI-D-11-00408.1.

Bürger, G., Reusser, D. and Kneis, D., 2009, Early flood warnings from empirical (expanded) downscaling of the full ECMWF Ensemble Prediction System, *Water Resour. Res.*, 45, W10443, DOI: 10.1029/2009WR007779.

Bürger, G., Sobie, S. R., Cannon, A. J., Werner, A. T. and Murdock, T. Q., 2013, Downscaling Extremes: An Intercomparison of Multiple Methods for Future Climate, *J. Clim.*, 26, 3429-3449, DOI:10.1175/JCLI-D-12-00249.1.

Cannon, A. J., 2013, ModExDs, Pacific Climate Impact Consortium.

Chen, J., Chen, H. and Guo, S., 2017, Multi-site precipitation downscaling using a stochastic weather generator, *Clim Dyn.*, DOI: 10.1007/s00382-017-3731-9.

Dobler, C., Bürger, G. and Stötter, J., 2012, Assessment of climate change impacts on

سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، دانشگاه شهید بهمن).

رضائی، م.، نهتانی، م.، مقدم‌نیا، ع.، جان‌آبکار، ع. و رضائی، م.، ۱۳۹۴، مقایسه روش‌های شبکه‌ی عصبی مصنوعی و SDSM در ریزمقیاس کردن اندازه‌ی بارش سالانه‌ی شبیه‌سازی شده با HadCM3 (مطالعه موردنی: کرمان، راور و رابر)، مجله مهندسی منابع آب، دوره ۸، شماره ۲۴، صفحه ۲۵-۴۰.

سبحانی، ب.، اصلاحی، م. و بابایان، ا.، ۱۳۹۴، کارایی الگوهای ریزمقیاس نمایی آماری SDSM و LARS-WG در شبیه‌سازی متغیرهای هواشناسی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، دوره ۴۷، شماره ۴، صفحه ۴۹۹-۵۱۶.

فوجزاده، م.، اوچی، ر.، قویدل‌رحمی، م. و مساح‌بوانی، ع.، ۱۳۹۶، ارزیابی ریزگردانی تکایستگاهی و

flood hazard potential in the Alpine Lech watershed, *J. Hydrol.*, 460-461, 29-39, DOI:10.1016/j.jhydrol.2012.06.027.

Farajzadeh, M., Oji, R., Cannon, A. J., Ghavidel Y. and Massah Bavani, A., 2015, An evaluation of single-site statistical downscaling techniques in terms of indices of climate extremes for the Midwest of Iran, *Theoretical and Applied Climatology* 120, 377-390, DOI: 10.1007/s00704-014-1157-4.

<https://rcmes.jpl.nasa.gov/content/statistical-downscaling#quantile>.

Haddad, Z. S. and Rosenfeld, D., 1997, Optimality of Z-R Relationships, *Q. J. R. Meteorol Soc.*, 123, 1283-1293.

Hamlet, A. F., Salathe, E. P. and Carrasco, P., 2010, Statistical downscaling techniques for global climate model simulations of temperature and precipitation with application to water resources planning studies. <http://www.hydro.washington.edu/2860/report>.

Harpham, C. and Wilby, R. L., 2005, Multi-site downscaling of heavy daily precipitation occurrence and amounts. *J. Hydrol.* 312:235-255.

Haylock, M. R., Cawley, G. C., Harpham, C., Wilby, R. L. and Goodess, C. M., 2006, Downscaling heavy precipitation over the UK: a comparison of dynamical and statistical methods and their future scenarios. *International Journal of Climatology*, 26, 1397-1415.

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins,

- W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Leetmaa, A., Reynolds, R., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, D., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Jenne, R. and Joseph, D., 1996, The NCEP/NCAR 40 year Reanalysis project, *Bulletin of the American Meteorological Society* 77, 437–471.
- Khalili, M., Brissette, F. and Leconte, R., 2011, Effectiveness of Multi-site Weather Generator for Hydrological Modeling, *American Water Resources Association, Journal of the American Water Resources Association*, 47(2), 303-314.
- Khalili, M. and Nguyen, V. T. V., 2016, An efficient statistical approach to multi-site downscaling of daily precipitation series in the context of climate change, *Climate Dynamics*, DOI: 10.1007/s00382-016-3443-6.
- Khalili, M., Nguyen, V. T. V. and Gachon, P., 2013, A statistical approach to multi-site multivariate downscaling of daily extreme temperature series, *International Journal of Climatology* 33(1): 15-32, DOI: 10.1002/ joc. 3402.
- Kim, K. Y. and Yi, G. S., 2008, Sequential KNN imputation method. R package version 1.0.1. CSBio lab., Information and Communications University, <http://csbio.icu.ac.kr>.
- Maraun, D., 2013, Bias Correction, Quantile Mapping, and Downscaling: Revisiting the Inflation Issue, *Journal of Climate*, DOI: 10.1175/JCLI-D-12-00821.1.
- Michelangeli, P. A, Vrac, M. and Loukos, H., 2009, Probabilistic downscaling approaches: application to wind cumulative distribution functions. *Geophys Res Lett* 36:L11708. doi: 10.1029/2009GL038401.
- Panofsky, H. A. and Brier, G. W., 1958, Some Applications of statistics to meteorology, Philadelphia: the Pennsylvania State University.
- Sunyer, M. A., Hundecha, Y., Lawrence, D., Madsen, H., Willems, P., Martinkova, M., Vormoor, K., Bürger, G., Hanel, M., Kriauciūnienė, J., Loukas, A., Osuch, M. and Yücel, I., 2015, Inter-comparison of statistical downscaling methods for projection of extreme precipitation in Europe, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 19, 1827-1847, DOI: 10.5194/hess-19-1827-2015.
- Vandal, T., Kodra, E. and Ganguly, A. R., 2017, Intercomparison of Machine Learning Methods for Statistical Downscaling: The Case of Daily and Extreme Precipitation, arXiv:1702.04018.
- Wang, X. L., 2008, Penalized maximal F-test for detecting undocumented mean-shifts without trend-change. *J Atmos Oceanic Tech* 25:368–384. DOI: 10.1175/2007/JTECHA982.1.
- Wang, X. L., Chen, H., Wu, Y., Feng, Y. and Pu, Q., 2010, New techniques for the detection and adjustment of shifts in daily precipitation data series. *J App Meteorol Climatol* 49:2416–2436. DOI: <http://dx.doi.org/10.1175/2010JAMC2376.1>
- Wang, X. L. and Feng, Y., 2010, RHtestsV3 user manual. Climate Research Division, Science and Technology Branch, Environment Canada, Toronto, ON, Canada. http://ccma.seos.uvic.ca/ETCCDMI/RHtest/RHtestsV3_UserManual.doc.
- Wang, X. L., Wen, Q. H. and Wu, Y., 2007, Penalized maximal t test for detecting undocumented mean change in climate data series. *J App Meteorol Climatol* 46:916–931. DOI: 10.1175/JAM2504.1.
- Wood, A., Maurer, E., Kumar, A. and Lettenmaier, D. P., 2002, Long-range experimental hydrologic forecasting for the eastern United States. *J Geophys Res* 107:4429, doi:10.1029/2001JD000659.
- Zhang, X., Alexander, L., Hegerl, G. C., Jones, P., Klein Tank, A., Peterson, T. C., Trewin, B., Zwiers, F. W., 2011, Indices for monitoring changes in extremes based on daily temperature and precipitation data. *WIREs Climate Change* 2:851–870. doi:10.1002/wcc.147.

Comparison of Multi-site and Single-site Daily Precipitation and Temperature Extremes Downscaling (Case Study: Southern Coast of the Caspian Sea)

Oji, R.*

Assistant Professor, Department of Geography, University of Guilan, Rasht, Iran

(Received: 20 Jun 2017, Accepted: 24 Oct 2017)

Summary

To characterize the linkage between large-scale climate conditions and local climate variability, statistical downscaling techniques have been frequently used in climate-related studies. Different single-site and multi-site approaches to downscaling methods are applied in this regard. Most of the studies, however, have been mainly dealing with downscaling of climatic processes for a specific site or watershed average, but few studies are concerned with the multi-sites downscaling techniques because of the complexity in accurately describing both observed at-site temporal persistence and spatial dependence between different variables and locations (Khalili et al. 2013; Chen et al., 2017).

In this study, in order to comparison of multi-site and single-site daily precipitation and temperature extremes downscaling, two methods of Single-site Quintile Mapping (SSQ) and multi-site Modular Expanded Downscaling (ModExDs) (Cannon, 2013) were applied to a set of 5 synoptic stations located within Southern Coast of the Caspian Sea, Iran. The SSQ downscaling technique is based on application of the quantile mapping bias correction step from the Bias Correction Spatial Disaggregation (BCSD; Wood et al. 2002) downscaling algorithm directly to daily GCM data, i.e., without spatial and temporal disaggregation (Bürger et al. 2013). In this study, quantile mapping algorithm with delta method extrapolation for nonlinear bias correction is applied. Expanded Downscaling (XDS) is a perfect prognosis technique which maps large-scale atmospheric fields to local station data. The XDS method is based on defining a multivariate linear regression between predictors and predictands, extended by the side condition that the local co-variability between the variables and stations is preserved (Sunyer et al.). The ModExDs, as a modular of XDS which is implemented in R by Cannon (2013), is performed here.

The predictands include daily time series of precipitation and temperature extremes for the 1961-2013 period that leads to create a training set consisting of the first 30 years data, and a test set consisting of the remaining observations. Same variables of the NCEP/NCAR (National Centers for Environmental Prediction/National Centre for Atmospheric Research) reanalysis dataset were considered as climate predictors. Missing values of observed data are filled in by using the sequential k-nearest neighbor imputation method (Kim and Yi 2008) and homogeneity tests, of the R packages RHtestsV3 (Wang and Feng 2010) and RHtests_dlyPrecp (Wang et al. 2010), based on penalized maximal t and F tests (Wang et al. 2007; Wang 2008b), are applied both before and after infilling to assess infilling performance.

The methods sensitivity to large-scale anomalies and their skill in replication of the observation data distribution during the validation period (1991-2013) are tested, according to the 27 Climate Extremes Indices (CLIMDEX), using Pearson correlation and Kolmogorov-Smirnov (KS) tests, respectively. Combined tests are used to assess overall model performances.

The results showed that the multi-site method of ModExDs was able to pass 66.7, 48.9 and 33.3 percent and the single-site method of SSQ, passed 63, 48 and 29.6 percent of the Kolmogorov-Smirnov (KS), the Pearson correlation and the combined tests respectively. Therefore, both methods performed well in terms of temperature and precipitation downscaling. However, multi-site method performed better than single-site overlay.

Correlation tests were passed less frequently than KS tests. Both methods downscaled temperature indices better than precipitation indices. According to the Tables 3, 4 and 5, some indices, notably FD, GSL, TN10p, TN90p, TR and DTR, were passed correlation test successfully. Most of the indices related to the precipitation, especially, Rx5day and R10 were not successfully simulated by any of the methods in the region. Model performance varied widely across the study region. Methods performance, however, were better in the Anzali station regarding to the test 1 (corr). More indices were able to pass the test 2 (KS) throughout the region. However, indices such as DTR, FD, TN10p, TN90p, TNN, were not successfully downscaled or appeared to be fairly weak in all stations except for Gorgan in this regard. The indices of GSL and TX90p could pass the combined test throughout the study area. As mentioned before, methods performance varied across the region. So that the methods performed well in Gorgan station, while both performed worse in Rasht station.

Keywords: Statistical Downscaling, comparison, extreme temperature and precipitation, the south coast of the Caspian.

* Corresponding author:

oji_r@yahoo.com