

مقاله کوتاه

اثر گردهافشانی بر کمیت و کیفیت بذر ده رقم پیاز انتخاب شده در اصفهان^۱

EFFECT OF POLLINATION ON SEED QUANTITY AND QUALITY OF TEN SELECTED ONION (*ALLIUM CEPA* L.) CULTIVARS IN ISFAHAN

سلمی سید ابراهیمی، مصطفی مبلی، رحیم عبادی و عبدالمجید رضایی^۲

چکیده

با وجود مرغوبیت رقم های بومی پیاز (*Allium cepa* L.), تولید اقتصادی بذر این رقم ها در داخل کشور با موانعی روپرتو است و هر ساله مقدار زیادی بذر پیاز از کشورهای دیگر وارد می‌گردد. یکی از مسائل مهمی که در تولید بذر پیاز حائز اهمیت است، تلقیح و باروری گل های آن است. حشرات از جمله زنبور عسل از عوامل موثر در گردهافشانی گل های پیاز می‌باشند. به منظور ارزیابی تأثیر حشرات گردهافشان بر کیفیت و کمیت بذر ۹ رقم پیاز انتخابی بومی ایران و یک رقم خارجی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل رقم های پیاز و کرت های فرعی شامل گرده افشنی آزاد و جلوگیری از گرده افشنی توسط حشرات بود. نتایج نشان داد میزان بذر تولید شده در یک گل آذین با حضور گرده افشن ها ۲/۴ برابر گل آذین های گرده افشنی نشده (داخل قفس های توری و بدون حضور گرده افشن ها) بود. تأثیر گرده افشنی بر وزن هزار دانه ناچیز (غیر معنی دار) بود. درصد جوانه زنی در بذر های حاصل از کرت های گرده افشنی شده ۷ درصد بیشتر از کرت های گرده افشنی نشده بود. میانگین تعداد ساعت های لازم برای تندش بذر های حاصل از کرت های گرده افشنی شده ۱۰/۶ ساعت کمتر از بذر های کرت های گرده افشنی نشده بود. وزن خشک گیاهچه حاصل از بذر های گرده افشنی شده بیشتر از بذر های گرده افشنی نشده بود. بین رقم های مختلف از نظر میزان بذر در گل آذین اختلاف معنی داری وجود داشت. بیشترین مقدار بذر تولید شده از رقم 'سفید قم' و کمترین مقدار از رقم 'هوراند' به دست آمد. میزان تأثیر گرده افشنی بر وزن بذر در رقم های مختلف به دلیل برهمکنش معنی دار، متفاوت بود. همچنین بین رقم های مختلف از نظر وزن هزار دانه، درصد و سرعت جوانه زنی بذر و وزن خشک گیاهچه اختلاف معنی داری وجود داشت.

واژه های کلیدی: بذر، پیاز، کمیت، کیفیت، گرده افشنی.

۱- تاریخ پذیرش: ۸۲/۱۱/۲۹

۲- تاریخ دریافت: ۸۲/۸/۱۲

به ترتیب دانشجوی سابق کاشتناسی ارشد، دانشیار و استادان دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه

پیاز خوارکی (*Allium cepa* L.) یکی از مهمترین سبزی هایی است که در دنیا در سطح وسیع کشت می شود و از هزاران سال پیش تا کنون یکی از اجزای جدایی ناپذیر رژیم غذایی روزانه تمامی اقوام جهان بوده است. در میان ۱۵ سبزی که به وسیله سازمان خوار و بار جهانی (F.A.O.) فهرست شده است پیاز رتبه دوم را پس از گوجه فرنگی را دارا است (۱۶) و از نظر ارزش تولیدی مقام چهارم را در بین سبزی ها به خود اختصاص داده است (۳). در سال زراعی ۱۳۷۸-۷۹ سطح زیر کشت پیاز آبی کشور حدود ۵۶۰۰ هکتار و میزان تولید آن ۱۶۷۷ هزار تن بوده است (۶).

با وجود این که منشأ پیاز را ایران و کشورهای همسایه می دانند (۱۲) و هم اکنون نیز این منطقه دارای غنی ترین منابع ژنتیکی موجود می باشد و با آن که به لحاظ شرایط اقلیمی کشورمان تمامی عوامل مطلوب برای کشت و کار این محصول فراهم می باشد، اما هنوز همگام با روش های نوین تولید، به جنبه های بهنژادی و تولید آن پرداخته نشده است. با توجه به میزان تولید و مصرف بالای پیاز، هر ساله با کمبود بذر مرغوب روبرو هستیم و مقادیر زیادی بذرهای اصلاح شده یا دورگه وارد کشور می شود و حتی در بعضی سال ها مجبور به وارد کردن پیاز هم بوده ایم. نظر به این که انواع پیازهای خوارکی که در ایران به عمل می آید اکثراً دارای صفات مطلوبی از جمله عملکرد بالا، انبارداری خوب و غیره هستند (۴)، بنابراین تولید بذر پیاز از رقم های مرغوب محظی در داخل کشور به منظور خودکفایی در این زمینه دارای اهمیت ویژه ای است. به این که توانایی تولید و شرایط رسیدن به این هدف کاملاً موجود می باشد، اما برای تولید بذر کافی و مطلوب از این گیاه مشکلات چندی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها لقادیر گل ها و دانه بندی است.

پیاز یک محصول به شدت دگر افشاران است. گل ها کامل هستند، ولی پرچم ها دانه های گرده خود را پیش از این که کلاله پذیرنده باشد رها می کنند. به بیان دیگر پیاز دارای نر پیش رسی^۲ است (۷)، بنابراین مهمترین مساله ای که تولید بذر پیاز را تحت تأثیر قرار می دهد گرده افشاری گل های آن است. باد، نیروی جاذبه و سایر نیروهای فیزیکی نقش کمی در گرده افشاری پیاز دارند، ولی حشرات مهمترین عامل گرده افشاری می باشند. با وجود حشرات مختلفی که گل های پیاز را ملاقات می کنند، به علت وجود درصد بالای گل های سترون، میزان بذر در پیاز کم است (۷). به هر حال، عدم تلقیح گل ها و دانه بندی بذرها در اثر عدم گرده افشاری کافی نیاز به حشرات گرده افشار را ضروری می سازد. در غیر این صورت تولید اقتصادی بذر پیاز در عمل با شکست روبرو می شود. گزارش های فراوانی از تاثیر گرده افشاری زنبور عسل روی میزان تولید و کیفیت بذرهای رقم های مختلف پیاز در کشورهای مختلف در دست است. زنبور عسل باعث افزایش درصد دانه بندی، وزن بذر در گل آذین و بوته پیاز می شود (۱۳). طبق پژوهش های آکوپین^۳ (۷) گل آذین هایی که در معرض گرده افشاری آزاد قرار گرفتند ۲۰ برابر آن هایی که در قفس ها مجزا شده بودند تولید بذر کردند و جوانه زنی این بذرها به میزان ۴۰-۳۸٪ افزایش یافت. بررسی ها در برزیل نشان داده است که در جایی که توانایی تولید بذر تا ۱۰۰۰ کیلوگرم در هکتار می باشد، تنها به میزان ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم بذر در هکتار تولید می شود. بررسی گل آذین ها نشان داد که نزدیک به ۳۰٪ گل ها بارور نشده بودند (۲۱). جاده او و آجری^۴ (۱۱) گزارش نموده اند که در صورت گرده افشاری میزان دانه بندی (تشکیل بذر) ۷۴٪ و وزن بذر در هر گل آذین ۳/۸۳ گرم بود، درحالی که در مورد گل آذین های درون

کیسه که گردهافشانی نشده بودند این داده‌ها به ترتیب٪ ۰/۱۸ گرم بود. کومار و همکاران^۱ (۱۲) مشاهده نمودند که میزان وزن دانه و دانه بندی در گل آذین‌های داخل قفس که حاوی چهار قاب زنبور عسل هندی (*Apis cerana*) بود، در حدود سه برابر گل آذین‌های فضای روباز بوده است. رائو و سوریانارایانا^۲ (۱۹) گزارش کردند که میانگین درصد دانه بندی در قفس بدون حشره ۷/۳۳، در قفس حاوی زنبور عسل هندی ۷۲/۰۷ و در کرت شاهد (روباز) بدون کندو ۱۶/۸۸ درصد بوده است. زودنوك^۳ (۲۱) هم دلیل اصلی برای محصول کم بذر پیاز را گرده افشنی ضعیف می‌داند و گزارش داده است که به کم گرده افشنی با حشرات میزان تولید بذر می‌تواند از ۲۰۰ به ۶۰۰ کیلو گرم در هکتار افزایش یابد. مارتینووسکی و همکاران^۴ (۱۵) یک راه ارزان و بسیار مؤثر برای تقویت گرده افشنی به وسیله زنبورها و حشرات دیگر را، کاشتن ردیف‌های گیاهانی که شهد زیادی تولید می‌کنند به فاصله ۲۵-۲۰ متر در حاشیه مزرعه پیاز می‌دانند. آن‌ها همچنین نشان دادند میزان تولید بذر در شرایط گرده افشنی با زنبور عسل ۲۵/۷۴٪ بیشتر از گرده افشنی مکانیکی (با برس) و ۴۴/۳۸٪ بیشتر از شاهد (گرده افشنی آزاد) بوده است (۱۵).

مطالعات اثنی عشری (۱) نشان داد که میزان تولید بذر پیاز در اثر عمل گرده افشنی زنبور عسل در سه رقم 'سفید کاشان'، 'درچه اصفهان' و 'قرمز آذرشهر' تا ۲۲ برابر افزایش یافت که بیشترین مقدار بذر از رقم 'درچه' به دست همچنین بذرها حاصل از گرده افشنی گل‌ها به وسیله زنبور عسل دارای کیفیت بهتری بودند (۱). پژوهش‌های دیگری نشان داد که میزان تنش بذرها گرده افشنی شده توسط زنبور عسل بیشتر است (۱۵). نتایج آزمایش پراساد و همکاران^۵ (۱۸) نشان داد، وزن بذر در گل آذین و در گیاه و سرعت جوانه‌زنی بذرها حاصل از دگرگرده افشنی در قفس با زنبور عسل و خارج قفس (آزاد برای تمام گرده افشنان) بیشتر از خودگشته در قفس بدون حشره بود. با توجه به کمبودهایی که در زمینه تولید بذر مرغوب پیاز در کشور وجود دارد و اثر مهم گرده افشنی بر تولید بذر، این پژوهش با هدف بررسی اثر گرده افشنی بر کمیت و کیفیت بذر ۹ رقم پیاز داخلی انتخابی و یک رقم خارجی در منطقه اصفهان صورت گرفت.

مواد و روش‌ها

این مطالعه در مزرعه لورک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، واقع در ۴۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان، در سال ۱۳۸۰ انجام شد. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده^۶ در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار بود که در آن کرت‌های اصلی شامل ۱۰ رقم پیاز بود که عبارت بودند از ۹ رقم ایرانی 'سفید قم'، 'قم'، 'سفید کاشان'، 'کاشان'، 'قرمز آذرشهر'، 'آذرشهر'، 'درچه اصفهان'، 'درچه'، 'طارم زنجان'، 'طارم'، 'قرمز کازرون ۱'، 'کازرون ۱'، 'کوار فارس'، 'کوار'، 'سفید ابرکوه'، 'ابرکوه'، 'هوراند آذربایجان'، 'هوراند' و یک رقم خارجی به نام 'یلو سوئیت اسپانیش'^۷. Y.S.S. (برای اطلاعات بیشتر به منبع شماره

۵ مراجعه شود). کرت های فرعی شامل گرده افشاری در فضای آزاد مزرعه و با کمک کلونی های زنبور عسل و عدم گرده افشاری توسط حشرات با کشیدن توری پارچه ای روی قفس های تعییه شده روی بوته ها بود.

عملیات کاشت در تاریخ ۷۹/۱۲/۲۵ انجام شد. قبل از کشت، زمین مزرعه به عمق ۲۰ سانتی متر شخم گردید و دو بار عمود بر هم دیسک زده شد تا خاک به خوبی آماده و به طور کامل نرم گردد. سپس حدود ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفات آمونیم به زمین اضافه شد و زمین کرت بنده گردید. روز قبل از کاشت، سوخ های رقم های مذکور از سردخانه خارج و از هر رقم ۹۰ سوخ سالم با اندازه متوسط، (به قطر حدود ۶۰ میلی متر) انتخاب شد. این سوخ ها از کاشت بذر های آن ها در مزرعه لورک در سال ۱۳۷۹ به دست آمده بودند، که پس از برداشت و ناجور زدایی، در حرارت 15 ± 5 درجه سانتی گراد انبار شده بودند. داخل هر کرت آزمایشی که به طول ۴ و عرض ۳ متر بود سوخ های بذری یک رقم پیاز روی ۶ ردیف کشت گردید. فاصله ردیف ها از یکدیگر ۳۵ سانتی متر و فاصله پیازها داخل ردیف ۲۵ سانتی متر بود. سوخ ها طوری در خاک قرار داده شدند که سر آن ها هم سطح خاک قرار گیرد. سه ردیف برای گرده افشاری آزاد و سه ردیف به تیمار عدم گرده افشاری اختصاص یافت. ردیف وسط از هر کدام از این سه ردیف برای نمونه گیری ها در نظر گرفته شد. طی دوره رشد، آبیاری به شیوه معمول منطقه و حذف علف های هرز با دست انجام گردید. همچنین ۴ بار سم پاشی علیه تریپس با سوموم امولسیون مالاتیون^۱ ۵٪ یک در هزار در تاریخ های ۸۰/۱/۱۴ و ۸۰/۱/۳۰، هوتستاکوئیک^۲ ۵۰٪ یک و نیم در هزار در تاریخ ۸۰/۲/۱۵ تیومتون^۳ ۲۵٪ یک و نیم در هزار در تاریخ ۸۰/۳/۱ انجام شد.

برای مطالعه تاثیر عمل گرده افشاری، پیش از این که گلچه ها باز شوند روی نیمی از کرت های آزمایشی (سه ردیف) قفس های فلزی به ارتفاع ۱۲۵ سانتی متر تعییه و روی آنها توری پارچه ای ریز بافت کشیده شد به طوری که هیچ حشره گرده افشاری نتواند روی گل های پیاز فعالیت کند. در هنگام باز شدن چتر های گل (اول خرداد ماه) تعداد دو کلونی زنبور عسل به محل انتقال و در طرفین مزرعه قرار داده شد تا روی بوته هایی که خارج از قفس قرار داشتند عمل گرده افشاری بهتر صورت گیرد.

اندازه گیری ها

زمانی که در هر گل آذین دست کم یک کپسول ترک برداشت، زمان رسیدن بذر تلقی گردید. برای دقیق در کار، تک تک گل آذین های ردیف وسط هر کرت بازرسی شد و تعداد گل آذین هایی که کپسول ترک خورده داشتند از ۸۰/۴/۲۴ تا ۸۰/۵/۲۱ به تقریب هر سه روز یک بار شمارش شد و درصد گل آذین هایی که بذر آنها رسیده بود محاسبه شد. هر کرتی که ۵۰٪ از گل آذین های آن به مرحله رسیدگی بذر رسیدند، برداشت شد. برای برداشت به وسیله قیچی با غبانی گل آذین های ۱۰ بوته میانی از ردیف وسط، هما راه با ۴۰-۲۰ سانتی متر از ساقه گل دهنده بریده و درون کیسه به آزمایشگاه منتقل شد. در آزمایشگاه تعداد گل آذین ۱۰ بوته شمارش شد و سپس تمام گل آذین ها درون جعبه چیده شد تا خشک شوند. برای جدا کردن بذرها، کلیه کپسول ها از ساقه جدا شد و بعد بین دو لاستیک آجدار با مالیمت مالش داده شدند سپس به وسیله الک کردن و بعد بوجاری با دست و سپس دمنده هوا^۴ بذر خالص به دست آمد.

الف- تعیین عملکرد بذر

بذرهای ۱۰ بوته وسط در کرت های گردهافشانی شده و گردهافشانی نشده به وسیله ترازوی دیجیتال وزن شد سپس وزن بذر در بوته و در هر گل آذین (با توجه به تعداد گل آذین در ۱۰ بوته) محاسبه شد. برای آزمایش های مربوط به کیفیت بذر، بذرهای ۳ تکرار (بلوک) از هر رقم در کرت های گردهافشانی شده و همچنین گردهافشانی نشده، به طور جداگانه، به خوبی با هم مخلوط شدند. سپس برای هر رقم ۴ نمونه ۱۰۰ تایی از بذرهای گردهافشانی شده و همچنین گردهافشانی نشده شمارش شد و در قالب آزمایش کرت های خرد شده در چهار تکرار برای ویژگی های زیر مورد ارزیابی قرار گرفتند.

ب- وزن هزار دانه

چهار نمونه ۱۰۰ تایی شمارش شده بذرها برای هر تیمار با ترازوی دقیق وزن شد. سپس وزن هزار دانه تعیین شد.

ج- درصد تندش

برای هر رقم ۸ عدد پتری استریل شده به قطر ۱۲ سانتی متر (مجموع ۸۰ پتری) انتخاب شد. در کف هر پتری یک لایه کاغذ صافی قرار داده شد و یکصد عدد بذر از نمونه موجود به طور یکنواخت روی کاغذ صافی قرار گرفت و ۷ میلی لیتر آب مقطر حاوی قارچ کش تیرام^۱ به نسبت ۱/۵ در هزار روی آن ریخته شد. پتری ها در ژرمنیاتور با دمای ۱۵ درجه سانتی گراد در تاریکی قرار داده شد. از زمان شروع آزمایش تا وقتی که تندیدن به تقریب متوقف شد هر ۱۲ ساعت یک بار، تعداد بذرهای تندیده در هر پتری شمارش شد و در جدول یادداشت گردید. این اطلاعات برای محاسبه درصد و سرعت تندش به کار رفت.

تعداد بذر تندیده در هر پتری بعد از ۱۲ روز به عنوان درصد نهائی تندش در نظر گرفته شد، زیرا درصد تندیدن پیاز در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد بعد از ۱۲ روز یک حد ثابت می رسد. (۸).

د- سرعت تندش

میانگین تعداد ساعت لازم برای تندیدن به عنوان شاخصی برای سرعت تندیدن به وسیله فرمول زیر برای تمامی ظروف پتری ها جداگانه محاسبه گردید.

$$\text{Mean days} = \frac{n_1 t_1 + n_2 t_2 + \dots + n_x t_x}{N}$$

n = تعداد بذر تندیده در فواصل زمانی متوالی (۱۲ ساعت)

t = زمان بین شروع آزمایش و پایان دوره معین اندازه گیری

N = تعداد کل بذرهای جوانه زده

ه- وزن خشک جوانه ها (گیاهچه ها)

پس از پایان آزمایش درصد تندش (پایان روز دوازدهم)، به وسیله چاقوی تیز از بذر جدا شد و سپس درون پاکت های کوچک کاغذی ریخته شد. این پاکت ها در آون با دمای ۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت

قرار داده شدند تا گیاهچه ها خشک شوند. مواد خشک شده در هر پاکت بوسیله ترازوی آزمایشگاهی حساس وزن شد و سپس وزن خشک گیاهچه ها برای ۱۰۰ بذر محاسبه گردید.

تجزیه آماری داده ها

داده ها براساس طرح کرت های خرد شده مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند و میانگین ها با آزمون LSD در سطح احتمال ۵٪ مقایسه شدند. در تجزیه های آماری از نرم افزارهای SAS و MSTATC استفاده شد.

نتایج و بحث

الف-عملکرد بذر

بررسی حاضر نشان داد که گرده افشاری تاثیر قابل توجهی در افزایش مقدار بذر داشت. میزان بذر تولید شده در یک گل آذین (چتر) و در یک بوته در تیمار گرده افشاری شده نسبت به تیمار گرده افشاری نشده به طور معنی دار ($P \leq 0.01$) بیشتر بود (جدول ۱). میزان بذر تولید شده در یک گل آذین با حضور گرده افشار ها $\frac{2}{4}$ برابر بیشتر از گل آذین های گرده افشاری نشده (داخل قفس و بدون حضور گرده افشار ها) بود و بوته های خارج قفس نسبت به بوته های داخل قفس 3 برابر بذر تولید کردند (جدول ۱).

بین رقم های مختلف از نظر میزان بذر در گل آذین و در بوته اختلاف معنی داری ($P \leq 0.01$) وجود داشت (جدول ۱). رقم های 'قم'، 'درچه' و 'کوار' به ترتیب با میانگین های 0.0802 ، 0.0757 و 0.0730 گرم بذر در گل آذین در مقایسه با سایر رقم ها، مقدار بذر زیادتری تولید نمودند و رقم 'هوراند' با میانگین 0.0850 گرم بذر در یک گل آذین کمترین مقدار بذر را تولید کرد.

برهمکنش رقم و تیمار گرده افشاری در تولید بذر معنی دار بود (جدول ۱). به بیان دیگر تاثیر گرده افشاری در رقم های مختلف یکسان نبود. در مجموع گرده افشاری میزان بذر را در گل آذین $\frac{4}{2}$ برابر نمود، اما در رقم های مختلف متفاوت بود. برای نمونه گرده افشاری بیشترین تاثیر را روی رقم کوار داشت که وزن بذر در یک گل آذین آن در کرت های گرده افشاری شده نسبت به گرده افشاری نشده $\frac{1}{6}$ برابر بود. بعد از آن در رقم های 'آذرشهر' و 'یلوسوئیت اسپانیش' بیشترین تاثیر را داشت که مقدار تولید بذر $\frac{1}{4}$ برابر بود. کمترین تاثیر گرده افشاری از نظر تولید بذر در رقم 'هوراند' بود که بر اثر گرده افشاری مقدار بذر حدود $\frac{1}{1}$ برابر شد. علت این امر ژنتیکی و به احتمال ناسازگاری و غیره در این رقم می باشد زیرا مقدار بذر در اساس، در این رقم پایین است.

علت تولید بیشتر بذر در گل آذین های گرده افشاری شده این است که مادگی و پرچم هر گلچه پیاز در یک زمان نمی رسند و اگرچه گلچه های یک گل آذین ممکن است در زمان های مختلفی برسند ولی انتقال گرده از یک گلچه به گلچه دیگر در یک گل آذین نیز به علت سنگین بودن دانه گرده با باد و نیروی جاذبه انجام نمی شود و یا خیلی کم صورت می گیرد و میزان خودگشتنی در آن بسیار پایین است (۱۶)، بنابراین گل آذین های خارج قفس که توسط حشرات گرده افشاری شده اند بذر بیشتری تولید کرده اند. اویس و ساها ر^۹ گزارش کرده اند که با گرده افشاری، وزن بذر در گل آذین و میزان بذر در گیاه افزایش می یابد. گزارش های دیگری که در مورد تاثیر عمل

گردهافشانی حشرات بر مقدار بذر رقم های مختلف پیاز در کشورهای مختلف ارائه شده همه نشان می دهند که گردهافشانی تاثیر بسیار زیادی بر افزایش تولید بذر دارد. از جمله پژوهش های آکوپین (۷)، جادها و اجری (۱۱)، کومار و همکاران (۱۳)، رائو و سوریانارایانا (۱۹)، لرنزون و همکاران^۱ (۱۴)، زودنوك (۲۱)، مارتینووسکی و همکاران (۱۵)، وانگ و همکاران^۲ (۱۰) و پراساد و همکاران (۱۸) را می توان نام برد که نتایج آنها با یافته های این پژوهش در یک راستا می باشد. در ایران نیز طبق مطالعات اثنی عشری (۱) کرت های باز (خارج از توری) که توسط زنبور عسل و سایر حشرات گردهافشانی شده بودند، حدود ۱۹ برابر کرت های مجزا شده (داخل توری) که زنبور عسل و سایر حشرات در گردهافشانی آنها نقشی نداشت، بذر تولید کردند. میزان بذر تولید شده در گل آذین نیز در حضور زنبور عسل نسبت به گل آذین های مجزا شده حدود ۲۳ برابر افزایش داشت. علت افزایش کمتر بذر (۳ برابر) در پژوهش حاضر نسبت به نتایج پژوهش اثنی عشری (۱)، به احتمال گرمای شدید هوا در سال آزمایش و شرایط متفاوت کاشت و داشت می باشد.

مبای و همکاران (۴) گزارش کردند که میزان تولید بذر نژادگان ها در شرایط آزمایش متفاوت بود و رقم 'قم' بالاترین میزان بذر را در بوته تولید نمود در حالی که رقم های 'آذرشهر'، 'درچه' و 'یلوسوئیت' اسپانیش' بذر کمی تولید کردند. این نتایج با نتایج پژوهش حاضر کم و بیش (به جز رقم 'درچه') همسو است. اثنی عشری (۱) نیز گزارش کرد که در بین سه رقم مورد بررسی، رقم 'درچه' بیشترین میزان بذر را تولید کرد و رقم های 'آذرشهر' و 'کاشان' به ترتیب رتبه دوم و سوم را داشتند. در بررسی حاضر رقم 'کاشان' بذر بیشتری از 'آذرشهر' تولید نمود که با مطالعات اثنی عشری همسو نیست، ولی رقم 'درچه'، همان طور که اثنی عشری گزارش کرده است، تولید بذر زیادی داشت. این رقم یک رقم بومی منطقه می باشد و تولید بالای آن می تواند به علت سازگاربودن آن با شرایط آب و هوایی اصفهان باشد. رقم 'قم' از رقم 'درچه' بذر بیشتری تولید کرد، بنابراین با وجود غیر بومی بودن سازگاری خوبی با منطقه نشان می دهد به احتمال توانایی ژنتیکی بالایی نیز دارد و یا این که شهد آن برای گردهافشان ها جذابیت بیشتری دارد. تولید کم بذر در رقم 'هوراند' ممکن است بیانگر سازگاری ضعیف آن با منطقه، توانایی ضعیف ژنتیکی آن در تولید بذر و یا مربوط به جذابیت کم گل های آن برای زنبور عسل باشد. زیرا تعداد و مدت استقرار زنبور عسل روی گل آذین این رقم از سایر رقم های کمتر است (۲). همچنین اوладیران و ایفر^۳ (۱۷) نیز به این نتیجه رسیدند که نژادگان ها از نظر تولید بذر با هم تفاوت دارند.

همان طور که گفته شد، بر همکنش تیمارهای گردهافشانی و رقم در تولید بذر معنی دار بود (جدول ۱). به عبارتی تاثیر گردهافشانی روی رقم ها متفاوت بود. ممکن است اثر بیشتر گردهافشانی بر یک رقم به دلیل زودرس تر بودن آن رقم و فعالیت بیشتر حشرات گردهافشان به ویژه زنبور عسل روی آن رقم باشد، زیرا زنبوران عسل در ابتدای فصل فعال تر هستند (۲۰). در رقم های زودرس عواملی مثل کمیت و کیفیت شهد موجب جلب متفاوت حشرات گردهافشان می گردند و در نتیجه مقادیر متفاوتی بذر تولید می گردد.

جدول ۱- تاثیر گرده افشانی توسط حشرات بر عملکرد بذر در گل آذین و بوته رقم های پیاز.

Table 1. Effects of pollination by insects on seed yield per inflorescence and plant of onion cultivars.

عملکرد در بوته (گرم)			عملکرد در گل آذین (گرم)			رقم Cultivar
میانگین Mean	گرده افشانی شده Pollinated	گرده افشانی نشده Non-pollinated	میانگین Mean	گرده افشانی شده Pollinated	گرده افشانی نشده Non-pollinated	
4.91 A	6.35 a	3.47 c	0.802 A	1.00b	0.59 e [†]	'Ghom' قم'
2.46 B	3.69 c	1.22 e	0.595 BC	0.91 c	0.28 gh	'Kashan' کاشان'
1.94 BC	3.22 c	0.66 f	0.402 D	0.65 c	0.16 jk	'Azarshahr' آذرشهر'
4.51 A	6.64 a	2.39 d	0.675 AB	1.04 b	0.31 fg	'Dorcheh' درچه'
0.51 D	0.72 f	0.32 f	0.100 EF	0.13 kl	0.07 l	'Tarom' طارم'
2.14 BC	3.57 c	0.71 f	0.480 CD	0.75 d	0.21 ij	'Kazeroon 1' کازرون ۱'
2.62 B	4.70 b	0.54 f	0.673 AB	1.16 a	0.19 ijk	'Kavar' کوار'
2.42 B	3.59 c	1.27 e	0.500 CD	0.76 d	0.24 hi	'Abarkoooh' ابرکوه'
0.99 D	1.54 e	0.43 f	0.230E	0.37 f	0.09 l	'Yellow Sweet Spanish' یلوسوئیت اسپانیش'
0.28 D	0.33 f	0.24 f	0.085 E	0.09 l	0.08 l	'Horand' هوراند'
3.435 A		1.125 B	0.685 A		0.287 B	میانگین

† For each trait, in each column or row, means followed by the similar capital letters and in other cases means followed by the similar small letters are not significantly different at 5% of probability (LSD).

† برای هر صفت، در هر ستون یا ردیف میانگین هایی که دارای حداقل یک حرف بزرگ مشابه هستند و در سایر موارد میانگین هایی که حداقل دارای یک حرف کوچک مشابه هستند، بر مبنای آزمون LSD در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی دارند.

ب- وزن هزار دانه

گردهافشانی تاثیر معنی داری بر میانگین وزن هزار دانه نداشت (جدول ۲). البته انتظار می رفت بین بذرهای حاصل از گردهافشانی و عدم گردهافشانی به علت پوکی نسبی دانه های کرت های گردهافشانی نشده اختلاف وزن وجود داشته باشد، بنابراین باید وزن هزار دانه در آنها کمتر از بذرهای کرت های گردهافشانی شده باشد. نتیجه پژوهش های سایرین نیز همین طور است. لرنزون و همکاران (۱۴) گزارش کردند که در کرت های باز، وزن هزار دانه و دانه بندی به طور معنی داری بالاتر از کرت های داخل قفس بود. مارتینوسکی و همکاران (۱۵) نیز گزارش نمودند که میانگین وزن بذر در کرت های گردهافشانی شده نسبت به گردهافشانی نشده بیشتر بود. اثنی عشری (۱) متوسط وزن هزار دانه را در کرت های گردهافشانی شده $4/8$ و در کرت های گردهافشانی نشده $4/3$ گرم گزارش کرده است. در بررسی حاضر چون هنگام جداسازی بذر از کپسول ها، بذرها مالش داده شدند و جداسازی بذر از کاه و کلش با روش باده هی صورت گرفت، تمام بذرهای پوک به ویژه بذرهای پوک کرت های گردهافشانی نشده در اثر این عملیات جدا شدند، بنابراین انتظار می رود که اختلاف وزن هزار دانه در کرت های گردهافشانی شده و گردهافشانی نشده معنی دار نباشد.

در بررسی حاضر بین رقم های مختلف از نظر وزن هزار دانه اختلاف معنی داری ($P \leq 0.01$) وجود داشت (جدول ۲). بیشترین وزن هزار دانه را رقم هوراند (۴/۴۲ گرم) و کمترین آن را رقم قم (۳/۳۷ گرم) داشت. به احتمال این اختلاف در وزن هزار دانه رقم های مختلف مربوط به ویژگی های ژنتیکی رقم ها و واکنش رویشی آنها در شرایط کشت بوده است.

جدول ۲- اثر گردهافشانی به وسیله حشرات بر میانگین وزن هزار دانه (گرم) بذر رقم ها ای پیاز.

Table 2. Effects of pollination by insects on weight of 1000 seeds of onion cultivars.

میانگین Mean	گردهافشانی شده Pollinated	گردهافشانی نشده Non-pollinated	Cultivar	رقم 'قم'
3.37 F	3.2 k	3.52 ij [†]	'Ghom'	'کاشان'
3.98 BC	4.04 ef	3.92 g	'Kashan'	'آذرشه'
3.85 CD	3.53 ij	4.17 c	'Azarshahr'	'درچه'
3.76 D	3.75 h	3.77 h	'Dorcheh'	'طارم'
3.97 BC	3.78 h	4.15 cd	'Tarom'	'کازرون ۱'
3.99 B	3.99 fg	4.00 f	'Kazeroon 1'	'کوار'
3.93 BC	4.09 de	3.75 h	'Kavar'	'ابرکوه'
4.00 B	4.02 ef	3.98 fg	'Abarkoooh'	'یلوسوئیت اسپانیش'
3.53 E	3.57 i	3.48 j	'Y. S. S.'	'هوراند'
4.43 A	4.49 a	4.38 b	'Horand'	میانگین
	3.846 A	3.912 A	Mean	

[†] In each column or row, means followed by the similar capital letters and in other cases means followed by the similar small letters are not significantly different at 5% of probability (LSD).

در هر ستون یا ردیف میانگین هایی که دارای حروف بزرگ مشابه هستند و در سایر موارد میانگین هایی که دارای حروف کوچک مشابه هستند بر مبنای آزمون LSD در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی داری ندارند.

برهمکنش تیمارهای گرده افشارانی و رقم بر وزن هزار دانه معنی دار بود ($P \leq 0.01$) (جدول ۲). بدین معنی که اثر گرده افشارانی در رقم ها یکسان نیست. با وجود این که در کل اثر گرده افشارانی بر وزن هزار دانه معنی دار نبود اما در بعضی از رقم ها مثل 'کوار' و 'یلوسوئیت اسپانیش' گرده افشارانی تاثیر مثبت و معنی دار نشان داد. اما در سایرین این طور نبود. همچنین با وجود این که بین رقم های 'کوار' و 'ابرکوه' و بین رقم های 'طارم' و 'درچه' در کرت های گرده افشارانی نشده اختلاف معنی داری وجود داشت وقتی گرده افشارانی شدند این اختلاف از بین رفت. ممکن است علت این باشد که درجه دگرگشتنی در رقم ها متفاوت است و با حضور حشرات از جمله زنبور عسل این عمل بهتر انجام گرفته و در اثر گرده افشارانی در این رقم ها ('درچه' و 'کوار') بذر بیشتری تولید شده است.

ج- درصد تندش بذرها

درصد تندش در بذرهای حاصل از کرت های گرده افشارانی شده و گرده افشارانی نشده تقاضت معنی داری داشت ($P \leq 0.01$) و در بذرهای گیاهان گرده افشارانی شده حدود ۷ درصد بیشتر از گرده افشارانی نشده بود (جدول ۳). علت این مساله این است که بذرهایی که به کمک گرده افشارانی حشرات حاصل می شوند اغلب کامل تر از بذرهای دیگر هستند (۱۶). البته بذرهای سبک و پوک در ابتدا از توode بذر در اثر بوخاری حذف شده بودند در غیر این صورت تاثیر گرده افشارانی بیشتر مشهود بود. همچنین بین رقم های مختلف از نظر درصد جوانه زنی بذر اختلاف معنی دار وجود داشت ($P \leq 0.01$). درصد تندش در رقم های 'قم'، 'کاشان'، 'درچه'، 'کازرون ۱'، 'کوار'، 'ابرکوه'، 'یلوسوئیت اسپانیش' و هوراند تقاضت معنی داری نداشت، ولی به طور معنی داری بالاتر از رقم های آذر شهر و طارم بود (جدول ۳) که به احتمال به دلایل مختلفی از قبیل سرعت رشد در موقع تشکیل بذر، ذخیره بذرها، برهمکنش نزادگان و گرده افشارانی و سرانجام ژنتیکی می باشد.

جدول ۳- تاثیر گرده افشارانی به وسیله حشرات بر میانگین درصد تندش بذر رقم های پیاز.

Table 3. Effects of pollination by insects on mean seed germination percentage of onion cultivars.

میانگین Mean	گرده افشارانی شده Pollinated	گرده افشارانی نشده Non-pollinated	رقم Cultivar
90.750 A	93.5 ab	88.00 e [†]	'Ghom'
89.125 A	92.25 c	86.00 g	'Kashan'
79.625 B	85.75 g	73.50 k	'Azarshahr'
89.125 A	91.25 d	87.00 f	'Dorcheh'
82.875 B	82.75 i	83.00 i	'Tarom'
89.625 A	92.00 c	87.25 f	'Kazeroon 1'
87.875 A	94.75 a	81.00 j	'Kavar'
89.000 A	93.50 ab	84.50 h	'Abarkooh'
89.250 A	93.00 b	85.50 g	'Y. S. S.'
91.125 A	93.50 ab	88.75 d	'Horand'
91.225 A		84.450 B	میانگین

† In each column or row, means followed by the similar capital letters and in other cases means followed by the similar small letters are not significantly different at 5% of probability (LSD).

† در هر ستون یا ردیف میانگین هایی که دارای حروف بزرگ مشابه هستند و در سایر موارد میانگین هایی که دارای حروف کوچک مشابه هستند بر مبنای آزمون LSD در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی داری ندارند.

اویس و ساهار (۹) و مارتینووسکی و همکاران (۱۵) گزارش نمودند که در صورت گردهافشانی با حشرات، میزان تندیدن بذر افزایش می‌یابد. همچنین آکوپین (۷) گزارش کرد در اثر گردهافشانی تندیدن به میزان ۴۰٪/۳۸٪ افزایش می‌یابد. اثنا عشری (۱) گزارش کرد تاثیر عمل گردهافشانی زنبور عسل در بهبود کیفیت بذر پیاز معنی دار بود به طوری که ظرفیت تندیدن بذرها در کرت های باز به میزان زیادی بیشتر از کرت های جدا سازی شده بود. بنابراین تاییدی بر نتایج به دست آمده در این پژوهش می‌باشد، ولی لرنزون و همکاران (۱۶) ذکر کردند که ظرفیت تندیدن در کرت های داخل قفس و خارج از آن تفاوتی نداشت.

برهمکنش رقم و گردهافشانی بر درصد تندش بذرها معنی دار بود ($P \leq 0.01$), بدین مفهوم که تأثیر گردهافشانی بر درصد جوانه‌زنی بذرها تابع رقم بود. گردهافشانی بیشترین اثر را بر درصد تندش بذرهاي رقم 'کوار' داشت که درصد تندش در بذرهاي حاصل از کرت های گردهافشانی شده اين رقم ۱۲/۷۵ درصد بیشتر از گردهافشانی نشده بود، ولی تأثیری بر رقم 'طارم' نداشت (جدول ۳). درحالی که بين رقم های 'قم' و 'کوار'، 'قم' و 'ابرکوه' و 'هوراند' از لحاظ درصد تندش در کرت های گردهافشانی نشده اختلاف معنی داری وجود داشت، ولی در کرت های گردهافشانی شده این اختلاف معنی داری نبود (جدول ۳). ممکن است علت این مساله تأثیر متفاوت گردهافشانی بر رقم های مختلف باشد.

د- سرعت تندیدن بذرها

میانگین تعداد ساعات لازم برای تندیدن، برای بذرهاي حاصل از کرت های گردهافشانی شده و گردهافشانی نشده تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۱٪ داشت (جدول ۴). به طور میانگین گردهافشانی، میانگین تعداد ساعت های لازم برای تندیدن بذرهاي حاصل را ۱۰/۷ ساعت در مقایسه با بذرهاي حاصل از کرت های گردهافشانی نشده کاهش داد. به عبارت دیگر باعث افزایش سرعت تندش گردید. این مساله را می توان در ارتباط با تشکیل کامل بذر در اثر گردهافشانی دانست. اثنا عشری (۱) گزارش کرده است سرعت تندیدن بذرهاي حاصل از کرت های باز به میزان چشمگیری بیشتر از کرت های مجزا شده بود که با نتایج این پژوهش همسو است..

در این بررسی میانگین تعداد ساعت لازم برای تندش بذرهاي رقم 'یلوسوئیت اسپانیش' بیشترین ۹۷/۹ ساعت) و رقم 'کاشان' کمترین (۴/۶ ساعت) بود (جدول ۴). به بیان دیگر سرعت تندیدن بذرهاي رقم های مختلف در شرایط یکسان متفاوت می باشد، که بستگی به ویژگی های ژنتیکی آنها دارد.

برهمکنش رقم و گردهافشانی بر تعداد ساعت لازم برای تندیدن بذرها معنی دار بود، بدین معنی که تأثیر گردهافشانی روی رقم ها متفاوت بود. در حالی که گردهافشانی در مجموع حدود ۱۰/۷ ساعت زمان لازم برای تندش را کاهش داد، بیشترین اثر مثبت گردهافشانی مربوط به رقم های 'ابرکوه' و 'هوران' بود، که گردهافشانی باعث شد میانگین تعداد ساعت لازم برای تندش حدود ۲۲ ساعت کاهش یابد. کمترین اثر در رقم 'قم' ملاحظه شد که گردهافشانی تاثیر معنی داری بر ساعت های لازم برای تندش نداشت (جدول ۴). در حالی که بین رقم های 'قم' و 'ابرکوه' و رقم های 'کوار' و 'یلوسوئیت اسپانیش' در کرت های گردهافشانی نشده اختلاف معنی داری وجود داشت، ولی در کرت های گردهافشانی شده چنین اختلافی مشاهده نشد. به عبارت دیگر اثر گردهافشانی بر رقم ها متفاوت بود، ولی در کل باعث افزایش سرعت تندیدن بذرهاي پیاز شده است.

جدول ۴- تاثیر گرده افشارانی به وسیله حشرات بر میانگین تعداد ساعات لازم برای تندیدن بذر رقمهای پیاز.

Table 4. Effects of pollination by insects on mean seed germination hours in onion cultivars.

میانگین Mean	گرده افشارانی شده Pollinated	گرده افشارانی نشده Non-pollinated	Cultivar	رقم
57.1 E	56.0 j	58.2 j [†]	'Ghom'	'قم'
46.8 F	43.3 l	51.3 k	'Kashan'	'کاشان'
56.2 E	52.6 k	59.8 j	'Azarshahr'	'آذربایجان'
69.9 D	66.7 h	73.2 g	'Dorcheh'	'درچه'
78.9 C	75.3 g	82.6 f	'Tarom'	'طارم'
90.9 B	86.1 e	95.8 b	'Kazeroon 1'	'کازرون ۱'
91.4 B	90.1 d	92.8 c	'Kavar'	'کوار'
71.5 D	59.9 j	83.2 f	'Abarkooch'	'ابرکوه'
97.9 A	90.2 d	105.8 a	'Y. S. S.'	'یلوسوئیت اسپانیش'
72.6 D	61.3 i	83.9 f	'Horand'	'هوراند'
68.0 B		78.7 A	Mean	میانگین

[†] In each column or row, means followed by the similar capital letters and in other cases means followed by the similar small letters are not significantly different at 5% of probability (LSD).

[‡] در هر ستون یا ردیف میانگین هایی که دارای حداقل یک حرف بزرگ مشابه هستند و در سایر موارد میانگین هایی که حداقل دارای یک حرف کوچک مشابه هستند بر مبنای آزمون LSD در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی داری ندارند.

۵- وزن خشک جوانه ها (گیاهچه ها):

بین وزن خشک گیاهچه های به دست آمده از بذر های کرت های گرده افشارانی شده و گرده افشارانی نشده تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۱٪ وجود داشت (جدول ۵). گرده افشارانی باعث شد که میانگین وزن خشک جوانه ها (۶۲ درصد) بیشتر شود به طوری که این عدد از ۴۰/۰۵ گرم برای ۱۰۰ جوانه بذر حاصل از گیاهان گرده افشارانی نشده به ۰/۰۸۶ گرم برای بذر گیاهان کرت های گرده افشارانی شده رسید (جدول ۵).

بیشترین وزن خشک ۱۰۰ گیاهچه از رقم 'کوار' با میزان ۱۰۶/۰ گرم و کمترین آن از رقم 'ابرکوه' به مقدار ۰/۰۴۰ گرم بدست آمد. برهمکنش بین رقم و گرده افشارانی از نظر وزن خشک جوانه ها معنی دار نشد.

به طور کلی بررسی حاضر نشان داد که بین رقم های مختلف از نظر میزان بذر در گل آذین و در بوته، وزن هزار دانه، درصد تندیدن، سرعت تندیدن و وزن خشک جوانه ها اختلاف معنی داری وجود داشت که می تواند حاکی از تنوع ژنتیکی بین رقم ها و شرایط محیطی و غیره باشد. گرده افشارانی میزان بذر تولید شده در گل آذین (چتر) و بوته و قدرت بذر (درصد تندش، سرعت تندش و وزن خشک گیاهچه) را نسبت به عدم گرده افشارانی افزایش داد، اما تاثیر گرده افشارانی روی صفات مختلف اندازه گیری شده در رقم های مختلف به دلیل برهمکنش معنی دار متفاوت بود.

در پایان پیشنهاد می شود برای تولید بذر پیاز، مناطقی گزینش شوند که افزون بر داشتن شرایط اقلیمی مناسب، حشرات گرده افشاران نیز به تعداد کافی وجود داشته باشند و از کشت محصولات زراعی که نیاز به گرده افشارانی تو سطح حشرات دارند در نزدیکی مزارع پیاز بذری و در سطح وسیع و به طور همزمان، خودداری شود، زیرا سطح وسیع پوشیده از گل در یک زمان سبب می شود که حشرات گرده افشاران در اثر رقابت گل های گیاهان مختلف نتوانند همه گل ها را تلقیح نمایند. در ضمن توصیه می شود با قرار دادن کندوهای زنبور عسل در

مجاورت مزارع پیاز بذری تا حد ممکن نسبت به اشبعاً منطقه از حشرات گردهافشان اقدام گردد تا تضمین بیشتری برای تولید بذر پیاز با کمیت و کیفیت بهتر حاصل شود.

جدول ۵- تاثیر گردهافشانی به وسیله حشرات روی میانگین وزن خشک ۱۰۰ گیاهچه (گرم) در رقم های پیاز.

Table 5. Effects of pollination by insects on mean of 100 seedling dry weight (g) in onion cultivars.

میانگین Mean	گردهافشانی شده Pollinated	گردهافشانی نشده Non-pollinated	رقم Cultivar
0.09060 B	0.1099	0.0713 [†]	'Ghom'
0.06510 D	0.0814	0.0488	'Kashan'
0.08683 B	0.1069	0.0668	'Azarshahr'
0.08197 BC	0.0954	0.0685	'Dorcheh'
0.05529 D	0.0751	0.0355	'Tarom'
0.06767 CD	0.0758	0.0596	'Kazeroon 1'
0.10587 A	0.1360	0.0758	'Kavar'
0.03989E	0.0546	0.0252	'Abarkooch'
0.05292 DE	0.0649	0.0410	'Y. S. S.'
0.05567 D	0.0638	0.0475	'Horand'
0.08637 A		0.05399 B	میانگین
		Mean	

[†] In each column or row, means followed by similar letters are not significantly different at 5% level of probability (LSD).

در هر ستون یا ردیف میانگین هایی که دارای حداقل یک حرف مشابه هستند بر مبنای آزمون LSD در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی داری ندارند.

سپاسگزاری

بخشی از هزینه اجرای این پژوهه تحقیقاتی از طریق طرح ملی تحقیقات، شماره NRC1-1140 و با حمایت شورای پژوهش های علمی کشور و همچنین سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تامین و پرداخت گردیده است که بدین وسیله تشکر و قدردانی می شود. همین طور از کلیه کارکنان گروه های باگبانی و حشره شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان سپاسگزاری می گردد.

REFERENCES

منابع

۱. اثنی عشری، م. ۱۳۶۵. تاثیر عمل گرده افشاری زنبور عسل (*Apis mellifera*) و زمان کاشت روی میزان تولید و کیفیت بذر سه واریته پیاز (*Allium cepa*) در اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد باگبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان. ۱۶۲ ص.
۲. سید ابراهیمی، س. ۱۳۸۱. تأثیر گردهافشانی بر عملکرد و کیفیت بذر ۱۰ رقم انتخابی پیاز (*Allium cepa* L.) در اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان. ۸۸ ص.

۳. مبلی، م. و ب. پیراسته. ۱۳۷۷. تولید سبزی (ترجمه). انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. ۸۷۷ ص.
۴. مبلی، م.، ا. دهداری، ع. رضائی و ا. مرتضوی بیک. ۱۳۸۱. بررسی تولید بذر و تاثیر اندازه سوخت مادری بر خصوصیات زایشی در برخی از پیازهای بومی ایران. مجله علوم و فنون باگبانی ایران. ۱۲-۱: ۳-۱۲.
۵. مبلی، م.، ا. دهداری و ع. رضائی. ۱۳۸۰. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین ویژگی‌های فیزیولوژیکی و زراعی در برخی از پیازهای بومی ایران. مجله علوم و فنون باگبانی ایران. ۹-۱۰: ۱۰۹-۱۲۴.
۶. وزارت کشاورزی. ۱۳۷۹. کشاورزی ایران در نگاه آماری، آمار سال ۱۳۷۸. ۵ ص.

7. Akopyan, G.A. 1977. Pollination of onion seed plants. Biol. Zhur. Armenii 30:88-91.
8. Ellis, R.H., T.D. Hong and E.H. Roberts. 1985. Handbook of seed technology for gene banks. Vol. II.Compendium of specific germination information and test recommendations. International Board for Plant Genetic Resources Rome, Italy. 667 p.
9. Ewies, M.A. and K.F. Sahhar. 1977. Observations on the behaviour of honey bees on onion and their effects on seed yield. J. Apic. Res. 16:194-196.
10. Hwang, H.J., J.K. Suh, I.J. Ha and Y.W. Ryu. 1998. Effect of pollinating insects on seed yield in seed production of onion (*Allium cepa* L.). RDA J. Agr. Sci. Hort. 40:27-30.
11. Jadhav, L.D. and D.S. Ajri. 1981. Insect pollinators of onion (*Allium cepa* L.) in Ahmednagar district of Maharashtra, India. Indian Bee J. 43:109-115.
12. Jones, H.A. and L.K. Mann. 1963. Onion and their allies. Leonard Hill, London, England. 321 p.
13. Kumar, J., R.C. Mishra and J.K. Gupta. 1989. Effect of honey bee pollination on onion (*Allium cepa* L.) seed production. Ind. Bee J.51:3-5.
14. Lorenzone, M.C.A., M.R. Martinho, J.A.H. Freire and F.P. Reis. 1993. Effect of pollination by honey bees on onion hybrid seed production. Pesquisa Agropecuaria Brasileira 28:229-235 .
15. Martinovski, D., D. Jankulovski and R. Agic. 1997. Analysis of onion (*Allium cepa* L.) seed yield components depending on the pollination method. Selekcija I semenarstro, 4:165-169.
16. Naik L.B. and K. Srinivas. 1992. Seed production of vegetable crops-onion-A Review. Agr. Rev. 13:59-80.
17. Oladiran, J.A. and S.O. Ifere. 1996. Effect of onion (*Allium cepa* L.) bulb size and spacing on seed yield and quality at Minna, Nigeria. Onion Newslet. Trop. 7:36-38.
18. Prasad, R., H. Chand and R. Singh. 2000. Effect of honey bee, *Apis mellifera* pollination on the yield and germination of onion, *Allium cepa* seeds. Shashpa 7:53-55.
19. Rao,G. M. and M.C. Suryanarayana 1989. Effect of honey bee pollination on seed yield in onion (*Allium cepa* L.). Indian Bee J. 51:9-11.
20. Woyke, H.W. 1987. Some aspects of the role of the honey bee in onion seed production in Poland. Acta Hort. 11:91-101.
21. Zvedenok, A.P. 1996. The onion seed crop can be improved. Kartofel Iovoshchi 4:29-31.