

جمع آوری و ارزیابی ژرم پلاسم زیتون (*Olea europaea* L.) استان خوزستان^۱

COLLECTION AND EVALUATION OF OLIVE (*OLEA EUROPAEA* L.) GERMPLASM OF KUZESTAN PROVINCE

فریدون عجم گرد و علیرضا شفیعی زرگر^۲

چکیده

شناسایی و جمع آوری ژرم پلاسم هر محصول، اولین کار برای اجرای برنامه بهنژادی و معرفی ارقام سازگار در هر منطقه است. به منظور دست یابی به نژادگان (ژنوتیپ) سازگار با مناطق گرم مانند استان خوزستان، از منابع ژرم پلاسم بومی منطقه و با هدف ایجاد کلسیون ملی زیتون از ژرم پلاسم کشور در طارم زنجان، این پژوهش از سال ۱۳۸۱ به مدت چهار سال در چند استان از جمله خوزستان انجام شد. درختان مسن زیتون در باغ‌های قدیمی که بارای ویژگی‌های بارز به ویژه محصول دهی خوب بودند، شناسایی و در مراحل مختلف رشد، اطلاعات مربوط به مراحل گله‌ی تا رسیدن میوه شامل ویژگی‌های مورفو‌لوژی و رویشی، میوه و هسته بر اساس توصیف نامه‌ها و دستورالعمل IOOC (شورای بین‌المللی روغن زیتون)، یادداشت برداری شدند. در پایان سال چهارم، نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه خوش‌های شده و نژادگان‌های جمع آوری شده بر اساس ویژگی‌های مرتبط با مورفو‌لوژی، میوه، هسته و میزان روغن در ماده خشک و در نهایت بر اساس تمامی ویژگی‌های کمی، گروه بندی شدند. کلیه نژادگان‌ها در هفت گروه قرار گرفتند. نژادگان‌هایی که در گروه‌های جداگانه ای قرار گرفتند شامل 'No.6'، 'No.7'، 'No.8'، 'No.9'، 'عقیلی'، 'ماوی'، 'ویسی'، 'دزفول' و 'کیوپ' بودند. در نهایت، از بین نژادگان‌های گردآوری شده از سطح استان خوزستان، نژادگان 'دزفول'، 'ماوی' و 'کیوپ' به دلیل سازگاری با اقلیم منطقه، داشتن عملکرد قابل قبول و تحمل شرایط کم آبی برای استفاده در برنامه بهنژادی مناطق گرم جنوب کشور توصیه می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: تجزیه خوش‌های، خوزستان، زیتون، ژرم پلاسم.

مقدمه

یکی از اهداف بزرگ دولت در بخش کشاورزی، تامین و خودکفایی کشور از نظر روغن مصرفی است. زیتون یکی از گیاهان روغنی است که با ویژگی‌های بارزی همچون محدوده تحمل به نسبت زیاد در برابر شرایط نامساعد محیطی و کم توقع بودن و امکان کشت در محدوده وسیع، بالا بودن کیفیت روغن و اهمیت آن از نظر تغذیه، قیمت بالای روغن آن و امکان صادرات به سایر کشورها، بسیار مورد توجه است. اولین نهاده مورد نیاز در گسترش سطح زیر کشت باغ‌های زیتون، به ویژه در مناطقی مثل استان خوزستان با شرایط اقلیمی ویژه، اجرای برنامه بهنژادی و گزینش ارقام سازگار و پر محصول است. در برنامه‌های بهنژادی، اولین قدم، جمع آوری، شناسائی و ارزیابی ژرم پلاسم هر منطقه است. این ژرم پلاسم، به دلیل داشتن امتیاز سازگاری با اقلیم ویژه همان

۱- تاریخ دریافت: ۸۵/۱۰/۱۲

۲- پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی صفائی آباد، دزفول، جمهوری اسلامی ایران.

منطقه، اهمیت بسیار زیادی در گزینش ارقام دارد. در این راستا، پژوهش های گستردگی در نقاط مختلف زیتونکاری جهان انجام شده یا در دست انجام است. دل ریو و کابالرو^(۷) با ارزیابی ۱۲۱ رقم، آن ها را بر اساس ویژگی های کمی و کیفی گروه بندی کردند. بارتولینی و همکاران^(۸) با ارزیابی ژرم پلاسم زیتون تعداد زیادی از کشورها، آن ها را بر اساس برخی ویژگی های مهم، گروه بندی کردند. فرینی و فیورینو^(۹)، یکی از راههای نگهداری ژرم پلاسم و گسترش ژنتیکی زیتون را ایجاد بانک داده گردد داشتند که می توان از آن در برنامه های دورگه گیری، نگهداری ژرم پلاسم و تولید گیاهان نیمگان استفاده کرد. سیماتو و همکاران^(۱۰) تعداد ۶۲ نژادگان مختلف را از مناطق توسکانا جمع آوری و کشت نمودند. مهربی و همکاران^(۱۱) نژادگان های مختلف زیتون از مناطق زیتونکاری تونس را جمع آوری و مورد ارزیابی قرار دادند (۱۱). در سال ۱۹۹۷ انجمن بین المللی روغن زیتون (IOOC)^(۹) پیشنهاد نمود که کشورهای عضو این انجمن می بایستی اقدام به جمع آوری و احداث کلکسیون برای منابع ژنتیکی زیتون خود بکنند و در مجموع این کشورها، در دو کشور، کلکسیون اصلی در برگیرنده نژادگان های سایر کشورها احداث گردد. سرانو و همکاران^(۱۲) همگروه از ۱۰ رقم در منطقه ای از کشور پرتغال را پس از ۱۰ سال بررسی و یادداشت برداری، گزینش و بررسی کردند. کمون و همکاران^(۱۰) با جمع آوری و بررسی ۱۸ رقم محلی مناطق جنوب و مرکز تونس، آن ها را بر اساس ویژگی های مورفو لوژیکی و پومولوژیکی گروه بندی کردند. چسا و همکاران^(۵) تعداد ۲۰ نژادگان محلی مناطق شمال ایسلند را جمع آوری و بر اساس ویژگی های مورفو لوژیکی دسته بندی کرده و مورد ارزیابی قرار دادند. اقدامی گل افزایی (۱) با بررسی و ارزیابی ارقام محلی منطقه روبار، اقدام به شناسایی و جداسازی آن ها بر اساس ویژگی های قید شده در توصیف نامه کرد. گل محمدی (۲) نژادگان های برتر ژرم پلاسم گردآوری شده در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم را شناسایی و معرفی کرد.

در این پژوهش، مناطق مختلف استان خوزستان مورد بازدید قرار گرفته و نژادگان های زیتون با ویژگی های بارز از نظر عملکرد و سازگاری با اقلیم استان، شناسایی شده و بر اساس توصیف نامه ارائه شده توسط شورای بین المللی روغن زیتون مورد ارزیابی قرار گرفتند تا در برنامه بهنژادی مورد استفاده قرار گیرند.

مواد و روش ها

برای اجرای این پژوهش، در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ با تهیه یک پرسشنامه و ارسال آن به ۴۸ مرکز خدمات کشاورزی در شهرستان های مختلف استان خوزستان، اطلاعات مربوط به تک درختان مسن زیتون موجود در عرصه های طبیعی آن مناطق که دارای ویژگی های بارز به ویژه وضعیت محصول دهی خوب و همچنین سازگاری با شرایط اقلیمی گرم بودند، گردآوری و در مرحله بعد با مراجعه به این مناطق، درختان مورد نظر نشانه گذاری شده و موقعیت مکانی آن ها ثبت گردید. در تمامی مراحل اجرای پژوهش از سال اول، تک درختانی مورد توجه بودند که دستکم از نظر ویژگی های ظاهری شاخصاره، برگ و میوه متفاوت از سایر نمونه های جمع آوری شده باشند. برای مثال نمونه هایی که از منطقه قلعه قاضی دزفول توسط بغدادیان معرفی شدند، بیشتر از نژادگان محلی دزفول بودند. بنابراین از این نمونه ها، تنها یک نمونه با عنوان نژادگان دزفول در تجزیه خوشای شرکت داده شد. در سایر مناطق استان نیز از نمونه های مشابه معرفی شده توسط بغدادیان تنها

نمونه‌های با ویژگی های بارز و متفاوت از سایر نمونه‌ها به عنوان یک نژادگان در تجزیه خوش‌های شرکت داده شدند. برای نژادگان های جمع‌آوری شده تا پایان اجرای پژوهش، مراحل مختلف رشدی از گل‌دهی تا مرحله رسیدن میوه، ویژگی های مهم آن ها یادداشت برداری شد. این ویژگی ها شامل ۳۵ ویژگی بر اساس توصیف نامه زیتون و روش کار ارائه شده در شورای بین المللی روغن زیتون مورد بررسی قرار گرفتند. در یادداشت برداری ویژگی های مربوط به برگ، از ۸ تا ۱۰ شاخه، یکساله، ۴۰ عدد برگ بالغ گزینش و ویژگی های آن ها ثبت شدند. طول میانگرهای با استفاده از ۱۰ شاخه بالغ یادداشت برداری شد. برای ثبت ویژگی گل و گل آذین نژادگان های جمع‌آوری شده، ۴ گل آذین در مرحله قبل از باز شدن از ۸ تا ۱۰ شاخه بالغ انتخاب و یادداشت برداری شدند. ثبت ویژگی میوه، با استفاده از ۳۰ تا ۴۰ میوه از قسمت‌های میانی شاخه‌های بارده انجام شد. در این مورد سعی شد تا میوه های بسیار ریز یا بسیار درشت منظور نشووند. به منظور تعیین قدرت ریشه‌زایی نژادگان های شناسایی شده و همچنین تولید ۶۰ نهال از هر نژادگان، جهت کشت در مجموعه کلکسیون ایستگاه های تحقیقات زیتون طازم زنجان، کازرون، سرپل زهاب و گرگان، مطابق روش پیشنهادی عجم‌گرد و همکاران (۳)، در اوایل پائیز از درختان شناسایی شده، ۳۰۰ قلمه تهیه شد. قلمه‌ها پس از تیمار هورمونی در بستر مخلوط ماسه و پرلاتیت در گلخانه مه افشار دار در قالب طرح های به طور کامل تصادفی با سه تکرار کاشته شدند. قلمه‌ها پس از ۱۲۰ روز از شناسی خارج شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نهال‌های تولیدی در سال‌های ۱۲۸۲ و ۱۲۸۳ به ایستگاه‌های مختلف فرستاده شدند. صفات مربوط به هسته با استفاده از میوه‌های گزیده شده، یادداشت برداری شد. زمان رسیدن بر اساس رنگ گوشت میوه در مرحله‌ای که شاخص رسیدگی به حد ۴/۵ رسیده بود، منظور شد. شاخص رسیدگی بر اساس روش کار ارائه شده در شورای بین المللی روغن زیتون بدین ترتیب بود:

$$\frac{1}{100} \times (n_0 + n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6 + n_7) = \text{شاخص رسیدگی}$$

در رابطه بالا n_0 =تعداد میوه‌های سبز، n_1 =تعداد میوه‌هایی که کلروفیل خود را از دست داده اند، n_2 =تعداد میوه‌هایی که در آن ها تغییر رنگ شروع شده است، n_3 =تعداد میوه‌ای که پوست آن ها به تقریب به طور کامل تغییر رنگ یافته، n_4 =تعداد میوه‌ای که رنگ پوست در آن ها تکمیل شده و رنگ گوشت نیز به تقریب تغییر یافته، n_5 =تعداد میوه‌ای که گوشت آن ها به طور سطحی تغییر رنگ یافته، n_6 =تعداد میوه‌ای که گوشت آن ها به طور عمیق تغییر رنگ یافته و n_7 =تعداد میوه‌هایی که گوشت در آن ها به طور کامل سیاه شده است، می باشد.

برای تعیین درصد روغن در ماده خشک گوشت، ابتدا میوه‌های هر نژادگان در مرحله‌ای که شاخص رسیدگی در حدود ۴/۵ بود، توزین شدند. گوشت میوه‌ها از هسته جدا و توزین شد تا نسبت گوشت به هسته محاسبه شود. گوشت میوه‌ها به مدت ۲۴ تا ۳۶ ساعت در دستگاه آون با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد به طور کامل خشک شدند. برای روش استاندارد (۷)، از ماده خشک به دست آمده، دو گرم توزین و در پاکت ویژه ای از جنس کاغذ صافی ریخته شد. پاکتها در دستگاه سوکسله قرار گرفته و با استفاده از حلال اتر نفت، روغن موجود در نمونه‌ها استخراج شد. در پایان وزن روغن تعیین و درصد روغن در ماده خشک گوشت میوه محاسبه شد.

اطلاعات مربوط به ویژگی های مورد بررسی به روش تجزیه خوشه ای با استفاده نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای شناسایی هر ژرم پلاسم، تمامی ۳۴ ویژگی مورد بررسی قرار گرفتند اما بزای گروه بندی نمونه های جمع آوری شده، تنها ۱۷ ویژگی کمی در تجزیه خوشه ای و ترسیم دندروگرام ها^۱ شرکت داده شد.

نتایج

در جدول ۱ اطلاعات و کد شناسایی مربوط به نمونه های جمع آوری شده از سطح آستان خوزستان آورده شده است. در جدول های ۲، ۴، ۵ و ۶ ویژگی های مرتبط با قدرت رشد رویشی، مورفوЛОژی برگ و گل، فیژگی های میوه، یزگی های هسته، میزان روغن و فنولوژی نزادگان های جمع آوری شده نشان داده شده است.

جدول ۱- اطلاعات نزادگان های جمع آوری شده زیتون استان خوزستان.

Table 1. Information on collected olive genotypes of Khuzestan province.

کد نزادگان	نام نزادگان	محل جمع آوری	موقعیت درخت	سن درخت (سال)
Genotype code	Genotype name	Collection place	Tree location	Tree age (years)
Kh 10	'No.7'	مرکز تحقیقات اهواز	مرکز تحقیقات اهواز	34
Kh 11	'No.6'	مرکز تحقیقات اهواز	A.R.C. of Ahvaz	34
Kh 12	'No.8'	مرکز تحقیقات اهواز	A.R.C. of Ahvaz	34
Kh 13	'No.9'	مرکز تحقیقات اهواز	A.R.C. of Ahvaz	34
Kh 14	'عقیلی'	بخش عقلی گتوند	A.R.C. of Ahvaz	41
Kh 15	'Aghili'	Aghili-Goutevand-V	Personal orchard	>150
Kh 15	'ماوی'	روستای ماوی باغمک	کوه صیدون به صورت خود رو	>150
Kh 15	'Mavi'	Baghmaleck-Mavi-V	Seydoon mountain- wild	>150
Kh 16	'ویسی'	بخش ویسی شوشتر	باغ شخصی به صورت تک کاشت	>70
Kh 17	'Veysi'	Veysi-Shoshtar-V	Personal orchid	40
Kh 17	'Deszfoul'	مرکز تحقیقات صفائی آباد	کلکسیون زیتون مرکز صفائی آباد	40
Kh 18	'Kiup'	Safi Abad A.R.C.	Safi Abad A.R.C.	>500
Kh 18	'Kiup'	روستای کیوب باغمک	کوه صیدون به صورت خود رو	>500
Kh 18	'Kiup'	Baghmaleck-Kiup-V	Seydoon mountain - wild	>500

جدول ۲- ویژگی های مرتبط با قدرت و عادت رشد رویشی نژادگان های جمع‌آوری شده زیتون.

Table 2. Vegetative growth and habit characters of collected olive genotypes.

کد نژادگان Genotype code	رشد رویشی Vegetative growth	فرم درخت Tree form	تراکم شاخصاره Canopy density	طول میانگرہ Internode length	ریشه زایی (%) Rooting (%)
Kh 10	قوی	رشد عمودی	متواسط	13.5	50
Kh 11	متواسط	گسترده	متواسط	13	56
Kh 12	متواسط	Bushy	متواسط	14.6	49
Kh 13	متواسط	ایستاده	متواسط	17.5	52
Kh 14	قوی	Upright	متواسط	22.1	48
Kh 15	متواسط	گسترده	متواسط	23.1	67
Kh 16	قوی	Bushy	Condensed	14.1	43
Kh 17	قوی	Bushy	Condensed	23.1	45
Kh 18	قوی	Bushy	Condensed	16.8	54
	Vigor	Bushy	Condensed		

جدول ۳- ویژگی های مرتبط با برگ و گل نژادگان های جمع‌آوری شده زیتون.

Table 3. Leaf and flower characters of collected olive genotypes.

کد نژادگان Genotype code	طول برگ (میلی متر)	عرض برگ (میلی متر)	نسبت طول به عرض برگ	طول محور گل آذین (میلی متر)	تعداد گل در گل آذین	Nomber of flowers in Inflorescence
Kh 10	55.3	12.5	4.38	36.5	21.2	
Kh 11	59.0	13.3	4.54	39.9	20.5	
Kh 12	50.0	13.0	3.95	39.6	19.8	
Kh 13	60.0	14.5	4.20	26.2	11.6	
Kh 14	58.3	11.8	4.94	34.9	20.0	
Kh 15	71.8	17.4	4.13	37.3	23.0	
Kh 16	86.1	11.9	7.23	42.2	22.0	
Kh 17	67.4	12.5	5.22	34.4	18.1	
Kh 18	64.3	12.5	5.12	30.2	16.0	

جدول ۴- ویژگی های مرتبط با میوه نژادگان های جمع آوری شده زیرتون.

Table 4. Fruit characters of collected olive genotypes.

کد نژادگان	طول (میلی متر)	قطر (میلی متر)	وزن (گرم)	نسبت طول به قطر	نسبت گوشسته به هسته	شکل	اندازه عدسک	تعداد عدسک	فریبینگی میوه	پستانک میوه	Nipple
Kh 10	25.0	19.0	5.2	1.32	4.89	کرد	کم	کم	+	متوسط	Medium
Kh 11	29.0	22.0	4.96	2.7	4.96	کرد	کم	کم	+	متوسط	Medium
Kh 12	26.0	23.0	5.0	1.13	5.22	کرد	کم	کم	+	بزرگ	Large
Kh 13	27.0	22.0	4.8	1.23	6.11	کرد	کم	کم	+	متوسط	Medium
Kh 14	24.3	12.7	2.9	1.91	4.05	کرد	کم	کم	-	متوسط	Medium
Kh 15	30.1	13.9	6.8	2.18	5.13	کرد	کم	کم	+	متوسط	Medium
Kh 16	27.0	12.0	2.08	4.2	5.15	نوکی	کم	کم	-	بزرگ	Medium
Kh 17	27.1	19.2	4.1	1.41	6.63	کرد	کم	کم	-	بزرگ	Large
Kh 18	35.6	20.71	9.2	1.72	6.42	نوکی	کم	کم	+	بزرگ	Large
						Beak	Very low	Large			

جدول ۵- ویژگی های مرتبه هسته زیادگان های جمع آوری شده زیتون:

Table 5. Seed characters of collected olive genotypes.

فرینگی	عرضی	عرضی Cross section	فرینگی طولی Longitudinal symmetry	پراکندگی شیار Crack distribution	تعداد شیار Truck number	سطح Surface	نیزک Beak	وزن Weight	نسبت طول به قطر Length/diameter ratio	قطر (میلی متر) Diameter (mm)	طول (میلی متر) Length (mm)	کد زیادگان Genotype code
+	+	+	Actinomorph	منظم دیخت	12-14	Rough	Sharp	0.88	3.20	6.0	19	Kh 10
+	+	+	Actinomorph	منظم دیخت	8-10	Rough	Sharp	0.45	2.40	9.2	22.5	Kh 11
+	+	+	Actinomorph	منظم دیخت	13	Rough	Sharp	0.80	2.90	7.0	20.2	Kh 12
۲۴	+	+	Actinomorph	منظم دیخت	12	Rough	Sharp	0.68	2.05	9.3	19.1	Kh 13
-	-	-	Actinomorph	منظم دیخت	12	Rough	Sharp	0.57	2.96	7.6	22.5	Kh 14
-	-	+	Actinomorph	منظم دیخت	12	Rough	Sharp	1.10	3.07	7.9	24.3	Kh 15
-	-	-	Zygomorph	نامنظم دیخت	13	Rough	Sharp	0.39	3.60	-6.0	22.0	Kh 16
-	-	-	Actinomorph	منظم دیخت	10-14	Rough	Sharp	0.53	2.10	9.0	19.0	Kh 17
+	-	-	Zygomorph	نامنظم دیخت	8	Rough	Sharp	1.32	2.91	9.9	28.7	Kh 18

جدول ۶- ویژگی های مرتبط با رسیدگی میوه نژادگان های جمع آوری شده زیرتون.

Table 6. Fruit ripening characters of collected olive genotypes.

کد نژادگان	زمان رسیدگی	زمان شروع تغییر رنگ	زمان رسیدگی در حد روغن در ماده خشک	زمان رسیدگی کامل	رنگ میوه رسیدگی	Fruit color	Ripening date	Time of color change	Genotype code
Kh 10				6 Sep.			20 Nov.		
	سپاه				سپاه				
	Black				Black				
Kh 11				20 Nov.			10 Nov.		
	سپاه				سپاه				
	Black				Black				
Kh 12				8 Sep.			12 Nov.		
	سپاه				سپاه				
	Black				Black				
Kh 13				23 Sep.			25 Oct.		
	سپاه				سپاه				
	Black				Black				
Kh 14				28 Agu.			20 Nov.		
	سپاه				سپاه				
	Black				Black				
Kh 15				28 Agu.			27 Nov.		
	سپاه				سپاه				
	Black				Black				
Kh 16				25 Sep.			27 Nov.		
	سپاه				سپاه				
	Black				Black				
Kh 17				30 Agu.			22 Nov.		
	سپاه				سپاه				
	Black				Black				
Kh 18				28 Agu.			22 Nov.		
	سپاه				سپاه				
	Black			27 Agu.			20 Nov.		
	Black				Black				

ویژگی‌های مورفولوژیکی برگ، میانگره و گل آذین و دندروگرام به دست آمده از تجزیه خوش‌های ویژگی‌های مرتبط با مورفولوژی نژادگان های جمع‌آوری شده زیتون شامل ویژگی‌های برگ، میانگره، گل و گل آذین در شکل ۱ نشان داده شده است. برش دندروگرام یاد شده از فاصله ۵ اقلیدسی درختان گزینش شده را به چهار گروه جداسازی نمود.

گروه ۱: Kh14، Kh12، Kh11، Kh10 و Kh17 و Kh15
گروه ۲: Kh18، Kh13 و Kh16
گروه ۳: Kh1 و Kh4
گروه ۴: No.9

نژادگان 'ویسی' با داشتن برگ بزرگ و گل آذین کشیده و نژادگان 'کیوب' و 'No.9' با داشتن گل آذین کوتاه از نظر مورفولوژی در گروه های متفاوتی قرار گرفته اند.




Fig. 1. Dendrogram of leaf and flower characters of collected olive genotypes.

شکل ۱- دندروگرام ویژگی‌های مرتبط با برگ و گل نژادگان های جمع‌آوری شده زیتون.

ویژگی‌های میوه

دندروگرام به دست آمده از تجزیه خوش‌های ویژگی‌های مرتبط با میوه نژادگان های جمع‌آوری شده زیتون در شکل ۲ نشان داده شده است. برش دندروگرام یاد شده از فاصله ۵ اقلیدسی درختان گزینش شده را به چهار گروه جداسازی نمود.

گروه ۱: Kh11، Kh12، Kh13، Kh10 و Kh17
گروه ۲: Kh14، Kh15، Kh16 و Kh18
گروه ۳: No.6
گروه ۴: 3، 4، 1، 8، 5، 7، 6، 9، 2

نژادگان 'No.6' به دلیل داشتن میوه‌های ریز و نژادگان 'کیوب' به دلیل داشتن میوه‌های درشت در گروهی جدا جای گرفته اند.




Fig. 2. Dendrogram of fruit characters of collected olive genotypes.

شکل ۲- دندروگرام ویژگی‌های مرتبط با میوه نژادگان های جمع‌آوری شده زیتون.

ویژگی های هسته

دندروگرام به دست آمده از تجزیه خوشهای ویژگی های مرتبط با هسته نژادگان های جمع آوری شده زیتون در شکل ۲ آمده است. برش دندروگرام یاد شده از فاصله ۵ اقلیدسی درختان گزینش شده را به چهار گروه جداسازی نمود:

گروه ۳: Kh14، Kh15، Kh11 و Kh14	گروه ۱: Kh13 و Kh17
گروه ۴: Kh18	گروه ۲: Kh10، Kh12، Kh16 و Kh10

نژادگان 'کیوپ' به دلیل داشتن هسته های درشت دز گروهی جدا جای گرفته است.




Fig. 3. Seed characters dendrogram of collected olive genotypes.

شکل ۳- دندروگرام ویژگی های مرتبط با هسته نژادگان های جمع آوری شده زیتون.

روغن در ماده خشک

دندروگرام به دست آمده از تجزیه خوشهای ویژگی های مرتبط با روغن در ماده خشک نژادگان های جمع آوری شده زیتون در شکل ۴ نشان داده شده است. برش دندروگرام یاد شده از فاصله ۵ اقلیدسی درختان گزینش شده را به سه گروه جدا سازی نمود:

گروه ۱: Kh10، Kh11، Kh12، Kh13 و

گروه ۲: Kh15

گروه ۳: Kh14، Kh16، Kh17 و Kh18

نژادگان 'ماوی' به دلیل پایین بودن درصد روغن در ماده خشک در گروهی جدا قرار گرفته است. در بین نژادگان های جمع آوری شده، نژادگان های 'ذفول'، 'ویسی' و 'عقیلی' میزان روغن در ماده خشک قابل توجهی داشته و در یک گروه قرار گرفتند. همچنین به جز نژادگان 'No.9' که در مهر ماه به طور کامل رسید، سایر نژادگان ها از اوایل آبان تا اوایل آذر ماه رسیده و آماده برداشت برای روغن کشی می باشند.




Fig. 4. Dendrogram of oil dry matter of collected olive genotypes.

شکل ۴- دندروگرام ویژگی مرتبط با میزان روغن در ماده خشک نژادگان های جمع‌آوری شده زیتون.

تمامی ویژگی های کمی

دندروگرام به دست آمده از تجزیه خوش‌آمی ویژگی های نژادگان های جمع‌آوری شده زیتون در شکل ۵ آمده است. برش دندروگرام یاد شده از فاصله ۵ اقلیدسی درختان گزینش شده را به هفت گروه جداسازی نمود:

گروه ۱: Kh11 و Kh12	گروه ۲: Kh13
گروه ۳: Kh15	گروه ۴: Kh16
گروه ۵: Kh17 و Kh18	گروه ۶: Kh14 و Kh17
گروه ۷: Kh19 و Kh20	




Fig. 4. dendrogram of quantitative characters of collected olive genotypes.

شکل ۵- دندروگرام تمامی ویژگی های کمی نژادگان های جمع‌آوری شده زیتون.

در جدول ۷ ضریب همبستگی ویژگی های کمی مورد بررسی در نژادگان های جمع‌آوری شده زیتون آمده است.

Table 7. Correlation coefficient of quantitative characters of collected olive genotypes.

ردیگی ها Characters	طول میان Internode length	طول برگ Leave length	عرض برگ Leave width	طول به عرض Leaf length/ width	طول محور کل اذین axis length	تعداد گل در کل اذین Number of flowers in inflorescence.	طول میوه Fruit length	قطر میوه Fruit diameter	طول به قطر length/en/ diameter
Internode	1								
Leaf length	0.168		1						
Leaf width	0.353	0.092		1					
Leaf Length/ width	-0.112	0.812*	-0.499		1				
Inflorescence length	-0.38	0.294	-0.219	0.410		1			
Flowers in Inflorescence	-0.61	0.293	0.005	0.255	0.870*				
Fruit length	0.497	0.295	0.247	0.089	-0.270	-0.071			
Fruit diameter	-0.405	-0.688	0.019	-0.607	-0.285	-0.722	-0.386		
Fruit length/diameter	0.445	0.741*	0.247	0.505	0.312	0.459	0.355	-0.951**	
Fruit weight	0.192	0.128	0.715*	-0.314	-0.093	0.126	0.694	-0.053	0.186
Flesh/seed	0.191	0.160	0.164	-0.003	-0.430	-0.560	0.260	0.422	-0.379
Seed length	0.226	0.383	0.422	0.123	0.469	0.608	-0.152	-0.591	0.757*
Seed width	0.372	-0.187	-0.331	-0.377	-0.553	-0.588	-0.338	0.441	-0.302
Seed length/width	-0.252	0.373	-0.132	0.440	0.672	0.752**	0.255	-0.651	0.595
Seed width	0.252	-0.276	0.719*	-0.668	-0.151	0.178	0.476	0.038	0.077
Seed crack number	0.078	0.138	-0.148	0.200	-0.031	0.046	0.856**	-0.292	0.157
Oil in dry matter	0.141	0.345	0.766*	0.712*	0.100	-0.057	-0.063	-0.262	0.077

Continued table 7:

ادامه جدول ۷:

ویژگی ها Characters	وزن میوه Fruit weight	کوشت به Seed length	قطر هسته Seed diameter	طول هسته Seed length	وزن هسته Seed weight	تعداد شیار دوی Seed crack number.	دوقن در ماده خشک (درصد) Oil in dry mater (%)
Fruit weight	1						
Flesh/seed	0.232	1					
Seed length	0.026	-0.575	1				
Seed width	-0.253	0.488	-0.034	1			
Seed length/width	0.240	-0.643	0.422	-0.917**	1		
Seed weight	0.858**	-0.079	0.118	-0.164	0.165	1	
Crack number	0.524	0.053	-0.340	-0.694	0.496	0.327	1
Oil in dry matter (%)	-0.661	0.194	-0.246	0.014	-0.09	-0.820*	0.031
[†] Pearson correlation							

*, ** Correlations are significant 5 and 1% levels.

* همبستگی های به ترتیب در سطح اختصاری ۵ و ۱٪ معنی دار است.

بحث

نتایج این پژوهش نشان داد که درختان زیتونی در استان خوزستان به ویژه در مناطق کوهستانی شمال و شمال شرق مانند منطقه صیدون با غملک و دامنه رشت، کوههای زاگرس در مرز بین استان خوزستان و استان کهکلیویه و بویراحمد وجود دارند که از زمان‌های بسیار قدیم، شرایط اقلیمی گرم را تحمل کرده و با منطقه سازگاری دارند. در بین نژادگان‌های شناسایی شده، درختانی وجود دارند که چند صد سال سن داشته‌اند. وجود این چنین درختان تنومند و قدیمی در مکان‌های آبیاری آن‌ها وجود نداشته، نشان از تحمل زیاد آن‌ها نسبت به گرما و کم آبی دارد. بنابراین می‌توان از آن‌ها در برنامه بهنژادی و معرفی ارقام سازگار با مناطق گرم جنوب کشور، استفاده کرد. به عنوان مثال، نژادگان 'دزفول' با وجود تحمل آب و هوای گرم منطقه و بادهای گرم و سوزان تابستان که گاهی تا ۵۰ درجه سانتی گراد می‌رسد، دارای عملکرد مناسب بوده و میزان روغن در ماده خشک آن بیش از ۵۰٪ می‌باشد. منطقه شناسایی نژادگان 'کیوب' و 'ساوی' و همچنین بررسی نتایج ریشه‌زایی و قدرت گسترش ریشه در نهال‌های این نژادگان، نشان دهنده تحمل آبیاری کم و سازگاری با شرایط کشت دیم در آن‌ها می‌باشد و می‌توان در برنامه بهنژادی گزینش ارقام دیم کشور از پتانسیل این نژادگان‌ها استفاده کرد.

منابع

- ۱- اقدامی گل افزائی، م.ت. ۱۳۷۸. شناسائی ارقام محلی روdbار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
- ۲- گل محمدی، م. ۱۳۸۱. مطالعه صفات مهم مرغولوژیکی و فیزیولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های جمع‌آوری شده زیتون. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
3. Ajamgard, F., A. Zeinanloo and A.R., Shafiezargar. 2004. Effect of collecting time and different methods on rooting cuttings of olive (*Olea europaea*) cv. 'Dezful'. International Symposium on Olive Growing. 233 p.
4. Bartolini, G., G. Pervost and C. Messeri. 1994. Olive tree germplasm: Some descriptor lists of cultivars in world. Acta Hort. 116-118.
5. Chssa, L., C. Sirca and C. Nieddu. 2002. Evaluation data from an olive germplasm collection. Acta Hort. 586:155-158.
6. Cimato, A., A. Baladini, S., Casselli, M. Maranchi and L. Marzi. 1996. Observations on Tuscana olive germplasms. Analytical and sensory characteristics of single variety olive oil. Olivae 62:45-51.
7. Del Rio, C. and J.M. Caballero. 1994. Preliminary agronomical characterization of 131 cultivars introduced to the olive germplasm band in 1987. Acta Hort. 110-115.
8. Ferrini, F. and P. Fioriono. 1996. Proposal for the setting up and use of a pollen bank in olive cultivar. Olivae 68:6-7.
9. IOOC. 1996. World Olive Encyclopaedia. 197-220.
10. Kmoun, N.C., N. Ouazzani and A. Trigui. 2002. Characterizing isozymes of some Tunisian olive (*Olea europaea*) cultivars. Acta Hort. 586:137-140.
11. Mehri, H., M. Salem, M. Kamoun and R. Mehri. 1998. Identification of the principal varieties of olive tree growing Tunisia plant genetic resources. Newsletter. 112:68-72.
12. Serrano, J.M., F. Liato, M. Pots and L. Amaral. 1997. Olive (*Olea europaea*) cultivars in south Portugal. Olivae 66:51-53.