

ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره‌های آبی و الکلی اکالیپتوس بر سودوموناس آیروژینوza

مرتضی ستاری^{۱*}، نسرین شهبازی^۲، شهرین نجارپیرایه^۳

- ۱- استادیار، گروه باکتری شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
۲- کارشناس ارشد باکتری شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
۳- استادیار، گروه باکتری شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در تحقیق حاضر اثر بازدارندگی از رشد عصاره اکالیپتوس به عنوان یک ماده ضد میکروبی طبیعی گیاهی بر روی سویه‌های ATCC ۲۷۸۵۳ و M ۸۸۲۱ سودوموناس آیروژینوza بررسی شد.

مواد و روشها: کمترین غلظت بازدارنده از رشد عصاره‌های آبی و الکلی به روش تهیه رقت در لوله و آگار تعیین شد. منحنی رشد باکتری در زمانهای مختلف تحت تأثیر عصاره برسی و با شاهد مقایسه شد. ضریب فنلی عصاره‌ها به روش ریدل- والکر اندازه‌گیری شد.

نتایج و بحث: MIC برای عصاره الکلی رقت ۱/۸ (۰/۴ mg/ml) و برای عصاره آبی رقت (۰/۱۷ mg/ml) محاسبه شد. در غلظتها کمتر از بازدارندگی رشد عصاره‌ها، با افزایش مقدار عصاره در مقایسه با نمونه شاهد سرعت رشد کاهش داشت. ضریب فنلی برای عصاره‌های الکلی و آبی اکالیپتوس بخوبی می‌توانند از رشد سودوموناس آیروژینوza جلوگیری کنند و کاهش رشد سودوموناس آیروژینوza در غلظتها Sub-MIC دیده شد.

نتیجه‌گیری: براساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر، عصاره‌های خام الکلی و آبی اکالیپتوس بخوبی می‌توانند از رشد سودوموناس آیروژینوza در غلظتها Sub-MIC دیده شد. به طور کلی گیاهان طیف وسیعی از فعالیتهای ضد میکروبی را نشان می‌دهند و این می‌تواند به کشف انواع جدیدی از مواد ضد میکروبی در برابر باکتریهای مقاوم به دارو منجر شود.

کلیدواژگان: سودوموناس آیروژینوza، اکالیپتوس، اثر بازدارندگی.

از اکالیپتوس برای درمان بسیاری از بیماری‌ها مانند آنفلومنزا، تونسیلیت، اسهال خونی و بیماری‌های پوستی استفاده می‌شده است. عصاره برگ این گیاه دارای خواص ضد سرطانی، ضد التهابی، ضد درد، آنتی اکسیدان، ضد ازدیاد قند خون، ضد مالاریایی، ضد قارچی و ضد ویروسی است [۲، ۳، ۴]. همچنین این عصاره روی طیف وسیعی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی نظیر استافیلوکوکوس اورئوس، شیگلا دیسانتری، سالمونела پاراتیفی، اشرشیا کولی، باسیلوس سرئوس و نیز قارچ کاندیدا آلبیکنس فعالیت ضد میکروبی از خود نشان داده است [۵].

۱- مقدمه

بروز مقاومتهای دارویی و توانایی باکتریها در ایجاد عفونتهای حاد سبب شده است تا علاقه مجددی به گیاهان به منظور بررسی اثرات ضد میکروبی آنها به وجود آید. اکالیپتوس یکی از معروف‌ترین گیاهان دارویی است که از دیرباز اثرات ضد میکروبی و خواص دیگر آن مورد توجه بوده است. این گیاه منبع غنی از پلی فنلها و ترپن‌وئیدهاست و ترکیب اصلی برگ آن اکالیپتوول یا سینئول (۷۰ تا ۸۰ درصد) می‌باشد [۱].

میکرونی در ظروف تیره ریخته و در دمای یخچال نگهداری شد [۷].

۳-۲- سویه‌های باکتری

سویه موکوئیدی سودوموناس آیروژینوزا M۸۲۲۱ به وسیله آقای دکتر اولیا اهدا گردید؛ سویه سودوموناس آیروژینوزا ATCC۲۷۸۵۳ نیز سویه دارای فلاژل است که از آزمایشگاه رفانس بیمارستان بوعلی تهیه شد. هر دو سویه به صورت جداگانه بر روی محیط کشت مولر هیتون آگار کشت شده و به منظور استفاده در زمانهای مختلف در محیط اسکیم میلک حاوی ۱۰٪ گلیسرول در دمای ۷۰°C نگهداری شدند.

برای اطمینان از جنس و گونه سویه‌های باکتری از رنگ آمیزی گرم، آزمایش‌های: اکسیداز، کاتالاز، اندول، هیدرولیزلازین، تولید H₂S، اکسیداسیون، فرمانتوسیون (OF)، ایجاد همولیز بر آگار خوندار، توانایی حرکت در محیط نیمه جامد، تولید رنگدانه پیوسین، تعیین حساسیت به انواع آنتی‌بیوتیکها، توانایی مصرف قندهای: لاكتوز، گلوکز و مالتوز و همچنین آزمایش آرژنین دهیدرولاز استفاده شد.

۴- تعیین وزن خشک عصاره‌های آبی و الکلی

اکالیپتوس

ابتدا وزن یک لوله آزمایش تعیین و پس از آن ۱ml از عصاره‌های آبی یا الکلی در آن ریخته شد؛ سپس محتوی لوله در دمای اتاق خشک گردید. بعد از خشک شدن عصاره، وزن لوله آزمایش مجددًا تعیین شد. اختلاف وزن لوله معادل با وزن ۱ml از عصاره‌های آبی یا الکلی است. میانگین سه بار تکرار، به عنوان وزن خشک عصاره محاسبه شد.

۵-۲- اندازه‌گیری MIC به روش رقت در لوله

از پرگنهای حاصل از کشت ۲۴ ساعته سودوموناس آیروژینوزا (هر دو سویه آزمایشی به طور مجزا) به محیط کشت آبگوشت مولر هیتون تلقیح شد. پس از ۶ تا ۴ ساعت کرمخانه‌گذاری کدورت ۰/۵ مک فارلن (۱۰×۱/۵) باکتری در هر میلی‌لیتر از سوسپانسیون میکروبی تهیه شد. این سوسپانسیون به هنگام آزمایش ۱:۱۰۰ رقيق گردید؛ سپس رقت‌های ۱:۲ تا ۱:۱۰۲۴ از عصاره‌های آبی و الکلی به صورت مجزا در محیط آبگوشت مولر هیتون تهیه و از سوسپانسیون باکتریایی هم حجم هر رقت اضافه

سودوموناس آیروژینوزا باکتری گرم منفی و میله‌ای شکل است که در افراد دارای نقص ایمنی و سوختگی به عنوان یک باکتری بیماریزای فرصت طلب عمل می‌کند و به بسیاری از آنتی‌بیوتیکهای معمول مقاوم است. این باکتری عوامل بیماریزای متعددی است و می‌تواند بیماریهای مختلفی را مانند باکتریمی و سپتی سمی، عفونتهای دستگاه تنفسی، ادراری و گوارشی تولید کند.

سودوموناس آیروژینوزا ۲۳٪ از کل باکتریهای جدا شده از بیماران، ۱۶٪ از پنومونیهای بیمارستانی، ۱۲٪ از عفونتهای مجاری ادراری کسب شده از بیمارستان، ۸٪ از عفونتهای رضم بعد از عمل جراحی و ۱۰٪ از عفونتهای خون بیمارستانی را تشکیل می‌دهد. استفاده گسترده از آنتی‌بیوتیکها و افزایش بیماران دارای نقص ایمنی باعث بروز مقاومتهای دارویی سودوموناس شده است. بنابراین استفاده از درمانهای جایگزین برای کنترل عفونتهای ناشی از این باکتری ضروری به نظر می‌رسد. هدف از این مطالعه بررسی آثار مهاری رشد عصاره‌های اکالیپتوس بر روی سودوموناس آیروژینوزا براساس ضریب فنلی است [۶].

۲- مواد و روشها

۱-۲- تهیه گیاه


برگهای تازه گیاه اکالیپتوس کامالدو نسیس از باغ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهیه و پس از شناسایی استفاده شد.

۲-۲- تهیه عصاره‌های آبی و الکلی برگ

اکالیپتوس

مقدار ۱۰ g از برگ تازه گیاه اکالیپتوس کامالدو نسیس را به قطعات کوچک خرد و سپس ۵۰ ml آتانول ۹۶ درجه یا آب مقطر به آن اضافه شد. برای عصاره الکلی مخلوط حاصل به مدت ۲۴ ساعت در دمای آزمایشگاه نگهداری و هر چند ساعت یکبار با یک میله شیشه‌ای به هم زده شد. مخلوط آبی نیز به مدت ۲۰ دقیقه با شعله پایین جوشانده شد تا مایع کرم رنگی به دست آمد. مایع رویی پس از جمع آوری با دور ۳۰۰۰ rpm به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شد. عصاره به دست آمده (مایع رویی) را با آتانول یا آب مقطر به حجم اولیه رسانده، پس از عبور از صافی ۰/۴۵m

۵ml و ۱۰ دقیقه مقدار ۱ لوب استاندارد از لوله‌های حاوی ۵ml ماده و باکتری برداشته و دوباره وارد حجم‌های ۵ml از محیط مایع بازیافت شد. سپس لوله‌ها برای مدت ۷۲–۴۸ ساعت در ۳۷°C قرار داده شدند. سپس رشد یا عدم سپس رشد بررسی شد. طبق تعریف، ضریب فنلی ریدل-والکر عصاره‌ها از تقسیم رقتی از عصاره‌ها در واحدهای زمانی که بقای باکتری در آنها ادامه می‌یابد) رشد باکتری در زمانهای ۲/۵ و ۵ دقیقه و عدم رشد در زمانهای ۵/۵ و ۱۰ دقیقه)، تقسیم بر رقتی از فنل که نتیجه‌ای همانند دارند، محاسبه می‌شود [۱۰].



نمودار ۱ منحنی رشد سودوموناس آیروژینوزا ۲۷۸۵۳ در مجاورت غلظتها ۱/۲ و ۱/۴ کمتر از بازدارندگی عصاره (۱ و ۲) در مقایسه با شاهد فاقد عصاره (۳).

۳- نتایج حاصل از تعیین ضریب فنلی برای عصاره‌های آبی و الکلی اکالیپتوس

رقتها ۱/۱۰۵ فنل، ۱/۴ عصاره الکلی و ۱/۲ عصاره آبی در زمانهای ۲/۵ و ۱۰ دقیقه باعث مرگ تمام باکترها شدند. ضریب فنلی از تقسیم رقتی از عصاره که در زمانهای ۲/۵ و ۵ به باکریها اجازه رشد می‌دهد اما در زمانهای ۷/۵ و ۱۰ دقیقه باعث مرگ باکریها می‌شود، به رقتی از فنل با نتیجه‌ای همانند به دست می‌آید.

جدول ۱ رشد باکتری در زمانهای ۲/۵ و ۵ دقیقه و عدم رشد آن

در زمانهای ۷/۵ و ۱۰ دقیقه در کشت ثانویه

زمان تماس باکتری و ماده ضدغوفونی کننده به دقیقه	ماده ضدغوفونی کننده			
	۱۰	۷/۵	۵	۲/۵
-	-	+	+	
-	-	+	+	
-	-	+	+	

ضریب فنلی عصاره الکلی: ۱:۱۰۵=۰/۰۳۸۱

ضریب فنلی عصاره آبی: ۲:۱۰۵=۰/۰۱۹

شد (رقت نهایی عصاره‌ها ۱:۴ تا ۱:۲۰۴۸ بود). پس از ۲۴ ساعت گرمخانه‌گذاری در دمای ۳۷°C به دلیل کدورت حاصل از ترکیب عصاره‌ها با محیط کشت تعیین MIC به وسیله کشت مجدد روی محیط آگاردار انجام گرفت [۸].

۶-۲- اندازه‌گیری MIC به روش رقت در آگار

برای اجرای این آزمایش محیط کشت مولر هیتسون آگار در حجم‌های ۲۰ml حاوی غلظتها ۱:۴ تا ۱:۲۰۴۸ از هر عصاره تهیه شد. به این ترتیب که برای تهیه ۲۰ml از محیط با غلظت عصاره مورد نظر، پس از توزین مقدار پودر مورد نیاز از مولر هیتسون آگار برای حجم معادل ۲۰ml، ابتدا با حجم مناسبی از آب م قطر محیطها ساخته و استریل شدند. زمانی که دمای محیطها به ۵۰°C رسید رقت مناسب عصاره‌ها اضافه، حجم با آب م قطر ۲۰ml به تعادل رسانده و در پلیت ریخته شد (حداقل ۵ پلیت برای هر رقت). ۱-۲۳۱ از سوسپانسیون میکروبی برابر با استاندارد ۰/۵ مک فارلن ر روی سطح کشت شد [۹].

۷-۲- بررسی تغییرات منحنی رشد سویه ATCC۲۷۸۵۳ در محیط حاوی غلظتها کمتر از بازدارندگی رشد عصاره و شاهد بدون عصاره

هدف از رسم منحنی رشد تعیین تعداد باکتری در واحد زمان می‌باشد. برای تعیین منحنی رشد ۲ تا ۳ پرگه از کشت ۲۴ ساعته سویه به محیط آبگوشت مولر هیتسون اضافه شد (کدورت معادل لوله ۰/۰ مک فارلن). سپس ارلنیایی حاوی غلظت ۱:۶۴ و ۱:۶۴۲ از عصاره الکلی و نیز محیط فاقد عصاره تهیه شد. سوسپانسیون میکروبی اضافه شد ($10^9 \text{ cfu/ml} \times 10^{1/3}$) جاذب سوری در ۵۸۰nm در زمانهای صفر، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ ساعت تعیین شد. از روش کشت بر روی محیط نیز هم زمان در هر بار استفاده شد (نمودار ۱).

۸-۲- تعیین ضریب فنلی عصاره‌های آبی و الکلی اکالیپتوس

در روش ریدل-والکر رقتها ای از ماده میکروبکش که بتواند با رقتها ای از فنل (۱:۱۱۵ تا ۱:۹۵) معادل باشد، استفاده می‌شود. در این آزمایش، به هر ۵ml از ماده ضدغوفونی کننده یا فنل در آب م قطر، در درجه حرارت ۱۷-۱۸°C ۰/۲ ml از کشت ۲۴ ساعته باکتری ATCC ۲۷۸۵۳ اضافه شد. در فواصل زمانی ۵، ۲/۵، ۱:۱۰۵ از رقت فنلی عصاره الکلی: ۱:۱۰۵=۰/۰۳۸۱

شناسایی شده اوکالیپتوول یا آلفا سینیول بیشترین و مهمترین ماده است که دارای آثار بیولوژیک گوناگون از جمله، ضد میکروبی است. MIC این ماده برای استرپتوكوس موتنس و $6715\text{ }\mu\text{m}/\text{ml}$ بترتیب $12/5$ و $7/25\text{ }\mu\text{m}/\text{ml}$ گزارش شده است [۱۲]. در مطالعه حاضر نیز اوکالیپتوول موجود در نمونه‌ها استخراج و تعیین عیار شد (نتایج ارائه نشده است).

کاهش رشد سودوموناس آیروژنوزا در مجاورت غلظتها کمتر از بازدارندگی رشد آنتی‌بیوتیکها انجام شده است. در مورد آمیکاسین، جستامايسین و توبرامايسین این آثار در سال ۱۹۹۱ به وسیله زانل و همکارانش بر روی سودوموناس آیروژنوزا انجام شد. براساس گزارش آنها با افزایش غلظت آنتی‌بیوتیکها از رشد باکتریها ممانعت بیشتری به عمل می‌آید [۱۳]. در زمینه عصاره‌های گیاهی این مسئله تا به حال زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی منحنی رشد این باکتری در زمانهای مختلف نشان داد که عصاره اکالیپتوس در غلظتها کمتر از بازدارندگی رشد هم می‌تواند موجب کاهش رشد باکتری شود؛ این کاهش با افزایش غلظت عصاره شدت بیشتری می‌یابد.

تعیین ضریب فنلی هر ماده ضد میکروبی به عنوان میزان اثربخشی آن بر علیه باکتریها معرفی شده است [۱۰]. در زمینه عصاره‌های گیاهی نیز توجه به این مسئله ضروری است، بنابراین در مطالعه حاضر شاخصه مذکور نیز بررسی و ثابت شد عصاره الکلی آن نسبت به عصاره آبی آن از خاصیت ضد میکروبی بهتری برخوردار است.

به طور کلی گیاهان طیف وسیعی از فعالیتهای ضد میکروبی و فعالیتهای دیگر را نشان می‌دهند؛ این موضوع ممکن است به کشف انواع جدیدتر آنتی‌بیوتیکها و داروهای دیگر کمک کند. در حال حاضر با توجه به این که اوکالیپتوس در اشکال مختلف در فارماکوپه‌های دارویی جهان وارد شده است [۱۴] و در ایران نیز شرکتهای دارویی آن را به نامهای تجاری بخور اوکالیپتوس و پماد انوکسولون تولید و عرضه می‌کنند، شایسته است در زمینه مکانیزم‌های تأثیر آن بر روی باکتریها و نیز پاسخهای فیزیولوژیک میکرووارگانیزم‌ها در تماس با این مواد مطالعه بیشتری انجام شود.

۵- منابع

- [۱] صمصم شریعت ه. معطر ف. گیاهان و داروهای طبیعی، چاپ دوم، اصفهان: انتشارات مشعت؛ ۱۳۷۰. ص ۴۳۱-۴۳۲.

۴- بحث

امروزه مسئله مقاومت آنتی‌بیوتیکی به شکل بسیار جدی مطرح شده است. یکی از باکتریهای مقاوم به دارو سودوموناس آیروژنوزا است. این باکتری به عنوان یک عامل بیماری‌زای فرست طلب و مهم در افراد نقص ایمنی می‌تواند از راههای مختلف به انواع آنتی‌بیوتیکها مقاوم شود. به همین دلیل تحقیق برای به دست آوردن مواد ضد میکروبی از منابع دیگری مانند گیاهان ضروری به نظر می‌رسد. یکی از این گیاهان اکالیپتوس است که آثار ضد میکروبی عصاره آن از دیرباز مورد توجه بوده و از آن برای درمان آنفولانزا، تونسیلیت، دیسانتری و بیماری‌های پوستی در چین و قسمتهای مختلف دنیا استفاده شده است. این گیاه متعلق به خانواده میرتاسه می‌باشد و از استرالیا به سایر نقاط دنیا انتشار یافته است. اکالیپتوس دارای گونه‌های مختلفی از جمله: آلب، دکلوتیا، سالیبیگنا، کامالدولنسیس، سیتری اودورا... است [۱]. تقریباً تمام گونه‌های اکالیپتوس دارای آثار ضد میکروبی‌اند. خصوصیات ضد میکروبی این گیاه بر علیه باکتریهای مختلف مانند اشريشیا کلی، استاف اوریوس، سالمونلا به اثبات رسیده است.

مطالعات انجام شده بر روی عصاره‌های مختلف اکالیپتوس نشان داده است میکرووارگانیزم‌های استافیلوکوکوس اوریوس، شبیگلا دیسانتری، اشريشیا کلی، سالمونلا پاراتیفی، کاندیدا آلبیکانس و باسیلوس سوبتیلیس بترتیب حساسترین تا مقاومترین اجرام میکروبی‌اند [۵].

در سال ۱۹۹۶ در ارتباط با سودوموناس آیروژنوزا MIC عصاره مтанولی گونه گلوبولوس 10 mg/ml گزارش شد [۵]. مشابه آن در سال ۲۰۰۱ سی ری نی و همکارانش قطره هاله بازدارنده از رشد عصاره خام گیاه را برای این باکتری 32 mm گزارش و آن را به عنوان یک ماده ضد عفنی کننده مناسب معرفی کرد [۱۱]. نتایج حاصل از تحقیق ما نیز نشان داد که عصاره خام الکلی اکالیپتوس با غلظتی معادل $3/2\text{ mg/ml}$ و عصاره خام آبی آن با غلظتی معادل $17/5\text{ mg/ml}$ می‌تواند بخوبی از رشد سویه‌های استاندارد سودوموناس آیروژنوزا جلوگیری به عمل آورد. اختلاف موجود در مقادیر گزارش شده ناشی از روشها و سویه‌های مختلفی است که در آزمایشها به کار گرفته شده‌اند.

در مطالعات مختلفی که بر روی ترکیبات مؤثر اندام این گیاه براساس روش‌های گوناگون استخراجی انجام شده است، وجود ترکیبات متعددی به اثبات رسیده است. از بین تمام مواد

- [2] Takasaki M, Konoshima T, Etoh H. Cancer chemo preventive activity of euglobal-G1 from leaves of *Eucalyptus grandis*. *Can. Let.* 2000; 155: 61-65.
- [3] Siddiqui B, Sultana I. Triterpenoidal constituents from *Eucalyptus camaldulensis* var. *Obtusa* leaves. *Phytochem* 2004; 54: 861-865.
- [4] Adebola O, Olusegun E, Olayide N. Antimicrobial activity of the essential oils of five *Eucalyptus* species growing in Nigeria. *Fitotera* 1999; 70: 526-528.
- [5] Srinivasan D, Nathan S, Suresh T. Antimicrobial activity of certain Indian medicinal plants used in folkloric medicine. *J. Ethnopharmacol.* 2001; 74: 217-220.
- [6] Van Deleden Ch, Iglewski B.H. Cell to cell signaling and *Pseudomonas aeruginosa* infections. *Emerg. Infect. Dis.* 1998; 4: 551-559.
- [7] Ahmad I, Beg AZ. Antimicrobial and phytochemical studies on 45 Indian medicinal plants against multi-drug resistant human pathogen. *J. Ethnopharmacol.* 2001; 74: 113-123.
- [8] Finegold S.M, Martin W.J. Diagnostic microbiology. 6nd edition, Missouri: The C.V. Mosby Company Inc., 1982; pp. 532-659.
- [9] Davis B.I. The importance of the geometric mean MIC. *J. Antimicrob. Chemother.* 1990; 25: 471-472.
- [10] فضلی براز ص. میکروبیشناسی دارویی، چاپ چهارم، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ ۱۳۶۷. ص. ۳۱۷-۳۱۹.
- [11] Navarro V, Villarreal M.L, Royas G. Antimicrobial evaluation of some plants used in Mexican traditional medicine for the treatment of infectious diseases. *J. Ethnopharmacol.* 1996; 53: 143-147.
- [12] Osava K, Yasuda H, Morita H, Eucalypton from *Eucalyptus globulus*. *Phytochem*. 1995; 40: 183-184.
- [13] Zhanel G.G, Kavlwosky J.A, Davidson RJ, Hoban DJ. Antimicrobial activity of Sub inhibitory concentration of amino glycosides against *Pseudomonas aeruginosa* as determined by the killing-curve method and the post antibiotic effect. *Chemoth*. 1991; 37: 114-121.
- [14] Council of Europe. European Pharmacopoeia. 3rd ed., Strasburg: Council of Europe, 1999.