

## مقایسه درمان ۴ و ۸ هفته‌ای فلئوکستین و ایمی پرامین روی قند خون ناشتا

### در بیماران افسردگی اساسی

دکتر بهمن صالحی<sup>۱</sup>، دکتر فرهاد غنی سنجانی<sup>۲</sup>

۱- استادیار گروه روانپردازی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران (مؤلف مسؤول) تلفن تماس: ۰۳۱۳۵۰۷۵-۰۸۶۱ basalehi@yahoo.com

۲- پژوهش عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

### چکیده

**زمینه و هدف:** افسردگی یکی از قدیمی‌ترین، شایعترین و شدیدترین اختلالات خلقی روانپردازی می‌باشد. خطر ابتلا به این اختلال در زنان ۲۵-۱۰ درصد و در مردان ۱۲-۵ درصد می‌باشد. چون دیابت و عوارض آن در ایجاد افسردگی مؤثر است و افسردگی نیز در بودجه آمدن دیابت نقش دارد، لذا کنترل قند خون در بیماران افسردگی و دانستن تأثیر داروهای ضد افسردگی روی قند خون کمکی به این بیماران می‌باشد. این مطالعه جهت مقایسه اثر فلئوکستین و ایمی پرامین روی قند خون ناشتا بیماران افسردگی اساسی در اراک طراحی شده است.

**روش بررسی:** پژوهش حاضر یک مطالعه کار آزمایی بالینی است که به صورت تصادفی از بین بیماران افسردگی اساسی مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید هاشمی سنجانی اراک، بر اساس معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR انتخاب شده و در دو گروه ۴۰ نفری A (روزانه ۲۰ mg فلئوکستین) و B (روزانه ۱۰۰ mg ایمی پرامین) قرار گرفتند. از بیماران در سه نوبت (قبل از شروع درمان، ۴ و ۸ هفته بعد از درمان قند خون ناشتا اندازه‌گیری شد. بعد از جمع‌آوری داده‌ها از آزمونهای آمار توصیفی و K-S (کلموگرونوف- اسمیرنوف)، آزمون T دو گروه وابسته<sup>۱</sup>، مستقل<sup>۲</sup> تجزیه و تحلیل بعمل آمد. اصول اخلاقی هلсинکی در کلیه مراحل تحقیق رعایت شد.  $p < 0.05$  معنی دار به حساب می‌آمد.

**یافته‌ها:** اختلاف آماری معنی داری بین میانگین قند خون ناشتا بین دو گروه A و B در نوبت اول و دوم بدست نیامد در صورتیکه در نوبت سوم معنی دار بود ( $p < 0.01$ ). اما اختلاف بین نوبت اول و دوم گروه A معنی دار نبود ( $p > 0.05$ ، هر چند کاهش معنی داری در میانگین قند خون ناشتا نوبت اول و سوم گروه A وجود داشت ( $p < 0.05$ )). همچنین افزایش معنی داری در میانگین قند خون ناشتا نوبت دوم و سوم نسبت به میانگین قند خون ناشتا نوبت اول در گروه B وجود داشت ( $p < 0.05$ ).

**نتیجه‌گیری:** در بیماران افسردگی اساسی پس از ۸ هفته درمان با فلئوکستین کاهش قند خون ناشتا نسبت به ایمی پرامین داریم و پس از ۴ و ۸ هفته درمان با ایمی پرامین افزایش قند خون ناشتا مشاهده می‌شود. بنابراین در بیماران افسردگی هیپرگلیسمیک (دیابتیک) فلئوکستین و در بیماران افسردگی هیپوگلیسمیک ایمی پرامین توصیه می‌شود.

**کلید واژه‌ها:** افسردگی، افسردگی اساسی، فلئوکستین، ایمی پرامین، قند خون ناشتا

وصول مقاله: ۸۸/۵/۶ پذیرش مقاله: ۸۸/۴/۲۸ اصلاحیه مقاله: ۸۸/۱/۱۵

1. Klomogronov-Smirnov  
2. Paired-T-test  
3. Independent T-test

## مقدمه

نسبت به گروه کنترل ۷۸ درصد بیشتر در معرض دیابت نوع II هستند (۴).

ضد افسردگی‌های چند حلقه‌ای و مهارکننده‌های اختصاصی باز جذب سرتونین و مهارکننده‌های منو آمینو اکسیداز داروهای مؤثر در اختلال خلقي افسردگی می‌باشند (۷ و ۱). طبق بررسی که در سال ۲۰۰۶ توسط مکیتری و همکاران در تورنتو کانادا انجام شد، نشان داد برخی ضد افسردگی‌ها اثر آشکاری روی متابولیسم، درمان و هم عوارض دیابت دارند. داروهای ضد افسردگی سرتونرژیک (مانند فلئوکستین) باعث افزایش حساسیت به انسولین و نرمال شدن هموستانز گلوکز و کاهش سطح قند خون می‌شوند و داروهای نورآدرنرژیک (مانند ایمی پرامین) با اثر متضاد باعث افزایش قند خون می‌گردند. داروهای دارای هر دو اثر (سرتونرژیک و نورآدرنرژیک) مانند ونلافکسین و دو لوکستین اثری روی قند خون ندارند. داروهای گروه MAOI (مثل فلتزین) باعث افزایش مصرف گلوکز و کاهش قند خون می‌شوند (۸). بر اساس مطالعه دیگری که در سال ۱۹۹۷ در امریکا توسط گود نیک و همکارانش انجام شد، افسردگی در بیماران دیابتی مکرراً رخ می‌دهد، به دنبال تحقیقاتی که از سال ۱۹۶۶ تا سال ۱۹۹۳ در مورد دیابت و سطح گلوکز خون و افسردگی و داروهای ضد افسردگی صورت گرفت، نتایج حاکی از این بود که شیوع افسردگی در دیابتی‌ها بین ۷۷/۳-۸/۵ درصد و شدت افسردگی با علائم دیابت مرتبط بود. MAOIs ها با اثر گلوکونئوژن هیپرگلیسمی می‌دهند، داروهای دو پا مینرژیک و نورآدرنرژیک، هیپرگلیسمی می‌دهند و سرتونرژیکها هم تا ۳۰ درصد قند خون ناشتا را کاهش می‌دهند. TCA ها هم به خاطر طلبیدن کربوهیدرات (۸۶ تا ۲۰۰ درصد) افزایش قند خون ایجاد

افسردگی یکی از قدیمی‌ترین و شایع‌ترین اختلالات روان شناختی و قبل توجه شخصی-اجتماعی می‌باشد، که تاریخچه‌ای قدیمی دارد (۱۰ و ۱۲). شیوع اختلالات افسردگی در زنان ۲۵٪-۱۰٪ و در مردان ۱۲٪-۵٪ به طور متغیر می‌باشد (۱).

بسیاری از اختلالات عصبی و داخلی و مواد فارماکولوژیک می‌توانند علائم افسردگی ایجاد کنند. تغیرات گوناگون در مصرف غذا و میزان استراحت نیز موجب و خامت بیماریهایی مثل دیابت و فشار خون می‌گردد (۱). در مطالعات مختلف اثر مقابله افسردگی و دیابت مطرح شده است، بنابراین تنظیم سطح قند خون در بیماران افسرده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (۳-۶). همچنین در مطالعات زیادی آثار متفاوتی برای انواع داروهای ضد افسردگی روی سطح قند خون ذکر گردیده است. به طوری که ضد افسردگی‌های مهارکننده منو‌آمینو اکسیداز (MAOI) و مهارکننده‌ای اختصاصی سرو‌تونین (SSRI) را کاهنده سطح قند خون و ضد افسردگی‌های چند حلقه‌ای (T.C.A) را افزاینده قند خون معرفی کرده‌اند (۷).

در پژوهشی که در سال ۲۰۰۴ توسط سیمون و کاتون در واشنگتن انجام شد میزان افسردگی در بیماران تحت مراقبتهای اولیه دیابت و ابتلای، همزمان افسردگی و دیابت و کیفیت مراقبت از افسردگی در یک دوره ۱۲ ماهه بررسی شدند. نتایج نشان می‌داد ۱۵-۱۱٪ دیابتی‌ها افسردگی داشتند و افسردگی با عدم کنترل قند خون همراه بود (۳). در مقاله دیگری در سال ۲۰۰۴ توسط واندن آکر و شوارمن در هلند بر روی افراد افسرده اساسی و سالم از نظر دیابت نوع II مورد بررسی قرار گرفتند که نشان می‌داد که مردان ۵۰-۲۰ ساله افسرده

بر روی سطح قند خون ناشتا بگذارند و از طرف دیگر انجام فقط یک مطالعه در ایران و آنهم در تهران، این مطالعه به مقایسه تغییرات سطح قند خون ناشتا در افراد افسردگی اساسی تحت درمان با داروهای ضد افسردگی فلئوکستین و ایمی پرامین با میزان دوز ثابت (۲۰ میلی گرم و ۱۰۰ میلی گرم) و در اراک انجام شد (۸-۱۴).

### روش بررسی

این پژوهش کار آزمایی بالینی تصادفی شده موازی، است که در سال ۱۳۸۵ انجام شد، جامعه مورد آزمون از بین بیماران افسردگی اساسی مراجعه کننده به مطب خصوصی مجری طرح و درمانگاه اعصاب و روان شهید هاشمی سنجانی اراک بر اساس ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR بودند که به صورت یک در میان توسط مجری طرح در گروههای فلئوکستین (گروه A) و ایمی پرامین (گروه B) قرار گرفتند. حجم نمونه بر اساس  $\alpha=5\%$ ,  $p_1=0.63$ ,  $p_2=0.82$  (پیش فرض‌های مطالعات قبلی)،  $Case/Control=1$ ,  $odd\ ratio=0.025$  با (در مطالعات قبلی) نفر در هر گروه تعیین شد.

معیارهای ورود به مطالعه علاوه بر تشخیص افسردگی اساسی، نداشتن دیابت یا سابقه خانوادگی آن، عدم استفاده از داروهای مؤثر بر روی قند خون، عدم داشتن سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و کبدی، سن بین ۲۰-۵۰ سال، نداشتن هیچگونه منع برای استفاده از فلئوکستین و یا ایمی پرامین، عدم دریافت داروهای ضد افسردگی یا الکتروشوک در سه ماهه اخیر بود. معیارهای خروج شامل: حساسیت به دارو، قطع دارو توسط بیمار، عدم مراجعت و عدم تمایل بیمار جهت ادامه درمان و یا انجام آزمایشات قند خون، عدم پاسخ درمانی

و داروهای SSRI نسبت به MAOI در بیماران دیابتی ارجح می‌باشند (۹).

همچنین بر اساس پژوهشی که در سال ۱۳۸۳ توسط قائلی و همکارانش در تهران انجام گرفت، ۶۰ بیمار غیر دیابتی که بر طبق معیارهای DSM-IV دچار افسردگی اساسی بودند در یک مطالعه دوسوکور به طور تصادفی در دو گروه فلئوکستین ۲۰-۴۰ میلی گرم در روز و ایمی پرامین ۷۵-۲۰۰ میلی گرم در روز برای مدت ۸ هفته قرار گرفتند و سطح قند خون ناشتا آنها در سه نوبت پایه، بعد از چهار و هشت هفته از درمان اندازه گیری شد. در گروه فلئوکستین میانگین قند خون ناشتا پایه  $88/5\text{mg/dl}$  و بعد از چهار هفته درمان  $85/8\text{ mg/dl}$  با ( $p=0.75$ ) و بعد از ۸ هفته درمان  $79/8\text{ mg/dl}$  با ( $p=0.001$ ) بود. گروه ایمی پرامین میانگین قند خون ناشتا پایه  $86/96\text{ mg/dl}$  و بعد از چهار هفته درمان  $89/71\text{ mg/dl}$  با ( $p=0.79$ ) و بعد از ۸ هفته درمان  $96/9\text{ mg/dl}$  با ( $p<0.001$ ) که قند خون ناشتا در گروه فلئوکستین کاهش و در گروه ایمی پرامین افزایش یافته بود. محققین به این نتیجه رسیدند که در طول درمان بیماران افسرده با ایمی پرامین یا فلئوکستین، قند خون ناشتا باید مونیتور شوند (۱۰).

با توجه به اینکه هر یک از دسته داروهای ضد افسردگی SSRI (اعم از فلاکستین، سرتالین، پاروکستین، فلووکسامین و ...) و ضد افسردگی‌های چند حلقه‌ای (ایمی پرامین، نور تریپتیلین، تریمیپرامین و...), با دوزهای خاص، میزان زمان خاص (از دو هفته تا شش ماه در مطالعات مختلف)، در مکان‌های مختلف از نظر شرایط جغرافیائی و متابولیسم و تنوع رژیم غذائی در مناطق مختلف، تأثیر عوامل نژادی در متابولیسم اثر این داروها و همچنین نوع دیابت که می‌توانند اثرات متفاوتی

مراحل تحقیق متعهد به رعایت اصول اخلاقی اعلامیه هلسینکی بودند.

### یافته‌ها

از ۴۰ نفر گروه A و گروه B در سه نوبت آزمایش قند خون ناشتا انجام شد و درمان را ادامه دادند، وضعیت دموگرافیک افراد مورد مطالعه در جدول ۱ ارائه شده است.

از ۴۰ نفر گروه A، ۱۸ نفر (۴۵ درصد) افسردگی حاد و ۲۲ نفر (۵۵ درصد) افسردگی مزمن و از ۴۰ نفر گروه B، ۱۷ نفر (۴۲/۵ درصد) افسردگی حاد و ۲۳ نفر (۵۷/۵ درصد) افسردگی مزمن داشتند.

میانگین و انحراف معیار سه نوبت قند خون ناشتا در گروههای A و B در جدول ۲ مشاهده می‌شود که اختلاف آماری معنی‌داری بین میانگین قند خون ناشتا پایه و نوبت دوم در دو گروه A و B وجود ندارد اما اختلاف آماری معنی‌داری در نوبت سوم بین دو گروه وجود دارد (جدول ۲). همچنین اختلاف آماری معنی‌داری بین میانگین قند خون ناشتا نوبت اول و دوم گروه A با  $p < 0.05$  دیده نشد. ولی اختلاف آماری معنی‌داری بین میانگین قند خون ناشتا نوبت اول و سوم گروه A با  $p < 0.05$  وجود داشت.

همچنین اختلاف آماری معنی‌داری بین میانگین قند خون ناشتا نوبت اول و دوم گروه B با  $(p < 0.01)$  و قند خون ناشتا نوبت اول و سوم آن با  $(p < 0.001)$  وجود داشت.

و تغییر دارو و باردار بودن بود. درمان برای افرادی که در گروه فلئوکستین (A) قرار می‌گرفتند، با یک کپسول فلئوکستین ۲۰ میلی‌گرمی شرکت داروسازی آریا شروع و ادامه می‌یافت برای افراد گروه ایمی پرامین (B) از قرصهای ایمی پرامین ۲۵ میلی‌گرمی ساخت شرکت داروسازی سبحان که با ۵۰ میلی‌گرم شروع و در هفته دوم به ۱۰۰ میلی‌گرم رسانده می‌شد و سپس ادامه می‌یافت. جهت کاهش اضطراب و بی‌خوابی به هر دو گروه روزانه ۱۰ میلی‌گرم کلردیازپوکساید شرکت داروسازی سبحان داده می‌شد.

قند خون ناشتا بیماران با توصیه‌های خاص غذایی شب قبل از آزمایش طی سه نوبت: قبل از شروع دارو، (نوبت اول) بعد از چهار هفته درمان (نوبت دوم) بعد از هشت هفته درمان (نوبت سوم) در آزمایشگاه درمانگاه شهید هاشمی سنجانی بر اساس کیت شرکت زیست-شیمی و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر APEL با طول موج ۴۹۰-۵۵۰ نانومتر توسط یک تکنسین مشخص (زیر نظر آزمایشگاه رفانس دانشگاه علوم پزشکی اراک) انجام و نتایج ثبت می‌گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب اطمینان و K-S (کلموگرونف-اسمیرونف) جهت بررسی میزان قند خون ناشتا در دو گروه از نظر توزیع نرمال بودن یا نبودن و آزمون T مستقل جهت بررسی اختلاف آماری بین میانگین‌های بین دو گروه A و B و از T وابسته (T زوج) جهت بررسی وجود اختلاف آماری بین میانگین‌های میزان قند خون پایه با نوبت دوم و سوم هر گروه تجزیه و تحلیل شدند.  $p < 0.05$  معنی‌دار تلقی و محققین در کلیه

## جدول ۱: وضعیت دموگرافیک دو گروه افسرده‌گی اساسی درمان با فلوکستین وایمی پرامین در مرکز روانیزشکی شهید هاشمی سنجانی اراک

**جدول ۲: میانگین قند خون ناشتا در سه نوبت بیماران افسردگی اساسی، تحت درمان فلتوکستین و ایمی پرامین در مركز روانپردازشکی شهید هاشمی سنجانی اراک (N=40)**

نوبت	نام دارو	میانگین ± انحراف معیار	حداقل	حداکثر	دامنه تغیرات	P. Value
		S.D±Mean	Minimum	Maximum	Range	
۰/۰۶۲	نوبت اول	فلوشکستین	۹۶/۳۷۵±۱۲/۶۲	۶۷	۱۳۰	۶۳
	(پایه)	ایمی پرامین	۹۱/۶۰±۱۰/۲۲	۶۹	۱۰۸	۳۹
۰/۲۵۴	نوبت دوم	فلوشکستین	۹۴/۹۲۵±۹/۰۶	۷۵	۱۱۰	۳۵
	(بعد از ۴ هفته)	ایمی پرامین	۹۷/۱۲۵±۹/۱۲	۷۳	۱۲۸	۵۵
۰/۰۰۱	نوبت سوم	فلوشکستین	۹۱/۹۷۵±۱۰/۲۴	۷۵	۱۱۰	۳۵
	(بعد از ۸ هفته)	ایمی پرامین	۹۸/۴۵±۷/۲۸	۸۲	۱۱۵	۳۳

بحث

گروه A نسبت به میانگین قند خون ناشتای پایه یعنی قبل از شروع درمان با  $p=0.039$  کاهش نشان می‌دهد، که با مطالعات انجام شده توسط گودنیک و همکاران در آمریکا (۹) و مکنتوری و همکاران در کانادا (۸) و مصباحی و شاهسوند در تهران هم خوانی دارد (۱۰). اما با مطالعه انجام شده توسط او زویان وارن در سال ۱۹۹۵ در ترکیه هم خوانی ندارد (۶).

با توجه به نتایج سه نوبت آزمایش قند خون ناشتا بدست آمده در گروههای A و B میانگین قند خون ناشتای به دست آمده در نوبت سوم آزمایش یعنی بعد از ۸ هفته درمان به صورت معنی داری تفاوت دارند (جدول ۱)، اما تفاوت میانگین قند خون ناشتا در نوبت اول و دوم بین دو گروه تفاوت معنی دار ندارند (جدول ۲). اگرچه تفاوت میانگین قند خون ناشتا نوبت سوم

چه همانند تحقیق صورت گرفته در تهران در تحقیق ما نیز پس از ۴ هفته درمان با فلئوکستین میانگین قند خون ناشتا بdst آمده نسبت به میانگین قند خون ناشتا قبل از شروع درمان کاهش معنی داری ندارد. همچنین میانگین قند خون پایه و چهار هفته بین دو گروه بعد از درمان نیز معنی دار نمی باشد (۱۰). عطف به این نتایج می توان گفت در بیماران افسردگی اساسی پس از ۸ هفته درمان با فلئوکستین کاهش قند خون ناشتا و پس از ۴ و ۸ هفته درمان با ایمی پرامین افزایش قند خون ناشتا داریم و در مورد اثر ۴ هفته درمان با فلئوکستین روی قند خون ناشتا نیاز به مطالعات بیشتر و با حجم نمونه های زیادتر می باشد.

### نتیجه گیری

با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه می توان گفت در بیماران افسرده اساسی با قند خون بالا فلئوکستین و در بیماران افسرده اساسی با قند خون پائین ایمی پرامین توصیه می شود و در بیماران با قند نرمال در صورت تجویز فلئوکستین، مصرف گلوکز بیشتر و در صورت تجویز ایمی پرامین، مصرف گلوکز کمتر توصیه می شود.

پیشنهاد می گردد تحقیقات دیگر با محدود کردن و معین کردن رژیم غذایی (گلوکز مصرفی) و حجم نمونه های زیادتر و در نواحی دیگر با توجه به متابولیسم بدنی و تغذیه بومی انجام پذیرد و همچنین تحقیقات دیگری با در نظر گرفتن متغیرهایی مثل کلسترول و تری گلیسرید و ... و هچنین اثر داروهای ضد افسردگی مختلف با سطح دوزهای متفاوت روی این متغیرها انجام گیرد.

در گروه B میانگین قند خون ناشتا بdst آمده در نوبت دوم و سوم آزمایش نسبت به نوبت پایه افزایش معنی داری نشان می دهد ( $p=0.001$ )، که با مطالعات انجام شده در آمریکا و در کانادا هم خوانی دارد (۸۹).

درمان ۸ هفته ای با فلئوکستین با کاهش معنی داری در میانگین قند خون ناشتا بdst آمده نسبت به میانگین قند خون ناشتا قبل از شروع درمان همراه است ( $p=0.039$ ). همچنین درمان ۸ هفته ای با ایمی پرامین با افزایش معنی داری ( $p=0.003$ ) میانگین قند خون ناشتا بdst آمده نسبت به میانگین قند خون ناشتا قبل از درمان همراه است.

همانند تحقیقات صورت گرفته توسط گودنیک و همکاران در امریکا که SSRI ها را کاهنده و TCA را افزاینده سطح قند خون معرفی کرده اند و مشابه تحقیقات صورت گرفته در کانادا که داروهای سروتونرژیک (مانند فلئوکستین) را کاهنده و داروهای نورآدرنرژیک (مانند ایمی پرامین) را افزاینده قند خون معرفی کرده اند، در تحقیق ما نیز نتایج مشابهی به دست آمده است (۱۶-۱۲ و ۹ و ۸).

این تحقیق با تحقیق انجام شده در ترکیه بر روی موشها که فلئوکستین را کاهنده قند خون و نورتریپتیلین (از TCA ها) را افزاینده قند خون معرفی کرده اند نیز مطابقت دارد (۶).

تحقیق ما در مقایسه با تحقیق مشابه در سال ۲۰۰۴ در تهران نتایج مشابه داشته است. اما در تحقیق ما برخلاف تحقیق صورت گرفته در تهران حتی پس از ۴ هفته درمان با ایمی پرامین هم افزایش معنی داری در میانگین قند خون ناشتا بdst آمده نسبت به میانگین قند خون ناشتا قبل از شروع درمان دیده می شود. اگر

## تشکر و قدردانی

همکاری داشته‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌شود. ضمناً این پژوهش برگفته از یک پایان نامه دوره دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک می‌باشد.

بدین وسیله از جناب آقای دکتر رفیعی کارشناس محترم آمار و کلیه همکارانی که در بیمارستان شهید هاشمی سنجانی از جمله کادر پرستاری، مسئول محترم آزمایشگاه مدیر محترم این مرکز و کلیه بیمارانی که در این تحقیق

## References

- Poorafcari N, In translation of Synopsis of Psychiatry, Sadock BJ, Sadock VA, (Writers) 2ed ,ed, Tehran, Shahre Aab Publishers, Volume 2, 95-150.
- Mashaechi A, A Determination of Depression in Medical Students of Arak University of Medical Sciences, [Dissertation], Arak, Medical University, 1377-78.
- Katon WJ, Simon G, Russo J, Vonkorff M, Lin LH, Ludman E, et al. Quality of Depression Care In A Population based sample of patient with Diabetes and major depression Med care 2004; 42: 1222-9.
- Van den Akker M, Schuurman A, Metsemakers J, Buntinx F. Is depression related to subsequent Diabetes Mellitus? Acta psychiatr Scand 2004; 110: 178-83.
- Katon WJ, Vankroff M, Ciechanowski P, Russo J, Lin E, Simon G, et al. Behavioral And Clinical Features Associated With Depression Among Individuals With Diabetes. Diabetes Care 2004; 27: 914-20.
- Eren I, Erdi O, Ozcankaya R. Relationship between Blood Glucose Control and Psychiatric Disorder in type II Diabetic Patient. Turk Psikiyatri Derg 2003; 14: 184-91.
- Malek Allaei M, Jahangiri B, In translations of Basic and clinical Pharmacology, Vebetran J, Katzoong (Writers), 1<sup>st</sup> ed, Tehran, Nassle Farda Publishers, 1383, Volume 1, 609-625.
- McIntyre RS, Soczynska JK, Konarski JZ, Kennedy SH. The effect of antidepressants on glucose homeostasis and insulin sensitivity: synthesis and mechanisms. Expert Opin Drug Saf 2006; 5: 157-68.
- Goodnick PJ, Henry JH, Buki VM. Treatment of depression in patient with diabetes mellitus. J Clin Psychiatry 1995; 56: 128-36.
- Ghaeli P, Shahsavand E, Mesbahi M, Kamkar MZ, Sadeghi M, Dashti-khavidaki. Scampering the effects of 8-weeks treatment with flouoxetine and imipramine on fasting blood glucose of patients with major depressive disorder. J Clin Psychopharmacol 2004; 24: 386-8.
- Good Nick PJ. Use of Antidepressants in treatment of comorbid diabetes mellitus and depression as well as in diabetic neuropathy. Ann Clin Psychiatry 2001; 13: 131-41.
- Lust man PJ, Griffith LS, Freed land KE, Clouse RE. The course of major depression in diabetes. Gen Hosp psychiatry 1997; 19: 138-43.
- Warnock JK, Multzig EM. Diabetes mellitus and major depression: considerations for treatment of Native Americans. Jokla State Med Assoc 1998; 91: 488-93.
- Erenmemisoglu A, Ozdogan UK, Saraymen R, Tütün A. Effect of some antidepressants on hyper glycaemia and insulin level of normoglycaemic and Allegan-include hyperglycemic mice. J Pharm Pharmacol 1999; 51: 741-3.
- Mussel man DL, Betan E, Larsen H, Philips LS. Relationship of depression to diabetes types 1 and 2: epidemiology, biology and treatment. Biol Psychiatry 2003; 54: 317-29.
- Katon WJ, Vonkorff M, Lin EH, Simon G, Ludman E, Russo J, et al. The path ways study: a randomized trial of collaborative care in patients with diabetes and depression. Arch Gen psychiatry 2004; 61: 1042-9.