

فعالیت ضد میکروبی، رادیکال‌زدایی نیتریک اکساید و سمیت سلولی انسان آویشن دنایی

مهدی داداش‌پور^۱، ایرج رسولی^{۲*}، رحیم سروی زنجانی^۳، فاطمه سفیدکن^۴، مسعود تقی‌زاده^۵،
شکیبا درویش‌علیپور آستانه^۶

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
- ۲- استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
- ۳- دانشیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...، تهران، ایران
- ۴- استاد، گروه شیمی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران، ایران
- ۵- استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
- ۶- دانشجوی دکتری تخصصی، گروه میکروب‌بیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

دریافت مقاله: ۸۹/۰۹/۲۰
پذیرش مقاله: ۸۹/۱۱/۲۶

چکیده

هدف: با وجود اثر سمی برخی از روغن‌های انسانی، استفاده آن‌ها تحت کنترل نیست. با توجه به گسترش مصرف فرآورده‌های گیاهی، ابعاد مختلف زیست‌شناختی انسان آویشن دنایی برای اولین بار گزارش می‌شود. مواد و روش‌ها: فعالیت ضد باکتریایی با دو روش انتشار و رقت، رادیکال‌زدایی نیتریک اکساید با روش مارکوکسی و همکاران و سمیت سلولی با روش احیا دی متیل تیازولیل دی فنیل ترازاولیوم بروماید به‌وسیله انسان‌های آویشن دنایی و تجاری و ترکیب شیمیایی اصلی آن‌ها، تیمول، بررسی و مقایسه شد.

نتایج: نمای حساسیتی میکروارگانیسم‌ها براساس حساس‌ترین به مقاوم‌ترین سودوموناس آثروژنیوزا > استافیلکوکوس اورئوس > اشريشیا کولی > کاندیدا آلبیکنس و کم‌ترین غلظت مهار کنندگی و کشنندگی ۱۰-۰/۱۰ میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر بود. رادیکال‌زدایی نیتریک اکساید وابسته به دوز با IC₅₀ برابر ۵ و ۷۵ و ۸۶۳ میکروگرم و فنل کل معادل ۱۶/۷۹±۰/۰۷ و ۶۴/۴±۰/۷۹ میکروگرم گالیک اسید در هر میلی‌گرم نمونه بهتریت در انسان آویشن دنایی، انسان تجاری و تیمول تعیین شد. سمیت سلولی آن‌ها بر سلول‌های طبیعی انسان بهصورت ۵۰ درصد غلظت ممانعت (IC₅₀) بهتریت ۱۴۵۵، ۱۲/۱۰ و ۲۸۶۷ میکروگرم و در خصوص سلول‌های سرطانی بهتریت ۴/۹۵، ۳/۶۱ و ۱۷۳۰ میکروگرم بود.

نتیجه‌گیری: آویشن با خاصیت خوب ضد میکروبی، می‌تواند در پیشگیری از تشکیل محصولات سمی نیتروزن واکنش‌گر نیز مؤثر بوده و به عنوان یک آنتی‌اکسیدان خوب مستقیماً NO و O₂⁻ را بزداید. تأثیر کشنندگی غلظت کم انسان بر سلول‌های سرطانی بدون تأثیر منفی بر سلول‌های طبیعی نویدبخش امکان استفاده در مبارزه با سلول‌های سرطانی است.

کلیدواژگان: آویشن، ضد میکروب، آنتی‌اکسیدان، نیتریک اکساید، روغن‌های انسانی

*نشانی مکاتبه: تهران، دانشگاه شاهد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، کدپستی: ۳۳۱۹۱۱۸۶۵۱

Email: rasooli@shahed.ac.ir

سویستراها در معرض اکسیداسیون قرار می‌گیرد، مکانیسم‌های دفاعی بدن ناتوان می‌شود و تخریب مولکول‌ها زیستی (DNA، لیپید، پروتئین) اتفاق می‌افتد [۶]. برخی آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند از خطر اکسید کنندگی توسط ROS و RNS، بروز بیماری‌های خاصی مثل سرطان و روند پیری جلوگیری کنند و می‌توانند از طریق فرایند اکسیداسیون، واکنش با رادیکال‌های آزاد، کلاته کردن (Chelating) فلزات و همچنین واکنش به عنوان رادیکال زداینده اکسیژن، مداخله کنند [۶]. تحقیقات اخیر کشف آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی از گیاهان را نشان می‌دهد. استفاده از گونه‌ها و گیاهان به عنوان آنتی‌اکسیدان‌ها در فرآیندهای غذایی، امیدی برای استفاده از آن‌ها به جای آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که با توجه به فعالیت آنتی‌اکسیدانی گونه، مصرف آن‌ها به عنوان افزودنی‌های طبیعی افزایش یافته است [۷]. در زمینه سمیت مزمن این ترکیب‌ها نظیر ناقص‌الخلقه‌سازی، جهش‌زایی و سرطان‌زایی بالقوه نیز مقادات کمی وجود دارد [۸]. جنس آویشن (*Thymus*) حدوداً ۴۰۰ گونه از گیاهان علفی مقاوم، چند ساله، معطر همیشه سبز یا نیمه‌سبز است که به طور عمده بومی نواحی معتدل شمالی نظیر اروپای جنوبی و آسیا هستند. نام این جنس برگرفته از یک واژه یونان باستان است؛ این گیاهان معطر به طور معمول با نام تایم (*Thyme*) شناخته می‌شوند [۹]. شیمی، فرآوری و کاربردهای اعضای جنس آویشن قبلاً بررسی شده است [۱]. با وجود این‌که گزارش‌ها در مورد ترکیب‌های روغن‌های انسانی و استفاده از گونه‌های مختلف آویشن کاملاً متداول است، ولی هنوز تحقیقات در مورد فعالیت‌های زیست‌شناختی آن‌ها نادر است [۱۰] و در دهه‌های اخیر این گیاهان هدف مطالعات در زمینه آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی و عوامل ضد میکروبی شده‌اند [۱۱]. نتایج مطالعات بسیاری که روی ترکیب روغن‌های انسانی قسمت‌های هوایی گونه‌های مختلف آویشن انجام شده است نشان می‌دهد که ترکیب‌های فرار اصلی به دست آمده عبارتند از تیمول (Thymol)، کارواکرول (Carvacrol)، پارا-سیمین (p-Cymene)، گاما-ترپین (γ-Terpinen)، β-کاریوفیلن (β-Caryophyllene) و

۱- مقدمه

گیاهان منابع طبیعی خوبی از ترکیب‌ها، با فعالیت زیستی هستند و می‌توانند در فرمولاسیون‌های غذایی به عنوان افزودنی و اجزای مؤثر در سلامتی کاربرد داشته باشند [۱]. بسیاری از ترکیب‌های طبیعی به دست آمده از گیاهان دارای طیف وسیعی از فعالیت‌های زیستی است. ترکیب‌های شیمیایی در خواص زیستی انسان‌ها تأثیر دارد. در بین انواع مختلف مواد اولیه، عوامل طبیعی بالقوه‌ای مانند روغن‌های انسانی استخراج شده از گیاهان معطر و دارویی دارای خواص ضد میکروبی، ضد قارچی، آنتی‌اکسیدانی است. با توجه به این‌که در سال‌های اخیر فشار قابل توجهی از طرف مصرف کننده‌ها برای کاهش یا محدود کردن استفاده از افزودنی‌های مصنوعی در غذاهای‌شان، اعمال می‌شود، یک راه جدید برای جلوگیری از تکثیر میکروارگانیسم‌ها و گسترش عوامل بیماری‌زا، استفاده از این ترکیب‌ها به عنوان نگهدارنده در مواد غذایی است. روغن‌های انسانی دارای تأثیرات مختلف دارویی مانند برطرف کنندگی انقباض عضلات، ضد نفخ، محافظت از کبد، ضد ویروسی و ضد سرطانی نیز است [۴-۶]. آنتی‌اکسیدان‌ها ترکیب‌هایی است که محصولات فعل شیمیایی مانند رادیکال‌های آزاد آسیب‌رسان به بدن که در نتیجه متابولیسم تولید می‌شود را خشی می‌کند. فنل‌ها و پلی فنل‌های گیاهان به علت خاصیت آنتی‌اکسیدانی‌شان نقش مهمی در جلوگیری از شرایط بیماری‌های قبیل سرطان، بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های تخریب اعصاب مرتبط با استرس‌های اکسید کنندگی، ایفا می‌کند. این ترکیب‌ها دارای خواص آنتی‌اکسیدانی، ضد ویروسی، آنتی‌بیوتیکی، ضد توموری نیز هست [۵]. اکسیژن (Reactive Oxygen Species: ROS/ Reactive Nitrogen Species: RNS) به طور مداوم در بدن انسان تولید می‌شوند و توسط آنزیم‌های داخلی مانند سوپر اکسید دسموتاز (Superoxide Dismutase)، گلوتاتیون پراکسیداز (Glutathione Peroxidase) و کاتالاز کنترل می‌شود. زمانی که تولید این رادیکال‌ها بیش از حد باشد،

انتشار (Dilution Test) و رقت (Diffusion Test) استفاده شد که از میان روش‌های انتشار از روش دیسک پلیت (Disk-plate Method) و از میان روش‌های رقت از روش رقت لوله‌ای استفاده شد. مقدار ۳۰ میکرولیتر اسانس معادل یک میلی‌گرم در میلی‌لیتر با رقت‌های ۱/۸، ۱/۴، ۱/۲ و ۱ در ۵ میلی‌لیتر سوسپانسیون میکروبی در محیط کشت نوترینت براث (Nutrient Broth) ریخته و پس از هم زدن در انکوباتور به مدت ۲۴-۱۸ ساعت قرار داده شد و سپس به‌وسیله اسپکتروفوتومتر جمعیت میکروبی تعیین و در نتیجه حداقل غلظت مهار کنندگی (Minimal Inhibitory concentration: MIC) مشخص شد. سپس از هر کدام از لوله‌ها که رشد جمعیت نشان نداده بود، ۰/۱ میلی‌لیتر روی پلیت حاوی نوترینت آگار (Nutrient Agar) کشت داده شد و حداقل غلظت کشنده (Minimal Bactericidal concentration: MBC) ماده ضد میکروبی تعیین شد. برای مطالعه فعالیت (سیتیک) میکروب‌کشی اسانس پس از تعیین *MBC* از سوسپانسیون‌های میکروبی محتوی 10^7 سلول میکروبی تهیه و مقدار ۵۰ میکرولیتر اسانس در ۵ میلی‌لیتر سوسپانسیون ریخته شد و در فواصل زمانی صفر، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه، مقدار ۱۰ میکرولیتر از هر لوله برداشته شد و پس از رقیق‌سازی بر سطح محیط نوترینت آگار به‌طور یکنواخت گسترده و به مدت ۲۴ ساعت داخل انکوباتور گذاشته شد. سپس تعداد کلونی‌ها با کلونی شمار شمارش و با ضرب عکس رقت در تعداد کلونی‌ها تعداد باکتری‌های زنده در هر میلی‌لیتر سوسپانسیون تعیین شد. با استفاده از فعالیت (سیتیک) مرگ میکروبی ارزش (Decimal Reduction Value) (D) براساس زمان لازم برای کاهش ۹۰ درصد جمعیت میکروبی در نمونه محاسبه شد.

حالات مختلف که در انسان‌گیری یا رقیق‌سازی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد قبل از رقت‌های مختلف تهیه و تأثیر آنها روی میکروب‌های مورد مطالعه با روش‌های انتشار (Dimethyl Sulfoxide) DMSO و رقت آزمایش شد. متانول و تأثیر ضد میکروبی نداشتند و مورد استفاده رقیق‌سازی قرار

غیره [۱۴-۱۲]. با وجود این‌که برخی از روغن‌های انسانی دارای اندکی اثر سمی حاد است، استفاده از روغن‌های انسانی در خیلی از کشورها تحت کنترل نیست. با توجه به گسترش مصرف فرآورده‌های گیاهان دارویی در کشورمان لازم است که جوانب مختلف این محصولات به دلیل کاربردهای مفید و احیاناً ضررهای آن‌ها در سلامتی انسان مورد توجه قرار گیرد. (Thymus daenensis) به دلیل بومی بودن گونه آویشن دنایی (Thymus vulgaris) لازم است بعد مختلف زیست‌شنختی آن بررسی شود؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اسانس آویشن دنایی و مقایسه با اسانس آویشن تجاری (Commercial Thymus vulgaris) و ترکیب اصلی آن، تیمول برای اولین بار انجام شد.

۲- مواد و روش‌ها

۱-۲- اسانس آویشن دنایی

آویشن دنایی در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع شناسایی و اسانس‌گیری شد. اسانس تجاری آویشن از منابع تولیدی داخل کشور که در داروخانه‌ها به فروش می‌رسد تهیه شد. تیمول تولیدی شرکت مرک (Merck) آلمان مورد استفاده قرار گرفت.

۲-۲- سویه‌های میکروبی

میکوارگانیسم‌های مورد مطالعه به شرح زیر بودند: اشربیشیا کولی (Escherichia coli) (ATCC25922)، استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus)، سودوموناس آئروژینوزا (Pseudomonas aeruginosa) (ATCC 25923)، کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) (ATCC8830) و (ATCC 5027)

۳-۲- بررسی آثار ضد میکروبی

آثار ضد میکروبی با روش یادگاری‌نیا و همکاران (۲۰۰۶) انجام شد [۱۵]. برای مطالعه آثار ضد میکروبی از دو روش

Griess reagent (1 g/l *N*-(1-naphthyl) ethylene-diamine and 10 g/l sulphanilamide dissolved in 20

[ml/l aqueous H₃PO₄)

پس از ۴۰ دقیقه جذب در ۵۴۶ نانومتر اندازه‌گیری شد و درصد ممانعت با فرمول زیر محاسبه شد:

$$\text{درصد ممانعت} = \frac{\text{نمونه A} - \text{کنترل A}}{\text{کنترل A}} \times 100$$

۶-۲- تعیین سمیت سلولی اسانس

دو رده سلول سرطانی و سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی با روش MTT (3-(4,5-dimethylthiazolyl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) روش احیای MTT بهوسیله دی هیدروژنаз میتوکندری‌ها به محصول آبی فرمازان (Formazan) انجام می‌شود که نشان دهنده عملکرد طبیعی میتوکندری و حیات سلول است [۱۹]. پس از برداشت از فلاسک‌های کشت، سلول‌ها به تعداد ۵×۱۰^۴ تا ۱۰^۴ (براساس برنامه کشت هر سلول سرطانی) در پلیت‌های ۹۶ چاهکی محتوى ۱۰۰ میکرولیتر محیط کشت در هر چاهک انکوبه شدند. سلول‌ها برای چسبیدن ۲۴ ساعت زمان برداشت و پس از آن با رقت‌های مختلف اسانس به مدت ۴۸ ساعت مواجه شدند. ۲۰ میکرولیتر از ۵ میلی‌گرم در میلی‌لیتر MTT در سالین بافر فسفاته (Phosphate Buffered Saline: PBS) به هر چاهک اضافه شد و به مدت ۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شدند. سپس محیط تخلیه شد و ۱۰۰ میکرولیتر DMSO به هر چاهک اضافه شد. پس از ۱۰ دقیقه انکوباسیون در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد جذب شاهد (موجه شده با ۰/۱ درصد DMSO) و نمونه‌های (ELISA Reader) با طول موج ۵۷۰ نانومتر خوانده و ثبت شد. منحنی بقا (سلول‌های زنده) ترسیم شد و سمیت سلولی (Cytotoxicity) عبارت بود از غلظتی از ماده مورد آزمایش که مانع رشد ۵۰ درصد سلول‌ها (IC₅₀) شد. همه آزمون‌ها به صورت سه بار تکرار انجام شد.

گرفتند. در کلیه مراحل آزمایش‌ها از DMSO به عنوان شاهد مواد ضد میکروبی استفاده شد.

۶-۴- تعیین محتوای کل فنل (Total Phenolic Content: TPC)

با استفاده از روش کاکون (Kahkonen) و همکاران

[۱۶] فنل اسانس‌ها به شرح زیر سنجیده شد: ۳۰۰ میکرولیتر از نمونه در لوله آزمایش ریخته شده و ۱/۵ میلی‌لیتر محلول ده برابر رقیق فولین سیوکلتیوس لیتر (Folin-Ciocalteau's reagent) (رقت ۱۰×) و ۱/۲ میلی‌لیتر کربنات سدیم ۷/۵ درصد ریخته شد و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار گرفت و جذب در ۷۶۵ نانومتر سنجیده شد. فنل کل براساس معادل میلی‌گرم گالیک اسید در هر ۱۰۰ گرم نمونه بیان شد:

$$y = 0.0111x - 0.0148$$

($r^2 = 0.9998$ ضریب همبستگی)

۶-۵- فعالیت رادیکال‌زادایی نیتریک اکساید (Nitric Oxide Radical Scavenging)

قدرت رادیکال‌زادایی نیتریک اکساید اسانس‌ها با روش مارکوکسی (Marcocci) و همکارانش (۱۹۹۴) انجام شد [۱۷]. نیم میلی‌لیتر رقت هر اسانس یا کنترل مثبت حل شده در ۰/۵ میلی‌مول در هر لیتر KH₂PO₄-KOH (۵۰ میلی‌مول در هر لیتر، pH=۷/۴) با ۱۰ میلی‌لیتر محلول سدیم نیتروپروسید (Sodium Nitroprusside) مخلوط به مدت ۲/۵ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد در شرایط نور معمولی اتاق و سپس به مدت ۲۰ دقیقه در محیط تاریک نگهداری شد. پس از آن یک میلی‌لیتر محلول واکنشگر گریس (Griess reagent) با ترکیب زیر به آن اضافه شد:

یک گرم در لیتر ان-(۱-نفتیل) اتیلین دی آمین و ۱۰ گرم در لیتر سولفانامید محلول در ۲۰ میلی‌لیتر در لیتر اسید فسفریک

جدول ۱ تأثیر ضد میکروبی اسانس‌ها و تیمول بر اساس ایجاد هاله عدم رشد

هزار D در هر دقیقه	**MIC-MBC	۲/۵	۵	۱۰	میانگین هاله ممانعت رشد* و غلظت اسانس**	
					آویشن دنایی	آشريشيا كولي
۳/۵۷	۰/۰۸-۰/۰۴	۱۵±۱	۳۱±۲	۴۳/۶۷±۱/۱۵	آویشن دنایی	آشريشيا كولي
۷/۴۳	۵-۲/۵	۱۰/۷۷±۰/۵۸	۱۵±۱	۱۹/۷۷±۲/۵۲	آویشن تجاری	
۱۷/۱۴	۱۰-۵	۷/۲۳±۰/۵۸	۱۱±۱	۱۵/۶۷±۱/۱۵	تیمول	
۷/۴۳	۰/۱۶-۰/۰۸	۹/۳۳±۰/۵	۱۱±۰	۲۴±۱/۷	آویشن دنایی	استافيلوكوكوس
۱۷/۱۴	۱۰-۵	۹/۷۷±۰/۵	۱۴/۶۷±۰/۵	۱۵/۶۷±۱/۱۵	آویشن تجاری	آورئوس
۱۷/۷	۵-۲/۵	۱۱±۱	۱۳/۶۷±۱/۱۵	۱۷/۷۷±۰/۵۷	تیمول	
۷/۴۳	۵-۲/۵	۱۰/۷۷±۰/۵۸	۱۱/۶۷±۰/۵۸	۱۶/۷۷±۱/۱۵	آویشن دنایی	سودوموناس
۱۷/۱۴	۲۰-۱۰	۷/۷۷±۰/۵	۹±۱	۱۱±۱	آویشن تجاری	آتروژينوزا
۱۷/۷	۱۰-۵	*	۸/۳۳±۰/۵	۱۳±۱	تیمول	
۳/۵۷	۰/۰۴-۰/۰۲	۴/۸۳±۲	۵۵/۳±۱/۱۵	۳۳±۲/۶	آویشن دنایی	
۷/۴۳	۵-۲/۵	۱۳±۰/۵	۱۶±۰/۵	۲۰/۷۷±۰/۵	آویشن تجاری	کاندیدا آلبیکنس
۱۷/۱۴	۵-۲/۵	۱۳±۱	۱۶±۱	۲۰±۱	تیمول	

* بر حسب میلی متر

** بر حسب میلی گرم در هر میلی لیتر

جدول ۲ قدرت رادیکال‌زادایی نیتریک اکساید اسانس‌ها و تیمول

تیمول		اسانس آویشن تجاری		اسانس آویشن دنایی	
درصد رادیکال‌زادایی	مقدار اسانس (میکرو گرم)	درصد رادیکال‌زادایی	مقدار اسانس (میکرو گرم)	درصد رادیکال‌زادایی	مقدار اسانس (میکرو گرم)
۱۵/۳±۰/۴	۶۲/۵	۲۷/۴±۰/۳	۷/۸	۱/۵±۰/۱۳	۰/۵
۱۸/۰۶±۰/۳۱	۱۲۵	۴/۴۷±۰/۴	۱۵/۶۲۵	۸/۲۵±۰/۶	۱
۲۳/۷±۰/۰۵	۲۵۰	۴/۶۴±۰/۹	۳۱/۲۵	۱۴/۰۳±۰/۷۱	۲
۳۱/۴±۰/۶	۵۰۰	۴/۹۳±۰/۷	۶۲/۵	۴۰/۱±۰/۵	۴
۵۷/۱±۰/۸۴	۱۰۰۰	۵/۴۲±۰/۸	۱۲۵	۷۰/۶۴±۱/۴	۸
۸۶۳	(IC ₅₀ میکرو گرم)	۷۵	(IC ₅₀ میکرو گرم)	۵	(IC ₅₀ میکرو گرم)
۱۰/۳۳±۲/۳۱	(محتوا فتلی (µg/mg GAE*)	۱۷/۹۴±۲/۵۵	(محتوا فتلی (µg/mg GAE*)	۶۴/۴۰/۷±۱/۷۹	(محتوا فتلی (µg/mg GAE*)

*: میکرو گرم در هر میلی گرم معادل گالیک اسید

داد (جدول ۱). MIC و MBC اسانس‌ها در طیف ۰/۰۴ تا ۱۰ داد (جدول ۱). MIC و MBC اسانس‌ها در طیف ۰/۰۴ تا ۱۰ میکرو گرم در هر میلی لیتر قرار داشت. در رقت‌های تعیین شده در آزمایش MBC در برابر سوسپانسیون میکروبی قرار داده شد تا جنبش مرگ میکروبی و ارزش D به دست آید (جدول ۱). توانایی رادیکال‌زادایی نیتریک اکساید رقت‌های مختلف اسانس‌ها نشان داد که رادیکال‌زادایی نیتریک اکساید وابسته به دوز بوده و مقدار اسانس لازم برای ۵۰ درصد رادیکال‌زادایی نیتریک اکساید اسانس

۳- نتایج

نمای حساسیتی میکروارگانیسم‌ها در برابر اسانس آویشن دنایی، آویشن تجاری و تیمول بر اساس حساس‌ترین به مقاوم‌ترین سودوموناس آتروژینوزا > استافیلولکوکوس اورئوس > اشريشيا كولي > کاندیدا آلبیکنس بود. تیمول اثر ضد میکروبی بیشتری بر استافیلولکوکوس اورئوس در مقایسه با اشريشيا كولي داشت. اسانس‌ها خاصیت کشندگی و مهار کشندگی میکروبی خوبی نشان

مختلف اسانس آویشن دنایی، اسانس تجاری و تیمول بر سلول‌های طبیعی انسان به صورت ۵۰ درصد غاظت ممانعت (IC₅₀) به ترتیب ۱۴۵۵، ۱۲/۱۰ و ۲۸۶۷ میکروگرم (جدول ۳) و این سمیت در خصوص سلول‌های سرطانی به ترتیب ۴/۹۵، ۳/۶۱ و ۱۷۳۰ میکروگرم (جدول ۴) بود.

آویشن دنایی، اسانس تجاری و تیمول به ترتیب ۵، ۷۵ و ۸۶۳ میکروگرم بود (جدول ۲). فنل کل اسانس‌های آویشن دنایی، اسانس تجاری و تیمول به ترتیب معادل ۶۴۴/۰۷±۶/۷۹ و ۱۰/۳۳±۲/۳۱ ۱۶/۹۴±۲/۵۵ میکروگرم گالیک اسید در هر میلی‌گرم نمونه تعیین شد (جدول ۲). سمیت سلولی رقت‌های

جدول ۳ سمیت سلولی رقت‌های مختلف اسانس‌های آویشن و تیمول بر سلول‌های طبیعی انسان

آویشن دنایی (میکروگرم در هر میلی‌لیتر)	درصد مرگ لنفوسيت‌ها (میکروگرم در هر میلی‌لیتر)	آویشن تجاری (میکروگرم در هر میلی‌لیتر)	درصد مرگ لنفوسيت‌ها (میکروگرم در هر میلی‌لیتر)	آویشن دنایی (میکروگرم در هر میلی‌لیتر)	درصد مرگ لنفوسيت‌ها (میکروگرم در هر میلی‌لیتر)
شاهد	شاهد	شاهد	شاهد	شاهد	شاهد
۲۸/۴۵	۲۵	۸/۲۵	۰/۲۵	۱۶/۱۵	۵۰
۳۳/۵۱	۵۰	۱۵/۲۱	۰/۵	۲۲/۳۵	۱۰۰
۳۸/۳۶	۱۰۰	۳۰/۵۵	۱	۳۰/۰۹	۲۰۰
۳۹/۴۴	۲۰۰	۳۵/۴۲	۲	۳۴/۷۶	۴۰۰
۴۷/۶۳	۲۰۰۰	۴۱/۱۱	۴	۴۱/۱۸	۸۰۰
۵۴/۳۱	۴۰۰۰	۴۶/۸۱	۱۰	۵۲/۶۲	۱۶۰۰
۲۸۶۷ میکروگرم	IC ₅₀	۱۲/۱۰ میکروگرم	IC ₅₀	۱۴۵۵ میکروگرم	IC ₅₀

جدول ۴ سمیت سلولی رقت‌های مختلف اسانس‌های آویشن و تیمول بر سلول‌های سرطانی انسان

آویشن دنایی (میکروگرم در هر میلی‌لیتر)	درصد مرگ لنفوسيت‌ها (میکروگرم در هر میلی‌لیتر)	آویشن تجاری (میکروگرم در هر میلی‌لیتر)	درصد مرگ لنفوسيت‌ها (میکروگرم در هر میلی‌لیتر)	آویشن دنایی (میکروگرم در هر میلی‌لیتر)	درصد مرگ لنفوسيت‌ها (میکروگرم در هر میلی‌لیتر)
شاهد	شاهد	شاهد	شاهد	شاهد	شاهد
۴۰/۰۳	۵۰	۳۲/۷۴	۰/۵	۲۲/۰۳	۰/۵
۴۲/۶۷	۱۰۰	۳۷/۷۲	۱	۲۸/۶۱	۱
۴۵/۶۳	۲۰۰	۴۳/۴۶	۲	۳۴/۶۸	۲
۵۱/۵۷	۲۰۰۰	۵۱/۱۸	۴	۴۹/۱۱	۴
۶۳/۱۰	۴۰۰۰	۶۷	۲۰	۷۵/۹۵	۱۰
۱۷۳۰ میکروگرم	IC ₅₀	۳/۶۱ میکروگرم	IC ₅₀	۴/۹۵ میکروگرم	IC ₅₀

مسومومیت‌های غذایی گزارش شده است. فعالیت ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی اعضای جنس آویشن به‌ویژه یکی از مهم‌ترین آن‌ها تیموس ولگاریس (*Thymus vulgaris*) به‌طور گستردۀ گزارش شده است [۲۰]. خاصیت ضد میکروبی روغن‌های انسانی و عصاره مثانولی به‌دست آمده از قسمت‌های هوایی تیموس ولگاریس و بذر پینپنلا آئیسوم (*Pimpinella anisum*) به صورت مجزا و ترکیبی علیه ۹ باکتری بیماری‌زا گرم مثبت و

۴- بحث

در این مطالعه فعالیت ضد باکتریایی اسانس‌های آویشن دنایی، آویشن تجاری و ترکیب شیمیایی اصلی آویشن، تیمول توسط روش‌های انتشار در آگار و رقت‌های مایع ارزیابی شد و نتایج نشان داد که اسانس‌ها دارای پتانسیل‌های ضد میکروبی بالایی است. فعالیت ضد میکروبی روغن انسانی بعضی از گونه‌های آویشن علیه خیلی از باکتری‌های مولد فساد و

(*Thymus algeriensis*) نشانگر اثر مثبت انسان‌ها عليه میکروارگانیسم‌های مورد آزمایش، بهویژه کاندیدا آلبیکننس بوده است [۲۲]. نتایج مطالعه حاضر تأیید کننده این گزارش بوده و نشان می‌دهد که کاندیدا آلبیکننس حساس‌ترین میکروارگانیسم به تأثیر انسان‌های آویشن دنایی و تجاری به ترتیب با MBC ۰/۰۴ و ۵ میلی گرم و ارزش D برابر ۳/۵۷ و ۶/۴۳ دقیقه است. با توجه به خاصیت ضد میکروبی روغن‌های انسانی، به دلیل فتل‌های موجود در انسان [۲۴]، تیمول به عنوان مهم‌ترین فتل موجود در انسان‌های گیاهی، روغن‌های انسانی منابع ارزان ضد باکتریایی بوده و قابلیت استفاده در سیستم‌های بیماری‌زا را دارد [۲۲].

رادیکال‌زدایی نیتریک اکساید انسان‌ها نشان داد که انسان آویشن دنایی با ۳۸ برابر فتل بیشتر نسبت به انسان آویشن تجاری دارای IC₅₀ ۵ و ۷۵ میکروگرم انسان به ترتیب در آویشن دنایی و آویشن تجاری است. تحقیقات اخیر اکنون به دنبال یافتن آنتی‌اکسیدان‌هایی با منشأ گیاهی است. خاصیت آنتی‌اکسیدانی فتل‌ها بیشتر به دلیل خواص اکسیداسیون و احیا آن‌هاست که به آن‌ها امکان عملکرد به عنوان مواد احیا کننده و اهدا کننده هیدروژن را داده و نیز آن‌ها پتانسیل همبند (کلاته) کردن فلزات را دارند [۲۵]. فتل‌ها و فلاونوئیدهای گیاهی ممانعت پراکسیداسیون لیپید را با فرونشانی رادیکال‌های پروکسی و احیا یا همبند (کلاته) کردن آهن در آنزیم لیپراکسیداسیون لیپید، انجام نهایت ممانعت از شروع واکنش پراکسیداسیون لیپید، انجام می‌دهند [۲۶]. تفاوت در فعالیت آنتی‌اکسیدانی می‌تواند مربوط به توانایی زدودن رادیکال‌های پروکسی، رادیکال‌های آزاد و رادیکال‌های هیدروکسی باشد [۲۷].

یک بررسی نشان داده است فعالیت آنتی‌اکسیدانی اوگنول (Eugenol)، تیمول، کارواکرول و ۴-آلیل فتل (4-allylphenol) موجود در روغن‌های انسانی برگ‌های تیموس و لگاریس نسبت به سایر ترکیب‌های آزمایش شده قوی‌تر است؛ به طوری که همه آن‌ها در مقدار ۵ میکروگرم به مدت ۳۰ روز تقریباً ۱۰۰ درصد از اکسیداسیون هگزانال (Hexanol Oxidation) جلوگیری کردند. به این ترتیب فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن‌ها قابل

گرم منفی: باسیلوس سرئوس (*Bacillus cereus*) استافیلکوکوس اورئوس، اشریشیا کولی، پروتئوس ولگاریس (*Proteus mirabilis*، *Proteus vulgaris*، پروتئوس میراپیلیس)، سالمونلا تیفی موریوم (*Salmonella typhi*)، سالمونلا پنومونیه (*Salmonella typhimurium*)، کلیسیلا پنومونیه (*Klebsiella pneumoniae*) و سودوموناس آئروژینوزا، ارزیابی شده است. این مواد فعالیت ضد میکروبی قابل قبولی علیه بیماری‌ Zahahی مورد استفاده در روش رقت لوله‌ای دارد. بیشترین فعالیت روغن‌های انسانی و عصاره مтанولی تیموس و لگاریس (MIC ۱۵/۶) بر علیه استافیلکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و پروتئوس ولگاریس مشاهده شده است. ترکیب روغن‌های انسانی و عصاره مtanولی فعالیت فراینده‌ای را علیه بیماری‌ Zahahی مورد استفاده بهویژه سودوموناس آئروژینوزا نشان داده است [۲۱]. نتایج مطالعه حاضر ضمن تأیید گزارش فوق، در برابر استافیلکوکوس اورئوس با MIC ۵ میلی گرم بر انسان تیموس و لگاریس برتری دارد. بررسی فعالیت ضد میکروبی انسان‌ها و ترکیب‌های مهم به دست آمده از مراحل رویشی، گل‌دهی، جوانه‌زنی گل، دانه‌دهی تیموس کارامانیکوس (*Thymus caramanicus*) بر علیه هفت باکتری گرم مثبت و گرم منفی به وسیله روش انتشار در آگار و تعیین MIC نشان داده است که ناحیه ممانعت و میزان MIC برای سویه‌های باکتریایی که به روغن انسانی آویشن حساس بودند به ترتیب ۳۶-۱۵ میلی‌متر و ۱۵-۰/۵ میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر است. روغن‌های انسانی به دست آمده فعالیت ضد باکتریایی خوبی علیه تمام باکتری‌های ذکر شده داشتند و باسیلوس سوتیلیس و سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب حساس‌ترین و مقاوم‌ترین سویه‌ها بودند [۲۲]. در این مطالعه نیز سودوموناس آئروژینوزا مقاوم‌ترین میکروارگانیسم بوده و ارزش D آن در برابر انسان آویشن دنایی، آویشن تجاری و تیمول به ترتیب ۱۷/۱۴، ۶/۷۴۳ و ۱۷/۷ دقیقه بود.

فعالیت‌های ضد میکروبی انسان‌های به دست آمده از سه گونه تیموس پالسنس (*Thymus pallescens*)، تیموس درآتنسیس (*Thymus dréatensis*) و تیموس آجرینسیس

است. بنابراین روغن‌های اسانسی آویشن به عنوان ترکیب طبیعی نگهدارنده در صنعت غذایی استفاده می‌شود [۳۳]. بنابراین بهره‌گیری از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی با پتانسیل حفاظت انسان از آسیب‌های ایجاد شده به وسیله استرس‌های اکسید کنندگی تشدید شده است [۳۴] و روغن‌های اسانسی سرشار از تیمول و کارواکرول با خاصیت آنتی‌اکسیدانی قوی [۳۵] می‌تواند به این منظور مورد استفاده قرار شود.

سمیت سلوالی رقت‌های مختلف اسانس آویشن دنایی، آویشن تجاری و تیمول بر سلول‌های طبیعی انسان به صورت ۵۰ درصد غلظت ممانعت (IC_{50}) به ترتیب ۱۴۵۵، ۱۲/۱۰ و ۲۸۶۷ میکروگرم و این سمیت در خصوص سلول‌های سرطانی به ترتیب ۴/۹۵ و ۳/۶۱ و ۱۷۳۰ میکروگرم بود. اسانس‌ها غنی از فنلهای مونوتربنیوئیدی (Monoterpene Phenols) به‌ویژه تیمول و کارواکرول است [۳۶]. هر دو ترکیب توانایی تجزیه غشای بیرونی را داشته و به صورت وابسته به دوز خاصیت مهاری بر زنده ماندن و تکثیر سلول‌های Hep-2 (لایه سلول سرطانی انسانی پوششی) را دارند [۳۸]. نتایج این مطالعه از نظر خاصیت آنتی‌اکسیدانی و شیمی درمانی ضد نئوپلاستی (Anti-neoplastic Chemotherapy) دارای اهمیت است و می‌تواند پایه یک تحقیق ارزشمند دیگر قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد که اسانس آویشن باید پس از تعیین دوز مورد مصرف قرار گیرد. با توجه به تأثیر منفی مقدار کم اسانس آویشن بر سلول‌های سالم خون محیطی می‌توان تأثیر خوراکی این اسانس را مورد توجه قرار داد و با مد نظر قرار دادن خاصیت کشندگی سلول‌های سرطانی اسانس در مقاییر کم اسانس می‌توان نتیجه گرفت که در مبارزه با سلول‌های سرطانی، اسانس‌های آویشن آسیبی بر سلول‌های طبیعی نمی‌رساند. در مجموع مطالعه خواص زیست‌شناختی اسانس آویشن نشان می‌دهد که این فراورده قابلیت خوبی برای بررسی کاربرد آن در صنعت غذا و دارو دارد.

۵- تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مرکز

مقایسه با آنتی‌اکسیدان‌های مشهور مانند آلفا- توکوفرول (α -Tocopherol) و بوتی‌لیتید هیدروکسی تولوئن (Butylated hydroxytoluene: BHT) احتمالی آنتی‌اکسیدانی اسانس‌های به دست آمده از گونه‌های تیموس پالسنس، تیموس در آتنسیس و تیموس آجرینسیس نشانگر فعالیت قوی زدودن رادیکال هیدروکسیل توسط دو شیمیوتیپ جدید از تیموس آجرینسیس (IC_{50} = ۳/۳-۲/۲ میکروگرم در هر میلی‌لیتر) بوده است؛ اما در مورد رادیکال‌های دیگر، فعالیت رادیکال‌زدایی ضعیف یا صفر و قدرت احیا کنندگی نیز ضعیف بوده است. با وجود تشابه شیمیابی اسانس‌های گونه‌های آویشن، گاهی تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای در فعالیت آنتی‌اکسیدانی مشاهده می‌شود [۲۳]. در این مطالعه اسانس‌های آویشن از تیمول قوی‌تر عمل کرد که می‌تواند بیانگر قدرت هم‌افزایی ترکیب‌های شیمیابی اسانس‌ها باشد. در حالت کلی خاصیت آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی روغن‌های اسانسی مربوط به حضور ترکیب‌های فنلی بوده که قادر به دادن هیدروژن به رادیکال است. گزارش‌های متعددی همبستگی خوب بین خاصیت آنتی‌اکسیدانی و محتوای فنلی را نشان می‌دهد. تعداد زیادی از ترکیب‌های فنلی ساده همانند می‌تواند به عنوان آنتی‌اکسیدان عمل کند، با این وجود قدرت آنتی‌اکسیدانی آن‌ها وابسته به برخی ساختارهای پیش‌نیاز، به‌ویژه تعداد و آرایش گروه‌های هیدروکسیل، میزان کونژوگاسیون ساختاری و حضور واحدهای دهنده و گیرنده الکترون در ساختار حلقه است [۲۹]. در این مطالعه آویشن دنایی دارای محتوای فنل تام بیشتری نسبت به اسانس آویشن تجاری بود. نتایج نشان دهنده ارزش غذایی این گونه گیاهان به‌ویژه قابلیت تیمول در پیشگیری از تشکیل محصولات سمی اکسیژن واکنش گر (ROS) بوده‌اند [۳۰، ۳۱]. افزایش سطح نیتریک اکساید در شرایط خاص اسپاسمی مانند التهاب آرژیک (Respiratory Distress Syndrome) و آسم دیده می‌شود [۳۲]. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که آویشن می‌تواند مستقیماً NO و O_2^- را بزداید که این امر تأیید کننده آنتی‌اکسیدان بودن آن در حد بسیار خوب

این طرح امکان عملی شدن آن را فراهم آوردند اعلام می‌داریم.

تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد که با تأمین هزینه‌های

۶- منابع

- [1] Loziene K, Venskutonis PR, Sipailiene A, Labokas J. Radical scavenging and antibacterial properties of the extracts from different *Thymus pulegioides* L. chemotypes. Food Chem 2007; 103(2): 546-59.
- [2] Soliman KM, Badeaa RI. Effect of oil extracted from some medicinal plants on different mycotoxicogenic fungi. Food Chem Toxicol 2002; 40(11): 1669-75.
- [3] Lambert RJ, Skandamis PN, Coote PJ, Nychas GJ. A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol. J Appl Microbiol 2001; 91(3): 453-62.
- [4] Lahoul M. Essential oils and fragrance compounds: bioactivity and mechanisms of action. Flavour Fragr J 2004; 19: 159-65.
- [5] Apak R, Güçlü K, Demirata B, Ozyürek M, Celik SE, Bektaşoğlu B, Berker KI, Ozyurt D. Comparative evaluation of various total antioxidant capacity assays applied to phenolic compounds with the CUPRAC assay. Molecules 2007; 12(7): 1496-547.
- [6] Oke F, Aslim B, Ozturk S, Altundag S. Essential oil composition, antimicrobial and antioxidant activities of *Satureja cuneifolia* Ten. Food Chem 2009; 112(4): 874-9.
- [7] Madsen HL, Bertelsen G. Spices as antioxidants. Trends Food Sci Technol 1995; 6(8): 271-7.
- [8] Yang Y, Huang CY, Peng SS, Li J. Carotenoid analysis of several dark-green leafy vegetables associated with a lower risk of cancers. Biomed Environ Sci 1996; 9(4): 386-92.
- [9] Tepe B, Sokmen M, Akpulat HA, Daferera D, Polissiou M, Sokmen A. Antioxidative activity of the essential oils of *Thymus sspyleus* subsp. *sipyleus* var. *sipyleus* and *Thymus sspyleus* subsp. *sipyleus* var. *rosulans*. J Food Eng 2005; 66(4): 447-54.
- [10] Safaei-Ghomi J, Ebrahimabadi AH, Djafari-Bidgoli Z, Batooli H. GC/MS analysis and in vitro antioxidant activity of essential oil and methanol extracts of *Thymus caramanicus* Jalas and its main constituent carvacrol. Food Chem 2009; 115(4): 1524-8.
- [11] Venskutonis PR. Food additives: The dilemma of synthetic or natural. Acta Aliment 2004; 33(1): 1-5.
- [12] Rustaiyan A, Masoudi S, Monfared A, Kamalinejad M, Lajevardi T, Sedaghat S, Yari M. Volatile constituents of three *Thymus* species grown wild in Iran. Planta Med 2000; 66(2): 197-8.
- [13] Sefidkon F, Dabiri M, Rahimi-Bidgoly A. The effect of distillation methods and stage of plant growth on the essential oil content and composition of *Thymus kotschyana* Boiss. and Hohen. Flavour Fragr J 1999; 14: 405-8.
- [14] Sefidkon F, Jamzad Z, Yavari-Behrouz R, Sharsh DN. Essential oil composition of *Thymus kotschyana* boiss. and Hohen from Iran. J. Essent. Oil Res. 1999; 11: 459-60.
- [15] Yadegarinia D, Gachkar L, Rezaei MB, Taghizadeh M, Astaneh SA, Rasooli I.

- Biochemical activities of Iranian *Mentha piperita* L. and *Myrtus communis* L. essential oils. *Phytochemistry* 2006; 67(12): 1249-55.
- [16] Kähkönen MP, Hopia AI, Vuorela HJ, Rauha JP, Pihlaja K, Kujala TS, Heinonen M. Antioxidant activity of plant extracts containing phenolic compounds. *J Agric Food Chem* 1999; 47(10): 3954-62.
- [17] Marcocci L, Maguire JJ, Droy-Lefaix MT, Packer L. The nitric oxide-scavenging properties of *Ginkgo biloba* extract EGb 761. *Biochem Biophys Res Commun* 1994; 201(2): 748-55.
- [18] Plumb JA, Milroy R, Kaye SB. Effects of the pH dependence of 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide-formazan absorption on chemosensitivity determined by a novel tetrazolium-based assay. *Cancer Res* 1989; 49(16): 4435-40.
- [19] Lau CB, Ho CY, Kim CF, Leung KN, Fung KP, Tse TF, Chan HH, Chow MS. Cytotoxic activities of *Coriolus versicolor* (Yunzhi) extract on human leukemia and lymphoma cells by induction of apoptosis. *Life Sci* 2004; 75(7): 797-808.
- [20] Dob T, Dahmane D, Benabdelkader T, Chelghoum C. Composition and antimicrobial activity of the essential oil of *Thymus fontanesii*. *Pharm Biol* 2006; 44(8): 607-12.
- [21] Al-Bayati FA. Synergistic antibacterial activity between *Thymus vulgaris* and *Pimpinella anisum* essential oils and methanol extracts. *J Ethnopharmacol* 2008; 116(3): 403-6.
- [22] Nejad Ebrahimi S, Hadian J, Mirjalili MH, Sonboli A, Yousefzadi M. Essential oil composition and antibacterial activity of *Thymus caramanicus* at different phenological stages. *Food Chem* 2008; 110: 927-31.
- [23] Hazzit M, Baaliouamer A, Veríssimo AR, Faleiro ML, Miguel MG. Chemical composition and biological activities of Algerian *Thymus* oils. *Food Chem* 2009; 116(3): 714-21.
- [24] Sefidkon F, Jamzad Z, Mirza M. Chemical variation in the essential oil of *Satureja sahendica* from Iran. *Food Chem* 2004; 88(3): 325-8.
- [25] Rice-Evans CA, Miller NJ, Bolwell PG, Bramley PM, Pridham JB. The relative antioxidant activities of plant-derived polyphenolic flavonoids. *Free Radic Res* 1995; 22(4): 375-83.
- [26] Torel J, Cillard J, Cillard P. Antioxidant activity of flavonoids and reactivity with peroxy radical. *Phytochemistry*. 1986; 25(2): 383-5.
- [27] Singh G, Marimuthu P, Murali HS, Bawa AS. Antioxidative and antibacterial potentials of essential oils and extracts isolated from various spice materials. *J Food Safety* 2005; 25(2): 130-45.
- [28] Lee SJ, Umano K, Shibamoto T, Lee KG. Identification of volatile components in basil (*Ocimum basilicum* L.) and thyme leaves (*Thymus vulgaris* L.) and their antioxidant properties. *Food Chem* 2005; 91(1): 131-7.
- [29] Miliauskas G, van Beek TA, de Waard P, Venskutonis RP, Sudhölter EJ. Identification of radical scavenging compounds in Rhaponticum carthamoides by means of LC-DAD-SPE-NMR. *J Nat Prod* 2005; 68(2): 168-72.

- [30] Cavar S, Maksimovic M, Solic ME, Jerkovic-Mujkic A, Besta R. Chemical composition and antioxidant and antimicrobial activity of two *Satureja* essential oils. *Food Chem* 2008; 111(3): 648-53.
- [31] Prieto JM, Iacopini P, Cioni P, Chericoni S. In vitro activity of the essential oils of *Origanum vulgare*, *Satureja montana* and their main constituents in peroxynitrite-induced oxidative processes. *Food Chem* 2007; 104(3): 889-95.
- [32] Ashutosh K. Nitric oxide and asthma: a review. *Curr Opin Pulm Med* 2000; 6(1): 21-5.
- [33] Curtis OF, Shetty K, Cassagnol G, Peleg M. Comparison of the inhibitory and lethal effects of synthetic versions of plant metabolites (anethole, carvacrol, eugenol, and thymol) on a food spoilage yeast (*Debaromyces hansenii*). *Food Biotechnol* 1996; 10(1): 55-73.
- [34] Scalbert A, Manach C, Morand C, Rémesy C, Jiménez L. Dietary polyphenols and the prevention of diseases. *Crit Rev Food Sci Nutr* 2005; 45(4): 287-306.
- [35] Dapkevicius A, Venskutonis R, Van Beek TA, Linssen PH. Antioxidant activity of extracts obtained by different isolation procedures from some aromatic herbs grown in Lithuania. *J Sci Food Agri* 1998; 77: 140-6.
- [36] Nickavar B, Mojab F, Dolat-Abadi R. Analysis of the essential oils of two *Thymus* species from Iran. *Food Chem* 2005; 90(4): 609-11.
- [37] Bounatirou S, Smiti S, Miguel MG, Faleiro L, Rejeb MN, Neffati M, Costa MM, Figueiredo AC, Barroso JG, Pedro LG. Chemical composition, antioxidant and antibacterial activities of the essential oils isolated from Tunisian *Thymus capitatus* Hoff. et Link. *Food Chem* 2007; 105: 146-55.
- [38] Stammati A, Bonsi P, Zucco F, Moezelaar R, Alakomi HL, von Wright A. Toxicity of selected plant volatiles in microbial and mammalian short-term assays. *Food Chem Toxicol* 1999; 37(8): 813-23.