

# تولید روتاویروس گاوی بازآرایی شده از طریق تکثیر آن با نسبت بالای عفونت‌زایی ویروس به سلول در کشت سلول و تکثیر ژن‌های غیر ساختمانی با روش RT-PCR

الهام احمدی<sup>۱</sup>، حوریه سلیمان‌جاهی<sup>۲\*</sup>، مجید صادقی زاده<sup>۳</sup>، علی قیموري<sup>۴</sup>

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ویروس‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
۲- دانشیار، گروه ویروس‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
۳- استاد، گروه ژنتیک مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
۴- دانشجوی دکتری تخصصی، گروه ویروس‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

\*آدرس نویسنده مسئول: ایران، تهران، کدپستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۶، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه ویروس‌شناسی  
Email: soleim\_h@modares.ac.ir

دریافت مقاله: ۹۱/۰۷/۰۲ پذیرش مقاله: ۹۱/۰۹/۲۲

## چکیده

هدف: گروه A روتاویروس، مهم‌ترین عامل ویروسی گاستروانتریت و اسهال شدید در نوزادان و کودکان و مسئول حدود ۶۰۰ تا ۸۷۰ هزار مرگ در سال است، بنابراین تشخیص و درمان این بیماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بازآرایی ژن‌ها طی پاساژهای متوالی ویروس با نسبت بالای عفونت‌زایی در کشت سلول و همچنین در عفونت‌های مزمن در بیماران با نقص ایمنی تشخیص داده شده است. در این مطالعه روش RT-PCR برای ردیابی، تشخیص و تکثیر ژن‌های روتاویروس استاندارد و بازآرایی شده راهاندازی شده است.

مواد و روش‌ها: RNA روتاویروس از ردۀ سلولی MA-104 آلوه استخراج شد و حضور ژنوم توسط الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید ۱۰ درصد و رنگ‌آمیزی نیترات نقره، مشخص شد. تکثیر توالی کامل ژن‌های کد کننده ۳ NSP1، 2، 3، با واکنش RT-PCR برای روتاویروس استاندارد و بازآرایی شده، با آغازگرهای اختصاصی انجام گرفت.

نتایج: بازآرایی در ژن‌های ۳ NSP1، با تغییر الگوی مهاجرت این قطعات در ژل، توسط الکتروفورز در ژل پلی آکریل آمید نشان داده شد. طول کامل محصولات ژن‌های کد کننده ۳ NSP1، 2، 3 برای روتاویروس استاندارد و بازآرایی شده تکثیر شد و برای تعیین توالی ارسال شد. نتایج، شکل‌گیری قطعات ژنومی بازآرایی شده، طی پاساژ متوالی روتاویروس گاوی سویۀ RF را نشان داد.

نتیجه‌گیری: تکثیر متوالی ویروس با نسبت بالای عفونت‌زایی در کشت سلول و همچنین غفرنات‌های مزمن در گروه‌های هدف با نقص ایمنی در تکامل آن نقش دارد و از طرف دیگر روش‌های استفاده شده برای تعیین ویژگی به طور مداوم در حال تحول و تعریف مجدد است. با در نظر گرفتن تحقق موقفيت مطالعات روتاویروس و اهمیت زیاد توسعه واکسن‌های روتاویروسی، مطالعه بیشتر جزئیات بازآرایی و جمع‌آوری داده برای فهم بهتر ویژگی‌های آنتی‌ژنیک و مولکولی ویروس لازم است. مطالعه حاضر اهمیت تنوع ژنتیکی را نشان داده و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در زمینه تکثیر، تنوع، زیست‌شناسی و تکامل روتاویروس را فراهم نماید.

کلیدواژگان: روتاویروس، گاستروانتریت، بازآرایی، تعیین توالی

مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب‌شناسی زیستی، دوره ۱۵، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحات: ۹-۱

## تولید روتاویروس گاوی بازآرایی شده از طریق تکثیر ویروس با نسبت بالای عفونت‌زاگی

### مقدمه

RNA قطعه قطعه نیز وقوع چنین رخدادی مطرح است، بنابراین امکان مطالعه تشخیص توالی‌های مؤثر در زمینه بازآرایی، فراهم شده و می‌تواند در ردیابی گونه‌های متعدد (Quasispecies) روتاویروس و ویروس‌های دیگر با ژنوم RNA قطعه قطعه و نیز تعیین فاکتورهای مؤثر در گرایش بافتی، حدت (Virulence) و تعاملات ویروس و میزان، گسترش یابد [۱۰، ۱۱].

## مواد و روش‌ها

### کشت سلول و تکثیر ویروس

در این مطالعه تجربی سلول MA-104 برای کشت روتاویروس گاوی (Bovine Rotavirus) سوش RF استفاده شد. این سلول از کلیه میمون رزوس ماکاک، منشأ گرفته و از نوع سلول‌های پوششی است. این سلول از بانک سلول انسنتیو پاستور ایران دریافت شد و در محیط کشت DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) (Gibco، آمریکا) حاوی آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین (Penicillin) ۱۰۰ واحد در هر میلی‌لیتر) استرپتومایسین (Streptomycin) (Fetal Bovine Serum) FBS (۱۰ درصد کشت داده شد. بعد از مدت ۴۸ ساعت سلول‌ها به ۱۰۰ درصد تلاقي (Confluence) رسیدند و برای کشت ویروس آماده شدند [۱۲]، سپس برای فعال شدن ویروس روتای گاوی (RF)، از تریپسین (Pancreatic Trypsinase Type IX) (Sigma، آلمان) با غلاظت ۱۰ میکروگرم در هر میلی‌لیتر استفاده شد و در فلاسک ۲۵ سانتی‌متر مربعی حاوی محیط بدون سرم کشت داده شد و در گرخانه ۳۷ درجه سانتی‌گراد حاوی ۵ درصد  $\text{CO}_2$  نگهداری شد [۱۳-۱۷].

### استخراج RNA ویروس

سلول‌ها در پاسازهای پشت سرهم با ویروس، عالیم تحریب سلولی (Cytopathic) را نشان دادند. برای استخراج

گروه A روتاویروس (Rotavirus) از اعضای خانواده رئوویریده (Reoviridae) و علت اصلی بیماری گاستروانتریتیت حاد (Acute Gastroenteritis) در انسان و حیوانات اهلی در بیشتر نقاط دنیا است. اعضای جنس روتاویروس بدون پوشش و دارای ژنوم RNA دو رشته‌ای ۱۱ قطعه‌ای، درون سه پوسته پروتئینی هستند. الگوی ژنومی روتاویروس به خوبی نمایش و تعریف شده است؛ با این حال برخی از روتاویروس‌های گروه A الگوی الکتروفورزی جدید و غیرمعمولی را نشان می‌دهند که قطعه استاندارد در آن‌ها توسط قطعه نوتریتیب و بازآرایی شده که اغلب اندازه بزرگ‌تری دارند، جایگزین می‌شود و علاوه بر روتاویروس انسانی در گونه‌های متعدد حیوانی نیز رخ می‌دهد. جداسازی روتاویروس از نمونه‌های متوالی مدفعی از کودکان مبتلا به فرم مزمم Severe Combined SCID (Immunodeficiency)، نوترکیبی روتاویروس به شکل بازآرایی را نشان می‌دهد. بنابراین حضور و ظهور الگوهای الکتروفوروتایپ (Electrophoretotype) مجزا، از جنبه تشخیصی اهمیت دارد که با الکتروفورز و رنگ‌آمیزی نیترات نقره قابل مشاهده است [۶-۱].

پاسازهای (Passages) پیاپی در شرایط آزمایشگاه و با نسبت بالای عفونت‌زاگی (High Multiplicity of Infection) یکی از عوامل تأثیرگذار در ایجاد این ذرات نوتریتیب است که گاهی در تکثیر روتاویروس اتفاق می‌افتد. بازآرایی یک مکانیسم افزاینده یا کاهنده در اندازه قطعات ژنومی یا طول ژنوم است که در اثر تکثیر بخشی از توالی ژنوم ویروس رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد در بیشتر ویروس‌های دارای ژنوم RNA دو رشته‌ای و قطعه قطعه، امکان پذیر باشد [۹-۷]. بررسی قطعات بازآرایی شده به دلیل نبودن توالی کامل ژنوم با موفقیت همراه نبوده است. به نظر می‌رسد با فراهم شدن امکان تعیین توالی کامل ژنوم یا حداقل برخی از قطعات ژنی روتاویروس، مطالعه در زمینه بازآرایی و تعیین قطعات تغییر یافته، میسر شود. با توجه به این که در سایر ویروس‌های با ژنوم

(National Center Biotechnology Information) موجود بود، طراحی و توسط شرکت EUROFINS (انگلستان) ساخته شد (جدول ۱).

واکنش PCR در حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر با استفاده از ۰/۵ میکرولیتر از هر آغازگر، ۲/۵ میکرولیتر بافر PCR (۵x)، ۰/۵ میکرولیتر از هر dNTP، ۰/۳ میکرولیتر آنزیم Taq DNA Polymerase و ۲ میکرولیتر از الگو DNA (ژن‌های محصول واکنش RT) انجام شد. شرایط واکنش به صورت ابتدا ۵ دقیقه در ۹۵ درجه سانتی‌گراد، ۳۰ ثانیه در ۹۴ درجه سانتی‌گراد، ۳۰ ثانیه در ۶۵ درجه سانتی‌گراد، ۵ دقیقه در ۷۲ درجه سانتی‌گراد برای ۳۵ چرخه و در نهایت ۷ دقیقه در ۷۲ درجه سانتی‌گراد بود. نکته قابل توجه این است که به دلیل مستعد بودن ژنوم برای تشکیل ساختارهای ثانویه، مرحله تکثیر ژنوم با مقادیر مختلف بتائین (Betaine) ۱/۸، ۱/۴، ۰/۸ و ۲ مولار بهینه‌سازی شد که ۱/۸ مولار به عنوان مقدار بهینه در نظر گرفته شد.

ژنوم دو رشته‌ای RNA ویروس سویه RF بازآرایی شده و استاندارد استخراج شده، براساس نسخه‌برداری معکوس، ابتدا رونویسی معکوس شد. سپس در فرآیند PCR با استفاده از کیت RT-PCR Two-step RT-PCR (Vivantis، مالزی) و آغازگرهای سنتز شده، DNA های دو رشته‌ای تکثیر داده شد و طول کامل cDNA از RNA دو رشته‌ای خالص شده به دست آمد. محصولات PCR فوق توسط کیت استخراج DNA (Qiagen) آلمان) از ژل آگارز ۱/۵ درصد تخلیص و برای تعیین توالی ارسال شد.

RNA ویروس، سلول‌های آلدوه دو بار منجمد و ذوب شدند و سوب سلولی جمع‌آوری شد. پس از سانتریفیوژ در ۵۰۰۰ g به مدت ۱۰ دقیقه برای حذف رسوب سلولی، مراحل استخراج RNA مطابق با دستورالعمل Qiagen RNeasy Mini Kit (آلمان) انجام شد.

## تجزیه و تحلیل الکتروفورز

به منظور بررسی الگوی الکتروفورزی، ژنوم ویروس‌های استخراج شده روتاویروس سوش RF استاندارد و بازآرایی شده، توسط ژل پلی آکریل آمید ۱۰ درصد و رنگ‌آمیزی نیترات نقره بررسی شد.

## طراحی آغازگر (Primer) و آزمون RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)

از روش‌های کلاسیک مطالعه ژنوم می‌توان به هیریویاسیون (Northern Blot) و نورترن بلات (Hybridization) اشاره کرد. روش PCR به عنوان یکی از حساس‌ترین روش‌های تشخیصی برای شناسایی مقادیر بسیار کم عامل عفونی در نمونه‌های مشکوک و نیز تکثیر ژنوم است [۱۸]. در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار OLIGO7 آغازگرهای نوکلئوتیدی با توجه به توالی حفاظت شده انتهایی دو سر ژن‌های Neuroendocrine-Specific (NSP1، 2، 3) و Protein NCBI روتاویروس گاوی که در بانک ژنی

جدول ۱ توالی آغازگرهای طراحی شده برای تکثیر روتاویروس گاوی سویه RF استاندارد و بازآرایی شده

قطعه ژنی	آغازگر مستقیم	آغازگر معکوس
NSP1	5'-GCTTTTTTATGAAAAGTCTTGTGG-3'	5'-GTTCACATTATGCTGCCTAG-3'
NSP2	5'-CGTCTCAGTCGCCGTCG-3'	5'-GGTCACATAAGCGCTTCATT-3'
NSP3	5'-ATTAAATGCTTTCAAGTGGTTGATGC-3'	5'-GGTCACATAACGCCCTATAGCC-3'


## تولید روتاویروس گاوی بازآرایی شده از طریق تکثیر ویروس با نسبت بالای عفونت‌زایی

بازآرایی شده در سلول‌ها است. علاوه بر خوبی برای هر دو ویروس استاندارد و بازآرایی شده یکسان بود، به عبارت دیگر طی فرآیند بازآرایی، در فنوتیپ تکثیر ویروس تغییری ایجاد نمی‌شود. کشت با شرایط یکسان سه بار تکرار شد و نتایج مشابه در هر بار نشان داده شد (شکل ۱).


## نتایج

### کشت سلول و تکثیر ویروس


آثار تخریب سلولی به صورت کندن سلول‌ها از بستر مشاهده می‌شود که نشان دهنده تکثیر ویروس استاندارد و



شکل ۱ (الف) وضعیت طبیعی سلول MA-104. (ب) وضعیت سلول پس از تلقیح روتاویروس گاوی



شکل ۲ الگوی ژنومی استاندارد و بازآرایی شده RNA روتاویروس در ژل پلی آکریل آمید ۱۰ درصد و رنگ‌آمیزی با نیترات نقره



شکل ۳ (الف) الکتروفورز حاصل از تکثیر قطعات استاندارد، (ب) الکتروفورز حاصل از قطعات بازآرایی شده، (ج) نشانگر ۱ کیلو بازی #SM0311

جدول ۲ طول قطعات طبیعی و بازآرایی شده (براساس جفت‌باز)، قطعه ۵ کد کننده پروتئین NSP1 و قطعه شماره ۷ کد کننده پروتئین NSP3

	قطعه بازآرایی شده	قطعه طبیعی	قطعه ژنومی
NSP1	۱۶۱۱	~ ۲۰۰۰	
NSP3	۱۱۰۴	~ ۱۵۰۰	

## بحث

روتاویروس‌ها عامل اصلی گاستروانتیریت حاد در نوزادان و دارای ۱۱ قطعه ژنوم RNA دو رشته‌ای هستند که در شرایط ویژه و با فراوانی متفاوت در برخی قطعات ژنومی آن‌ها بازآرایی اتفاق می‌افتد. براساس دانسته‌های محققان حاضر بازآرایی ژنوم پدیده‌ای ویژه در فرآیند تکثیر است که در تکامل و تنوع روتاویروس نقش دارد. بنابراین با بررسی بازآرایی، اطلاعات زیادی در زمینه جزئیات ساختاری از ژن‌های بازآرایی شده، محصول و عملکرد آن‌ها و اهمیت تنوع سویه‌های روتاویروس مورد مطالعه به دست می‌آید. طی بازآرایی الگوی الکتروفورزی تغییر می‌کند و در مواردی به تبع آن، ساختار و عملکرد پروتئین‌های کد شده تغییر خواهد کرد [۱۹، ۲۰]. از آن جایی که مشخص شدن یک ویروس نوترکیب کاربردهایی در زمینه نوترتیبی و تولید واکسن‌های روتاویروسی دارد، باید بیشتر به آن توجه شود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که RT-PCR، امکان تشخیص اختصاصی و حساس اشکال بازآرایی شده را فراهم می‌کند، بنابراین ابزار مفیدی برای تشخیص قطعات نوترکیب در کشت و نمونه‌های روتاویروسی است. تا به حال بازآرایی روتاویروس در ایران بررسی نشده است و این گزارش برای اولین بار، بازآرایی در شرایط تکثیر ویژه ویروسی و در کشت سلولی با نسبت عفونت‌زاوی بالا را نشان می‌دهد. در این تحقیق برای افزایش تیتر، ویروس با نسبت‌های عفونت‌زاوی مختلف، پاساژهای متوالی داده شد تا تیتر بهینه ویروس به دست آید. برای بررسی الگوی ژنومی ویروس از الکتروفورز استفاده شد و طی بررسی‌های انجام شده قطعات بازآرایی شده نشان داده شد. طی این بررسی‌ها دو باند ژنومی به بالای ژل مهاجرت داشت که افزایش وزن

## استخراج RNA ویروس و تجزیه و تحلیل الکتروفورز

ژنوم ویروس‌های استاندارد و بازآرایی شده RF استخراج و توسط ژل پلی آکریل آمید ۱۰ درصد و رنگ‌آمیزی نیترات نقره بررسی شد. حضور الگوی ژنومی غیرطبیعی در مقایسه با وضعیت استاندارد، وقوع بازآرایی در دو قطعه NSP1 و NSP3 را نشان داد که به صورت افزایش طول قطعه در اثر بازآرایی و مهاجرت قطعات ثانی NSP1 و NSP3 به بالای ژل بود. همان‌طور که در شکل دیده می‌شود قطعه NSP1 بین دو قطعه ۳ و ۴ و قطعه NSP3 در جایگاه قطعه ۵ قرار گرفته است (شکل ۲).

## تکثیر ژن‌ها به روش PCR

محصولات PCR در کنار نشانگر ژنومی در ژل آکارز ۱/۵ درصد با ژل رد (Red Gel) رنگ‌آمیزی و جدا شد. بدین ترتیب و با در نظر گرفتن الگوی ژنومی طبیعی روتاویروس گاوی، بازآرایی در این ویروس برای قطعات ۵ و ۷ که به ترتیب پروتئین‌های غیرساختمانی NSP1 و NSP3 را کد می‌کند، شناسایی شد. در این مطالعه قطعات نوترتیب (بازآرایی شده) بزرگ‌تر از قطعه طبیعی بود و در مقایسه با ویروس با ژنوم طبیعی که به عنوان کنترل است، تکثیر مناسبی در PCR نداشت (شکل ۳).

## تعیین توالی و تجزیه و تحلیل نتایج

قطعات بازآرایی شده ۵ و ۷ به طور ویژه و در مقایسه با قطعات استاندارد تشخیص داده شد. در این مطالعه براساس الگوی الکتروفورزی و در نتیجه بازآرایی، قطعه ۵ کد کننده پروتئین NSP1 به اندازه تقریباً ۵۰۰ نوکلئوتید و قطعه شماره ۷ کد کننده پروتئین NSP3 به اندازه تقریباً ۴۰۰ نوکلئوتید در طول توالی افزایش نشان داد. با استفاده از برنامه BLAST، توالی‌های به دست آمده بررسی شد و وقوع بازآرایی به صورت افزایش طول قطعات نشان داده شد و بنابراین اختصاصی بودن آزمایش تأیید شد (جدول ۲).

## تولید روتاویروس کاوی بازآرایی شده از طریق تکثیر ویروس با نسبت بالای عفونت‌زایی

طور عمده برای قطعات ژنومی ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰ و ۱۱ توصیف کرده و فرآیند بازآرایی را به صورت تکثیر جزئی توالی در Polyacrylamide (PAGE) این قطعات و به کمک RT-PCR (Gel Electrophoresis) بیان نموده است. در این مطالعات فرضیه‌هایی در رابطه با مکانیسم‌های بروز بازآرایی، مانند حضور توالی‌های ویژه یا عملکرد آنزیم پلیمراز ویروسی مطرح و بر اهمیت مطالعه بیشتر این فرآیند با توجه به وقوع آن در کودکان با نقص سیستم ایمنی و نیز شرایط ویژه آزمایشگاهی تأکید شده است و نقش آن در ایجاد جهش یافته‌های ویروسی و جایگزین شدن ویروس وحشی توسط این ذرات و نیز کاربرد آن‌ها در تولید واکسن موردن توجه قرار گرفته است [۲۴، ۳]. باید توجه نمود که بازآرایی‌های ژنوم به عنوان وقایع نوترکیبی، توسط تعیین توالی می‌تواند به خوبی مطالعه و توصیف شود. به این ترتیب توسعه و فراهم بودن روش‌های تکثیر و مطالعه ژنوم برای شناسایی و تشخیص و درک بهتر سویه‌های ویروسی با ترکیب ژنومی متفاوت که درون زمینه‌ای از ویروس‌های استاندارد پدیدار می‌شوند و نیز محصولات ژنومی آن‌ها که برای تشخیص آن‌ها ابزارهای قوی از جمله آنتی‌بادی‌های خشی کننده در دسترس نیست، دارای اهمیت است [۲۴، ۸].

## تشکر و قدردانی

تحقیق حاضر بخشی از پایان‌نامه دانشجویی کارشناسی ارشد رشته ویروس‌شناسی مصوب دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس است که با حمایت مالی آن دانشگاه انجام شده است.

مولکولی حاصل از تکثیر توالی در این قطعات را نشان می‌داد. با مطالعه متون مربوط به بازآرایی و نیز انجام الکتروفورز برای ژنوم استخراج شده ویروس‌های استاندارد و بازآرایی شده، فرآیند بازآرایی به طور ویژه در قطعات ۵ و ۷ در مقایسه با الگوی ژنومی استاندارد استفاده شده به عنوان کنترل، تشخیص داده شد. سپس به منظور مطالعه دقیق تر ژنوم‌های ویروس استاندارد و بازآرایی شده توسط روش RT-PCR تکثیر شد که علاوه بر تأیید وقوع بازآرایی، نشان داده شد که قطعات RT-PCR بازآرایی شده تکثیر ضعیف‌تری دارد. با استفاده از روش RT-PCR هر دو مورد بازآرایی به صورت افزایش توالی به اندازه تقریباً ۵۰۰ نوکلئوتید مربوط به قطعه ۵ کد کننده پروتئین NSP1 و به اندازه تقریباً ۴۰۰ نوکلئوتید برای قطعه شماره ۷ کد کننده پروتئین NSP3 را تأیید شد. در این تحقیق روتاویروس بازآرایی شده بدون هیچ‌گونه فشار انتخابی در کشت سلولی MA-104 به دست آمد. با توجه به عدم امتیاز رشد در کشت سلول برای ویروس بازآرایی شده در مقایسه با ویروس استاندارد که در سایر مطالعات اثبات شده است و در تحقیق حاضر نیز مشاهده شد، فرض بر این است که قطعات بازآرایی شده به طور انتخابی و تغیریکی در ذرات ویروسی وارد می‌شود [۲۱-۲۳]. بنابراین مطالعه بیشتر قطعات تغییر یافته و به طور کلی فرآیند بازآرایی به منظور توسعه ابزارهای قوی از جمله آنتی‌بادی‌های خشی کننده، ساخت واکسن زنده ضعیف شده داری ژن‌های هدف خاص از طریق ژنتیک معکوس و به خصوص ساخت واکسن‌های نوترکیب و دارای قطعه یا قطعات نوترکیب لازم و ضروری به نظر می‌رسد. سایر مطالعات بازآرایی را به شیوه‌ای مشابه با تحقیق حاضر و به

## منابع

- [1] Estes MK, Kapikian AZ. Rotaviruses. In: Knipe DM, Howley PM (editors). *Fields Virology*. 5<sup>th</sup> ed, vol. 2, Chapter 53, Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2007; p: 1918-32.
- [2] Graham A, Kudesia G, Allen AM, Desselberger U. Reassortment of human rotavirus possessing genome rearrangements with bovine rotavirus: evidence for host cell selection. *J gen Virol* 1987; 68(Pt 1): 115-22.

- [3] Hundley F, Biryahwaho B, Gow M, Desselberger U. Genome rearrangements of bovine rotavirus after serial passage at high multiplicity of infection. *Virology* 1985; 143(1): 88-103.
- [4] Desselberger U. Genome Rearrangement of Rotaviruses. In: Marmorosch K, Murphy FA (editors). *Advances in Virus Research*. vol. 46, New York: Academic Press, 1996; p: 71-93.
- [5] Zuccotti G, Meneghin F, Dilillo D, Romanò L, Bottone R, Mantegazza C, Giacchino R, Besana R, Ricciardi G, Sterpa A, Altamura N, Andreotti M, Montrasio G, Macchi L, Pavan A, Paladini S, Zanetti A, Radaelli G. Epidemiological and clinical features of rotavirus among children younger than 5 years of age hospitalized with acute gastroenteritis in Northern Italy. *BMC Infect Dis* 2010; 10: 218.
- [6] Ramani S, Iturriaga-Gomara M, Jana AK, Kuruvilla KA, Gray JJ, Brown DW, Kang G. Whole genome characterization of reassortant G10P[11] strain (N155) from a neonate with symptomatic rotavirus infection: Identification of genes of human and animal rotavirus origin. *J Clin Virol* 2009 45(3): 237-44.
- [7] Dolan KT, Twist EM, Horton-Slight P, Forrer C, Bell LM Jr, Plotkin SA, Clark HF. Epidemiology of rotavirus electropherotypes determined by a simplified diagnostic technique with RNA analysis. *J Clin Microbiol* 1985; 21(5): 753-8.
- [8] Troupin C, Deheé A, Schnuriger A, Vende P, Poncet D, Garbarg-Chenon A. Rearranged genomic RNA segments offer a new approach to the reverse genetics of rotaviruses. *J Virol* 2010; 84(13): 6711-9.
- [9] Matsui SM, Mackow ER, Matsuno S, Paul PS, Greenberg HB. Sequence analysis of gene 11 equivalents from "short" and "super short" strains of rotavirus. *J Virol* 1990; 64(1): 120-4.
- [10] Manual of rotavirus detection and characterization methods: WHO Press. 2009; [http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/who\\_ivb\\_08.1\\_7\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/who_ivb_08.1_7_eng.pdf)
- [11] Taniguchi K, Komoto S. Genetics and reverse genetics of rotavirus. *Curr Opin Virol* 2012; 2(4): 399-407.
- [12] Teimoori A, Soleimanjahi H, Pourasgari F. Comparison of Rotavirus RF Strain and HSV-1 Titration by CCID50% and Plaque Assays. *MJMS* 2012; 15(2): 35-45. (Persian)
- [13] Arnold M, Patton JT, McDonald SM. Culturing, storage, and quantification of rotaviruses. *Curr Protoc Microbiol* 2009; Chapter 15: Unit 15C.3.
- [14] Benureau Y, Huet JC, Charpilienne A, Poncet D, Cohen J. Trypsin is associated with the rotavirus capsid and is activated by solubilization of outer capsid proteins. *J Gen Virol* 2005; 86(Pt 11): 3143-51.
- [15] Gray J, Desselberger U. Rotaviruses methods and protocols. In: Walker JM (editor). *Methods in molecular medicine*. vol. 34, New Jersey: Humana Press, 2000; p: 1-258.
- [16] Gilbert JM, Greenberg HB. Rotavirus entry into tissue culture cells. *Methods Mol Med* 2000; 34: 67-77.
- [17] Agbalika F, Hartemann P, Foliguet JM. Trypsin-treated Ma-104: a sensitive cell line for isolating enteric viruses from environmental samples. *Appl Environ Microbiol* 1984; 47(2): 378-80.

تولید روتاویروس کاوی بازآرایی شده از طریق تکثیر ویروس با نسبت بالای عفونت‌زاوی

- [18] Maan S, Rao S, Maan NS, Anthony SJ, Attoui H, Samuel AR, Mertens PP. Rapid cDNA synthesis and sequencing techniques for the genetic study of bluetongue and other dsRNA viruses. *J Virol Methods* 2007; 143(2): 132-9.
- [19] Tian Y, Tarlow O, Ballard A, Desselberger U, McCrae MA. Genomic concatemerization/deletion in rotaviruses: a new mechanism for generating rapid genetic change of potential epidemiological importance. *J Virol* 1993; 67(11): 6625-32.
- [20] Gault E, Schnepf N, Poncet D, Servant A, Teran S, Garbarg-Chenon A. A Human Rotavirus with Rearranged Genes 7 and 11 Encodes a Modified NSP3 Protein and Suggests an Additional Mechanism for Gene Rearrangement. *J Virol* 2001; 75(16): 7305-14.
- [21] Schnepf N, Deback C, Dehee A, Gault E, Perez N, Garbarg-Chenon A. Rearrangements of Rotavirus Genomic Segment 11 Are Generated during Acute Infection of Immunocompetent Children and Do Not Occur at Random. *J Virol* 2008; 82(7): 3689-96.
- [22] Mattion NM, Bellinzoni RC, Blackhall JO, Estes MK, Gonzalez S, La Torre JL, Scodeller EA. Genome rearrangements in porcine rotaviruses: biochemical and biological comparisons between a supershort strain and its standard counterpart. *J Gen Virol* 1990; 71(Pt 2): 355-62.
- [23] Pedley S, Hundley F, Chrystie I, McCrae MA, Desselberger U. The genomes of rotaviruses isolated from chronically infected immunodeficient children. *J Gen Virol* 1984; 65(Pt 7): 1141-50.
- [24] Ward RL, McNeal MM, Steele AD. Why does the world need another rotavirus vaccine? *Ther Clin Risk Manag* 2008; 4(1): 49-63.