

Effects of Different Doses of LIF on IVM Rate and Cumulus Expansion in Mouse Oocytes

Mohammadi Roushandeh A., Ph.D.^{*}, Haji Hosseinlou H., M.Sc., Niknafs B., Ph.D., Halabian R., M.Sc., Rouhbakhsh M., M.Sc, Daneshvar M.

****: P.O.Box:51666-14766, Anatomy Department, Medicine Faculty, Tabriz Medical University, Tabriz, Iran***

Abstract

Purpose: The aim of this research was to study the effects of different doses of LIF on GVBD and MII development rate and cumulus expansion.

Materials and Methods: Immature mice superovulated with HMG and GV oocytes obtained from ovary 48 hours later. The GV oocytes were cultured in TCM199 with 100, 500 and 1000 IU /ml LIF. Cumulus expansions were evaluated with two examiners and numbers of MII oocytes were recorded. For denuding the oocytes hyaluronidase was used.

Results: Our results showed that the rate of GVBD and MII development increased in groups with LIF compared with control group. Rate of MII development with 1000 IU/ml LIF was significantly higher than that of control group ($P<0.05$). Cumulus expansion in group with 1000 IU/ml LIF improved significantly compared with control group ($p<0.05$).

Conclusion: Our results showed that LIF could improve IVM rate in dose dependant. Also cumulus expansion improved in group with LIF and increased oocyte quality.

Key words: LIF, IVM, IVF, Cumulus expansion, Mouse

مقاله تحقیقی

اثر دوزهای مختلف LIF بر میزان IVM و انبساط کومولوسی (Cumulus expansion) در اروسیت‌های موش

آمنه محمدی روشنده^{*}, حسن حاج حسینی^{*}, بهروز نیک نفس^{*}, راحله حلیان^{M.Sc.}, Ph.D., Ph.D.

مهدی روحبخش^{*}, منیره دانشور^{M.Sc.}

* گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران

** مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون تهران، ایران

تاریخ وصول: فروردین ماه ۸۸، تاریخ پذیرش: خردادماه ۸۸

چکیده

هدف بررسی آثار دوزهای مختلف فاکتور مهاری لوسی در میزان Expansion (Metaphase II) MII و GVBD (Germinal vesicle breakdown) روی تکامل

مواد و روش‌ها: موش‌های نابالغ توسط HMG تحریک تخمک گذاری شده و تخمک‌های GV از تخدمان‌ها بعد از ۴۸ ساعت جمع‌آوری شدند. تخمک‌های GV در محیط TCM199 با فاکتور مهاری لوسی IU/ml ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ کشت داده شدند.

انبساط کومولوسی (Cumulus expansion) توسط دو نفر ارزیابی شد و سپس تعداد تخمک‌های MII شمارش شدند. برای برهمه کردن (denude) اروسیت‌ها از هیالورونیداز استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که میزان GVBD و MII در گروه‌های حاوی فاکتور مهاری لوسی در مقایسه با گروه کنترل دارای افزایش است. میزان تکامل MII با غلاظت IU/ml ۱۰۰۰ فاکتور مهاری لوسی به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل بالاتر بود ($p < 0.05$). Cumulus expansion در گروهی با IU/ml ۱۰۰۰ فاکتور مهاری لوسی در مقایسه با گروه کنترل بهبود پیدا کرد.

نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که فاکتور مهاری لوسی می‌تواند میزان IVM را به صورت وابسته به دوز افزایش دهد. همچنین cumulus expansion در گروه حاوی فاکتور مهاری لوسی بهبود پیدا کرده و کیفیت تخمک افزایش یافته که آن هم وابسته به دوز بوده است.

کلید واژه‌ها: فاکتور مهاری لوسی، انبساط کومولوسی، تکوین آزمایشگاهی تخمک، لقاح آزمایشگاهی، موش

مقدمه

است که اخیراً در تکنولوژی کمکی تولید مثل ART: assisted reproductive technology)

این روش می‌تواند در تولید جنین در بیمارانی که دچار تخدمان حساس به هورمون‌های تحریک کننده تخمک و

رشد و نمو تخمک در خارج از بدن (IVM: In vitro maturation of oocyte) یکی از روش‌هایی

آدرس مکاتبه: ایران، تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح، صندوق پستی: ۱۴۷۶۶-۱۶۶۶ E-mail:dinachal@yahoo.com

هچینگ (Hatching) شده است، در حالی که افزودن IU/ml ۵۰۰ در تحقیق دیگر، تغییری در میزان تکامل بلاستوسیست‌ها نداشته اما در تعداد سلول‌های توده داخلی بلاستوسیست نقش داشته است [۱۰]. فاکتور مهاری لوکمیا اثر خود را از طریق گیرنده خود اعمال می‌کند. فاکتور مهاری لوسمی عاملی است که به طور اختصاصی با گیرنده GP130 عمل می‌کند و در تعدادی از سیستم‌های تکاملی تأثیرگذار است. این گیرنده روی بافت‌های مختلف سیستم تناسلی جنس منث از جمله اووسیت نشان داده شده است [۱۱].

تحقیقان نشان داده‌اند که فاکتور مهاری لوسمی در مایع فولیکولی وجود دارد و به نظر می‌رسد که در راستای رشد فولیکول میزان آن هم افزایش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد که فاکتور مهاری لوسمی روی سلول‌های زایگر مقدماتی در محیط داخل بدن (*In vitro*) و محیط کشت (*In vivo*) نقش داشته باشد اما نقش آن در تکامل اووسیت توضیح داده نشده است. در تحقیقی نشان داده شد که استفاده از ۱۰۰۰ IU/m³ فاکتور مهاری لوسمی، میزان تکامل اووسیت‌های ژرمینال وزیکل را افزایش می‌دهد [۱۲ و ۱۳].

یکی از مواردی که در مقوله رشد آزمایشگاهی تخمک مهم است تکامل همزمان سیتوپلاسم و هسته است. Cumulus expansion شاخصی است که میزان آن می‌تواند بیان‌کننده کیفیت تخمک تلقی شود [۱۴] با توجه به اینکه کیفیت تخمک به دست آمده نقش بسیار زیادی در مراحل بعدی مانند IVF دارد در تحقیق حاضر اثر فاکتور مهاری لوسمی بر میزان تکامل GVBD و MII و Cumulus expansion بررسی شده است.

مواد و روش‌ها

در تحقیق حاضر از موش‌های ماده سوری نابالغ ۵ هفت‌های استفاده شد. موش‌ها از حیوانخانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

همین‌طور برای بیمارانی با تخمدان پلی کیستیک استفاده شود. در خانم‌هایی که دچار سرطان شده و تخمدان‌های آن‌ها برداشته شده هم می‌توان از این روش استفاده کرد [۱۹ و ۲۰]. با تمام مزایایی که این روش نسبت به روش‌های معمول در درمانگاه‌های ناباروی دارد، اما هنوز هم به طور روزمره در مراکر ناباروی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و علت آن پایین بودن میزان جنین‌ها و بارداری است. یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن میزان جنین‌ها تکامل نامناسب هسته و سیتوپلاسم تخمک در محیط‌های کشت است. محیط‌های کشت نتوانسته‌اند شرایط مناسب مانند داخل بدن را برای رشد تخمک ایجاد کرده و میزان رشد آن دچار اختلال می‌شود [۳]. استراتژی‌های موجود برای بهبود و افزایش میزان تکامل اووسیت، اصلاح ترکیبات محیط کشت و افزودن مواد جدید در محیط‌های کشت است. تحقیقات زیادی وجود دارد که نقش موادی همچون پروتئین‌ها، اسیدهای آمینه، هورمون‌ها و مواد آنتی‌اکسیدان را روی تکامل تخمک و جنین و بهبود تکامل هسته و سیتوپلاسم بررسی کرده اند [۴ و ۵].

فاکتور مهار کننده لوسمی برای اولین بار در سال ۱۹۸۶ کشف شد. این فاکتور یک سیتوکین از خانواده ایترولوکین-۶ است و روی انواع مختلف سلول‌ها عمل می‌کند. فاکتور مهار کننده لوسمی (LIF: Leukemia inhibitory factor) یک سیتوکین با ترکیب گلیکوپروتئینی است که دارای وزن مولکولی ۳۸-۶۷ کیلو Dalton است [۶]. نشان داده شده است که این ترکیب نقش مهمی در جایگزینی جنین جوندگان داشته باشد [۷ و ۸]. اضافه کردن فاکتور مهاری لوسمی به محیط کشت جنین گاومیش در چند مطالعه نشان داد که نتایج حاصل یکسان نیستند [۹]. به طور مثال اضافه کردن ۵۰۰ IU/ml در مرحله مورولا یا مراحل اولیه بلاستوسیست منجر به افزایش تعداد بلاستوسیست‌ها بدون تغییر در میزان

غلظت‌های مختلف فاکتور مهاری لوسمی نشان می‌دهد. نتایج حاصل از کشت تخمک‌های مرحله ژرمنیال وزیکل در محیط کشت با مقادیر مختلف فاکتور مهاری لوسمی نشان می‌دهد که در غلظت 1000 IU/ml میزان تکامل اووسیت‌ها به مرحله متافاز II نسبت به گروه‌های دیگر بیشتر بوده و نسبت به گروه IU/ml کنترل معنی‌دار است ($p < 0.05$). در محیط با مقدار 100 IU/ml ، تخمک‌های ژرمنیال وزیکل به میزان 50 درصد به متافاز II تبدیل شدند که نسبت به گروه کنترل بیشتر بوده اما از IU/ml لحاظ آماری معنی‌دار نیست ($p > 0.05$). در گروه با غلظت 100 IU/ml ، پایین‌ترین میزان تکامل تخمک‌های متافاز II به دست آمد که در آن میزان درصد تکامل نسبت به گروه کنترل کمتر بوده اما این کاهش معنی‌دار نبود ($p > 0.05$).

جدول ۱. میزان تکوین تخمک‌های متافاز II را در گروه‌های مختلف

		تعداد تخمک‌ها	تکوین درصد تکوین متافاز II	تکوین
		گروه‌ها		
۱۷۳/۹۲	%۵۳	گروه کنترل		
۹۰/۵۴	%۶۰	گروه 100 IU/ml		
۱۱۱/۶۱	%۵۵	گروه 500 IU/ml		
۱۳۰/۱۰۹	%۸۴/۶*	گروه 1000 IU/ml		

*: $P < 0.05$

اثر مقادیر مختلف فاکتور مهاری لوسمی بر میزان expansion

بررسی‌های حاصل از میزان expansion در گروه‌های مختلف نشان داد که فاکتور مهاری لوسمی با غلظت 1000 IU/ml میزان expansion را بهبود بخشدید که نسبت به گروه کنترل معنی‌دار بوده است ($p < 0.05$). در گروه‌های دیگر با غلظت‌های 500 IU/ml و 100 IU/ml میزان expansion نسبت به گروه کنترل بیشتر بوده است. ارزیابی expansion با ۲ نفر انجام گرفته و به دو درجه + و ++ تقسیم‌بندی شده است (شکل‌های ۱ و ۲).

تهیه شده و در شرایط ۱۲ ساعت روشناجی و ۱۲ ساعت تاریکی و دستری اسان به غذا و آب نگه داشته شدند.

تحریک تخمک گذاری: برای تحریک تخمک گذاری از HMG به میزان $7/5$ واحد برای هر موش و به صورت تزریق داخل صفاقی استفاده شد.

گرفتن تخمک GV: بعد از ۴۸ ساعت از تزریق HMG، موش‌ها به صورت جابه‌جایی گردنی قربانی شده و تحمدان آن‌ها برداشته شد و در داخل محیط کشت TCM199 قرار گرفت. با استفاده از دو سوزن انسولین تخمک‌های مرحله ژرمنیال وزیکل از تحمدان گرفته شده و بعد از ۳ مرحله شستشو به قطرات 50 میکرولیتری محیط کشت انتقال داده شدند.

کشت تخمک‌ها: تخمک‌های مرحله ژرمنیال وزیکل در محیط کشت TCM199 با مقادیر مقادیر مختلف (کنترل) و 1000 IU/ml , 500 IU/ml , 100 IU/ml فاکتور مهاری لوسمی همراه با سدیم پیرووات، و FSH در انکوباتور با 5CO_2 درصد و دمای 37 درجه سانتی‌گراد کشت داده شدند.

ارزیابی تخمک‌ها: ۲۰ ساعت بعد از کشت، تخمک‌ها بررسی شده و Cumulus expansion توسط ۲ نفر ارزیابی شد. سپس تخمک‌ها با استفاده از هیالورونیداز برنه شده و تعداد تخمک‌های مرحله MII و GVBD ارزیابی شد.

داده‌ها با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS Ver.11 مقایسه بین گروه‌های مختلف با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه بررسی شد.

یافته‌ها

اثر مقادیر مختلف فاکتور مهاری لوسمی بر میزان تشکیل تخمک‌های MII و GVBD

جدول ۱ درصد تشکیل اووسیت‌های مرحله متافاز II را در

جدول ۲. میزان درصد expansion در گروههای مختلف

میزان expansion	گروهها	گروه کنترل	گروه ۱۰۰۰ IU/ml	گروه ۵۰۰ IU/ml	گروه ۱۰۰ IU/ml
+	% ۵۱/۲	% ۵۰/۴۸	% ۲۲,۰۵%	۸۱/۱٪	۳۰/۱۳۶±۳/۵
++	% ۵/۵	% ۱۱/۶۵	% ۵۱/۴	% ۱۳/۵۱	۸۹/۱۱۱±۴/۱۱
	۱۱/۲۰۰	۱۲/۱۰۳	۷۰/۱۳۶	۱۵/۱۱۱	۵۲/۱۰۳±۴,۶

بحث


نتایج حاصل از آزمایش‌های حاضر نشان داد که فاکتور مهاری لوسومی قادر به افزایش میزان تکامل اووسیت‌های مرحله ژرمنیال وزیکل به متافاز II است. این افزایش در دوز ۱۰۰۰ IU/ml بیشتر بوده و نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌داری را نشان می‌دهد.

محققان نشان داده اند که فاکتور مهاری لوسومی در تکامل بلاستوسیست‌ها نقش دارد. همچنین نشان داده شده است که در تخمک‌گذاری و تکامل جنین و جایگزینی نقش دارد [۱۵].


نقش فاکتور مهاری لوسومی در بلوغ ازماشگاهی تخمک هنوز به طور کامل مشخص نیست. به این منظور در تحقیق حاضر آثار دوزهای مختلف فاکتور مهاری لوسومی بر میزان GVBD و MII مطالعه شد. نشان داده شده است که فاکتور مهاری لوسومی در محیط *In vitro* موجب افزایش میزان تکامل جنین‌ها در انسان، جوندگان و گاومیش می‌شود [۱۴]. در تحقیقی که توسط دماتوس (De matos) و همکارانش انجام شده است میزان ۱۰۰۰ ng/ml فاکتور مهاری لوسومی، اثر مثبتی در میزان افزایش جنین‌های دو سلولی، بلاستوسیست و تولدۀای زنده داشته است [۱۴].

فاکتور مهاری لوسومی از طریق بیان ژن‌های KL (Kit ligand) و FGF می‌تواند در تکثیر سلول‌های گرانولوزا و تکا تأثیر

در گروه با ۵۰۰ IU/ml میزان expansion در درجه + در حدود ۹۰ درصد بوده است؛ در حالی که میزان expansion در گروه با ۱۰۰۰ IU/ml در درجه ++ در حدود ۶۰ درصد بوده است که میزان expansion مطلوب را نشان می‌دهد (شکل ۱). میزان درصد expansion در جدول ۲ آمده است.



شکل ۱. اووسیت‌های expand شده یک + را نشان می‌دهد (بزرگنمایی: ×۵۰۰).



شکل ۲. اووسیت‌های expand شده دو مثبت را نشان می‌دهد (بزرگنمایی: ×۱۰۰).

شده توسط FSH هستند [۱۸]. در تحقیق حاضر expansion کومولوس‌ها با به کارگیری فاکتور مهاری لوسی در محیط کشت افزایش پیدا کرد و این افزایش با میزان دوز به کار گرفته متفاوت بود. القای سلول‌ها با فاکتور مهاری لوسی و دیگر سیتوکین‌ها آبشار Jak-STAT و مسیر Ras-MAPK را درگیر می‌کند. بنابراین در expansion ناشی از فاکتور مهاری لوسی فعالیت MAPK دخیل است [۱۸]. اضافه کردن فاکتور مهاری لوسی به محیط کشت حاوی اووسیت‌های گوسفنند موجب بهبود تکامل تخمک‌ها و جنین‌های این حیوان شده است [۱۹]. بررسی حاضر نشان داد که فاکتور مهاری لوسی نقش مهمی در بلوغ آزمایشگاهی اووسیت داشته است. همین طور القای expansion کومولوس‌ها با وجود فاکتور مهاری لوسی و در دوز ۱۰۰۰ بیشترین میزان بوده است. با این وجود مکانسیم عمل فاکتور مهاری لوسی طی IVM و گیرنده‌های درگیر در آن هنوز به طور کامل بررسی نشده است.

References

1. Trounson A, Anderiesz C, Jones G. Maturation of human oocytes in vitro and their developmental competence. Reproduction 2001; 121: 51-75.
2. Kim BK, Lee SC, Kim KJ, Han CH, Kim JH. In vitro maturation, fertilization, and development of human germinal vesicle oocytes collected from stimulated cycles. Fertil Steril 2000; 74: 1153-8.
3. Ravinderanatha BM, Nandi S, Raghu HM, Reddy SM. In vitro maturation and fertilization of buffalo oocytes: Effects of storage of ovaries, IVM temperatures, storage of processed sperm and fertilization media. Reprod Domest Anim 2003; 38: 21-6.
4. Mohammadi-Roushandeh A, Noori-Mooghahi MA, Pasbakhsh P, Abdolvahabi A, Akbari A, Shokrgozar A, Sobhani A. Effect of cysteamine on the rate of in vitro maturation of oocytes in two media. Acta Medica Iranica 2006; 44: 167-71.
5. Mohammadi Roushandeh A, Pasbakhsh P, Alizadeh Z, Habibi Roudkenar .In vitro maturation media, cysteamine concentration and glutathione level affect blastocysts development in mouse. Iranian J Reprod Med 2007; 5: 159-63.
6. Sirisathien S, Hernandez-Fonseca HJ, Bosch P, Hollet BR, Lott JD, Brackett BG. Effect of leukemia inhibitory factor on bovine embryos produced in vitro under chemically defined conditions. Theriogenology 2003; 59: 1751-63.
7. Rizos D, Gutierrez-Adáñ A, Pérez-Garnelo S, de la Fuente J, Boland MP, Lonergan P. Bovine Embryo Culture in the Presence or Absence of Serum: Implications for Blastocyst Development,

داشته باشد و فاکتور مهاری لوسی به طور مستقیم نمی‌تواند بر تکثیر این سلول‌ها نقش داشته باشد. در فولیکول پستانداران دو رویداد بزرگ رخ می‌دهد. یکی اینکه اووسیت تقسیم میوز خود را از سر می‌گیرد و دیگر اینکه سلول‌های کومولوس که اووسیت را در بر گرفته‌اند عمل expansion را انجام می‌دهند [۱۵].

فاکتور مهاری لوسی طی رشد فولیکولی وجود دارد و به طور قابل ملاحظه‌ای در هنگام تخمک‌گذاری زیاد می‌شود. Expansion سلول‌های کومولوس بسته به ماده زمینه‌ای است که سلول‌های گرانولوزا در آن حرکت می‌کنند و حدائق دارای ۳ ترکیب است. این ۳ ترکیب شامل اسید هیالورونیک و حدائق دو پروتئین متصل شونده به اسید هیالورونیک است [۱۶]. سو (Su) و همکارانش ثابت کرده‌اند که germinal vesicle breakdown به فعالیت MAPK در سلول‌های کومولوس نیاز دارد [۱۷]. به علاوه همان محققین نتیجه‌گیری کرده‌اند که القای expansion کومولوس‌ها نیازمند افزایش cAMP است.

- Cryotolerance, and Messenger RNA Expression1D. *Biol Reprod* 2003; 68: 236–43.
8. **Stewart CL, Kaspar P, Brunet LJ, Bhatt H, Gadi I, Köntgen F, et al.** Blastocyst implantation depends on maternal expression of leukaemia inhibitory factor. *Nature* 1992; 3: 76-9
 9. **Fedorcsák P, Storeng R.** Effect of leptin and leukemia inhibitory factor on preimplantation development andSTAT3 signaling of mouse embryos in vitro. *Biol Reprod* 2003; 69: 1531–8.
 10. **Han YM, Lee ES, Mogoe T, Lee KK, Fukui Y.** Effect of human leukemia inhibitory factor on in vitro development of IVF-derived bovine morulae and blastocysts. *Theriogenology* 1995; 44: 507-16.
 11. **Ni H, Ding NZ, Harper MJ, Yang ZM.** Expression of leukemia inhibitory factor receptor and gp130 in mouse uterus during early pregnancy. *Mol Reprod Dev* 2002; 63: 143-50.
 12. **Hsieh YY, Chang CC, Tsai HD, Lin CS.** Leukemia inhibitory factor in follicular fluid is not related to the number and quality of embryos as well as implantation and pregnancy rates. *Biochem Genet* 2005; 43: 501-6.
 13. **Skinner MK.** Regulation of primordial follicle assembly and development. *Hum Reprod Update*. 2005; 11:461-71.
 14. **De Matos DG, Miller K, Scott R, Tran CA,**
 - Kagan D, Nataraja SG, et al.** Leukemia inhibitory factor induces cumulus expansion in immature human and mouse oocytes and improves mouse two-cell rate and delivery rates when it is present during mouse in vitro oocyte maturation. *Fertil Steril* 2008; 90: 2367-75.
 15. **Nilsson EE, Kezele P, Skinner MK.** Leukemia inhibitory factor (LIF) promotes the primordial to primary follicle transition in rat ovaries. *Mol Cell Endocrinol* 2002; 188: 65-/73.
 16. **Salustri A, Camaioni A, Di Giacomo M, Fulop C, Hascall VC.** Hyaluronan and proteoglycans in ovarian follicles. *Hum Reprod Update* 1999; 5:293–301.
 17. **Su YQ, Wu X, O'Brien MJ, Pendola FL, Denegre JN, Matzuk MM.** Synergistic roles of BMP15 and GDF9 in the development and function of the oocyte–cumulus cell complex in mice: genetic evidence for an oocyte–granulosa cell regulatory loop. *Dev Biol* 2004; 276: 64–73.
 18. **Auernhammer CJ, Melmed S.** Leukemia-inhibitory factor—neuroimmune modulator of endocrine function. *Endocr Rev* 2000; 21: 313–45.
 19. **Ptak G, Lopes F, Matsukawa K, Tischner M, Loi P.** Leukaemia inhibitory factor enhances sheep fertilization in vitro via an influence on the oocyte. *Theriogenology* 2006; 65:1891-9.