

مطالعه اثر تجویز نیکوتین مادری بر تغییرات کلژن نوع IV ریوی نوزادان در موش

مهدی جلالی^{*}, محمد رضا نیکروش^{**}, عباسعلی معین^{***}, شبنم محمدی^{M.Sc.}, محمد حسن گریمفر^{Ph.D.}

* گروه علوم تشریحی و بیولوژی سلوی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

** گروه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل، ایران

تاریخ وصول: تیرماه ۸۹، تاریخ پذیرش: مهرماه ۸۹

چکیده

هدف: مطالعه و ارزیابی اثر تجویز نیکوتین مادری بر تغییرات کلژن ریه نوزادان موش

مواد و روش‌ها: در این مطالعه از ۲۴ موش ماده نژاد balb/c استفاده شد که با تعیین روز صفر بارداری به دو گروه تجربی و دو گروه کنترل تقسیم شدند. به گروه تجربی ۱ از روز پنجم تا پایان دوره بارداری روزانه $3\text{mg}/\text{kg}$ نیکوتین به صورت داخل صفاقی تزریق شد و در گروه تجربی ۲ این عمل تا دوهفته پس از زایمان ادامه یافت. گروه‌های کنترل نیز حجم مشابهی از نرمال سالین در زمان‌های مشابه دریافت نمودند. در پایان دوره همه نوزادان تجربی و کنترل پس از بیهوشی عمیق قطع نخاع شده و ریه‌های آنان به منظور مطالعات ایمونوهیستوشیمی ثبت و آماده‌سازی شد.

یافته‌ها: یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که واکنش کلژن در غشای پایه برونشیال و ماده خارج سلوی پارانشیم ریوی نوزادان گروه‌های تجربی نسبت به کنترل به شکل معنی‌داری افزایش یافته است. علاوه بر این در سلوی‌های پارانشیم ریوی گروه تجربی ۲ نشانه‌های بارزی از مرگ سلوی دیده شد که در سایر گروه‌ها مشهود نبود.

نتیجه‌گیری: شواهد حاصل از این مطالعه بر این موضوع دلالت دارد که چنانچه مادران باردار در معرض نیکوتین مستمر قرار گیرند افزایش کلژن غیر قابل انکاری در غشای پایه آلوئی و ماده خارج سلوی ریوی فرزندان آنها پدید می‌آید. سیستم تنفسی اینگونه موجودات که نیکوتین را از طریق جفت و علاوه بر این از طریق شیر مادر نیز دریافت کرده‌اند به نوعی مستعد آسیب‌های ریوی می‌شود که به ستر غیر متعارف کلژن و حتی مرگ سلوی در پارانشیم ریوی آنان منجر می‌شود.

کلید واژه‌ها: سیستم تنفسی، نیکوتین، کلژن نوع IV، موش

مقدمه

رونده طبیعی تکامل و گذر از این مراحل به خاطر اینکه ریه در آینده عضو تبادل گازهای تنفسی است، اهمیت فراوان دارد. اختلال در این مراحل بر بلوغ و نیز مقاومت ریه در برابر بیماری‌ها در زندگی آینده می‌تواند تأثیر بگذارد [۱-۴]. در این دستگاه نیز مثل بسیاری از ارگان‌های دیگر، سلوی‌های مزانشیمی به وسیله فاکتورهای رشد و تمایز (که توسط

در مقایسه با سایر سیستم‌های بدن، تکامل ریه به دلیل اینکه به یک دستگاه تبادل گاز تبدیل می‌شود، اهمیت دارد. ریه باید طی دوران قبل از تولد تکامل یابد و بلافاصله در زمان تولد آماده فعالیت باشد اما مراحل نهایی تکامل آن در موش همانند سایر پستانداران پس از تولد به انجام می‌رسد. تکامل ریه طی دوران جنینی به چندین مرحله تقسیم می‌شود.

آدرس مکاتبه: ایران، مشهد، میدان آزادی، دانشکده پزشکی، علوم تشریحی و بیولوژی سلوی
Email: Nikravesh@hotmail.com

جفت‌گیری و تعیین روز صفر بارداری به ۲ گروه تجربی و ۲ گروه کترل تقسیم شدند. شرایط نگهداری حیوانات دمای 22 ± 1 درجه سانتی‌گراد و دوره نور و تاریکی ۱۲ ساعت با آب و غذای کافی در نظر گرفته شد. به گروه تجربی ۱ از روز پنجم تا پایان دوره بارداری روزانه 3 mg/kg نیکوتین محلول در نرمال سالین به صورت داخل صفائی تزریق شد [۱۱] و در گروه تجربی ۲ این عمل تا دوهفته پس از زایمان ادامه یافت. گروه‌های کترل نیز حجم مشابهی از نرمال سالین در زمان‌های مشابه دریافت نمودند. در پایان دوره همه نوزادان تجربی و کترل پس از بیهوشی عمیق قطع نخاع شده و ریه‌های آنان به مدت ۲۴ ساعت در فرمالدهید ۱۰ درصد تثبیت شد و به منظور مطالعات ایمونوھیستوشیمی مورد آماده‌سازی بافتی قرار گرفت.

روش‌های ایمونوھیستوشیمی

روش به کار رفته در این تحقیق تکنیک آویدین-بیوتین پراکسیداز بود. برش‌هایی که از ریه نوزادن به دست آمده بود به میزان دو بار و هر بار به مدت ۵ دقیقه در PBS (حاوی $1/5$ درصد کلرور سدیم در $\text{pH} = 7/4$) شستشو داده شد. برای بلوك کردن آنتی‌ژنهای غیر اختصاصی، ابتدا برای مدت ۳ ساعت، برش‌ها در مجاورت تریتون $0/۳$ درصد $X100$ در PBS و goat serum و پس از آن برای مهار فعالیت آندوزنáz پراکسیداز به مدت ۱ ساعت در محلول 3 درصد آب اکسیژنه در متابولول قرار گرفت و در ادامه با آنتی‌بادی کلاژن IV (کانژوگه شده با Horse radish peroxidase (Horse radish peroxidase) به مدت 50 به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شد و سپس مجدداً در محلول PBS حاوی تریتون 3 درصد و سرم 2 درصد قرار گرفت و آنگاه 3 بار و هر بار به مدت 10 دقیقه در بافر تریس شستشو داده شد. پس از این مرحله، برش‌ها برای مدت 15 دقیقه در معرض دی-آمینو بنزیدین (Di-aminobenzidine) حاوی $0/۰۳$ درصد آب اکسیژنه قرار داده شد و در نهایت پس از شستشوی نمونه‌ها برای ایجاد رنگ زمینه از هماتوکسیلین استفاده شد. برش‌ها با ژل گلیسرول تثبیت شد و با میکروسکوپ نوری بررسی شد.


هormون‌ها تنظیم می‌شوند) باعث جهت دهی به اسکلت سلولی و رشد بافت می‌شود [۵]. در این راستا بعضی از محققین، رابطه مستقیمی بین غشای آلومئلی (Blood-Gas Barrier) و کشش مکانیکی ایجاد شده توسط حرکات تنفسی جنین یافته‌اند [۶]. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که کشش مکانیکی از تکثیر فیروblast‌ها جلوگیری می‌کند و (زمانی که به طور طبیعی ضخامت مزانشیم کاهش یافته) باعث تحریک آپوپتوز در مرحله کانالیکولار ریوی می‌شود [۶]. این موضوع نشان می‌دهد که به طور طبیعی آپوپتوز در زمان تکامل سیستم تنفسی نیز اتفاق می‌افتد و چنانچه عاملی بر این روند تأثیر بگذارد به نقايسن تکاملی ریه‌ها خواهد انجامید. از سوی دیگر ماتریکس خارج سلولی جزء مهمی از پارانشیم ریه است که در تکامل داربست بافت همبند ریه و حفظ ساختار و عملکرد آن اهمیت فوق العاده‌ای دارد [۷]. بنابراین هر گونه تغییر در ماده خارج سلولی یا غشای پایه سلول‌های ریوی ممکن است حتی بر تمایز سلولی آن نیز اثر بگذارد [۸-۱۰]. ماتریکس خارج سلولی به طور عمده از رشته‌های کلاژن، الاستیک، رشته‌های رتیکولر، گلیکوپروتئین‌ها، پروتئوگلیکان‌ها و گلیکوز آمینوگلیکان‌ها تشکیل شده است که در این میان الیاف کلاژن و به‌ویژه کلاژن نوع IV نقش تعیین کننده‌ای در ساختمان آن ایفا می‌نماید. بنابراین با توجه اینکه نیکوتین طی دوران جنینی با عبور از سد جفتی و پس از تولد از طریق شیر مادر به جنین‌ها و نوزادان منتقل شده و بر بافت همبند تأثیر گذارد، ضروری به نظر می‌رسد که نتیجه این تأثیر گذاری بر ریه نوزادان از طریق تغییرات عناصر تشکیل دهنده بافت همبندی آن از جمله کلاژن نوع IV ارزیابی شود.

مواد و روش‌ها

تجویز نیکوتین و تهیه بافت

در این مطالعه از 24 موش ball/c استفاده شد که پس از

از نمونه‌های تجربی بود. چنین تغییری در غشای پایه گروه کترل مثبت نیز به شکل خفیف ارزیابی شد (شکل ۴g). تغییرات غشای پایه آندوتیلیوم عروقی گروه‌های تجربی نیز در مقایسه با گروه‌های کترول به شکل معنی‌داری افزایش یافت (شکل ۵) اما در گروه‌های تجربی ۱ و ۲ نسبت به هم‌دیگر تغییر چشمگیری ملاحظه نشد (شکل ۴). در ارزیابی ماده خارج سلولی گروه‌های تجربی، بیان کلائز به رنگ طلایی روشن دیده شد (شکل‌های ۳e و ۳f). که نسبت به هم‌دیگر معنی‌دار نبود. این رنگ‌پذیری اگرچه در خصوص سایر گروه‌ها با این شدت دیده نشد اما در نمونه‌های کترول مثبت (شکل ۴h) تقریباً معادل با گروه‌های تجربی واکنش نشان داد.



شکل ۱. مقاطع مربوط به اپیتلیوم برونژیال نوزادان ۱۴ روزه موش در گروه تجربی ۱ (a)، کترول ۱ (b)، که در نمونه تجربی غشای سلولی اپیتلیوم مجاري تنفسی (پیکان دو شاخه) به خوبی واکنش نشان داد و این واکنش در غشای پایه سلولی به رنگ قهوه‌ای روشن (پیکان‌های نشانه قابل مشاهدا است. این واکنش در غشای سلولی اپیتلیوم کترول نیز با شدت کمتری دیده می‌شود اما در غشای پایه وجود ندارد (رنگ آمیزی زمینه: هماتوکسیلین، بار: ۱۰۰ میکرومتر).


به اعتبار اینکه واکنش به رنگ‌پذیری کلائز نوع IV که با استفاده از آنتی‌بادی مونوکلونال صورت می‌گیرد شاخص مناسبی در تعیین تراکم این نوع کلائز محسوب می‌شود، درجه رنگ‌پذیری بر اساس روش درجه‌بندی فرت (Firth) و همکاران [۱۲] به عنوان معیار تغییرات کلائز مد نظر قرار گرفت. در این روش واکنش بافت به آنتی‌بادی به کار رفته از صفر تا ۴ (واکنش منفی، خفیف، ملایم و شدید) به صورت دونفره و جدای از یکدیگر درجه‌بندی می‌شود و از حالت کیفی به کمی تبدیل می‌شود. در پایان نتایج مبتنی بر مطالعات میکروسکوپیک ارزیابی شد و با استفاده از میکروسکوپ دوربین دار Olympus B57 از مناطق مورد نظر اقدام به تهیه عکس‌های دیجیتال شده و فایل مربوط به آن ذخیره شد. پس از مطالعه عکس‌ها ارزیابی کلائز در نواحی غشای پایه آلوئولی و پارانشیم ریوی، بر اساس شدت واکنش، به صورت دو نفره و جدای از یکدیگر درجه‌بندی شد.

آنالیز آماری


داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه و آزمون کروسکال والیس و من-ویتنی تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی‌داربودن برای یافته‌های این مطالعه $P < 0.05$ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها


ردیابی کلائز در گروه‌های مختلف مورد مطالعه نشان داد که غشای سلولی اپیتلیوم مجاري تنفسی در همه نمونه‌ها تقریباً واکنش مشابهی نشان داده است (شکل‌های ۱-۳). علاوه بر این؛ واکنش ملایمی در غشای پایه اپیتلیوم آلوئل‌های ریوی مربوط به گروه تجربی ۱ (شکل ۱a) دیده شد که چنین عکس العملی در گروه کترول مشابه (شکل ۱b) وجود ندارد. غشای پایه اپیتلیوم تنفسی گروه تجربی ۲ (شکل ۲d) به شکل چشمگیری واکنش نشان داد که این عکس العمل اگرچه در گروه کترول مشابه (شکل ۲c) نیز دیده شد اما بسیار ضعیف‌تر



شکل ۲. مقاطع مربوط به اپیتلیوم برونшиال نوزادان ۱۴ روزه موش در گروه کنترل ۲ (c)، و تجربی ۲ (d)، که در نمونه تجربی واکنش غشای پایه اپیتلیوم تنفسی (پیکان‌های نشانه) شدت یافته است. این واکنش اگرچه در نمونه کنترل نیز دیده می‌شود اما مقدار آن اندک است. علاوه بر این واکنش ماتریکس خارج سلولی نمونه تجربی نسبت به کنترل افزایش یافته است.




شکل ۲. مقاطع مربوط به اپیتلیوم برونшиال نوزادان ۱۴ روزه موش در گروه کنترل ۲ (c)، و تجربی ۲ (d)، که در نمونه تجربی واکنش غشای پایه اپیتلیوم تنفسی (پیکان‌های نشانه) شدت یافته است. این واکنش اگرچه در نمونه کنترل نیز دیده می‌شود اما مقدار آن اندک است. علاوه بر این واکنش ماتریکس خارج سلولی نمونه تجربی نسبت به کنترل افزایش یافته است.



شکل ۳. مقاطع مربوط به پارانشیم ریوی یک نمونه تجربی ۱ (e) و تجربی ۲ (f) که ماتریکس خارج سلولی در هر دو مورد نسبت به آنتی‌کلاژن نوع IV واکنش نشان داده است. در تصویر f علامت ستاره مقطع کامل یک آلوئول ریوی را نشان می‌دهد.

مشاهده شد. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که نوزادانی که از طریق جفت یا از طریق جفت و شیر مادر نیکوتین دریافت کرده‌اند به نوعی در معرض نفایص تکاملی ریه و بروز آسیب‌های ریوی هستند که تغییرات کلائز نوع IV و نکروز بافتی از نشانه‌های بارز آن است. در مطالعات قبلی نیز نقش کلائز نوع IV در ارتباط با شکل‌گیری و تکامل بسیاری از ارگان‌های جنبی مدنظر قرار گرفت. در این یافته‌ها نشان داده شد که بیان این پرتوئین در تکامل شبکیه دارای نقشی کلیدی است [۱۳]. هچنین در ارتباط با تکامل عدسی نیز ساختار اپیتلیوم قدامی و ماتریکس عدسی به‌ویژه بخش حاشیه‌ای ساختمان آن به این مولکول وابستگی نشان داد [۱۲ و ۱۴]. یافته‌های دیگر در این زمینه مشخص نمود که شکل‌گیری گلومرول‌ها [۱۵ و ۱۶] و پیدایش توبول‌های کلیوی به شکل غیر قابل انکاری در گروه کلائز نوع IV است [۱۷ و ۱۸]. علاوه بر این؛ نقش آن در تکامل کورونید مغزی نشان داد که این شبکه عروقی تغییر شکل یافته وابسته به وجود غشای پایه‌ای است که صرف‌نظر از سایر پرتوئین‌هایی که در آن به کار گرفته شده، کلائز نوع IV در ساختار آن نقشی تعیین‌کننده دارد [۱۹]. بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که غشاهای پایه اندوتیالی و اپیتلیالی و همچنین ماده خارج سلولی بافت‌های مختلف از وجود این پرتوئین به خوبی سود می‌برند و در این میان غشای پایه تنفسی و ماده خارج سلولی پارانشیم ریوی از این قاعده مستثنی نیست [۲۰-۲۳]. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که هر عاملی که بتواند بر روند تنظیم کلائز نوع IV طی فرایند سیستم تنفسی یا حتی بعد از آن اثر بگذارد می‌تواند به نوعی سلامت این ارگان حیاتی را دچار مخاطره نماید. یافته‌های این مطالعه نشان داد که کلائز ریوی نوزادانی که مادرانشان در معرض دریافت نیکوتین بوده‌اند تغییر می‌کند و بر ساختار غشای پایه و ماده بین سلولی سیستم تنفسی آنان تأثیر می‌گذارد. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که دریافت نیکوتین چه از طریق جفت و چه از طریق شیر مادر می‌تواند



شکل ۵. شمارش در هر یک از گروه‌ها ۱۰۰ مورد و با بزرگنمایی انجام شده و شدت واکنش کلائز از خفیف تا شدید در چهار رتبه و با علامت + نشان داده شده است. عدم واکنش کلائز (-)، ضعیف (+)، ملایم (++)، شدید (+++) و بسیار شدید (++++) در نظر گرفته شده است. برای تبدیل اعداد کمی به جای منفی عدد ۰، به جای + عدد ۱۰، به جای ++ عدد ۲۰، به جای +++ عدد ۳۰ و به جای +++++ در نظر گرفته شد. * p=<0.05

نتیجه

بر اساس مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد که ماده خارج سلولی و غشای پایه نقش مهمی در فرایند تکامل بافت‌ها بر عهده دارند. غشای پایه نواحی تخصص یافته‌ای از ماتریکس خارج سلولی است که حاوی مولکول‌ها و اجزای خاصی است و نقش‌های مختلفی از قبیل تنظیم تکامل، تکثیر، تعیین شکل و ایجاد بستری برای مهاجرت سلولی را بر عهده دارد. در بین ترکیبات غشای پایه، کلائز نوع IV ساختار اصلی این بخش را تشکیل می‌دهد. یافته‌های این مطالعه نشان داد که افزایش معنی‌داری در کلائز غشای پایه آلوئول‌های ریوی نوزادان گروه‌های تجربی وجود دارد و چنین روند افزایشی در ماتریکس خارج سلولی پارانشیم ریوی این نوزادان نیز دیده می‌شود. از سوی دیگر؛ اگر چه سنتز کلائز غشای پایه گروه‌های تجربی نسبت به همدیگر معنی‌دار نبود اما نسبت به گروه‌های کنترل تفاوت چشمگیری نشان داد. در عین حال کلائز ماتریکس خارج سلولی در ریه نوزادان گروه تجربی ۲ نسبت به گروه تجربی ۱ افزایش بیشتری یافته و حتی شواهد انکار ناپذیری از نکروز بافتی و مرگ سلولی

به درستی مشخص نیست [۲۷]. در عین حال همان‌طور که اشاره شد تأثیر نیکوتین را بر فرایند گلیکولیز نباید از نظر دور داشت یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که نیکوتین باعث پراکسیداسیون لیپیدها می‌شود که این موضوع کاهش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی ریه را به دنبال دارد. در این صورت عدم تعادل بین اکسیدان‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها باعث تغییر برنامه ژنی و در نتیجه کاهش گلیکولیز شده و در نتیجه به بیان و سنتز غیرطبیعی پروتئین‌هایی مثل کلائز نوع IV منجر شود و ممکن است از این طریق زمینه تغییرات هیستوپاتولوژیک را در ریه‌ها فراهم نماید.

تقدیر و تشکر

این مطالعه در قالب یک طرح پژوهشی بین دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی زابل صورت گرفته و هزینه‌های آن توسط معاونت محترم پژوهشی دانشگاه زابل تأمین شده است. بنابراین بدینوسیله از مساعدت‌های به عمل آمده در این زمینه تقدیر و تشکر می‌گردد. همچنین از خدمات تکنیکی سرکارخانم متعدد در آزمایشگاه تخصصی بافت شناسی دانشکده پزشکی مشهد قدردانی می‌شود.

References

- Sekhon HS, Proskocil BJ, Clark JA, Spindel ER.** Prenatal nicotine exposure increases connective tissue expression in foetal monkey pulmonary vessels. *Eur Respir J* 2004, 23: 906-15.
- Wasowicz M, Yokoyama S, Kashima K, Nakayama I.** The connective tissue compartment in the terminal region of the developing rat lung. An ultrastructural study. *Acta Anat (Basel)* 1996, 156:268-282
- Wasowicz M, Biczyk W, Marszalek A, Yokoyama S, Nakayama I.** Ultrastructural studies on selected elements of the extracellular matrix in the developing rat lung alveolus. *Folia Histochem Cytobiol* 1998, 36:3-13
- Rosenbloom J, Abrams WR.** Elastin and microfibrillar apparatus. *Connective Tissue and Its Heritable Disorders. Molecular, Genetic, and Medical Aspects*. Edited by Royce PM, Steinmann B. New York, Wiley-Liss Inc., 2002, pp 249-269
- Torday J.** Cellular timing of foetal lung development. *Seminars in perinatology*, 1992, 16(2): 130-139.
- Sanchez-Esteban J, Wang Y, Cicchielo LA and Rubin LP.** Pre and postnatal lung development, سلامت ریه‌ها تأثیر بگذارد [۲۵]. تحقیقات نشان داده است که در حیواناتی که در معرض نیکوتین قرار گرفته‌اند، فرایند گلیکولیز مهار می‌شود که این امر به کاهش و از بین رفتن سلول‌های نوموسيت I و از سوی دیگر باعث افزایش نوموسيت‌های نوع II می‌شود [۲۶]. نتیجه این امر باعث به هم خوردن مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی (programmed cell death) خواهد شد که هنوز هم بعضی از جنبه‌های آن

- maturation and plasticity. Cyclic mechanical stretch inhibits cell proliferation and induces apoptosis in foetal rat lung fibroblasts. *Am. J. Physiol. Lung Cell. Mol. Physiol.* 2002, 282:448-456.
7. **Shifren A and Mecham RP.** The stumbling block in lung repair of emphysema: elastic fiber assembly. *Proc. Am. Thorac. Soc.* 2006, 3(5): 428-433.
 8. **Burgess JK, Ceresa C, Johnson SR, Kanabar V, Moir LM, Nguyen TT, Oliver BG, Schuliga M, Ward J.** Tissue and matrix influences on airway smooth muscle function. *Pulm Pharmacol Ther.* 2009, 22(5):379-387.
 9. **Hilfer, S. R. Morphogenesis of the lung.** control of embryonic and fetal branching. *Annu. Rev. Physiol.* 1996, 58:93-113.
 10. **Goldin, G. V., and N. K. Wessells.** Mammalian lung development: the possible role of cell proliferation in the formation of supernumerary tracheal buds and in branching morphogenesis. *J. Exp. Zool.* 1979, 208:337-346.
 11. **Hisz SH, Schulman SR, Meliones JN, Canada AT, Chen SC.** Effects of maternal nicotine exposure on branching morphogenesis of mouse fetal lung: in vivo and in vitro studies. *Acta Paediatr Taiwan.* 2003, 44(3):150-154.
 12. **Firth NA, Reade PC.** The prognosis of oral mucosal squamous cell carcinomas: a comparison of clinical and histopathological grading and of laminin and type IV collagen staining. *Aust Dent J.* 1996, 41(2):83-86.
 13. **Nikravesh Mohammad Reza, Jalali Mehdi, Moein Abbas Ali, Karimfar Mohammad Hassan, Mohammadi Shabnam, Rafighdoust Houshang.** The key role of type IV collagen in developing retinal basement membrane. *Scientific Journal of Guilan University of Medical sciences,* 2010, 18(72):62-67.
 14. **Jalali Mehdi, Nikravesh Mohammad Reza, Moein Abbas Ali, Karimfar Mohammad Hassan, Mohammadi Shabnam, Rafighdoust Houshang.** Immunohistochemical study of retinal collagen type IV expression during lens development, *Scientific Journal of Babol University of Medical Sciences,* 2010, 11(6): 58-63.
 15. **Karimfar Mohammad Hassan, Nikravesh Mohammad Reza, Jalali Mehdi, Moein Abbas Ali, Rafighdoust Houshang.** Immunohistochemical Study Collagen IV Changes in Glomerular Basement Membrane During Fetal and Postnatal Periods of Balb/c Mice . *Iranian Journal of Anatomical Sciences,* 2009, 6 (25, 26):559-567.
 16. **Nikravesh Mohammad Reza, Jalali Mehdi, Karimfar Mohammad Hassan, Moein Abbas Ali, Saeedi Nejat Shahin, Mohammadi Shabnam, Rafighdoust Houshang.** The role of collagen IV in formation glumerolar and mesengial cells basement membrane. *J. Cell. Mol. Res.,* 2009, 1(2): 90-95.
 17. **Jalali Mehdi, Nikravesh Mohammad Reza, Moein Abbas Ali, Karimfar Mohammad Hassan, Saeedi Nejat Shahin, Mohammadi Shabnam, Rafighdoust Houshang.** Inductive role of type IV Collagen in nephrogenesis. *Urology Journal of Iran,* 2009, 6(4): 289-294.
 18. **Moein Abbas Ali, Jalali Mehdi, Nikravesh Mohammad Reza, Karimfar Mohammad Hassan, Rafighdoust Houshang.** Study of Expression Type IV Collagen During Mouse Kidney Tubulogenesis in Balb/c Mice . *Iranian Journal of Anatomical Sciences,* 2008, 6 (24):471-479.
 19. **Nikravesh Mohammad Reza, Jalali Mehdi, Moein Abbas Ali, Karimfar Mohammad Hassan, Mohammadi Shabnam, Rafighdoust Houshang.** Study of basement membrane type IV collagen appearance in the brain choroids plexus of mouse fetuses. *Scientific journal of Hamadan university of medical sciences & health services,*

- 2009, 16 (1): 5-9.
20. **West JB.** Comparative physiology of the pulmonary blood-gas barrier. the unique avian solution. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2009, 297(6): 1625-1634.
21. **Kang D, Nakayama T, Togashi M, Yamamoto M, Takahashi M, Kunugi S, Ishizaki M, Fukuda Y.** Two forms of diffuse alveolar damage in the lungs of patients with acute respiratory distress syndrome. Hum Pathol. 2009, 40(11):1618-1627.
22. **Hinenoya N, Naito I, Momota R, Sado Y, Kumagishi K, Ninomiya Y, Ohtsuka A.** Type IV collagen alpha chains of the basement membrane in the rat bronchioalveolar transitional segment. Arch Histol Cytol. 2008, 71(3):185-194.
23. **Lan KP, Lai SC.** *Angiostrongylus cantonensis*. induction of urokinase-type PA and degradation of type IV collagen in rat lung granulomatous fibrosis. Exp Parasitol. 2008, 118(4):472-477.
24. **Gert SM.** Nicotine and Lung Development. Birth Defects Res. 2008, 84:45-53.
25. **Maritz GS.** Lung glycogen metabolism in suckling rats: a comparative study. Biol Neonate. 1988, 54:100-106.
26. **Maritz GS, Thomas RA.** Maternal nicotine exposure: reponse of type II pneumocytes of neonatal rat pups. Cell Biol Inter. 1995, 19 (4): 323-332.
27. **Johannes CS, Valentin D, Alan F, Peter HB.** Programmed cell death contributes to postnatal lung development. Am J Respir Cell Mol Biol. 1998, 18: 786-793.