

اثر نوروتروفین ۳ بر تمایز سلول‌های بنیادی فولیکول موی موش صحرایی به سلول‌های شبه نورون

فاطمه مغنی قرقی.^{*}، ملیحه نوبخت.^{*}، مهرداد بختیاری.^{*}، بنفشه اسماعیلزاده.^{**}، لیلا بیگم حجازیان.^{***} M.Sc.

* گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

** گروه بافت شناسی و علوم اعصاب و مرکز تحقیقات مقاومت‌های ضد میکروبی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

*** گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، و گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ایران

**** گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، و گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
تاریخ پذیرش: دی ماه ۹۰ تاریخ پذیرش: اسفند ماه ۹۰

چکیده

هدف: بررسی تأثیر NT-3 بر کاهش زمان تمایز سلول‌های بنیادی ناحیه bulge فولیکول مو به سلول‌های شبه نورون

مواد و روش‌ها: ابتدای فولیکول‌های ناحیه گونه و پشت لب موش صحرایی جداسده و ناحیه bulge آن کشت داده شد. سلول‌های بنیادی به دست آمده از ناحیه bulge در محیط DMEM/F12 حاوی EGF در ۳ گروه کشت داده شدند. در این ۳ گروه پاساژ در روزهای ۷ و ۸ و ۹ انجام شد. سپس هر گروه به مدت ۳ روز در مجاورت NT-3 با دوز ۱۰ نانوگرم در میلی‌لیتر قرار داده شدند. به‌وسیله روش ایمونوستیوژنی تمایز سلول‌ها با آنتی‌بادی بتاتری توبلوین (βIII-tubulin) در این سه گروه بررسی و با گروه کنترل مقایسه شد. نتایج با استفاده از آزمون T تی تست آنالیز شده و $p < 0.05$ به عنوان سطح اختلاف معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در این مطالعه سلول‌های بنیادی به دست آمده از ناحیه bulge فولیکول در ۷-۹ روز اول نشانگر CD34 و طی ۱۰-۱۲ روز اول نشانگر نستین را بیان کردند. سپس پس از دریافت NT-3 به مدت ۳ روز در گروه‌های ذکر شده همزمان با روند تمایز، این سلول‌ها با آنتی‌بادی بتاتری توبلوین (βIII-tubulin) واکنش مثبت نشان دادند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، NT-3 بر تسريع روند تمایز سلول‌های بنیادی فولیکول مو اثر معنی‌داری دارد و حتی می‌تواند در کمتر از ۱۰ روز سلول‌های بنیادی ناحیه bulge را به سلول‌های شبه نورون متمايز کند.

کلید واژه‌ها: bulge فولیکول مو، CD34، نستین، NT-3، بتاتری توبلوین

مقدمه

گرفته است. در این راستا، استفاده از سلول‌های بنیادی برای تمایز به سلول‌های شبه نورون، مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به پیشرفت‌های جدید در علوم اعصاب و کشت سلولی، درمان‌های جدید برای ترمیم عصبی مدد نظر قرار

آدرس مکاتبه: تهران، بزرگراه همت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه آناتومی و علوم اعصاب، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۸۳ Email: m-nobakht@sina.tums.ac.ir

جنینی و رویانی، توانایی در رشد مجدد نورون‌ها و قابلیت پیوند اتولوگ است [۷].

در سال ۲۰۰۹ آمو (Amoh) و همکاران توانستند در مدت ۴–۳ هفته از این سلول‌ها، سلول‌های GFAP و β III tubulin K15 مثبت به دست آورند. همچنین نوبخت و همکاران در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب در مدت ۸ و ۳ هفته توانستند از این سلول‌ها، سلول‌های β III tubulin مثبت به دست آورند [۸-۱۰].

نوروتروفین‌ها بهترین فاکتورهای تروفیک شناخته شده در سیستم عصبی هستند. نوروتروفین‌ها از خانواده فاکتورهای رشد پلی پپتیدی هستند که روی افزایش، تکثیر، تمایز، زنده ماندن و مرگ سلول‌های نورونی و غیر نورونی تأثیر می‌گذارند. این فاکتورها برای سلامتی و بهبود سیستم عصبی لازم و ضروری است. این فاکتورها شامل NGF، BDNF، NT-3 و NT-4 است که علاوه بر عملکرد اصلی شان برای زنده نگهداشت سلول‌ها، فعالیت‌هایی در سطح بالاتر از قبیل یادگیری، حافظه و رفتار را نیز واسطه‌گری می‌کنند [۱۱].


فاکتورهای نوروتروفیک در دوران تکامل و بلوغ در پاسخ به آسیب‌های عصبی عملکرد تنظیم نورونی را انجام می‌دهد [۱۲]. نوروتروفین‌ها در پاتوفیزیولوژی گروه گسترده‌ای از اختلالات نورودوئرأتیو و روانی، موثر شناخته شده‌اند. همچنین تغییرات در سطح نوروتروفین‌ها در اختلالات نورودوئرأتیو مانند بیماری آزاریم و هانتیگتون و اختلالات روانی شامل افسردگی و سوء مصرف مواد یافت شده است. در نتیجه نوروتروفین‌ها به عنوان یک استراتژی درمانی برای اختلالات روانی – عصبی مورد توجه قرار گرفته‌اند. تأثیر نوروتروفین‌ها بستگی به دو عامل دارد: سطح و میزان در دسترس بودن آن‌ها و تمایل آن‌ها برای اتصال به رسپتورهای خالل غشایی و واکنش‌های آبشاری سیگنانالی که پس از اتصال به رسپتور تحریک می‌شود [۱۱].

نوروتروفین‌ها ابتداً به شکل پیش سازها یا پیش-نوروتروفین‌ها ساخته می‌شوند که این پیش سازها شکسته شده و پروتئین فعال بالغ را آزاد می‌کنند [۱۳]. پروتئین‌های بالغ دایمرهای پایدار غیر کووالان را تشکیل می‌دهند و معمولاً در طول دوران تکامل در

برای این منظور استفاده از سلول‌های بنیادی بالغ موجود در ناحیه bulge فولیکول مو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. NT-3 نیز به عنوان یکی از فاکتورهای تروفیک شناخته شده سیستم عصبی برای ایفای نقش مهم تسهیل در زنده ماندن و تمایز نورونی طی تکامل بسیار مورد توجه است. از آنجایی که کوتاه کردن زمان ترمیم عصبی فاکتور بسیار مهمی در روند درمان است؛ در پژوهش حاضر تأثیر NT-3 بر کاهش زمان تمایز سلول‌های بنیادی ناحیه bulge فولیکول مو به سلول‌های شبه نورون بررسی شد.

بدن انسان از سه دسته سلول ساخته می‌شود: سلول‌های جنسی، سلول‌های سوماتیک یا احتشایی و سلول‌های بنیادی. سلول بنیادی سلولی است که تمایز نیافته و دارای قابلیت تقسیم زیادی است. این سلول‌ها هم دارای خاصیت خود تکثیری هستند و هم پتانسیل تبدیل شدن به انواع سلول‌های تخصص یافته بالغ را دارند [۱]. اگرچه زمانی تصور براین بود که ترمیم سیستم عصبی مرکزی پستانداران غیرممکن است اما مطالعات دو دهه اخیر نشان داده است که ترمیم سلول‌های عصبی می‌تواند در یک محیط مناسب رخداده. پیوند بافتی یا گرافت‌های عصب محیطی برای ترمیم نواحی آسیب دیده سیستم عصبی مرکزی به صورت سنتی استفاده می‌شود. اما در این روش‌ها اختلالات ایمونولوژیکی و بیماری‌های عفنونی مشکل ساز است. خوشبختانه پیشرفت‌های جدید در علوم اعصاب و کشت سلولی، درمان‌های جدید برای ترمیم عصبی پیش رو قرار داده است [۲]. در این راستا استفاده از سلول‌های بنیادی برای تمایز به نورون‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. به این منظور می‌توان از انواع سلول‌های بنیادی استفاده کرد. از جمله سلول‌های بنیادی بالغ، سلول‌های بنیادی موجود در ناحیه bulge فولیکول مو در نزدیک محل اتصال عضله راست کننده مو زیر غدد سباسه هستند. این ناحیه دارای سلول‌های بنیادی چند ظرفیتی است [۳]. همچنین بیان نستین (نشانگر سلول‌های بنیادی عصبی) در این سلول‌ها نشانده‌نده خاستگاه این سلول‌ها از ستیغ عصبی است [۴-۶]. سلول‌های بنیادی فولیکول مو دارای مزایای متعددی هستند. از جمله این مزایا در دسترس بودن آن‌ها، اختصاصی بودن برای هر فرد، کشت راحت و آسان، چند ظرفیتی بودن، نداشتن موارد اخلاقی سلول‌های بنیادی

بافت خارج شد (شکل ۱-A). با دو برش عرضی در ناحیه فوقانی و تحتانی فولیکول ناحیه Bulge جداشد (شکل ۱-B). سپس به مدت چند دقیقه در محیط DMEM/F12 محتوی پنی‌سیلین ۱۰۰ واحد در میلی لیتر، استریوتومایسین ۱۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر انکوبه شد. سپس فولیکولها در Trypsin-EDTA ۰/۲۵ درصد به مدت ۲۰ دقیقه در دمای اتاق و زیر هود لامیناریه صورت قطعات کوچک درآمدند. در نهایت قطعات فولیکول به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۱۲۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند.



شکل ۱. فتوگراف از فولیکول موی رت ویستار. (A) فولیکول همراه با بافت همبند و کپسول اطراف آن. (B) ناحیه Bulge پس از برش طولی کپسول کلاژن (Arrow head). علامت بار: ۵۰۰ میکرومتر

سطح خیلی پایین بیان می‌شوند. تأثیرات سلولی نوروتروفین‌ها از طریق ۲ رسپتور متفاوت اعمال می‌شود: رسپتور تیروزین کیناز (Trk) و P75 رسپتور نوروتروفین (P75 NTR) به صورت اختصاصی به TrkC متصل می‌شود. NT-3 به دلیل اینکه نقش مهم تسهیل در زندگاندن و تمایز نورونی طی تکامل بسیار مشهور است [۱۴].

در سال ۲۰۰۹ لی (Li) و همکاران تمایز سلول‌های NSC را به سلول‌های نورونی با استفاده از NT-3 با دوز ۲۰ نانوگرم در میلی لیتر و بعد از مدت ۲ هفته عنوان کردند [۱۵]. همچنین ژانگ (Zhang) و همکاران در سال ۲۰۰۹ بعد از مدت ۳ هفته با استفاده از NT-3 تمایز SKPs (Skin-derived precursors) را به نورون گزارش کردند [۱۶] از آنجا که در ترمیم ضایعات عصبی زمان از اهمیت بالایی برخوردار است، در مطالعه حاضر اثر NT-3 بر تمایز سلول‌های بنیادی فولیکول موی موش صحرایی به سلول‌های شبکه نورون در زمانی کمتر از زمان‌های عنوان شده، ارزیابی شد.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه از موش صحرایی ویستار نر با وزن تقریبی ۱۵۰-۲۰۰ گرم استفاده شد. حیوانات از انسستیتو پاستور خریداری شدند و ضمن رعایت قوانین بین المللی حمایت از حیوانات، در شرایط استاندارد ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی نگهداری شدند. آب و غذای کافی در اختیار حیوانات قرار داده شد. برای استخراج سلول‌های بنیادی، از فولیکول موی پشت لب و گونه‌های موش‌های صحرایی استفاده شد. گونه‌های موش به روش اصلاح شده Amoh پس از بیهوشی توسط کلروفرم تشریح شد [۱۷ و ۱۸]. گونه‌ها به وسیله بتادین و الکل ۷۰ درصد ضد عفونی و تراشیده شد. کل بافت پشت لب و گونه‌ها برداشته شد و نمونه‌ها در الکل ۷۰ درصد و ۰/۲ PB pH=7.4 شستشو داده شد. سپس به منظور جدا شدن پوست و بافت اطراف فولیکول‌ها، نمونه‌ها به مدت ۱۵ دقیقه در محلول کلاژنаз I و دیسپاز II با غلاظت ۲ میلی‌گرم بر میلی لیتر در انکوباتور و در دمای ۳۷ درجه انکوبه شد. پس از آن فولیکول‌ها با دقت و توسط یک پنس ظرفی از لابه‌لای

بافر ۰/۱ مولار و pH=۷/۴ شستشو داده شدند. پس از آن نمونه‌ها به مدت یک ساعت در Normal Goat Serum ۳/۰ درصد قرار داده شدند. سپس آنتی‌بادی‌های اوایله در غلظت‌های زیراضافه شد و نمونه‌ها به مدت یک شبانه روز در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد و در تاریکی نگهداری شدند. آنتی‌بادی پلی کلونال CD34 (Sigma, 1:75) (Sigma, 1:75) (Sigma, 1:200)، آنتی‌بادی مونوکلونال K15 بتاتری تویین (Sigma, 1:200) و آنتی‌بادی مونوکلونال K15 (Sigma, 1:30) استفاده شد. پس از گذشت زمان فوق نمونه‌ها به مدت ۱۵ دقیقه و سه بار با فسفات بافر ۰/۱ مولار و pH=۷/۴ شستشو داده شدند و سپس به مدت ۱ ساعت در آنتی‌بادی ثانویه FITC (Sigma, 1:1400) (Sigma, 1:1400)، انکوبه شدند. پس از سه بار شستشو با فسفات بافر، رنگ هسته ۴',۶-diamidino-2-phenylindole (DAPI, 1 µg/ml, Sigma) اضافه شد. سپس یک بار شستشو با فسفات بافر انجام شد. لامل با چسب گلیسروول به لام چسبانده شد و در نهایت سلول‌ها زیر میکروسکوپ فلئورسنت مدل AX70 Olympus مشاهده شدند. در هر نمونه ۵ زمینه به صورت راندوم انتخاب شد و توسط نرم افزار Bioreport Olysia شمارش سلولی انجام شد. سپس یافته‌ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ آزمون آزمون Independent-samples T-test تجزیه و تحلیل شد.

فلوسایتو متري

پس از تریپسینه کردن فلاسک و سانتریفوژ سلول‌ها، تعداد ۱۰۰ هزار سلول در ۱۰۰ میکرولیتر از آنتی‌بادی‌های اوایله (۱:۲۰۰) Nestin (۱:۲۰۰)، β -III Tubulin (۱:۷۵) و K15 (۱:۳۰) به مدت ۱ ساعت در دمای اتاق مجاور شدند. سپس با اضافه کردن ۱-۲ میکرولیتر PB ۰/۱ مولار، سلول‌ها سانتریفوژ شدند. سپس سلول‌ها در ۱۰۰ میکرولیتر آنتی‌بادی ثانویه (۱:۱۴۰۰) FITC به مدت ۱ ساعت در دمای اتاق و در تاریکی قرار داده شدند. پس از زمان فوق آنالیز فلوسایتو متري

کشت Bulge فولیکول مو

پس از سانتریفوژ، قطعات فولیکول در فلاسک کشت فيلتردار ۲۵ سانتی‌متر مربع که یک روز قبل با کلاژن نوع یک پوشانده شده بود، کشت داده شدند. برای کشت سلول‌ها از محیط کشت F12(3:1) DMEM/DMEM حاوی ۰/۵ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر هیدروکورتیزون، ۱۰ نانو‌گرم بر میلی‌لیتر EGF (Sigma-Aldrich) (Epidermal Growth Factor) توکسین (Sigma-Aldrich) به همراه ۱۰ FBS درصد استفاده شد. سپس سلول‌ها در دمای ۳۷ درجه و ۵ CO₂ درصد انکوبه شدند. سلول‌های بنیادی فولیکول مو در روزهای ۹ و ۱۲ به وسیله روش ایمونوستیتوشیمی و فلوسایتو متري ارزیابی شدند. سپس برای بررسی وضعیت تمایز سلول‌ها درسه گروه، پاساژ‌سلول‌ها در سه زمان انجام شد. پاساژ در روزهای ۸، ۸ و ۹ انجام شد. EGF از محیط سلول‌ها خارج شد و NT-3 (Sigma-Aldrich) با دوز ۱۰ نانو‌گرم بر میلی‌لیتر به مدت ۳ روز به محیط کشت اضافه و هر روز محیط کشت سلول‌ها تعویض شد. پس از ۳ روز دریافت NT-3 سلول‌های هر گروه به وسیله روش ایمونوستیتوشیمی بررسی شدند.

ایمونوستیتوشیمی


سلول‌ها با ۲ میلی‌لیتر Trypsin-EDTA ۰/۲۵ درصد از کف فلاسک جدا شدند. سپس به فلاسک ۱۰ FBS درصد اضافه شد. پس از آن سلول‌ها سانتریفوژ شده و روی لاملی که از ۲۴ ساعت قبل با کلاژن پوشانده شده بود، ریخته شدند. ۲۴ ساعت پس از چسبیدن سلول‌ها به لامل محیط روی سلول‌ها برداشته شد و رنگ آمیزی ایمونوستیتوشیمی طبق مراحل زیر انجام شد. سلول‌ها با پارافرمالدیید ۴ درصد به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد تثبیت شدند. سپس به مدت ۱۵ دقیقه و سه بار با فسفات بافر ۰/۱ مولار و pH=۷/۴ شستشو داده شدند. نمونه‌ها به مدت ۲۰ دقیقه در تریتون ۰/۱٪ قرار داده شدند. سپس مجدداً به مدت ۱۵ دقیقه با فسفات

در ۷-۱۰ روز اول کشت و نشانگر Nestin (نشانگر سلول‌های بنیادی عصبی) را در ۱۰-۱۲ روز اول کشت بیان می‌کنند. در حالی که نشانگر K15 (نشانگر کراتینوسيت‌ها) را بیان نمی‌کنند (شکل‌های ۲A، ۲B). همچنین نتایج فلوسایتومنتری بیان نشانگر‌های CD34 و Nestin را در زمان‌های مطرح شده تأیید کرد (شکل ۳).


روی آن‌ها انجام شد.

یافته‌ها


در این پژوهش سلول‌های بنیادی فولیکول موش صحرایی با استفاده از فاکتور EGF کشت داده شدند. این سلول‌های بنیادی نشانگر CD34 (نشانگر سلول‌های بنیادی) را




شکل ۲. ایمونوستیوژئمی سلول‌های بنیادی فولیکول مو. A: بیان CD34 در سلول‌های بنیادی فولیکول مو در ۷-۱۰ روز اول کشت. B: بیان نشانگر Nestin در سلول‌های بنیادی فولیکول مو در ۱۰-۱۲ روز اول کشت. C: پس از گذشت ۳ هفته با شروع روند تمایز سلول‌های بنیادی فولیکول مو به آنتی‌بادی‌های Nestin و اکنشی نشان ندادند. هسته‌ها با DAPI (رنگ هسته) رنگ شد. (فلش‌ها). علامت بار A و B: ۱۰ میکرومتر. C: ۵۰ میکرومتر



شکل ۳. فلوسایتومنتری سلول‌های بنیادی فولیکول موش صحرایی. پس از گیت بندی جمعیت سلولی و اعمال آن روی FL1 میزان سلول‌های Nestin مثبت، سلول‌های CD34 مثبت و K15 مثبت به دست آمد. میزان M2 ۶۵ درصد آنتی‌بادی Nestin در مورد آنتی‌بادی CD34 ۹۲ درصد است ولی در مورد آنتی‌بادی K15 M1 ۹۲ درصد است که منفی در نظر گرفته شد.



شکل ۴. ایمونوستیوژنی سلول‌های بنیادی فولیکول موش صحرایی پس از القای تمایز به نورون بوسیله نوروتروفین ۳. سلول‌ها در روزهای ۷/۸ و ۹ پس از کشت اولیه باسازی داده شدند و پس از ۳ روز دریافت نوروتروفین ۳ ایمونوستیوژنی با آنتی‌بادی بتا تری توبولین انجام شد. سلول‌ها بی که ۱۰ روز پس از کشت اولیه به آنتی‌بادی بتاتری توبولین واکنش مثبت نشان دادند. A: سلول‌های بتاتری توبولین مثبت در گروه ۱۱ روز پس از کشت اولیه. B: سلول‌های تمایز یافته در گروه سوم که ۱۲ روز پس از کشت اولیه بتاتری توبولین مثبت هستند. C: هسته با رنگ DAPI رنگ شده است. علامت بار: ۲۰ میکرومتر



شکل ۵. مقایسه تعداد سلول‌های بیان کننده بتاتری توبولین ۳ در دو گروه کنترل و گروه دریافت کننده NT3 در روزهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲. در روزهای ۱۰ و ۱۱ در گروه کنترل سلول بیان کننده بتا تری توبولین مشاهده نشد. در حالی که در گروه NT-3 سلول بتا تری توبولین مثبت دیده شد. طبق نتایج اختلاف معنی‌داری بین روزهای ۱۰ و ۱۱ مشاهده نشد ولی بین روزهای ۱۰ و ۱۱ با روز ۱۲ اختلاف معنی‌داری مشهود است. * نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین گروه دریافت کننده NT3 در روز ۱۲ نسبت به روزهای ۱۰ و ۱۱ است ($p < 0.05$).

بحث

اخیراً تحقیقات بسیاری درباره سلول‌های بنیادی بالغ انجام

دو هفته پس از کشت سلول‌ها، سلول‌های بنیادی عصبی Bulge فولیکول مو شروع به تمایز به سلول‌های عصبی و غیرعصبی می‌کنند. بنابراین پس از گذشت تقریباً ۳ هفته از کشت سلول‌های بنیادی در ایمونوستیوژنی با آنتی‌بادی‌های Nestin و CD34 هیچ‌گونه واکنشی نشان داده نشد (شکل ۲C). در حالی که به آنتی‌بادی اولیه β Tubulin III و آنتی‌بادی ثانویه FITC واکنش نشان داده و سلول‌های تمایز یافته نورونی در زیر میکروسکوپ فلورسانس مشاهده شدند.

به منظور سرعت بخشیدن به روند تمایز سلول‌های بنیادی فولیکول مو به نورون از فاکتور-3 NT با دوز ۱۰ نانوگرم در میلی‌لیتر، به مدت سه روز استفاده شد. سلول‌ها در ۳ گروه زمانی در روزهای ۱۱، ۱۰ و ۱۲ مقایسه شدند. در این سه گروه سلول‌ها پس از دریافت NT-3 به آنتی‌بادی بتا تری توبولین واکنش مثبت نشان دادند (شکل ۴).

شمارش سلول‌ها در این سه گروه و گروه کنترل انجام شد. در آنالیز آماری $p < 0.05$ بود که نشان دهنده اختلاف معنی‌دار بین گروه دریافت کننده NT-3 و گروه کنترل بود (شکل ۵). نتایج به دست آمده، تمایز در هر سه گروه روزهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ را نشان داد.

درمان ضایعات سیستم عصبی از اهمیت بالایی برخوردار است، برای کوتاه کردن زمان تمایز سلول‌های بنیادی ناحیه Bulge به سلول‌های شبه نورونی از فاکتور نوروتروفیک NT-3 استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اضافه کردن NT-3 با دوز ۱۰ نانوگرم برمیلی لیتر تأثیر معنی‌داری بر کاهش زمان تمایز سلول‌های بنیادی فولیکول مو در مقایسه با زمان‌های گزارش شده دارد و زمان تمایز این سلول‌ها از ۸ و ۳ هفته به ۱۰ روز کاهش داده شد. در این پژوهش در روزهای ۹-۱۰ و ۱۱ پس از کشت اولیه به مدت ۳ روز و با دوز ۱۰ نانوگرم بر میلی لیتر NT-3 به محیط کشت سلول‌ها اضافه شد. نتایج به دست آمده از ایمونوستیوشیمی سلول‌های تمایز یافته نشان داد که سلول‌های بنیادی ناحیه Bulge فولیکول مو حتی در روز ۱۰ پس از کشت اولیه نیز با دریافت دوز بیان شده NT-3 قادر به بیان پروتئین β -III tubulin هستند. همچنین نتایج شمارش سلولی در این مطالعه نشان داد که با افزایش سن سلول‌های بنیادی میزان تمایز به سلول‌های شبه نورون افزایش می‌یابد. در این پژوهش مشاهده شد که میزان تمایز در روز ۱۲ نسبت به روزهای ۱۰ و ۱۱ به طور معنی‌داری افزایش یافت در حالی که شمارش نورونی در روزهای ۱۰ و ۱۱ با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشت.

در مطالعات دیگری فرناندز (Fernandes) و همکاران در سال ۲۰۰۴، با استفاده از NT-3 با دوز ۱۰ نانوگرم در میلی لیتر و پس از ۱۴ روز و Zhang و همکاران در سال ۲۰۰۹، با دوز ۲۰ نانوگرم در میلی لیتر و پس از ۲۱ روز توانستند سلول‌های SKPs را به سلول‌های β -III Tubulin مثبت تمایز دهند [۲۴ و ۲۶]. محققان در بررسی حاضر در زمانی کوتاه‌تر از زمان‌های فوق و پس از ۱۰ روز سلول‌های بنیادی فولیکول موی موش صحرایی را به سلول‌های شبه نورون تمایز نمودند.

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که نوروتروفیک ۳ اثر نوروتروفیک مؤثری بر سلول‌های بنیادی ناحیه

شده است زیرا مشکلات سلول‌های بنیادی رویانی و جنینی از جمله مشکلات مربوط به تطبیق ایمونولوژیکی را ندارند. فولیکول مو یک ارگان کوچک فعال است که دستخوش تغییرات دوره‌ای در دوران رشد است. همچنین یک منبع فعال و در دسترس سلول‌های بنیادی چند ظرفیتی بالغ است [۱۷ و ۱۸]. مطالعات محققان نشان داده است که ناحیه Bulge دارای سلول‌های بنیادی است که قابلیت تمایز به انواع سلول‌های فولیکول را دارند [۱۹ و ۲۰]. بنابراین در این مطالعه از سلول‌های بنیادی ناحیه Bulge فولیکول مو به عنوان یک منبع سلولی قابل دسترس و چند ظرفیتی که توانایی تمایز به سلول‌های شبه نورون را دارند، استفاده شد. همان طور که در مطالعات گذشته محققان حاضر Nestin مثبت بودن سلول‌های این ناحیه گزارش شده بود [۲۱ و ۲۰، ۹]، در این مطالعه نیز نتایج به دست آمده از Nestin ایمونوستیوشیمی سلول‌های بنیادی کشت داده شده بیان را در این سلول‌ها تأثید کرد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سلول‌های بنیادی ناحیه Bulge فولیکول موی موش صحرایی CD34 مثبت و K15 منفی هستند. واکنش این سلول‌ها به آنتی‌بادی CD34 در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ توسط آمو (Amoh) و همکاران به عنوان نشانگر بنیادی بودن این سلول‌ها مطرح شده بود [۲۲ و ۱۷]. روند تمایز موجب می‌شود که بیان دو نشانگر CD34 و Nestin به صورت کاملاً واضحی متوقف شده و نشانگر اختصاصی β -III Tubulin مشاهده شود. این نشانگر یکی از زیر واحدهای توبولین-پروتئین موجود در سیتوپلاسم است. توبولین خود دارای ۲ زیر واحد به نام‌های آلفا و بتا است. هرکدام از این زیر واحدها دارای چند ایزومر است. از جمله این ایزومرها ایزومر III beta است. این ایزومر در سلول‌های نورونی یافت می‌شود [۲۳]. بنابراین در این مطالعه برای نشان دادن حضور سلول‌های تمایز یافته شبه نورونی از آنتی‌بادی β -III Tubulin استفاده شد. مطالعات قبلی محققان حاضر تمایز سلول‌های بنیادی ناحیه Bulge را پس از گذشت ۳ و ۸ هفته نشان داد [۹، ۱۰ و ۲۱]. از آنجا که زمان در

تقدیر و تشکر

این مطالعه نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی ارشد به شماره ۱۰۲۲ مصوب دانشگاه علوم پزشکی تهران است که بدینوسیله از مسئولین محترم دانشگاه قدردانی می‌شود.

References

- Bongso A, Richards M.** History and perspective of stem cell research. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2004;18: 827-42.
- Tabesh H, Amoabediny G, Nik NS, Heydari M, Yosefifard M, Siadat SO, et al.** The role of biodegradable engineered scaffolds seeded with Schwann cells for spinal cord regeneration. Neurochem Int 2009; 54:73-83.
- Alonso L, Fuchs E.** Stem cells in the skin: waste not, Wnt not. Genes Dev; 2003 15;17:1189-200..
- Sieber-Blum M, Grim M, Hu F, Szeder V.** Pluripotent Neural Crest Stem Cells in the Adult Hair Follicle. Dev Dyna 2004; 231: 258-69.
- Amoh Y, Li L, Katsuoka K, Penman S, Hoffman RM.** Multipotent Nestin-Positive, Keratin-Negative Hair-Follicle Bulge Stem Cell Can Form Neurons. Proc Natl Acad Sci USA 2005; 102: 5530-4.
- Zhang Y, Xiang M, Wang Y, Yan J, Zeng Y.** Bulge Cells Human Hair Follicles Segregation Cultivation and Properties. Coll Surfaces 2006; 47: 50-6.
- Hoffman RM.** The pluripotency of hair follicle stem cells. Cell Cycle 2006;5: 232-3
- Amoh Y, Kanoh M, Niijima S, Kawahara K, Sato Y, Katsuoka K, et al.** Human and mouse hair follicles contain both multipotent and monopotent stem cells. Cell Cycle 2009; 8:176-7.
- Nobakht M, Najafzadeh N, Safari M, Rahbar Roshandel N, Delaviz H, Joghataie MT, et al.** Bulge Cells of Rat Hair Follicles: Isolation, Cultivation, Morphological and Biological Features. Cell 2010; 12: 51-58
- Nobakht M, Asalgoor S, Rahbar Roshandel N, Mousavizadeh K, Najafzadeh N.** Effects of Silibinin on Hair Follicle Stem Cells Differentiation to Neural-like Cells. American Journal of Biochemistry and Molecular Biology 2011; 1: 212-22.
- Chao MV, Rajagopal R, Lee FS.** Neurotrophin signalling in health and disease. Clin Sci 2006; 110: 167-73.
- Huang EJ, Reichardt LF.** Neurotrophins: roles in neuronal development and function. Annu Rev Neurosci 2001; 24: 677-736.
- Hempstead BL.** The many faces of p75NTR. Curr Opin Neurobiol 2002;12: 260-7.
- Levi-Montalcini R.** The nerve growth factor: thirty-five years later. Science1987; 37: 1154-64.
- Li X, Yang Z, Zhang A.** The effect of neurotrophin-3/chitosan carriers on the proliferation and differentiation of neural stem cells. Biomaterials 2009; 30 :4978-85.
- Zhang W, Zeng YS, Wang JM, Ding Y, Li Y, Wu W.** Neurotrophin-3 improves retinoic acid-induced neural differentiation of skin-derived precursors through a p75NTR-dependent signaling pathway. Neurosci Res 2009; .64: 170-6.
- Amoh Y, Li L, Campillo R, Kawahara K, Katsuoka K, Penman S, et al.** Implanted hair follicle stem cell form schwan cells that support repair of severed peripheral nerve. Proc Natl Acad Sci U S A 2005; 102: 17734-8.
- Amoh Y, Li L, Katsuoka K, Hoffman RM.** Multipotent hair follicle stem cells promote repair

Bulge فولیکول موش صحرایی داشته و باعث کوتاه کردن زمان تمایز این سلول‌ها به سلول‌های شبیه نورون می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود که تأثیردوزهای مختلف این فاکتور در کنار عوامل دیگر بر این سلول‌های بنیادی بررسی شود.

- of spinal cord injury and recovery of walking function. *Cell Cycle* 2008; 7:1865-9.
19. **Oshima H, Rochat A, Kedzia C, Kobayashi K, Barrandon Y.** Morphogenesis and renewal of hair follicles from adult multipotent stem cells. *Cell* 2001;104: 233-45.
20. **Cotsarelis G, Sun TT, Lavker RM.** Label-retaining cells reside in the bulge area of pilosebaceous unit: implications for follicular stem cells, hair cycle and skin carcinogenesis. *Cell* 1990; 61:1329-37.
21. **Nobakht M, Asalghoo S, Rahbar Roshandel N, Mousavizadeh K, Najafzadeh N.** Effects of Silibinin on Hair Follicle Stem Cells Differentiation to Neural-like Cells. *Qom Univ Med Sci J* 2009; 3:12-9.
22. **Amoh Y, Kanoh M, Niyyama S, Hamada Y, Kawahara K, Sato Y, et al.** Human hair follicle pluripotent stem (hfPS) cells promote regeneration of peripheral-nerve injury: an advantageous alternative to ES and iPS cells. *J Cell Biochem* 2009; 107:1016-20.
23. **Raff EC, Fackenthal JD, Hutchens JA, Hoyle HD, Turner FR.** Microtubule architecture specified by a beta-tubulin isoform. *Science* 1997; 275: 70-3.
24. **Fernandes KJL , McKenzie IA, Mill P, Smith KM, Akhavan M, Barnabé-Heider F, et al .** A dermal niche for multipotent adult skin-derived precursor cells. *Nature Cell Biol* 2004; 6:1082-93.