

# بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه بر روی فاکتورهای عملکردی کبد در موش صحرایی نر

دکتر مختار مختاری<sup>۱</sup>، دکتر مهرداد شربعتی<sup>۲</sup>، لاله خداپرست<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> دانشیار فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

<sup>۲</sup> استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

<sup>۳</sup> کارشناس ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

نشانی نویسنده مسؤول: کازرون، کیلومتر پنجم جاده کازرون- شیراز، ساختمان شماره ۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، دکتر مختار مختاری

E-mail: Mokhtar \_ mokhtary@Yahoo.Com

وصول ۸۷/۶/۲۵، اصلاح ۸۷/۵/۱، پذیرش ۸۷/۴/۱۰

## چکیده

**زمینه و هدف:** کبد یکی از اندام‌های حیاتی بدن به شمار می‌رود که در تنظیم بسیاری از پدیده‌های فیزیولوژیک دارای نقش کلیدی است و هرگونه اختلال در عملکرد آن باعث می‌شود مجموعه‌ای از اختلالات فیزیولوژیک، آناتومیک و انواعی از بیماری‌های مختلف به وجود آید. از طرفی با توجه به مصرف گیاهان دارویی در طب سنتی، در این مطالعه اثرات عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه (*Mentha pulegium*) بر روی فاکتورهای عملکردی کبد مورد بررسی قرار گرفت.

**مواد و روش‌ها:** در این مطالعه تجربی، ۵۰ سر موش صحرای نر بالغ از نژاد ویستان، با وزن تقریبی ۲۲۰۰- ۲۳۰ گرم در ۵ گروه ۱۰ نایی مورد استفاده قرار گرفت. گروه‌های آزمایش شامل گروه کنترل بدون هیچ گونه تیمار دارویی، گروه شاهد که روزانه فقط با حلal تیمار شدند و سه گروه تجربی ۳ و ۲ و ۱ بودند که به ترتیب مقادیر (mg/kg) ۴۰۰، ۸۰۰ و ۱۶۰۰ عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه به صورت داخل صفائی دریافت کردند. ۱۸ روز بعد، از همه گروه‌ها نمونه خونی گرفته شد و میزان آنزیم‌های کبدی آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلkalین فسفاتاز (ALP) و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی شامل پروتئین تام و آلبومین اندازه‌گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون تی و نرم‌افزار SPSS و Excel تجزیه و تحلیل گردید.

**یافته‌ها:** مقدار آنزیم ALT در گروه‌های تجربی حداکثر، متوسط و حداقل دریافت‌کننده عصاره به ترتیب  $70/13 \pm 4/48$ ،  $71/38 \pm 4/67$  و  $50/63 \pm 6/51$  بود که نسبت به گروه کنترل  $96/75 \pm 5/91$  کاهش معنی‌داری را نشان داد. آنزیم AST فقط در دوز حداکثر عصاره  $(175/63 \pm 4/84)$  نسبت به گروه کنترل  $(207/88 \pm 13/85)$  کاهش معنی‌داری را نشان داد. میزان آنزیم ALP در دوز حداکثر  $(778/8 \pm 58/8)$ ، متوسط  $1/63 \pm 39/1$  و حداقل  $8/2 \pm 39/1$  نسبت به گروه کنترل  $(608/38 \pm 44/2)$  افزایش معنی‌داری را نشان داد. مقدار پروتئین‌های تام و آلبومین در گروه تجربی دریافت‌کننده عصاره با دوزهای بالا نسبت به گروه کنترل نیز کاهش معنی‌داری را نشان داد. همچنین وزن موش‌ها با افزایش دوز کاهش معنی‌داری پیدا کرد.

**نتیجه‌گیری:** عصاره آبی- الکلی برگ گیاه آنزیم‌های کبدی از جمله ALT و AST را کاهش می‌دهد. همچنین با کاهش فعالیت عملکردی کبد، مقدار پروتئین‌های تام و آلبومین کاهش می‌یابد. (مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره ۱۵/شماره ۲/صص ۱۱-۱۰) (۷۳)

**واژه‌های کلیدی:** گیاه پونه؛ ALP؛ AST؛ ALT؛ پروتئین؛ موش صحرایی.

**مقدمه**

نفع، قولنج روده‌ای، بادشکن و ضداسپاسم استفاده شده است (۶). پونه به عنوان دافع حشرات، گندزدا (۷)، طعم-دهنده برای چاشنی غذا (۸)، خلط‌آور و ضدغونه کننده (۹) و همچنین به عنوان رایحه در شوینده‌ها و صابون‌ها استفاده می‌شود (۵,۷). تحقیقات نشان داده است که پونه به عنوان داروی قاعده‌آور برای تحریک قاعدگی نیز به کار می‌رود (۸). عصاره جوشانده آبی، عصاره خیسانده الکلی و فراکسیون‌های حاصل از *Mentha longifolia* (گونه دیگری از گیاه پونه) همگی دارای اثر ضد تهوعی با مکانیسم‌های احتمالی مرکزی و محیطی می‌باشند (۹).

کبد یکی از اندام‌های حیاتی بدن به شمار می‌رود که در تنظیم بسیاری از پدیده‌های فیزیولوژیک دارای نقش کلیدی است و هرگونه اختلال در عملکرد آن باعث می‌شود مجموعه‌ای از اختلالات فیزیولوژیک، آناتومیک و انواعی از بیماری‌های مختلف به وجود آید. بررسی عملکرد کبد نیز همواره مورد نظر پژوهشگران بوده است. لذا با توجه به این‌که تاکنون اثرات جانبی عصاره برگ گیاه پونه و سمیت آن مورد بررسی قرار نگرفته و با توجه به این‌که آنزیم‌ها در همه بافت‌های بدن از جمله در کبد فعالیت دارند، با اندازه‌گیری آنزیم‌هایی نظیر گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز سرم (SGOT) یا آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، گلوتامیک پیروویک ترانس آمیناز سرم (SGPT) یا آلانین ترانسفراز (ALT) و آلکالین فسفاتاز (ALP) می‌توان به آسیب سلولی پی برد. به علاوه، تغییرات پروتئین‌های پلاسمما به خصوص آلبومین که توسط کبد ساخته می‌شود به عنوان یک معیار مقایسه در این تحقیق، مورد اندازه‌گیری قرار گرفت.

در پژوهش حاضر تأثیر عصاره آبی -الکلی برگ گیاه پونه با مقدار (mg/kg) ۴۰۰، ۸۰۰ و ۱۶۰۰ بر فاکتورهای عملکردی کبد یعنی سنجش میزان برخی از فاکتورهای کبدی در موش‌های صحرایی نر بالغ به مدت ۱۸ روز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. آنزیم‌های کبدی ALT، AST و ALP و برخی فاکتورهای

امروزه اکثر داروهای گیاهی بدون انجام آزمایشات استاندارد، وارد بازار می‌شوند و تصور عموم بر این است که این داروها قادر سمتی می‌باشند. از طرفی گیاهان دارویی از منابع طبیعی مهم در دنیا به شمار می‌آیند و از زمان‌های بسیار دور مورد توجه و استفاده بشر بوده است. در طب سنتی برای برای تسکین دردها و درمان بسیاری از بیماری‌ها از گیاهان دارویی استفاده شده است که از جمله این گیاهان، گیاه پونه (*Mentha pulegium*) از خانواده نعنای (Lamiaceae) می‌باشد (۱). پونه گیاهی است علفی، پایا و دارای ساقه‌ای با ظاهر تقریباً استوانه‌ای به ارتفاع ۱۰-۱۵ cm که به حالت وحشی در دشت‌های مرطوب و حاشیه جریان‌های آب (حتی داخل آب) می‌روید (۲). این گیاه به حالت وحشی در دشت‌های مرطوب و حاشیه جریان‌های آب غالب نواحی مرکزی، جنوبی و غربی اروپا، جنوب غربی آسیا، شمال آفریقا، حشنه و جزایر قناری می‌روید. در بیشتر نقاط ایران به ویژه در دامنه‌های شمالی و شمال شرقی البرز و برخی نقاط دیگر انتشار دارد (۳).

سرشاخه‌های گلدار و برگ گیاه پونه دارای خواص درمانی است (۴). اندام‌های مختلف این گیاه دارای تانن، مواد رزینی، قند و اسانس است. این اسانس که مقدار آن بر حسب واریته‌های مختلف گیاه و مشخصات محل رویش از ۱-۴٪ درصد تغییر می‌کند، دارای ۹۰-۷۵٪ درصد از ترکیبات ستنت دار مخصوصاً پوله ژون (پولگون)، الکلهای توتال به مقدار ۱۲-۷٪ درصد، لیمونن و دیپانتن است (۵). اسانس مذکور به اسانس پونه درخشندگی آبی رنگ جلوه می‌کند که علت آن وجود ماده‌ای به نام آزولن در آن است.

در برگ گیاه مذکور، وجود هسپریدین یا دیوسمین مشخص گردیده است که مشابه ماده موجود در مرکبات است (۱). از این گیاه در طب سنتی در درمان

تقسیم شدند: گروه کنترل بدون هیچ گونه تیمار دارویی، گروه شاهد که روزانه با آب مقطر تیمار شد و سه گروه تجربی ۳ و ۲ و ۱ که به ترتیب دوزهای (mg/kg) ۸۰۰، ۴۰۰ و ۱۶۰۰ عصاره الکلی گیاه پونه را به صورت درون صفاقی دریافت کردند و بعد از ۱۸ روز تحت تأثیر بیهوشی خفیف با اتر از قلب خون گیری به عمل آمد. نمونه‌های خونی به دست آمده ۲۰ دقیقه در شرایط آزمایشگاه نگهداری و به مدت ۱۵ دقیقه با ۲۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. سپس سرم هر لوله جمع‌آوری و ترانس آمینازهای خون از جمله آنزیم‌های آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) و آلkalین فسفاتاز (ALP)، پروتئین تام و آلبومین توسط دستگاه اتوآنالایزر (Technico RA-1000) به روش فتومتری اندازه‌گیری شد (۱۲). داده‌های به دست Excel آمده با استفاده از آزمون تی و نرمافزار SPSS و تجزیه و تحلیل گردید. اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های تجربی و کنترل،  $P < 0.05$  در نظر گرفته شد.

### یافته‌ها

اثر عصاره آبی - الکلی برگ گیاه پونه بر آنزیم‌های کبدی: بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش دوز میزان آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) در گروه‌های تجربی به ترتیب  $50/63 \pm 4/48$ ،  $71/38 \pm 4/48$ ،  $70/13 \pm 4/51$  بود - که نسبت به گروه کنترل ( $50/91 \pm 5/91$ ) کاهش معنی - داری را نشان می‌دهد ( $P < 0.05$ ) (نمودار ۱). آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) فقط در دوز حداقلر عصاره با مقدار  $175/63 \pm 4/84$  نسبت به گروه کنترل  $207/88 \pm 13/85$  (کاهش معنی‌داری را نشان داد. در مورد سایر مقادیر اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (نمودار ۲). همچنین میزان آنزیم آلkalین فسفاتاز (ALP) در گروه‌های تجربی با افزایش دوز به ترتیب با مقادیر  $58/8 \pm 5/778$ ،  $52/63 \pm 5/802$  و  $55/5 \pm 5/815$  بود که نسبت به گروه کنترل ( $44/2 \pm 4/608$ ) افزایش معنی‌داری را نشان داد


بیوشیمیابی از جمله آلبومین و پروتئین تام اندازه‌گیری شد تا در خصوص استفاده بهینه از این فرآورده گیاهی اقدامات لازم انجام گیرد (۳، ۱۰).

### مواد و روش‌ها


در این مطالعه تجربی، تعداد ۵۰ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار (wistar) در محدوده وزنی ۲۳۰ - ۲۲۰ g استفاده شد که از بخش پرورش حیوانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون تهیه گردید. حیوانات در پنج گروه ۱۰ تایی تا زمان انجام آزمایش در قفس‌های استاندارد و تحت شرایط یکسان با دمای ۲۲ - ۲۰ درجه سانتی‌گراد و با چرخه نوری ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی نگهداری شدند. آب و غذا به میزان کافی در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت و به جز در زمان آزمایش، به راحتی به آب و غذا دسترسی داشتند و فقط یک بار تحت آزمایش قرار می‌گرفتند.

روش تهیه عصاره الکلی برگ گیاه پونه: از اواسط بهار سال ۱۳۸۷ در اطراف شهرستان کازرون بخش‌های هوایی گیاه پونه که مصرف خوراکی دارند، به منظور تهیه عصاره جمع‌آوری شد و در شرایط مناسب دور از نور آفتاب، خشک شده و سپس پودر حاصله، مقدار یک کیلوگرم به نسبت ۵۰/۵۰ با الکل اتیلیک ۹۶ درصد به مدت حداقل ۴۸ ساعت خیسانده شده و در طی این مدت چندین بار ظرف را تکان داده تا الکل به راحتی تبخیر شود. سپس آن را صاف کرده و عصاره آبی - الکلی به دست آمده در لوله آزمایش ریخته و در دستگاه سانتریفیوژ با سرعت ۴۵۰۰ دور در دقیقه به مدت ۸ دقیقه قرار داده می‌شد تا ذرات معلق در آن جدا شود. بعد از سانتریفیوژ، مایع به دست آمده در آون با دمای ۴۰ درجه قرار گرفت تا یک شیره سبز غلیظ باقی بماند. در مرحله بعد مقادیر مورد نظر از عصاره در آب مقطر حل شد تا غلظت‌های مختلف به - دست آید (۱۱).

حیوانات مورد آزمایش به پنج گروه ۱۰ تایی




نمودار ۱: مقایسه میانگین غلظت سرمی آنزیم آلانین ترانسفراز (ALT) به دنبال دریافت مقدار مختلف عصاره آبی - الکلی برگ گیاه پونه در گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل. علامت \* نشان دهنده اختلاف معنی دار گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل است. ( $P<0.05$ ). ( $n=10$ ).




نمودار ۲: مقایسه میانگین غلظت سرمی آنزیم آسپارتات ترانسفراز (AST) به دنبال دریافت مقدار مختلف عصاره آبی - الکلی برگ گیاه پونه در گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل. علامت \* نشان دهنده اختلاف معنی دار گروه تجربی دریافت کننده عصاره با دوز بالا نسبت به گروه کنترل است ( $P<0.05$ ). ( $n=10$ ).

مقدار  $17/10 \pm 0.8$ ،  $10/98 \pm 0.8$  و  $7/0.6 \pm 0.7$  نسبت به گروه کنترل ( $11/0.8 \pm 0.11$ ) معنی دار است ( $P<0.05$ ). در مورد وزن بدن نیز کاهش معنی داری در گروههای تجربی دریافت کننده دوز متوسط و حداقل عصاره به ترتیب  $198/62 \pm 8/20.7$  و  $75/75 \pm 11/5.6$  مشاهده می شود (هر یک از مقدار نشان دهنده خطای معیار  $\pm$  میانگین است).

اثر عصاره آبی - الکلی برگ گیاه پونه بر آلبومین و پروتئین های تام: کاهش معنی داری در آلبومین به مقدار  $3/53 \pm 0.11$  در گروه تجربی دریافت کننده عصاره با دوز حداقل نسبت به گروه کنترل ( $4/86 \pm 0.8$ ) مشاهده می شود ( $P<0.05$ ). همچنین میزان پروتئین در هر سه گروه تجربی دریافت کننده عصاره به ترتیب با



نمودار ۳: مقایسه میانگین غلظت سرمی آنزیم آلکالین فسفاتاز (ALP) به دنبال دریافت مقادیر مختلف عصاره آبی-الکلی برگ گیاه پونه در گروه‌های تجربی نسبت به گروه کنترل. علامت \* نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار گروه‌های تجربی دریافت‌کننده عصاره نسبت به گروه کنترل است ( $n=10$ ) ( $P<0.05$ ).



نمودار ۴: مقایسه میانگین غلظت سرمی آلبومین به دنبال دریافت مقادیر مختلف عصاره آبی-الکلی برگ گیاه پونه در گروه‌های تجربی نسبت به گروه کنترل. علامت \* نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار گروه تجربی دریافت‌کننده عصاره در دوز بالا نسبت به گروه کنترل است ( $P<0.05$ ) ( $n=10$ ).

نشان داد. مقدار پروتئین‌های تام و آلبومین نیز در گروه تجربی دریافت‌کننده عصاره با دوز حد اکثر نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی‌داری داشت. در تحقیقات گذشته، مواردی از مسمومیت با انسانس پونه در انسان گزارش شده است (۱۳,۱۴) که از آن جمله می‌توان به سمیت کبدی حاصل از انسانس پونه اشاره نمود که پولگون و متabolیت‌های آن را در این عارضه دخیل می‌دانند (۱۴,۱۵). مطالعات دیگر نشان می‌دهد که آمینوترانسفرازها باعث کاتالیز واکنش‌های شیمیایی در سلول‌ها می‌شوند که

## بحث


در این مطالعه، تأثیر عصاره آبی - الکلی گیاه پونه بر روی آنزیم‌های کبدی و پروتئین‌های سرم مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بیانگر آن بود که مقدار آنزیم‌های ALT و AST در گروه‌های تجربی دریافت‌کننده عصاره نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی‌داری ( $p<0.05$ ) نشان داد. همچنین میزان ALP در گروه‌های تجربی دریافت-کننده عصاره نسبت به گروه کنترل، افزایش معنی‌داری را

مرکبات و همچنین برگ سبزیجات به مقدار زیادی یافت می-شود (۱۸) و به طور مؤثری سطوح آنزیم‌های ALT و AST را در سرم کاهش می‌دهد و میزان پروتئین‌های توتال و آلبومین را نیز کاهش می‌دهد (۱۹). ASP یک آنزیم هیدرولاز می‌باشد که مسؤول گروههای فسفات در انواعی از مولکول‌ها از قبیل پروتئین‌ها، نوکلئوتیدها و آلكالوئیدها است (۲۰). بررسی میزان آنزیم ALP نشان می‌دهد عصاره آبی -الکلی این گیاه سبب افزایش قابل ملاحظه این آنزیم می‌شود و این نشانگر سمیت عصاره این گیاه بر روی اپتیلیوم مجاری صفرایی و ایجاد کلستاز باشد (۲۰) و یا ممکن است (در رتهای بالغ) به دلیل ایجاد حالت پاتولوژی در استخوان باشد. افزایش ALP ممکن است فیزیولوژیک یا پاتولوژیک باشد. نقش فیزیولوژیک این آنزیم به طور کامل مشخص نشده است، اما افزایش تولید آن در بافت‌ها نشان‌دهنده تحریک متابولیکی است. همچنین ALP می‌تواند به طور زیان‌آوری بدون آن که کبد یا استخوان آسیب دیده باشد، افزایش یابد (۲۱). کاهش پروتئین تام و آلبومین از جمله علائم پیشرفت بیماری‌های مزمن کبدی است و میزان این کاهش شدت آسیب کبدی را نشان می‌دهد (۲۲,۲۳).

در تحقیق حاضر، غلظت پروتئین تام و آلبومین به دنبال تزریق غلظت حداقل تراکث عصاره آبی -الکلی پونه کاهش

در آن گروه، آمین از یک مولکول دهنده به مولکول گیرنده منتقل می‌گردد. AST به طور طبیعی در انواع مختلف بافت‌ها از قبیل کبد، قلب، ماهیچه، کلیه و مغز قرار دارد. این آنزیم در زمان آسیب به هر کدام از این بافت‌ها وارد خون می‌شود. ALT نیز به طور طبیعی در کبد یافت می‌شود. اگرچه نمی‌توان گفت که این آنزیم منحصراً در کبد قرار دارد اما کبد جایی است که در برگ‌گیرنده بیشترین غلظت این آنزیم است. این آنزیم در نتیجه آسیب کبدی وارد خون می‌گردد، بنابراین نسبتاً از این آنزیم تا حدودی به عنوان شناساگر ویژه موقعیت کبدی استفاده می‌شود.

از آنجا که آنزیم ALT نشانگر اختصاصی تری برای آسیب کبدی است (۱۶)، با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق اثر عصاره آبی -الکلی این گیاه برای دوزهای پایین و متوسط بر روی آنزیم ALT قادر اثرات سمی بر روی پارانشیم و سلول‌های کبدی است و این ممکن است به خاطر وجود آنتی‌اکسیدان‌ها باشد زیرا آنتی‌اکسیدان‌ها نقش بسیار مهمی در محافظت اندام‌های داخلی بدن به ویژه قلب و کبد دارند که باعث کاهش آمینوترانسفرازها می‌شوند (۱۶,۱۷). اما مکانیسم عمل آنتی‌اکسیدان‌ها بر کاهش آمینوترانسفرازها به طور کامل مشخص نیست. مطالعات پژوهشگران دیگر نشان می‌دهد که هیسپریدین یک فلاونوئید گلیکوزیدی است که در پوست



نمودار ۵: مقایسه میانگین غلظت سرمی پروتئین به دنبال دریافت مقادیر مختلف عصاره آبی -الکلی برگ گیاه پونه در گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل. علامت \* نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار گروه تجربی دریافت‌کننده عصاره با دوز بالا نسبت به گروه کنترل است ( $P<0.05$ ). (n=10).

متابولیت هپاتوتوكسیک ضروری است.

متوفوران به عنوان متابولیت سمی پولگون شناخته شده است و تحقیقات با پولگون نشان دار نشان می دهد که متوفوران به دنبال یک سری واکنش های متوالی تشکیل می شود که عبارتند از:  
 (الف) اکسیداسیون گروه متیل آلیلیک،  
 (ب) تشکیل حلقه های داخل مولکولی به منظور تشکیل همی کتاب،  
 (ج) دهیدراسیون برای تشکیل فوران.

این مسأله که آیا متوفوران، تنها متابولیت پولگون می باشد که در پاتوزنر سمیت کبدی دخالت دارد و یا متابولیت های دیگری نیز مسؤول هستند، هنوز مشخص نشده است (۲۶). اما با توجه به این که در عصاره این گیاه انواع فلاونئیدها و آنتی اکسیدان ها وجود دارند نقش آنتی اکسیدان ها در محافظت از کبد، عصاره آبی - (الکلی این گیاه در دوزهای متوسط و کم از مسمومیت القابی ناشی از پولگون (اسانس پونه) در موش صحرابی می تواند جلوگیری کند. آنتی - اکسیدان ها که در عصاره آبی - (الکلی برگ گیاه پونه نیز وجود دارند، از تشکیل این رادیکال های آزاد جلوگیری می کنند (۲۷).

به طور کلی، عصاره آبی - (الکلی برگ گیاه پونه در دوزهای کم و متوسط دارای اثرات محافظتی بر کبد می باشد ولی در دوزهای بالا به دلیل وجود پولگون می تواند اثرات سمی بر کبد داشته باشد. همچنین عصاره آبی - (الکلی این گیاه در دوزهای بالا باعث کاهش میزان آلبومین و پروتئین تام می شود که احتمالاً به دنبال کاهش فعالیت کبد به وجود می آید. کاهش وزن نیز در دوزهای بالا می تواند به دلیل کاهش در میزان سنتز پروتئین به وجود آید.

### تشکر و قدردانی

بدين وسیله از همکاری صمیمانه آقای احمد پیشگر مدیر محترم آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی کازرون آقای احمد محمود پور مسؤول محترم بخش حیوانات دانشگاه تشکر و قدردانی می شود.

پیدا کرد که این اثر بیانگر آسیب کبدی است. مطالعات قبلی نشان می دهد که تانن موجود در ترکیبات این گیاه باعث کاهش میزان پروتئین ها می شود (۲۴). سطح آلبومین می تواند وابسته به تعدادی از فاکتورهای دیگر از قبیل وضعیت تغذیه، کاتabolیسم، فاکتورهای هورمونی، کاهش ادرار و کاهش فعالیت معده ای - روده ای نیز باشد (۲۱). از آنجایی که برای افزایش وزن بدن به تکثیر سلولی و رشد بدن احتیاج است و برای این دو فاکتور (تکثیر سلولی و رشد بدن) سنتز پروتئین ضروری است و با توجه به این که عصاره آبی - (الکلی این گیاه میزان پروتئین های تام را کاهش می دهد و شاید یکی از دلایل کاهش وزن به دنبال تزریق عصاره آبی - (الکلی پونه در دوز ۱۶۰۰، کاهش تولید پروتئین تام باشد. (۲۵). از طرف دیگر، می توان یکی دیگر از دلایل کاهش وزن را کاهش کلسترول دانست.

برخی مطالعات نشان می دهد که آنتی اکسیدان های موجود در عصاره آبی - (الکلی این گیاه باعث از بین رفتن رادیکال های آزاد ایجاد شده توسط چربی های موجود در کبد می شود. این عملکرد مثبت، مانع از بروز بیماری های کبدی به ویژه سرطان کبد می شود. از جمله ترکیبات دیگری که در برگ این گیاه وجود دارد پولگون است. مطالعاتی که توسط گردون و همکاران در سال ۱۹۸۲ انجام شد (۲۶) نشان داد که پولگون در موش به وسیله مونو اکسیژناز های میکروزومی کبدی به یک هپاتوتوكسین (فنوباریتال) متابولیزه می شود. ظاهرآ، تشکیل متابولیت سمی به وسیله سیتوکروم های P-۴۵۰ مربوط به فنوباریتال (یکی از مهم ترین متابولیت های پولگون) واسطه گری می شود. مهار کنندگان سیتوکروم P-۴۵۰، مانند کیالت کلراید و پیپرونیل بو توکساید می توانند از مسمومیت کبدی ناشی از پولگون جلوگیری کنند. همچنین آنالوگ پولگون که به وسیله دوتریوم در گروههای متیل آلیلیک نشان گذاری شده است، به میزان قابل توجهی نسبت به ترکیب اصلی، سمیت کمتری در کبد ایجاد می کند. این نتایج نشان می دهنند که اکسیداسیون گروه متیل آلیلیک برای تشکیل

## References

- Shahidivagheidahande F. Study of phytochemical and antimicrobial effects of mentha pulegium [dissertation] Tehran Univ. 1987.
- Vian MA, Fernandez X, Visinoni F, Chemat F. Microwave hydrodiffusion and gravity, a new technique for extraction of essential oils. *J Chromatogr A.* 2008; 1190(1-2): 14-7.
- Shahverdi AR, Rafii F, Tavassoli F, Bagheri M, Attar F, Ghahraman A. Piperitone from *Mentha longifolia* var. *chorodictya* Rech F. reduces the nitrofurantoin resistance of strains of enterobacteriaceae. *Phytother Res.* 2004; 18(11): 911-4.
- Faraji Zadeh Sheikh A, Zahedi Asl S , The Effect Of *Mentha Pulegium* On Peristaltic Contractions Of Isolated Rabbit Deudenum And Ileum. *Journal of Physiology and Pharmacology.* 1990; 511.
- Mahboubi M, Haghi G. Antimicrobial activity and chemical composition of *Mentha pulegium* L. essential oil. *J Ethnopharmacol.* 2008; 119(2): 325-7.
- Newell CA., Plant transformation technology. Developments and applications. *Molecular biotechnology.* 2000; 16(1):53-65.
- Lawless, J. *The Illustrated Encyclopedia of Essential Oils: The Complete Guide to the Use of Oils in Aromatherapy and Herbalism.* USA: Element Books Ltd. 1995.
- Farshad H. Shirazi, Neda Ahmadi, Mohammad Kamalinejad, Evaluation Of Northern Iran *Mentha Pulegium* L. Cytotoxicity. *DARU,* 2004; 12(3):106-10.
- Hossein Zadeh H, Ramezani M,Naghizadeh B. Antiemetic effect of fractions of aerial parts of *Mentha longifolia* in young chickens, *Iranian Journal Of Basic Medical Sciences.* 2004; 7(3): 145-50.
- Samsamshariat H, editor. Extraction of effective matters Medicinal Plants and Method of Recognition and Assessment Of Those, Isfahan: Publication Of Isfahan, 1371.
- Germanò MP, D'Angelo V, Sanogo R, Morabito A, Pergolizzi S, De Pasquale R. Hepatoprotective activity of Trichilia roka on carbon tetrachloride-induced liver damage in rats. *J Pharm Pharmacol.* 2001; 53(11):1569-74.
- Rubino L, Catapano V, Guerra G. Determination of inorganic phosphorus in serum: Evaluation of three methods applied to the Technicon RA-1000 analyzer. *J Automat Chem.* 1989; 11(4): 164-7.
- Gaze DC, Collinson PO. Multiple molecular forms of circulating cardiac troponin: analytical and clinical significance. *Ann Clin Biochem.* 2008; 45(Pt 4):349-55.
- Sztajnkrycer Md, Otten Ej, Bond Gr, Lindsell Cj, Goetz Rj. Mitigation of pennyroyal oil hepatotoxicity in the mouse. *Acad Emerg Med.* 2003 Oct; 10(10):1024-8.
- Thulasiram Hv, Bhat Vb, Madayastha Mk. Effect of ring size in R-(+)-pulegone-mediated hepatotoxicity: studies on the metabolism of R-(+)-4-methyl-2-(1-methylethylidene)-cyclopentanone and DL-camphorone in rats. *Drug Metab Dispos.* 2001; 29(6): 821-9.
- Aniya Y, Koyama T, Miyagi C, Miyahira M, Inomata C, Kinoshita S, Ichiba T. Free radical scavenging and hepatoprotective actions of the medicinal herb, *Crassocephalum crepidioides* from the Okinawa Islands. *Biol Pharm Bull.* 2005; 28(1): 19-23.
- Ulicná O, Greksák M, Vancová O, Zlatos L, Galbavý S, Bozek P, et al. Hepatoprotective effect of rooibos tea (*Aspalathus linearis*) on CCl4-induced liver damage in rats. *Physiol Res.* 2003; 52(4): 461-6.
- Morin B, Nichols LA, Zalasky KM, Davis Jw, Manthey JA, Holland LJ. The citrus flavonoids hesperitin and nobiletin differentially regulate low density lipoprotein receptor gene transcription in hepg2 liver cells. *J Nutr.* 2008; 138(7):1274-81.
- Kaur G, Tirkey N, Chopra K. Beneficial effect of hesperidin on lipopolysaccharide-induced hepatotoxicity. *Toxicology.* 2006; 226(2-3): 152-60.
- Oates Ja, Sjoerdsma A. A unique syndrome associated with secretion of 5-hydroxytryptophan by metastatic gastric carcinoids. *Am J Med.* 1962; 32:333-42.
- Giboney PT. Mildly elevated liver transaminase levels in the asymptomatic patient. *American Family Physician.* 2005; 71(6): 41.
- Sethuraman MG, Lalitha KG, Rajkapoor B. Hepatoprotective activity of *sarcostemma brevistigma* against carbon tetrachloride-induced hepatic damage in rats. *Curr Sci.* 2003; 84: 1186-7.

23. Jayasekhar P, Mohanan PV, Rathinam K. Hepatoprotective Activity Of Ethyl Acetate Extract Of Acacia Catechu. Indian J Pharmacol. 1997; 29: 426-8.
24. Tamir M, Alumot E. Carob tannins--growth depression and levels of insoluble nitrogen in the digestive tract of rats. J Nutr. 1970; 100(5): 573-80.
25. Abbey M, Noakes M, Belling GB, Nestel PJ. Partial replacement of saturated fatty acids with almonds or walnuts lowers total plasma cholesterol and low-density-lipoprotein cholesterol. Am J Clin Nutr. 1994; 59(5): 995-9.
26. Gaikwad NW, Madyastha KM. Biosynthesis of beta-substituted furan skeleton in the lower furanoterpenoids: a model study. Biochem Biophys Res Commun. 2002; 290(1): 589-94.
27. Gutteridge JM. Antioxidants, nutritional supplements and life-threatening diseases. mBr J Biomed Sci. 1994; 51(3): 288-95.