

اثر عصاره الکلی گیاه آب بشقابی بر غلظت سرمی تستوسترون، FSH و LH در موش صحرایی نر نژاد ویستار

مجید جاسمی^۱، قاسم ساکی^۲، فاخر رحیم^۳

^۱ استادیار گروه ارولوژی، بیمارستان گلستان، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز

^۲ دانشیار جنین شناسی و بافت شناسی، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز

^۳ کارشناس ارشد بیوانفورماتیک، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه جندی شاپور اهواز

نشانی نویسنده مسؤول: اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پزشکی، دکتر قاسم ساکی

E-mail: ghasemsaki@yahoo.com

وصول: ۸۷/۱۰/۳۰، اصلاح: ۸۸/۱/۲۲، پذیرش: ۸۸/۲/۱۶

چکیده

زمینه و هدف: تعداد اسپرم‌ها و قدرت باروری آن‌ها به سطح هورمون‌های آندروژنی خون وابسته است. بنابراین احتمال می‌رود که عصاره گیاه آب بشقابی بر سطح هورمون‌های مؤثر در روند اسپرماتوژنر اثر بگذارد. به همین منظور، مطالعه‌ای با هدف تعیین اثر عصاره الکلی گیاه آب بشقابی (Centella asiatica (L.) Urban.) بر غلظت سرمی تستوسترون، FSH و LH موش صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، ۴۰ سر موش صحرایی نر در پنج گروه (گروه کنترل، گروه شم و گروه‌های تجربی که به ترتیب مقدار ۱۰، ۵۰ و ۸۰ میلی‌گرم/کیلوگرم عصاره به مدت ۴۰ روز دریافت کردند) تقسیم شدند. ۲۴ ساعت بعد از آخرین روز تجویز عصاره، ۳ تا ۴ میلی‌لیتر خون از بطن قلب هر موش جمع‌آوری شده سپس با استفاده از روش رادیوایمنتواسی، غلظت سرمی هورمون‌های تستوسترون، FSH و LH اندازه‌گیری شد. داده‌های بدست آمده در نرم‌افزار SPSS.13 توسط آزمون‌های آماری آنالیز واریانس و توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار غلظت تستوسترون در گروه کنترل و شم به ترتیب برابر $2/18 \pm 0/4$ و $14/09 \pm 0/09$ بود و در گروه‌های تجربی که مقدار ۱۰، ۵۰ و ۸۰ میلی‌گرم/بر کیلوگرم عصاره دریافت کردند، به ترتیب برابر با $15/01 \pm 0/05$ و $9/8 \pm 0/05$ و $8/4 \pm 0/31$ نانومول بر لیتر بود. میانگین غلظت تستوسترون در گروه دریافت‌کننده عصاره به میزان ۵۰ و ۸۰ به طور معناداری نسبت به گروه کنترل ($p < 0/001$) و ($p < 0/004$)، شاهد ($p < 0/003$) و ($p < 0/001$) و نسبت به گروه دریافت‌کننده ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم کاهش یافته بود ($p < 0/02$) و ($p < 0/008$). بین دو گروه دریافت‌کننده عصاره به میزان ۵۰ و ۸۰ میلی‌گرم، این اختلاف معنادار نبود ($p > 0/09$). غلظت هورمون‌های LH و FSH در تمام گروه‌های تجربی، اختلاف معناداری در مقایسه با گروه کنترل و شاهد نشان نداد ($p > 0/05$).

نتیجه‌گیری: عصاره الکلی آب بشقابی با تأثیر بر سلول‌های لیدیگ و اختلال در ترشح هورمون تستوسترون تعداد اسپرم‌ها و نیز با تأثیر بر ابی‌دیدیم، تحرک و قدرت باروری آن‌ها را کاهش می‌دهد. (مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره ۱۶/شماره ۱/صص ۱۱-۶).

واژه‌های کلیدی: آب بشقابی؛ تستوسترون؛ LH؛ FSH؛ موش صحرایی.

مقدمه

اسپرماتوزوئیدهای زنده، متحرک و ذخیره اسپرماتوزوئیدهای ابی دیدیم ایجاد می شود (۱۲). مکانیسم اثر عصاره این گیاه بر روند اسپرماتوژن تاکنون مشخص نشده است اما به نظر می رسد که با توجه به این که رشد و تمایز اسپرم ها و هم چنین قدرت بارورسازی آنها و حتی تعداد آنها به سطح هورمون های آندروژنی وابسته است (۱۳)، این عصاره باعث بر هم خوردن تعادل هورمونی شود.

لذا با توجه به این که مسئله کترل جمعیت در رأس برنامه بسیاری از کشورهای جهان بوده و مسؤولان بهداشت در این کشورها تلاش می کنند تا با ارائه روش های نوین جلوگیری از بارداری این امر مهم را به مرحله اجرا درآورند، هم چنین با توجه به این که این عقیده که جلوگیری از بارداری به عهده زن است، در حال تغییر بوده و این تغییر همراه با پیشرفت در شناخت فیزیولوژی دستگاه تولید مثل مردان می باشد، اما داروی ضد باروری که تأثیر ناگواری بر صفات ثانویه و تمایلات جنسی مردان نداشته و بدون عوارض جانبی باشد، در دسترس نیست تصمیم گرفته شد تا در رابطه با اثر عصاره گیاه آب بشقابی بر سطح هورمون های مؤثر در روند اسپرماتوژن مطالعه ای صورت گیرد و در جهت افزایش دانسته ها در مورد گیاه آب بشقابی که احتمالاً در آینده به عنوان یک ماده ضد بارداری مردانه معرفی شود، گامی برداشته شود.

مواد و روش ها

نوع مطالعه و حیوانات آزمایشگاهی: در این پژوهش تجربی، از ۴۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن ۱۰-۱۲ هفته و با وزن تقریبی 200 ± 10 گرم که از مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه جندی شاپور اهواز و پس از دریافت مجوز از کمیته اخلاق شاپور اهواز و پس از دریافت مجوز از کمیته اخلاق پژوهشکی خریداری شده بودند، از شهریور ماه سال ۱۳۸۶ تا مهر ماه سال ۱۳۸۷ استفاده شد. حیوانات در مرکز نگهداری حیوانات گروه علوم تشریحی دانشکده پژوهشکی در

گیاه آب بشقابی (Centellae Asiatica) که از خانواده چتریان (Apiaceae) است، گیاهی پایا و علفی بوده و در محل بندها ریشه زاست (۱). این گیاه با توجه به منابع معتبر، مشاهدات محققین و نمونه های دقیق هرباریومی تاکنون پراکنده فراتر از محدوده تالاب بندر انزلی برای آن گزارش نشده است (۲,۳). این گونه گیاهی نیازمند رویش در بخش های نمناک و مرطوب حواشی تالاب است (۴). زمان رویش و گلدهی این گیاه در اردیبهشت و خرداد و زمان میوه دهی آن در تیر و مرداد است (۴). عصاره این گیاه دارای ترکیبات متعددی است که شامل آمینواسیدها، اسیدهای چرب، فلاونوئیدها (کویرستین، کامپرول)، ماد کاسسول، اسید ماد کاسسیک، تانن، گلیکوزیدهای مختلف ایندوستالتالوزید، براهموزید، براهمینوزید، اسید اسیاتیک، اسید آسیاتیسنوتیک، اسید ستونیک، اسید سنتلیک، ایزو تانکونزید و فیتواسترول می باشد (۵,۶). ترکیبات اصلی این گیاه اسید اسیاتیک و اسید ماد کاسسیک و سایر مشتقات گلیکوزیدهای استری ترینی، آسیاتیا کوزید و ماد کاسوزید است (۱).

گیاه آب بشقابی که آن را در گذشته های دور عصاره معجزه آسای حیات می نامیدند، از هزاران سال پیش در کشورهایی همچون هند، چین، اندونزی، سریلانکا و در جنوب آفریقا برای درمان بیماری های مختلف همچون سفیلیس، جذام، روماتیسم، صرع و بیماری های مغزی به طور وسیعی استفاده می شد. هم چنین برای افزایش هوش، طولانی شدن عمر و تقویت حافظه، درمان آسیب های پوستی ناشی از اثر اشعه، بهبود زخم و سوختگی، بی خوابی و التهابات پوستی استفاده شده است (۷-۱۱). در حال حاضر، در کشورهای هندوستان و چین از عصاره بشقاب آبی به عنوان داروی ضد بارداری برای انسان استفاده می شود (۱۲). هم چنین مطالعات تجربی انجام شده نشان داده است که در صورت تجویز خوراکی این عصاره به موش صحرایی نر کاهش معناداری در میزان

شد. کیت‌های هورمونی مورد استفاده در این تحقیق که شامل محلول‌های استاندارد، یاد رادیواکتیو، آنتی بادی و بافر شستشو بود، همگی از شرکت کاوشیار (وابسته به سازمان انرژی اتمی) خریداری و تهیه گردید.

در روش رادیوایمنوتوسی اساس کار بر این است که ابتدا سرم خون بدون مواد نشان‌دار در ظرفی ریخته و سپس هورمون نشان‌دار شده به آن اضافه می‌شود. هر دو آنتی ژن برای وصل شدن به آنتی بادی نشان‌دار و استاندارد که به محلول اضافه می‌شود با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این مراحل، ابتدا آنتی بادی با آنتی ژن غیرنشان‌دار متصل شده و اضافی آن به آنتی ژن نشان‌دار متصل می‌گردد. محلول بالایی موجود در ظرف را که حاوی آنتی ژن نشان‌دار آزاد و آنتی ژن غیر نشان‌دار و متصل به آنتی بادی است، دور ریخته و رسوب آن که حاوی آنتی ژن نشان‌دار و متصل به آنتی بادی است، در ته ظرف باقی می‌ماند. رسوب حاصله در دستگاه گاماماکنتر قرار گرفته و اعداد حاصله که نشان‌دهنده میزان آنتی ژن متصل به رادیو اکتیو است خوانده می‌شود. این اعداد هر چه بیشتر باشد نشان‌دهنده این است که مقدار هورمون در سرم کم است زیرا باعث شده که مقدار بیشتری از آنتی ژن‌های نشان‌دار به آنتی بادی استاندارد و نشان‌دار متصل شود (۱۴).

جمع‌آوری گیاه: گیاه آب بشقابی در خرداد ماه سال ۱۳۸۶ از مناطق مرطوب اطراف مرداب‌های بندر انزلی جمع‌آوری شد و توسط متخصص گیاه‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز شناسایی و تأیید گردید. به منظور خشک کردن گیاه جمع‌آوری شده، گیاه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و در سایه قرار داده شد.

استخراج عصاره: به منظور استخراج عصاره، ابتدا گیاه خشک شده به وسیله آسیاب برقی به پودر تبدیل شد و در ظرف مخصوص ریخته شد. سپس در مراحل مختلف به آن کلروفرم، اتر و متانول اضافه گردید و بعد از گذشت حدود ۲۴ ساعت، محتویات حاصله با دور ۳۰۰۰ در دقیقه به مدت ۵ دقیقه سانتریفیوژ شد و رسوبات جدا گردید. با

دمای معمولی (23 ± 2) و در شرایط ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی نگهداری شدند. غذای مورد استفاده حیوانات به صورت غذای آماده موش از شرکت دام و طیور پارس تهیه گردید و به شکل Pellet به همراه آب تصفیه شده شهری در آبخورهای مخصوص در اختیار آن‌ها قرار گرفت. موش‌های صحرایی حدود ۲۴ ساعت قبل از انجام آزمایش از لحاظ میزان آب مصرفی طی یک روز تحت نظر قرار گرفتند تا میزان دوز دریافتی عصاره از طریق آب روزانه محاسبه شود. میزان آب مصرفی هر موش حدود ۳۵ میلی لیتر در روز بود. همچنین نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده جهت تعیین سمیت حاد (LD50) نشان داد که دوزهای کمتر از 80 mg/kg به عنوان دوزهای غیر کشنده محسوب می‌شوند.

حیوانات به ۵ گروه تقسیم شدند و در هر گروه ۸ حیوان قرار داشت:

الف-گروه کنترل: این حیوانات آب آشامیدنی بدون عصاره و حلال دریافت کردند.

ب-گروه شم: این حیوانات تنها آب آشامیدنی به همراه حلال دریافت کردند

ج) گروه تجربی(۱) تا (۳): به ترتیب مقدار 10 mg/kg ، 50 mg/kg و 80 mg/kg عصاره به صورت خوراکی و روزانه دریافت کردند و این کار تا ۴۰ روز ادامه یافت.

۲۴ ساعت بعد از آخرین روز تجویز عصاره به وسیله بی‌هوشی با اتر از هر موش حدود ۳ تا ۴ میلی لیتر خون از ناحیه بطن قلب و در لوله‌های آزمایش تمیز که فاقد ماده ضدانعقادی بود، جمع‌آوری شد. نمونه‌های جمع‌آوری شده به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. سپس با استفاده از سمپلر سرم در هر نمونه از لخته جدا و تا زمان سنجش هورمونی در دمای ۲۰-۲۰ درجه سانتی گراد برای اندازه‌گیری غلظت سرمی هورمون‌های تستوسترون، FSH و LH نگهداری شدند. اندازه‌گیری هورمونی بر اساس روش‌های معمول آزمایشگاهی یعنی استفاده از روش رادیوایمنوتوسی انجام

گروه‌های کنترل ($p < 0.001$)، شاهد ($p < 0.008$) و گروه دریافت‌کننده عصاره به مقدار ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم کاهش یافته بود ($p < 0.02$). همچنانی بین دو گروه دریافت‌کننده عصاره به میزان ۵۰ و ۸۰ میلی‌گرم این اختلاف معنادار نبود ($p > 0.09$).

میانگین و انحراف معیار غلظت هورمون FSH در پنج گروه مورد مطالعه به ترتیب برابر $11/1\pm 2/23$ ، $20/9\pm 1/24$ ، $22/6\pm 1/24$ ، $24/4\pm 3/22$ و $28/8\pm 1/20$ واحد در لیتر می‌باشد. اما آزمون‌های آماری انجام شده تفاوت معناداری را در پنج گروه نسبت به همدیگر نشان نداد. میانگین و انحراف معیار غلظت هورمون LH به ترتیب برابر $10/6\pm 2/11$ ، $17/7\pm 1/10$ و $19/6\pm 1/10$ در سه گروه دریافت‌کننده عصاره به میزان ۱۰، ۵۰ و ۸۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم بود. همچنان در گروه کنترل و شاهد به ترتیب برابر $18/9\pm 1/83$ و $19/4\pm 0/09$ واحد در لیتر است. گروه‌های تجربی مورد مطالعه اختلاف معناداری در مقایسه با گروه‌های کنترل و شاهد نشان ندادند.

بحث

در مطالعه حاضر که به تأثیر عصاره الکلی بر میزان هورمون‌های مؤثر بر روند اسپرماتوزنژ پرداخته است، مشاهده گردید که در صورت تجویز عصاره به میزان ۵۰ mg/kg و ۸۰ mg/kg ترشح هورمون تستوسترون به طور معناداری کاهش می‌یابد. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که این هورمون به طور مستقیم بر سلول‌های سرتولی تأثیر می‌گذارد. سلول سرتولی با ترشح مایع لوله‌ای (Tubular Fluid) به تغذیه سلول‌های جنسی در حال تقسیم کمک

کمک دستگاه حذف حلال در خلا و در دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد، حلال اضافی تبخیر گردید. عصاره‌های حاصله به پلیت‌های جداگانه و روی بن‌ماری با حرارت ملایم خشک گردید (۱۵). غلظت‌های مناسب عصاره قبل از تجویز به حیوانات تهیه شد.

تجزیه و تحلیل آماری: نتایج به دست آمده در بررسی های هورمونی بین گروه‌های تجربی و کنترل به صورت میانگین و انحراف معیار بررسی شد. از آزمون‌های آنالیز واریانس و توکی در نرم‌افزار SPSS.13 برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج و مقایسه گروه‌های تجربی و کنترل استفاده شد. ارزش p کمتر از ۰.۰۵ صدم معنادار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

میانگین و انحراف معیار غلظت تستوسترون در گروه کنترل و شم به ترتیب برابر $18/4\pm 2/18$ و $14/1\pm 0/09$ (جدول ۱) و در گروه‌های تجربی که مقدار ۱۰، ۵۰ و ۸۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره دریافت کردند به ترتیب برابر با $15/1\pm 1/32$ ، $9/8\pm 0/05$ و $8/4\pm 0/31$ نانومول بر لیتر بود. آنالیز آماری انجام شده نشان می‌دهد که میانگین غلظت تستوسترون در گروه دریافت‌کننده عصاره به میزان ۵۰، به طور معناداری نسبت به سایر گروه‌های کنترل ($p < 0.001$)، شاهد ($p < 0.003$) و گروه دریافت‌کننده عصاره به مقدار ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم کمتر بود ($p < 0.004$).

میانگین غلظت تستوسترون در گروه دریافت‌کننده عصاره به میزان ۸۰، به طور معناداری نسبت به سایر

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار غلظت هورمون‌های تستوسترون، FSH و LH در موش‌های صحرایی نر مورد مطالعه

گروه مورد مطالعه	غلظت هورمون‌ها			
	LH IU/I	FSH IU/I	غلظت تستوسترون Nmol/l	غلظت هورمون‌ها Nmol/l
گروه کنترل	$19/4\pm 0/09$	$23/2\pm 1/11$	$16/4\pm 2/18$	
گروه شاهد	$18/9\pm 1/38$	$24/4\pm 3/22$	$14/1\pm 0/09$	
گروه تجربی	$16/4\pm 2/11$	$22/6\pm 1/88$	$15\pm 1/32$	
	$17/7\pm 1/10$	$20/9\pm 1/20$	$9/8\pm 0/05$	
	$19\pm 1/06$	$24/0\pm 2/81$	$8/4\pm 0/31$	

مورد ترشح هورمون LH نیز صادق است، یعنی این که تجویز عصاره آب بشقابی سطح سرمی هورمون LH را تغییر نمی‌دهد. این هورمون مستقیماً بر سلول‌های بینایینی تأثیر گذاشته و ترشح هورمون تستوسترون را تحریک می‌کند.^(۱۶)

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چگونه است که سطح سرمی هورمون تستوسترون کاهش می‌یابد اما سطح هورمون‌های FSH، LH در سرم تغییر نمی‌کند؟ علت شاید این باشد که تجویز عصاره برای یک دوره اسپرماتوژنر حدود ۴۰ روز بود و این امر از نقاط ضعف این مطالعه است. اما چرا بعد از تأثیر عصاره، حرکت اسپرم‌ها کاهش می‌یابد^(۱۲) شاید بتوان گفت که این عصاره می‌تواند بر اپی دیدیم تأثیر بگذارد. مطالعات نشان داده است که فعالیت نرمال اپی دیدیم برای بلوغ شیمیایی اسپرم‌ها لازم و ضروری است. در اپی دیدیم است که پروتئین‌های متعددی ترشح می‌شوند و ترشح این هورمون‌ها به هورمون آندروجن وابسته است^(۲۰). پس شاید بتوان نتیجه گرفت که بلوغ شیمیایی و تحرك اسپرم‌ها به هورمون تستوسترون وابسته است و با تغییر در مقدار آن به دلیل اثر عصاره آبی الکلی فعالیت اپی دیدیم نیز مختل شده و در نتیجه حرکت اسپرم‌ها کاهش می‌یابد. نگارندان این مقاله پیشنهاد می‌کنند که تأثیر دراز مدت عصاره الکلی آب بشقابی بر هورمون‌های دخیل در روند اسپرماتوژنر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

نگارندگان این مقاله مراتب تقدير و تشکر خود را از سرکار خانم لیدا مرادی کارشناس ارشد علوم تشریحی به دلیل همکاری در عصاره‌گیری اعلام می‌دارند.

References

1. World Health Organization. Monographs on selected medicinal plants. World Health Organization Geneve. 1998.

می‌کند. هم‌چنین پروتئین‌های متعددی همچون فاکتورهای رشد، ترانسفیرین و غیره را ترشح می‌نماید که هر کدام از این‌ها در تقسیم سلول‌های جنسی و در نهایت در تولید اسپرم نقش ویژه‌ای دارند. هورمون تستوسترون نقش دیگری هم دارد و آن اثر مستقیم بر سلول‌های جنسی در حال تقسیم است^(۱۶). با توجه به نقش مهم هورمون تستوسترون در روند اسپرماتوژنر، واضح است که در صورت کاهش ترشح این هورمون تعداد اسپرم‌ها کاهش یابد.

در تأیید کاهش هورمون بعد از تجویز عصاره آب بشقابی، نتایج حاصل از یک مطالعه تجربی نشان داده است که در صورت تجویز عصاره گیاه بشقاب آبی به موش صحرایی اسپرم‌های زنده و متحرک و هم‌چنین تعداد آن‌ها در دم اپی دیدیم به طور معناداری کاهش می‌یابند^(۱۲). هم‌چنین در تحقیقی که توسط دوتا و باسو بر موش‌های نر صورت گرفت نیز اثر ضدناباروری عصاره این گیاه به صورت خواصی را نشان داد^(۱۷). همچنین در مطالعه دیگری که توسط ماهانم و نورازالی در سال ۲۰۰۴ انجام شد، اثر عصاره این گیاه بر بافت بیضه و کیفیت اسپرم در موش نیز نشان داده شد^(۱۸).

از نتایج دیگر مطالعه حاضر این است که با خوراندن عصاره به موش‌های صحرایی در میزان ترشح هورمون FSH تغییر معناداری مشاهده نگردید. این هورمون از هیپوفیز قدمی ترشح می‌شود و به طور مستقیم بر سلول‌های سرتولی تأثیر می‌گذارد. مطالعات دیگر نشان داده است که این هورمون در جهت آغاز روند اسپرماتوژنر در موش صحرایی و ادامه آن نقش مهم و اساسی دارد^(۱۸,۱۹). این که عصاره گیاه آب بشقابی میزان سطح سرمی هورمون FSH را تغییر نمی‌دهد، نشان دهنده این است که عصاره آب بشقابی بر غده هیپوفیز و محور هیپوفیز – گناد تأثیر نمی‌گذارد. همین موضوع در

2. Taghizadeh M, Ahvazi M, Naghinezhad A. Determination of growth and distribution of centella asiatica in the anzali lagoon. *Iranian J Pharm Res.* 2004; 3(Supplement 2):66-66.
3. Jalili A, Jamzed Z. Red data book data of Iran, a preliminary survey of endemic, rare and endangered plant species in Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, Publication, 1999; 215:pp.748
- 4- تقی نژادع، تقی زاده م، اهوازی م.وضعیت گیاهان هیگروفت و دارویی آب بشقابی (تیره چتریان) در ایران. دهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران. دانشگاه بولی سینا همدان. ۱۳۸۲.
5. Gruenwald J, Brendler and Jaenicke C, editors. PDR for Herbal medicine. Second edition. Montvale (New Jersey): Medical economics Co; 2000:pp:729-31.
6. Fetrow CW, Avila JR. Professional Hand Book of complementary &Alternative therapies. Pnnsylvania: Spring House; 2001, pp: 239-40.
7. Kuhn MA, Winston D, DerMarderosian A. Herbal Therapy & Supplements: A Scientific & Traditional Approach: Lippincott; 2000; pp. 163-66.
8. Sastravaha G, Yotnuengnit P, BoonCong P, Sangherapitkul P. Adjunctive periodontal treatment with centella asiatica and punica granatum extracts. A preliminary study. *J Int Acad Periodontal.* 2003; 5:106-15.
9. Carpenter D. Professional guide to complementary and alternative therapies .Springhouse. Pensylvania.2002; pp: 239-240.
10. Corpoter DO. Nursing herbal medicine handbook. Pennsylvania: Sprinhouse; 2001; pp. 213-14.
11. Schultz V, Hansel R, Tyler V. Rational physiotherapy: a physician's guide to herbal medicine. Fourth edition. Springer.Germany.2000; pp: 337-8.
- 12- حیدری م، جمشیدی ا، آخوندزاده ش، غفاری نوبن م، صادقی م ر. اثر گیاه آب بشقابی بر اسپرماتوزئنزر. فصلنامه باروری و ناباروری. سال ۱۳۸۵. صفحات ۳۷۴-۳۶۸.
13. Shetty J, Marathe GK, Ramaswamy S, Dighe RR. Pituitary gonadotropins regulate spermatogonial differentiation and proliferation in the rat. *J.Biosci.* 1996; 21: 81-92.
14. Bingel AS, Farnsworth NR. Botanical source of fertility regulation agents:, Chemistry and pharmacology. In: Briggs M & Corbin A, editors. Progress in hormone biochemistry and pharmacology. Lancaster: MTP Press; 1981; 1: PP.149-225
- 15- فارماکوبه گیاهی ایران- کمیته تدوین فارماکوبه گیاهان ایران (مجرج طرح دکتر نصرالله قاسمی دهکردی) ناشر: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - معاونت غذا و دارو ۹۹-۱۰۷: صفحات ۱۰۷-۱۲۸۱
16. Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 3rd edition. Philadelphia: Elsevier;2004; pp:21-22.
17. Duta T, Basu UP. Crude extract of centella asiatica and products derived from its glycosides as oral antifertility agents. *Ind J Exp Biol.* 1968; 6: 181.
18. Mahanem MN, Norazalia MA. In Vivo Effects of Centella asiatica Leaf Extract on the Histology of Testis and Sperm Quality in Mice. *Sains Malaysiana*, 2004; 33 (2): 97-103. ISSN 01266039
19. McLachlan RI. O'Donnell L, Meachem SJ, Stanton PG, De Krester DM, Pratis K, et al. Identification of specific sites of hormonal regulation in spermatogenesis in rats, monkeys and man. *Recent Prog Horm Res.* 2002; 57:149-179.
20. O'Donnell L, Meachem SJ, Stanton PG, McLachlan RI. The endocrine regulation of spermatogenesis. In: Neill JD, (ed), Knobil and Neill's Physiology of Reproduction (3rd ed). r, San Diego CA: Elsevie. 2006; pp. 1017-1069.