

شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارکنان بهداشتی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ۱۳۸۶

علی اصغر خسروآبادی^۱، سید مهدی رضوی^۲، مجید فلاحی^۳، آرش اکابری^۴

^۱ عضوهای علمی گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

^۲ کارشناس بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

^۳ عضوهای علمی گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

^۴ کارشناس ارشد آمار حیاتی

نشانی نویسنده مسؤول: سبزوار. مرکز بهداشت، واحد بهداشت حرفه‌ای، سید مهدی رضوی

E-mail: razavi_seyedmehdi@yahoo.com

وصول: ۸۹/۴/۲، اصلاح: ۸۹/۵/۱۷، پذیرش: ۸۹/۶/۱۶

چکیده

زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی- عضلانی یکی از مهم‌ترین موضوع‌های سلامت شغلی در دنیا امروز می‌باشد. با توجه به این که وزارت بهداشت متولی امر سلامت جامعه است و ارائه هر چه بهتر خدمات سلامت نیازمند نیروی کار سالم می‌باشد، تحقیق حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ۱۳۸۶ انجام گردید.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی به صورت نمونه‌گیری در دسترس بر روی ۳۶۴ نفر از پرسنل گروه‌های پیراپزشکی، بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ۱۳۸۶ انجام شده است. در این مطالعه اختلالات اسکلتی- عضلانی از طریق پرسشنامه نوردیک که شامل بررسی اختلالات در ۹ عضو بدن در یک هفته گذشته، یک سال گذشته و بازماندگی از کار به عنوان اختلالات می‌باشد، بررسی گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با آزمون‌های تی مستقل و ضربی همبستگی در نرم‌افزار 13 SPSS تحلیل گردید.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کارکنان به ترتیب $۳۲/۸۱ \pm ۷/۸۸$ سال و $۹/۳۶ \pm ۷$ سال می‌باشد. بیشترین شیوع اختلالات در یک- سال گذشته در کل افراد مورد بررسی در نواحی کمر، زانو و پشت به ترتیب $۵۷/۸$ درصد، ۴۴ درصد و $۴۲/۶$ درصد بود ولی در گروه درمان به ترتیب $۶۱/۶$ درصد، $۴۱/۹$ درصد و $۴۸/۶$ درصد بود. در گروه پیراپزشکی، شیوع اختلالات در ناحیه شانه $۲۹/۷$ درصد و در گروه بهداشت در ناحیه مچ $۲۸/۴$ درصد بوده است.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه شیوع اختلالات کارکنان دانشگاه بالا بوده و بیشترین شیوع اختلال در نواحی کمر و زانو می‌باشد. اختلال در ناحیه پشت، کمر و زانو در گروه درمان و اختلال ناحیه گردن در گروه بهداشت بیشتر بود. (مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره ۱۷/شماره ۳ / صص ۲۲۳-۲۱۸).

واژه‌های کلیدی: اختلالات اسکلتی- عضلانی؛ پرسشنامه نورد یک؛ پوسچر.

مقدمه

که در بین زنان بهداشت کار دهان و دندان انجام گردید، ۸۱ درصد دندانپزشکان، بهداشتیاران دهان و دندان و پرستاران دندانپزشکی دچار اختلالات اندام فوقانی بودند (۹).

اختلالات اسکلتی - عضلانی از نظر اقتصادی نیز بسیار پرهزینه هستند به طوری که از نظر بروز درد و رنجی که گریبانگیر فرد می شود، این اختلالات دارای رتبه نخست هستند و از میان آنها کمر درد در جایگاه اول قرار دارد (۱۰). ارتباط شغل با اختلالات اسکلتی - عضلانی نظیر کمر درد در کارگران ساختمانی و درد شانه و گردن در کارگران اداری، به طور وسیعی گزارش گردیده است (۱۱). اختلالات اسکلتی - عضلانی در بین کارگران مراقبت های بهداشتی مشکل شغلی مهمی تلقی می شوند و علت اصلی مرگ و میر برای آنان تلقی می شود (۱۲). از این رو، با توجه به این که وزارت بهداشت متولی امر سلامت جامعه است و ارائه هر چه بهتر خدمات سلامت، نیازمند نیروی کار سالم می باشد، تحقیق حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ۱۳۸۶ انجام گردید.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی به صورت سرشماری بر روی ۳۶۴ نفر از پرسنل معاونت های بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ۱۳۸۶ انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در سه گروه پیراپزشکی (کارکنان آزمایشگاه، رادیولوژی، بینایی سنجی و شنوایی سنجی)، گروه بهداشت (بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت مبارزه و بهداشت خانواده) و گروه درمان (پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما، بهیار، کارکنان اتاق عمل و هوشبری) طبقه بندی شده و با استفاده از پرسشنامه استاندارد نوردیک که از پایابی و روایی بالایی برخوردار است، مورد بررسی قرار گرفتند. این پرسشنامه از دو بخش (پرسشنامه عمومی شامل

اختلالات اسکلتی - عضلانی یکی از مهم ترین موضوع های سلامت شغلی در دنیا امروز می باشد و تقریباً در تمام مشاغل شیوع بالایی دارد (۱). این اختلالات یکی از دلایل عدمه نقص و آسیب شغلی در کشورهای پیشرفته و کشورهای صنعتی در حال توسعه می باشند (۲). اختلالات اسکلتی - عضلانی تحت عنوان آسیب و عوارض در ماهیچه ها، اعصاب، تاندون ها، لیگامان ها، مفاصل، غضروف و ستون فقرات تعریف می شوند (۳). چنین اختلالاتی ممکن است در اثر مواجهه دراز مدت با عوامل ایجاد کننده آنها، به تدریج و در یک فرآیند طولانی رخ دهن و یا به طور ناگهانی، در اثر وارد شدن ضربه بزرگ بر بخشی از دستگاه اسکلتی - ماهیچه - ای ایجاد شوند. این آسیب ها پدیده ای چند عاملی است. به طور کلی، همه عوامل خطر را می توان در چهار گروه (عوامل ژنتیک، عوامل ریخت شناختی، عوامل روانی - اجتماعی و عوامل بیومکانیکی) رد بندی کرد. عوامل ژنتیک و ریخت شناسی به عنوان عوامل غیرقابل دستکاری و عوامل روانی - اجتماعی و بیومکانیکی را به عنوان عوامل قابل دستکاری می توان برای پیشگیری از رخداد آسیب مورد استفاده قرار داد (۴).

بیشتر مردم دردهای اسکلتی - عضلانی را در مراحل مختلف زندگی تجربه می کنند (۵). مطالعات اپیدمیولوژیک شواهدی را مبنی بر ارتباط بین عوامل شغلی و اختلالات اسکلتی - عضلانی نشان داده اند (۶). همچنین برخی بررسی ها نشان داده اند که شیوع درد، محل درد و سایر علائم می تواند به حالت ایستادن، عادات کاری و سایر عوامل دموگرافیک ربط داشته باشد (۷). در مطالعه پول مسجн در هلند، میزان شیوع سه ماهه اختلالات اسکلتی - عضلانی در بین پرسنل مراقبت های بهداشتی در مقایسه با افراد عمومی جامعه بیشتر بود که با میزان شیوع در سایر مشاغل استرس زا، صنعت و ساختمان قابل مقایسه بود (۸). همچنین در مطالعه پترا لینوفورس

یافته‌ها

میانگین و انحراف معیار سن و ساقه کارکنان به- ترتیب $۳۲/۸۱ \pm ۷$ سال و $۹/۳۶ \pm ۷$ سال می‌باشد. میانگین شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی در یک سال گذشته در کل افراد مورد بررسی در نواحی کمر ($۵۷/۸$ درصد)، زانو (۴۴ درصد) و پشت ($۴۲/۶$ درصد) به ترتیب دارای بیشترین فراوانی بوده است (جدول ۱).

جدول ۱: میانگین شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی در سه گروه پیراپزشکی، بهداشت و درمان

درصد فراوانی	تعداد	اندام‌های بدن
۳۱/۹	۱۱۶	گردن
۳۴/۳	۱۲۵	شانه
۱۲/۲	۴۴	آرنج
۳۵/۵	۱۲۷	مج و دست
۴۲/۶	۱۵۳	پشت
۵۷/۸	۲۰۸	کمر
۱۹	۶۸	باسن - ران
۴۴	۱۵۸	زانو
۲۲/۶	۸۱	پا و قوزک پا

مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه اختصاصی که به تجزیه و تحلیل عمیق اختلالاتی چون وجود درد، ناراحتی و بی‌حسی (در نواحی خاصی از بدن مانند کمر، گردن و شانه‌ها می‌بردازد) تشکیل شده است. این پرسشنامه دو هدف را دنبال می‌نماید:

(الف) به عنوان ابزاری جهت غربالگری اختلالات اسکلتی - عضلانی،

(ب) ابزاری جهت سنجش نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه اختلالات اسکلتی عضلانی.

با توجه به بالا بودن سطح تحصیلات گروه مورد مطالعه (حداقل دیپلم) پرسشنامه به صورت خوداظهاری تکمیل گردید. داده‌های مطالعه پس از جمع‌آوری به رایانه منتقل و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 13، ابتدا توسط شاخص‌های آماری، جدول و نمودار خلاصه شده و سپس توسط آزمون مجدد رکای و آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت که سطح معناداری نیز معادل $0/05$ در نظر گرفته شد.

جدول ۲: توزیع فراوانی اختلالات اسکلتی - عضلانی در سه گروه پیراپزشکی، بهداشت و درمان

اختلالات اسکلتی - عضلانی						گروه‌ها
مج دست	آرنج	شانه	گردن	تعداد	درصد	پیراپزشکی
۱۱	۳	۱۱	۷	تعداد		
۲۹/۷	۸/۱	۲۹/۷	۱۸/۹	درصد		
۱۹	۱۱	۲۱	۲۵	تعداد		
۲۸/۴	۱۵/۹	۳۰/۴	۳۶/۲	درصد		
۹۷	۳۰	۹۳	۸۴	تعداد		
۳۸/۲	۱۱/۷	۳۶	۳۲/۶	درصد		
۵	.	۶	۷	تعداد		
۱۴/۳	.	۱۶/۲	۱۸/۹	درصد		
۱۲	۶	۱۴	۱۸	تعداد		
۱۷/۹	۸/۷	۲۰/۳	۲۶/۱	درصد		
۵۰	۲۷	۶۷	۵۵	تعداد		
۱۹/۸	۱۰/۵	۲۶/۴	۲۱/۵	درصد		
۵	۳	۶	۵	تعداد		
۱۳/۹	۸/۳	۱۶/۷	۱۳/۵	درصد		
۱۱	۶	۱۲	۱۴	تعداد		
۱۵/۹	۸/۷	۱۷/۴	۲۰/۳	درصد		
۴۲	۲۴	۴۳	۴۰	تعداد		
۱۶/۵	۹/۵	۱۷/۱	۱۵/۵	درصد		
بازماندگی در یک سال گذشته به-						
دلیل اختلالات اسکلتی - عضلانی						
درمان						

جدول ۲: توزیع فراوانی اختلالات اسکلتی - عضلانی در سه گروه پیراپزشکی، بهداشت و درمان (ادامه جدول ۲)

پا	زانو	باسن	کمر	پشت	اختلالات اسکلتی - عضلانی		گروه ها
					تعداد	پیراپزشکی	
۴	۱۱	۲	۱۲	۱۰	درصد	پیراپزشکی	
۱۱/۱	۲۹/۷	۵/۶	۳۲/۴	۲۷	درصد	بهداشت	اختلالات اسکلتی - عضلانی
۱۷	۲۷	۱۸	۳۷	۱۹	درصد	دراست	
۲۴/۶	۴۰/۳	۲۶/۵	۵۶/۹	۲۸/۴	درصد	دراست	
۶۰	۱۲۰	۴۸	۱۵۹	۱۲۴	درصد	دراست	
۲۳/۶	۴۶/۹	۱۸/۹	۶۱/۶	۴۸/۶	درصد	دراست	
۱۰	.	۱۰	۸	۵	تعداد	پیراپزشکی	
۵/۶	۲۷/۸	.	۲۷	۲۱/۶	درصد	بهداشت	اختلالات اسکلتی - عضلانی در ۷ روز گذشته
۱۰	۱۸	۱۳	۲۷	۱۵	تعداد	دراست	
۱۴/۹	۲۶/۹	۱۹/۷	۴۰/۳	۲۱/۷	درصد	دراست	
۴۰	۸۸	۵۰	۱۲۴	۸۲	تعداد	دراست	
۱۵/۸	۳۴/۹	۱۹/۸	۴۸/۶	۳۲/۳	درصد	دراست	
۲	۳	۱	۶	۵	تعداد	پیراپزشکی	
۵/۶	۸/۳	۲/۸	۱۶/۷	۱۳/۹	درصد	بهداشت	بازماندگی در یک سال گذشته به -
۸	۱۸	۱۲	۲۹	۱۴	تعداد	دراست	دلیل اختلالات اسکلتی - عضلانی
۱۱/۶	۲۶/۱	۱۷/۱	۴۳/۳	۲۰/۳	درصد	دراست	
۲۶	۵۹	۴۰	۹۵	۵۸	تعداد	دراست	
۱۰/۲	۲۳	۱۵/۷	۳۷/۳	۲۲/۵	درصد	دراست	

گروه بیشترین بازماندگی از کار به علت اختلال در ناحیه کمر بوده است که این بازماندگی در گروه بهداشت با ۴۳/۳ درصد نسبت به دو گروه درمان با ۳۷/۳ درصد و پیراپزشکی با ۱۶/۷ درصد بیشتر بوده است (جدول ۲). همچنین نتایج مطالعه نشان داد که بین سابقه کار و اختلال اسکلتی - عضلانی در نواحی گردن ($p=0.001$) و کمر ($p=0.002$) ارتباط معناداری وجود دارد.

بحث

شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نواحی کمر، زانو، پشت و مج دست از سایر قسمت‌های بدن بیشتر می‌باشد و شیوع اختلالات در نواحی آرنج و باسن / ران کمترین می-باشد. در گروه پیراپزشکی (کارکنان آزمایشگاه، رادیولوژی، بینایی‌سنگی و شنوایی‌سنگی) شیوع اختلالات در نواحی کمر و زانو بیشترین و در نواحی باسن و آرنج کمترین بوده است. در گروه بهداشت (کارکنان بهداشت

میزان شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی (وجود درد، ناراحتی و بی‌حسی در اندامها) در یک سال گذشته به تفکیک در ۳ گروه پیراپزشکی، بهداشت و درمان نشان داد که اختلال در ناحیه گردن (۳۶/۲ درصد) در گروه بهداشت بیشتر از دو گروه دیگر بوده و اختلال در ناحیه کمر (۶۱/۶ درصد) و زانو (۴۶/۹ درصد) در گروه درمان از دو گروه دیگر بیشتر بوده است (جدول ۲).

میزان شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی (وجود درد، ناراحتی و بی‌حسی در اندامها) در ۷ روز گذشته به تفکیک در ۳ گروه پیراپزشکی، بهداشت و درمان نشان داد که اختلال در ناحیه کمر (۴۸/۶ درصد) در گروه درمان بیشتر از دو گروه دیگر بوده و اختلال در ناحیه زانو (۳۴/۹ درصد) در گروه درمان از دو گروه دیگر بیشتر بوده است (جدول ۲).

میزان بازماندگی در یک سال گذشته به دلیل اختلالات اسکلتی - عضلانی به تفکیک در سه گروه پیراپزشکی، بهداشت و درمان نشان داد که در هر سه

بوده است (۱۳).

در مطالعه لگات و اسمیت، شیوع اختلالات اسکلتی - عضلاتی در بین دندانپزشکان در یک سال گذشته در گردن $57/5$ درصد، کمر $53/7$ درصد و شانه $53/3$ درصد بود (۷). در مطالعه ترسا و همکاران شیوع کمر درد در دندانپزشکان بیشتر از سایر نواحی و 59 درصد بود و سپس گردن 56 درصد و شانه‌ها 47 درصد بیشترین شیوع را داشتند (۱۴).

به طور کلی در هر سه گروه، ناحیه کمر با $57/8$ درصد بیشترین شیوع اختلال را در یک سال گذشته داشته است که میزان شیوع کمر درد در بین دندانپزشکان در مطالعه مأول و همکاران بین 73 تا 76 درصد (۱۵)، سراجی و همکاران 60 درصد (۱۶)، منشادی و همکاران $54/5$ درصد (۱۷) گزارش شده است. در مطالعه چوبینه و همکاران نیز بیشترین اختلال در یک سال گذشته، درد کمر در بین پرستاران اتفاق عمل با شیوع $60/6$ درصد بود (۲). در تحقیق نوروز پرویز و همکاران که در بین کارکنان پرستار بیمارستان‌های دانشگاهی مشهد انجام گردید، شیوع کمر درد در مطالعه حاضر کمتر بود. در مطالعه پتروفورس او همکاران، شیوع اختلالات اندام فوقانی در بین کارکنان زن بهداشت دهان و دندان 81 درصد بود (۹) که از میزان شیوع کمر درد در مطالعه حاضر بیشتر بود و این تفاوت را می‌توان به بار فیریکی بالای کار دندانپزشکی نسبت به مشاغل دیگری نسبت داد که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

در پژوهش حاضر، درد کمر، زانو، پشت و مچ/دست شیوع بالایی در بین کارکنان رسته‌های مختلف شغلی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دارد که نشان‌دهنده آن است که کارکنان هر رسته با چندین عامل خطر مرتبط با کار خود مواجهه دارند. به منظور پیشگیری و کاهش اختلالات اسکلتی - عضلاتی در بین افراد باید برنامه‌های آموزشی جهت افزایش آگاهی پرسنل، تغییر

محیط، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت مبارزه و بهداشت خانواده) شیوع اختلالات در نواحی کمر و زانو بیشترین و در نواحی آرنج و پا کمترین بوده است. در گروه درمان که شامل پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما، بهیار، کارکنان اتفاق عمل و هوشبری بودند، شیوع اختلالات در نواحی کمر و پشت بیشترین و در نواحی آرنج و باسن کمترین بوده است.

در مطالعاتی که در زمینه شیوع اختلالات اسکلتی - عضلاتی در دنیا انجام شده است، کارکنان رسته‌های شغلی پرستاری و دندانپزشکی نسبت به کارکنان سایر مشاغل نظیر آزمایشگاه، رادیولوژی، بینایی‌سنجه، شناوری - سنجه، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت مبارزه، بهداشت خانواده، ماما، بهیار، اتفاق عمل و هوشبری (که در این مطالعه بررسی شده‌اند) بیشتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند و این پژوهش جزء محدود مطالعاتی است که مشاغل ذکر شده را نیز از لحاظ شیوع اختلالات اسکلتی - عضلاتی مورد بررسی قرار داده است. با توجه به آن‌چه گفته شد، شیوع اختلالات اسکلتی - عضلاتی در مشاغل پرستاری و دندانپزشکی در مطالعه حاضر را فقط می‌توان با مطالعاتی که شیوع اختلالات را در مشاغل پرستاری و دندانپزشکی بررسی کرده‌اند، مقایسه نمود و می‌توان شیوع اختلالات اسکلتی - عضلاتی پژوهش‌های انجام شده را گزارش نمود.

در مطالعه تینوبو و همکاران شیوع اختلالات اسکلتی - عضلاتی در بین پرستاران در کمر $44/1$ درصد، گردن 28 درصد و زانوهای $22/4$ درصد بود (۱۱). در مطالعه دویونگ کی و همکاران در بین پرستاران کره‌ای، شانه‌ها حساس‌ترین ناحیه بدن نسبت به اختلالات اسکلنی - عضلاتی و به ترتیب زانو، کمر، دست / مچ، گردن، پا و ساق پا و انگشتان بودند (۱۲) که ترتیب آن در مطالعه حاضر کمر، زانو، پشت و مچ - دست بود. همچنین در مطالعه آنتونیو لوروسو و همکاران در ایتالیا، شیوع کمر درد در 25 پژوهش مورد بررسی بین 33 تا 86 درصد

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از همکاری صمیمانه همکاران دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌های شهرستان سبزوار که در جمع‌آوری نمونه‌ها ما را یاری نموده‌اند، تشکر و قدردانی می‌نماییم.

رفتار آن‌ها و همچنین استراتژی‌های پیشگیرانه با توجه به عوامل خطر مرتبط با کار در هر رسته و مداخلات ارگونومی جهت شناسایی عوامل خطر، وضعیت کاری و طراحی مجدد محیط کار انجام شود.

References

- Smith DR, Leggat PA, Speare R. Musculoskeletal disorders and psychosocial risk factors among veterinarians in Queensland, Australia. *Aust Vet J*. 2009;87(7):260-5.
- Chubineh A , Movahed M, Tabatabaie SH, Kumashiro M. Perceived Demands and Musculoskeletal Disorders in Operating Room Nurses of Shiraz City Hospitals. *Ind Health*. 2010;48(1):74-84.
- Gangopadhyay S, Ghosh T, Das T, Ghoshal G and Das BB. Prevalence of Upper Limb Musculoskeletal Disorders among Brass Metal workers in West Bengal, India. *Ind Health*. 2007; 45(2): 365-70.
- چوینه علیرضا. مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید. چاپ دوم، تهران: انتشارات تچر، ۱۳۸۰، صفحه ۲۹۳ و ۴۰۴.
- Girish. M. Mody, and Anthony D Wolf. The Global Burden of musculoskeletal Disorders-Business Briefing; European Pharmaco therapy 2003 .
- Hansson GA, Balogh I, Ohlsson K, Pålsson B, Rylander L, Skerfving S. Impact of physical Exposure neck and upper limb disorders in Female Workers. *Applied Ergonomics*. 2000; 31: 301-10.
- Leggat PA, Smith DR. Musculoskeletal disorders self-reported by dentists in Queensland, Australia. *Australian Dental Journal* 2006; 51: 324-7.
- Meijzen P, Knibbe HJJ. Work-Related Musculoskeletal Disorders of Preoperative Personr in the Netherland. *AORN Journal*, 2007; 86: 193-208.
- Lindfors P, Von Thiele U and Ludberg U. Work characteristics and upper Extremity Disorders in Female Dental Health Workers. *Journal of Occupational Health* 2006 ; 48: 192-7.
- چوینه علیرضا. شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی، انتشارات فن آوران ۱۳۸۳.
- Naidoo S, Kromhout H, London L, Naidoo RN, Burdorf A. Musculoskeletal Disorders Pain in Women Working in Small-Scale Agriculture in South Africa. *Am J Ind Med*. 2009; 52: 202-9.
- Bolanle MS Tinubu, Chidozie E Mbada, Adewale L Oyeyemi, Ayodele A Fabunmi. Work-Related Musculoskeletal Disorders among Nurses in Ibadan, South-west Nigeria: a cross-sectional survey. *BMC Musculoskeletal Disorders* 2010, 11:12:1-8.
- Dohyung Kee , Sun Rim Seo. Musculoskeletal disorders among nursing personnel in Korea. *International Journal of Industrial Ergonomics* 2007; 37: 207–12.
- Lorusso A, Bruno S, L'Abbate N. A Review of Low Back Pain and Musculoskeletal Disorders among Italian Nursing Personnel. *Industrial Health* 2007, 45: 637-44.
- Newella TM, Kumar S. Prevalence of musculoskeletal disorders among orthodontists in Alberta. *International Journal of Industrial Ergonomics*. 2004; 33: 99-107.
- Maul I, Läubli T, Klipstein A, Krueger H. Course of low back pain among nurses: a longitudinal study across eight years. *Occupational Environmental Medicine*. 2003; 60:497–503.
- نسل سراجی جبرائلی، حسینی محمدحامد، شاه طاهری سیدجمال الدین، گل بابائی فریده، قاسم خانی مهدی . ارزیابی ارگونومیکی وضعیت های کاری شاغلین حرفه های دندانپزشکی شهرستان بیرجند به روش REBA. *مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی* تهران. سال ۱۳۸۴، دوره ۱۸، شماره ۱، صفحه: ۶۱.
- دهقان منشادی فریده، امیری زهره، ربیعی مليحه. بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در دندانپزشکان. *مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی* سال ۱۳۸۲، جلد ۲۱، شماره ۱، صفحه: ۱۸۶/۲(۲).
- نوروز پرویز و همکاران. میزان شیوع کمردرد و عوامل خطرزای آن در کارکنان پرستار بیمارستان های دانشگاهی مشهد در سال ۷۸ - ۷۸. *مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان* . دوره سوم، شماره ۱، بهار و تابستان ۸۵ : صفحات ۲۲ تا ۷۹