

تأثیر یک جلسه دو استقامت (۵۰۰۰ متر) بر میزان الکتروولیت‌های سرم خون

محسن غفرانی^۱، ابراهیم جوادی^۲

^۱ استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

^۲ دانشیار دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

نشانی نویسنده مسئول: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه تربیت بدنی، محسن غفرانی
E-mail: m.ghofrani18@yahoo.com

وصول: ۹۱/۸/۲۱، اصلاح: ۹۱/۱۰/۱۸، پذیرش: ۹۱/۱۲/۴

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی اثر یک جلسه دو استقامت (۵۰۰۰ متر) بر میزان الکتروولیت‌های سرم خون بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی ۱۴ دونده دانشجوی پسر به صورت داوطلبانه شرکت نمودند. بعد از گرم کردن، آزمودنی‌ها مسافت ۵۰۰۰ متر را در زمان ۲۳ دقیقه دویدند و در مرحله دوم خون‌گیری شرکت نمودند. از دستگاه فیلم فوتومتر و اسپکتروفوتومتر برای تعیین الکتروولیت‌های خون استفاده شد.

یافته‌ها: پنج هزار متر دویدن باعث تغییر معناداری ($P=0/039$, $t=-2/30$) در سدیم سرم خون می‌شود. میزان کلسیم نیز در سرم خون به طور معناداری ($P=0/005$, $t=-3/37$) به مقدار ۱/۷ درصد افزایش یافت.

نتیجه‌گیری: پنج هزار متر دویدن، میزان سدیم و کلسیم موجود در سرم خون را افزایش و میزان پتانسیم را کاهش می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: سرم خون، دو استقامت، الکتروولیت.

است (۱).

مقدمه

ورزش ممکن است باعث از دست رفتن عناصر معدنی بدن از طریق چندین مکانیسم شود (۲). به نظر می‌رسد که در طی ورزش مواد معدنی زیادی به گردش خون منتقل می‌شوند که احتمالاً از ذخایر بدن در عضلات یا استخوان‌ها آزاد می‌شوند. مقداری از این عناصر همزمان با حمل در گردش خون به وسیله کلیه‌ها از خون خارج شده و از طریق ادرار دفع می‌شوند مقداری از آن نیز در

الکتروولیت‌ها به مقدار فراوان در طبیعت یافت می‌شوند، این عناصر فلزی در حدود ۴ درصد وزن بدن را تشکیل می‌دهند که وظایف حیاتی و مهمی را در بدن بر عهده دارند. تنظیم مقدار کلی آب بدن و حجم خون، قابلیت نفوذپذیری غشاها، استحکام استخوان‌ها، تحریک-پذیری عصبی و عضلانی و تعادل اسید و باز بخشی از این وظایف مهم در بدن به ویژه هنگام فعالیت‌های ورزشی

نتایج متفاوتی در مورد تغییر غلظت الکتروولیت های سرم در اثر ورزش را گزارش نموده اند، لذا پژوهش های بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد. این پژوهش نیز سعی دارد تا به صورت تکمیلی به تغییرات الکتروولیت های سرم خون در اثر یک جلسه دو استقامت (۵۰۰۰ متر) پردازد.

مواد و روش ها

این پژوهش از نوع نیمه تجربی است. آزمودنی های این تحقیق ۱۴ نفر از دوندگان آماده بودند که از بین دانشجویان دانشگاه های تهران به صورت غیر تصادفی انتخاب شدند.

این ورزشکاران برای شرکت در مسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به صورت منظم به تمرین می پرداختند. اطلاعات مربوط به آزمودنی ها مانند سن، قد، سلامت جسمانی و نداشتن سابقه بیماری های خاص (قلبی - عروقی، ریوی و کلیوی و ...) از طریق پرسشنامه جمعیت شناختی جمع آوری شد. در روز اجرای آزمون، آزمودنی ها صبح به صورت ناشتا در محل آزمایشگاه حضور یافتند.

نمونه خون از ورید بازویی دست راست همه آزمودنی ها قبل از اجرای آزمون اخذ شد. سپس آزمودنی ها پس از گرم کردن، مسافت ۵۰۰۰ متر را حداکثر در زمان ۲۳ دقیقه دویدند، آزمون شوندگان در طی اجراء از هیچ گونه مایعات یا ماده غذایی استفاده نمی کردند. بعد از پایان فعالیت، دوباره از آزمودنی ها نمونه خون گرفته شد. نمونه های خون در دستگاه سانتریفیوژ با سرعت ۳۷۰۰ دور در دقیقه برای به دست آوردن میزان غلظت الکتروولیت ها تجزیه شدند. برای تعیین میزان سدیم و پتاسیم از روش تحریک سطح خارجی یونها با حرارت به وسیله دستگاه فیلم فتو متر و برای اندازه گیری کلسیم با روش تیتراسیون از دستگاه اسپکترو فتو متر استفاده گردید.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی

عرق ترشح شوند که به نظر می رسد این مقادیر دفعی در ورزش های طولانی مدت بیشتر باشد (۳). سدیم و پتاسیم از یون های مهم در بدن هستند چون تغییرات جزئی آنها می تواند پتانسیل عمل (action potentials) را مختل کرده و باعث مشکلات عصبی و قلبی گردد (۴) لذا نیاز است سطح آنها در خون به دقت تنظیم شود. کلسیم نیز یکی از عناصر ارگانیکی مهم بدن است که علاوه بر استحکام استخوانها در آزادسازی عضله بعد از انقباض و تاخیر در حسٹگی عضلاتی نقش اساسی بر عهده دارد (۵).

تحقیقات متعددی در رابطه با الکتروولیت های سرم خون در ورزش صورت گرفته که یافته های آنها گاهی با یکدیگر همخوانی ندارد. برای مثال، افزایش در غلظت پتاسیم سرم را جانسون و همکاران (۱۹۹۸) پس از اجرای دو ۳۵۰۰ متر (۶) و همچنین میلارد و همکاران (۱۹۹۰) در مسابقات دو، شنا و دوچرخه سواری گزارش کرده اند (۷). در حالی که نوبل و همکارانش (۱۹۸۷) در تحقیق بر روی دوندگان ماراتن کاهش پتاسیم خون را گزارش نمودند (۸). برودوکس ۱۹۸۷ عنوان کرده بود که افزایش یون پتاسیم باعث اتساع عروق می شود (۹). کمبود آن نیز می تواند منجر به ضعف عمومی عضلات ارادی و گرفتگی عضلانی گردد (۱۰). آرمسترانگ (۱۹۹۴) طی پژوهشی نشان داد که ورزش طولانی مدت موجب افزایش سدیم خون می شود (۱۱). اما ادوین و همکارانش (۱۹۷۹) در مقایسه بین میزان سدیم خون دونده های استقامت با افراد غیر ورزشکار، تفاوت چشم گیری را مشاهده نکرد (۱۲). جانسون (۱۹۸۸)، جاوید (۱۹۸۳) و واسکی ویز (۲۰۱۱) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که تمرینات استقامتی طولانی مدت موجب افزایش غلظت کلسیم می شود (۱۳، ۱۴). در صورتی که در مطلعه ادوین و همکارانش (۱۹۷۹) تفاوت معناداری در مقادیر کلسیم خون دوندگان ماراتن در مقایسه با ورزشکاران عادی و غیر ورزشکاران به دست نیامد (۱۲).

با توجه به مطالعه فوق، پژوهش های انجام شده

ضرورت پیشرفت در علوم ورزشی ایجاب می‌کند تا عوامل اثرگذار بر اجرا را بشناسیم، دردهای عصلانی، ضعف بدنی، خستگی زودرس، کاهش استقامت، کاهش انتقال تحیریکات عصبی، اغما و ... که در هنگام مسابقات دو استقامت در بعضی از ورزشکاران مشاهده می‌شود، ضرورت بررسی تغییرات الکتروولیت‌های سرم خون را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

نتایج به دست آمده در مورد افزایش معنادار غلظت سدیم سرم خون در تحقیق حاضر با تحقیقاتی که توسط آرمسترانگ (۱۹۹۴) جانسون (۱۹۸۸)، گرین لیف (۱۹۷۴) انجام گرفته همخوانی دارد (۲,۶,۱۱) هر چند بعضًا

(فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمون‌های t همبسته با نرم‌افزار SPSS.15 در سطح ($\alpha = 0.05$) انجام گرفت.

یافته‌ها

در جدول ۱ اطلاعات مربوط به سن، قد و وزن آزمودنی‌ها آورده شده است.

در جدول (۲) میانگین و انحراف معیار میزان سدیم، پتاسیم، کلسیم، وزن و ضربان قلب آزمودنی‌ها قبل و پس از طی مسافت ۵۰۰۰۰ متر به همراه نتایج آزمون تی وابسته آورده شده است.

داندگان استقامت	سن	قد	وزن	شاخص گروه
	22 ± 0.89	$179 \pm 6/3$	$65/99 \pm 5/75$	قبل از فعالیت
			$65/36 \pm 5/61$	پس از فعالیت

جدول ۲: مقایسه میانگین فاکتورهای مورد ارزیابی در دو مرحله

فاکتورها	پیش آزمون men \pm sd	T	Sig
سدیم	$141/92 \pm 3/24$	-۲/۳۰	۰/۰۳۹
پتاسیم	$4/30 \pm 0/35$	۲/۰۹	۰/۰۵۶
کلسیم	$9/31 \pm 0/22$	-۳/۳۷	۰/۰۰۵

محققین کاهش غلظت سدیم را گزارش دادند اما افزایش غلظت سدیم سرم خون در طی ۵۰۰۰ هزار متر دویدين در آب و هوای معتدل منطقی به نظر می‌رسد که به علت دفع آب از طریق پوست، تغییر فشار اسماتیک در نتیجه تغییر در حجم پلاسمما که در مرحله ابتدایی مسابقه منجر به تصفیه آب از مویرگها می‌شود، افزایش درجه حرارت بدن، به طوری که با تنظیم درجه حرارات بدن میزان سدیم و سایر الکتروولیت‌ها تعدیل می‌گردد، افزایش ترشح آلدسترون، کاهش جریان خون در لوله‌های ادراری و افزایش غلظت خون خواهد بود.

نتایج تحقیق، کاهش به میزان $5/8$ درصد در پتاسیم سرم خون را نشان داد که از لحاظ آماری معنادار

تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش نشان داد که پنج هزار متر دویدين در آب و هوای معتدل تهران باعث تغییر معناداری ($t = -2/30$, $P = 0/039$) در سدیم سرم خون می‌شود (سدیم سرم به قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد)، همچنین موجب کاهش پتاسیم خون به میزان $5/8$ درصد می‌گردد، که این کاهش معنادار نیست ($P = 0/056$, $t = 2/09$). همچنین میزان کلسیم در سرم خون به طور معناداری ($t = -3/37$, $P = 0/005$) به میزان $1/7$ درصد افزایش یافت. وزن بدن نیز به میزان $1/06$ درصد کاهش یافت که این کاهش به لحاظ آماری معنادار ($P = 0/000$, $t = 6/52$) بود.

بحث

هورمون رشد، صفرا و مواد آنتی بیوتیک در افزایش نسبت جذب کلسیم دخالت دارند از طرفی مادامی که مقدار کل کلسیم بدنه کاهش می یابد، کلسیم استخوانها بسیج شده و کلسیم سرم خون افزایش می دهد (۱).

با توجه به اثرات سوء برهم خوردن تعادل الکتروولیت های خون بر عملکردهای عصبی - عضلانی، تعادل اسید و باز، ریتم قلب و ایجاد خستگی و اسپاسم عضلات لازم است ورزشکاران توجه خاصی به رژیم غذایی خود داشته تا ضمن حفظ تعادل الکتروولیت های خون خود از این نوع عوارض پیشگیری نمایند.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از تمامی دانشجویان تربیت بدنه و مسؤولین دانشکده تربیت بدنه دانشگاه تهران که من را در این پژوهش یاری دادند، سپاسگزاری می کنم.

نیست. کاهش مقدار پتانسیم سرم خون توسط لی تیچ (۱۹۹۴)، سو (۲۰۰۱) و واسکی ویز (۲۰۱۱) گزارش شده (۴,۵,۱۱). علل کاهش پتانسیم سرم خون را می توان به دفع پتانسیم در نتیجه تأثیر هورمون آلداسترون بر روی کلیه ها، دفع پتانسیم در اثر بالا رفتن غلاظت بیکربنات و دفع پتانسیم به دلیل کاهش حجم مایع خارج سلولی نسبت داد. افزایش معنادار کلسیم سرم خون از نظر آماری به دنبال ۵۰۰۰ هزار متر دویین در آب و هوای متعادل تهران مشاهده شد که با نتایج تحقیقات پژوهشگرانی چون واسکی ویز (۲۰۱۱)، جانسون (۱۹۸۸)، جاوید و همکاران (۱۹۸۳) همخوانی دارد (۶,۱۳,۱۴). اگرچه محققینی چون ادوین (۱۹۷۹) بر روی ورزشکاران دوی مارتون، دو استقامت و ورزشکاران عادی پژوهش کردند، اما مقادیر سرم خون در این گروه ها تفاوت معناداری نشان نداد (۱۲) ولی افزایش کلسیم سرم خون منطقی به نظر می رسد و می توان این دلایل را مطرح کرد: ترشح هورمون های پاراتورمون از پاراتیر وئید،

References

1. Fox EL, Mathews DK. Exercise Physiology: Translated by Khaledan A. 1th ed. Tehran: University of Tehran Press; 2008.(Persian)
2. Greenleaf JE, Castle BL, Card DH. Blood electrolytes and temperature regulation during exercise in man. *Acta Physiol Pol.* 1974;25(5):397-410.
3. Suzuki M, Machida K. Sports and measurement of components in urine-responses of renal blood flow, electrolytes and hormones and of excretion of proteins into urine to exercise. *Rinsho Byori.* 1996; 44(7):627-32.
4. Su M, Stork C, Ravuri S, Lavoie T, Anquish D, Nelson LS, Hoffman RS. Sustained-release potassium chloride overdose. *J Toxicol Clin Toxicol.* 2001; 39 (6): 641-8.
5. Leitch SP; Patterson DJ. Interactive effects of K+, acidosis, and catecholamines on isolated rabbit heart: implications for exercise. *J appl physiol.* 1994; 77 (3): 1164-71.
6. Johnson HL, Nelson RA, Consolazio CF. Effect of electrolyte nutrient solution on performance and metabolic balance. *Med Sci sports Exerc.* 1988; 20(1):26-33.
7. Millard-Stafford M, Sparling PB, Rosskopf LB, Hinson BT, DiCarlo LJ. Carbohydrate – electrolyte replacement during asimulated triathlon in heat. 1990; 22(5):621-8.
8. Noble T. physiology of exercise and sport.1987:189-90.
9. Berdeaux A, Giudcelli JF. Antihypertensive drugs and bar receptor reflex control of heart and blood pressure, *Fundam Clin Pharmacol.* 1987;1(4):257-82.
10. Muñoz A, Riber C, Trigo P, Castejón F. Muscle damage, hydration, electrolyte balance and vasopressin concentrations in successful and exhausted endurance horses. *Pol J Vet Sci.* 2010;13(2):373-9.

11. Armstrong LE, Curtis WC, Hubbard RW, Franceconi RP, Moore R, Askew EW. Symptomatic hyponatremia during prolonged exercise in heat. *Med Sci Sports Exerc.* 1993;25(5):543-9.
12. Edwin D, Detlef H. Physical fitness and reproductive physiology of the female distance runner. *Physician and sport med.* 1979;83-95.
13. Jaweed MM. Muscle electrolyte changes in young exercised rates. *Biochem exere.* 1983; 13: 551-63.
14. Waśkiewicz Z, Kłapcińska B, Sadowska-Krępa E, Czuba M, Kempa K, Kimsa E, Gerasimuk D. Acute metabolic responses to a 24-h ultra-marathon race in male amateur runners. *Eur J Appl Physiol.* 2011; 112(5):1679-88.

Archive of SID

The effect of one session endurance running (5000 m) on the level of serum electrolytes

Ghofrani M., Ph.D

Assistant Professor of Physical Education, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

Javadi A., phD

Associate Professor of Department of Medicine , Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Received:11/11/2012, Revised: 07/01/2013 , Accepted: 23/02/2013

Corresponding Author:

zahedan, , University of Sistan and Baluchestan, Department of Physical Education, Mohsen Ghofrani
E-mail: M.ghofrani18@yahoo.com

Abstract

Background: The purpose this study was the effect of one session endurance running (5000 m) on the level of serum electrolytes.

Materials and methods: In this quasi-experimental, 14 male runners participated in the test, voluntarily. After warm-up, subjects ran distances of 5,000 meters in 23 minutes and participated in the second blood sampling. Photometer and spectrophotometer video device to determine blood electrolytes were used.

Results: 5,000-meter run at Tehran's climate caused significant change in serum sodium ($p=0/039$, $t=2/30$).Serum calcium levels also rose significantly in the amount of 7/1 percent ($p=0/005$, $t=-3/37$).

Conclusion: the 5000-meter run, Increases in sodium and calcium in the blood serum and Reduces the amount of potassium.

Keywords: *blood, running endurance, electrolyte*