

اثر نیکوتین بر میزان انسولین، گلوکز، پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی AST و ALT در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

لیلا صیادی^۱، سید ابراهیم حسینی^{۲*}، علیرضا فتحی^۳

^۱ دانش آموخته زیست‌شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران.

^۲ دانشیار زیست‌شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران.

^۳ استادیار زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران.

نشانی نویسنده مسئول: فارس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

E-mail: Ebrahim.hossimi@yahoo.com

وصول: ۹۲/۱۲/۲۶، اصلاح: ۹۲/۱۲/۲۳، پذیرش: ۹۳/۱/۲۳

چکیده

زمینه و هدف: نیکوتین یکی از مواد مؤثر موجود در سیگار می‌باشد. نیکوتین برای مغز، سیستم‌های قلبی‌عروقی، تنفسی و بافت‌های مختلف بدن سمی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر نیکوتین بر آنزیم‌های الائین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آکالالین فسفاتاز (ALP)، پروفایل لیپیدی، گلوکز و انسولین در موش‌های دیابتی شده انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی از ۵۰ سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی ۲۲۰ تا ۲۵۰ گرم استفاده شد که به ۵ گروه ۱۰ تابی شامل کنترل (فاقد تیمار)، شاهد دیابتی، ۳ دسته تجربی شامل موش‌های دیابتی شده‌ای که تحت تیمار دوزهای ۰/۱۲۵ mg/kg، ۰/۰۵ mg/kg و ۰/۰۲۵ mg/kg بودند. در این مطالعه برای دیابتی کردن موش‌ها از تزریق درون صفاقی ۶۰ mg/kg استرپتوزوتوسین استفاده گردید. در پایان آزمایش از موش‌ها خون گیری به عمل آمده و میزان سرمی آنزیم‌های AST، ALT، ALP، HDL، LDL، کلسترول، تری گلیسرید، انسولین و گلوکز بررسی گردید. داده‌ها به کمک آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون پیگیری Tukey توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۸، آنالیز شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که غلظت آنزیم‌های ALP، AST، انسولین، گلوکز، کلسترول نام، تری گلیسرید و LDL در گروه‌های تجربی دارای افزایش و غلظت HDL دارای کاهش معناداری نسبت به گروه شاهد می‌باشند.

نتیجه‌گیری: نیکوتین، باعث افزایش عوارض ناشی از بیماری دیابت از قبیل افزایش قند، چربی‌ها و آنزیم‌های کبدی ALP، AST و می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: نیکوتین، انسولین، گلوکز، لیپیدها، ALT، AST، ALP

مقدمه

آدرنرژیکی، افزایش می‌یابد و عواملی چون روزه‌داری، سوماتوستاتین، تحریکات آلفا-آدرنرژیکی و لپتین باعث کاهش ترشح انسولین می‌شوند (۱۱). کبد با داشتن آنزیم‌های مختلف محل اصلی متابولیسم داروهای مختلف بوده و برخی از این داروها نیز نظری داروی زولپیدم منجر به افزایش سرمی برخی از فاکتورهای کبدی مانند ALT و AST می‌شود (۱۲). کبد طی روندهای بیوترانسفورماسیون با دخالت آنزیم‌های مختلف مواد را سمزدایی و غیرفعال می‌سازد. اندازه‌گیری ترانس آمینازها که وظیفه انتقال گروه آمین را از آسپارتات و یا آلانین به آلفا-کتوگلوتارات بر عهده دارند، معکوس کننده سلامتی و یا بیماری و بازتابی از شدت نکروز در کبد می‌باشد (۱۳). حساس‌ترین و پرمصرف‌ترین آنزیم‌های کبدی آمینوترانسفرازها هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به ALT و AST اشاره نمود (۱۴). افزایش آنزیم‌های کبدی تقریباً در تمام بیماری‌های کبدی از جمله سرطان کبد، کبد چرب، الکلیسم، چاقی و دیابت دیده می‌شود (۱۵). استریتوزوتوسین یک ترکیب nitrosurea است و به عنوان یک عامل مولد دیابت در حیوانات تجربی به حساب می‌آید که از طریق تخریب غشاء سلول‌های بتای پانکراس منجر به مرگ و میر آن‌ها می‌شود (۱۶). پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که تعداد مرگ و میر ناشی از استعمال دخانیات و نیکوتین تا سال ۲۰۳۰ میلادی آینده به حدود ۱۰ میلیون نفر در سال افزایش پیدا خواهد کرد (۱۷) و با توجه به گسترش روز افزون بیماری دیابت در سراسر دنیا و همچنین مصرف هم زمان سیگار توسط بسیاری از این بیماران، این مطالعه با هدف بررسی اثر نیکوتین بر میزان سرمی انسولین، گلوکز، لیپیدها و برخی از آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه تجربی از ۵۰ سر موش صحرایی نر

وجود بیش از ۴۰۰۰ نوع ماده شیمیایی خطرناک از جمله نیکوتین در ترکیبات دود سیگار شناخته شده است. استعمال دخانیات باعث افزایش فشارخون، اختلالات قلبی-عروقی، دیابت، هیپرلیپیدمی، ایسکمی مغزی و شوک اکسیداتیو می‌شود (۱). نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیکوتین وزن بدن را به کمک تأثیر بر کاهش گرسنگی و افزایش ترمومژن کاهش می‌دهد (۲) و با اثر بر روی گیرنده‌های نیکوتینی استیل کولین در سلول‌های بتای پانکراس باعث افزایش تجزیه و بازسازی اینوزیتول فسفولیپیدها و در نتیجه افزایش حساسیت این سلول‌ها به کلسیم و تحریک ترشح انسولین می‌گردد (۴و۳). نیکوتین باعث افزایش میزان سرمی هورمون انسولین در موش‌های صحرایی می‌گردد (۵). دیابت یکی از بیماری‌های شایع متابولیکی است که دارای عوارض زیادی در بافت‌های مختلف بدن از جمله کبد بوده و با مقادیر بالای قندخون در ارتباط مستقیم است (۶). در بیماری دیابت به دلیل افزایش میزان لیپیدهای خون، بیماری‌های قلبی عروقی و آترواسکلروز افزایش می‌یابند (۷). از طرف دیگر آسیب‌های عصبی ناشی از دیابت می‌تواند موجب اختلال در عملکرد اعصاب اتونومیک و سیستم نورواندوکرین شده و از این طریق سبب تشدید و خامت بیماری و افزایش مرگ و میر بیماران شود (۸). بیماری‌های ویروسی و خودایمنی از طریق تخریب سلول‌های بتا در پانکراس باعث ایجاد دیابت نوع یک و چاقی و کم تحرکی و مقاومت به انسولین از دلایل دیابت نوع دو می‌باشند (۹). عوارض مزمن دیابت با مقادیر بالای گلوکز در خون ارتباط مستقیم دارد (۱۰). میزان ترشح انسولین با افزایش غلظت گلوکز خون، اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب آزاد خون، هورمون‌های گوارشی (گاسترین، کوله سیتوکینین، سکرتین و پپتید شبه گلوکاگون (GLP1)، گلوکاگون، هورمون رشد، کوررتیزول، تحریکات پاراسمپاتیکی، تحریکات بتا-

آزمایشگاهی معمول و با استفاده از کیت‌های ساخت شرکت آزمون میزان آنزیم‌های ALT، AST و گلیسیریدهای تهیه شده از شرکت هیومن آلمان و میزان سرمی انسولین نیز با استفاده از کیت اندازه‌گیری انسولین (DAG rat insulin high range) در موش‌های صحرایی (DGR International EIA-3985) ساخت شرکت Inc.USA آندازه‌گیری گردید. در نهایت داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس یک‌طرفه (ANOVA) و آزمون پیگیری Tukey به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۸ تجزیه و تحلیل شدند. لازم به ذکر است که در کلیه تحلیل‌ها مرز استنتاج آماری در سطح معنی‌داری 0.05 در نظر گرفته شد.

نتایج

با توجه به نتایج آزمون ANOVA بین میزان سرمی انسولین، گلوکز، ALT، ALP و AST در گروه‌های مختلف تفاوت معنی دار بوده است و آزمون پیگیری Tukey نیز بین میانگین هورمون انسولین و گلوکز در گروه‌های شاهد و تجربی نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان داد و بین میانگین هورمون انسولین و گلوکز در گروه‌های تجربی نسبت به گروه شاهد، افزایش معناداری مشاهده شد (جدول ۱). هم چنین آزمون پیگیری Tukey بین میانگین آنزیم ALT در گروه‌های شاهد و تجربی نسبت به گروه کنترل و بین میانگین آنزیم ALT در گروه‌های تجربی نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری را نشان داد. بین میانگین آنزیم AST و ALP در گروه‌های شاهد و تجربی نسبت به کنترل و هم چنین بین میانگین آنزیم ALP و AST در گروه‌های تجربی نسبت به گروه شاهد افزایش معناداربوده است (جدول ۱). نتایج این مطالعه نشان داد که بین میانگین غلظت تری گلیسیرید و کلسیترول خون در گروه‌های شاهد و تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار و بین میانگین غلظت کلسیترول و تری گلیسیرید خون در گروه‌های تجربی

بالغ از نژاد ویستار با وزن $220\text{--}250$ گرم که از خانه پرورش حیوانات دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شدند استفاده گردید. میانگین سن حیوانات در زمان انجام آزمایش ها 90 روز بود و حیوانات در شرایط دمایی 22 ± 2 درجه سانتی‌گراد و شرایط نوری 12 ساعت تاریکی و 12 ساعت روشنایی قرار گرفتند. حیوانات در طول دوره آزمایش به آب و مواد غذایی به مقدار کافی دسترسی داشتند. پروتکل انجام این پروژه تحقیقاتی در مورد کار با حیوانات آزمایشگاهی تنظیم و در کمیته اخلاق دانشگاه به تصویب رسید. در این مطالعه نمونه‌ها به ۵ گروه 10 تایی شامل گروه‌های کنترل غیردیابتی، شاهد دیابتی و 3 گروه تجربی دیابتی تقسیم شدند. در این پژوهش برای دیابتی کردن موش‌ها از تزریق درون صفاقی 60 mg/kg داروی استرپتوزوتوسین تهیه شده از شرکت up John آمریکا استفاده شد (۱۶). پس از گذشت 72 ساعت، ضمن خون گیری از ناحیه دم موش‌ها، با استفاده از نوار گلوكوباب و دستگاه GLUCODR مدل SENSOR ساخت کرده جنوی، میزان قدرخون نمونه‌ها اندازه‌گیری شد و جهت اطمینان بیشتر مبنی بر دیابتی بودن موش‌ها، یک هفته بعد از تزریق، خون گیری تکرار گردید و موش‌های با قدرخون 300 mg/dl در سرم خون به عنوان موش‌های دیابتی در نظر گرفته شدند (۲۵). در این مطالعه گروه‌های کنترل تحت تجویز امیلی لیتر آب نگرفتند و گروه شاهد نیز تحت تجویز امیلی لیتر آب مقطار به صورت گاواظر قرار گرفتند. گروه‌های تجربی دریافت کننده نیکوتین نیز به ترتیب دوزهای $0/5$ ، $0/25$ و $0/125$ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن نیکوتین را به صورت گاواظر در هر روز و برای مدت 5 روز دریافت داشتند (۵). کلیه تجویزها در ساعت 9 تا 10 صبح انجام گردید و در آخرین روز انجام آزمایش‌ها و بعد از بی‌هوش نمودن موش‌ها به وسیله کتابمین، با کمک سرنگ از درون قلب آنها خون گیری به عمل آمد. پس از سانتریفیوژ نمودن نمونه‌های خونی با استفاده از روش‌های

جدول ۱: میزان سرمی انسولین، گلوکز، ALP، AST و ALT در گروه‌های مختلف (خطای معیار میانگین ± میانگین)

گروه‌ها	انسولین (ng/ml)	گلوکز (ng/ml)	ALT (ng/ml)	AST (ng/ml)	ALP (ng/ml)
کنترل	۱۴/۳۸ ± ۰/۵۱	۷۲/۲۰ ± ۲/۳۶	۱۲۷/۳۰ ± ۲/۲۸	۵۷/۰۰ ± ۲/۲۴	۳۷۱/۲۰ ± ۴/۱۶
شم	۳/۴۴ ± ۰/۲۷*	۳۴۳/۴۰ ± ۳/۶۲*	۱۷۸/۸۰ ± ۲/۷۱*	۱۰۹/۳۰ ± ۱/۷۱*	۵۵۶/۳۰ ± ۹/۳۳*
تجربی ۱ (نیکوتین با دوز ۰/۱۲۵mg/kg)	۶/۵۰ ± ۰/۲۵*,##	۴۳۲/۳۰ ± ۵/۹۳*,##	۲۰۰/۶۰ ± ۳/۳۸*,#	۱۲۵/۱۰ ± ۳/۳۲*,##	۱۱۳۷/۹۰ ± ۲۴/۵۸*,##
تجربی ۲ (نیکوتین با دوز ۰/۰۴۵mg/kg)	۸/۶۷ ± ۰/۳۳*,##	۵۰۳/۳۰ ± ۵/۰۱*,##	۲۳۰/۸۰ ± ۴/۷۴*,##	۱۷۲۴/۴۰ ± ۳/۲۲*,##	۱۴۸۸/۴۰ ± ۱۹/۷۵*,##
تجربی ۳ (نیکوتین با دوز ۰/۰۵mg/kg)	۱۱/۲۱ ± ۰/۳۳*,##	۵۹۱/۱۰ ± ۴/۶۹*,##	۳۰۷/۱۰ ± ۴/۴۳*,##	۲۰۵/۷۰ ± ۵/۶۹*,##	۲۱۷۹/۹۰ ± ۳۴/۶۷*,##

* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح ۰/۰۰۰۵ با گروه کنترل می‌باشد.

نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح ۰/۰۰۰۵ با گروه شاهد می‌باشد.

نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح ۰/۰۰۱ با گروه شاهد می‌باشد.

جدول ۲: میزان سرمی کلسترول تام، تری گلیسرید، LDL و HDL در گروه‌های مختلف (خطای معیار میانگین ± میانگین)

گروه‌ها	کلسترول تام (ng/ml)	تری گلیسرید (ng/ml)	LDL (ng/ml)	HDL (ng/ml)
کنترل	۵۷/۳۰ ± ۱/۵۷	۴۷/۷ ± ۱/۷۵	۸/۲۰ ± ۰/۴۹	۳۴/۳۰ ± ۰/۸۹
شم	۱۰/۶۰ ± ۱/۳۸*	۱۱۱/۴۰ ± ۳/۶۵*	۱۸/۳۰ ± ۰/۸۲*	۲۴/۹۰ ± ۱/۱۵*
تجربی ۱ (نیکوتین با دوز ۰/۱۲۵mg/kg)	۱۲۰/۰۰ ± ۵/۳۵*#	۱۲۸/۴۰ ± ۲/۵۶*#	۲۶/۲۰ ± ۰/۸۷*,##	۲۵/۹۰ ± ۱/۱۶*
تجربی ۲ (نیکوتین با دوز ۰/۰۴۵mg/kg)	۱۳۲/۵۰ ± ۱/۹۳*##	۱۵۱/۰۰ ± ۳/۲۷*##	۳۳/۵۰ ± ۱/۳۶*,##	۲۱/۵۰ ± ۰/۸۹*
تجربی ۳ (نیکوتین با دوز ۰/۰۵mg/kg)	۱۵۹/۷۰ ± ۳/۸۹*##	۱۸۳/۸۰ ± ۳/۸۶*##	۵۱/۴۰ ± ۱/۸۷*,##	۱۴/۳۰ ± ۰/۶۳*,##

* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح ۰/۰۰۰۵ با گروه کنترل می‌باشد.

نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح ۰/۰۰۱ با گروه شاهد می‌باشد.

نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح ۰/۰۰۰۵ با گروه شاهد می‌باشد.

افزایش انسولین نیز زیادتر می‌شود (۱۸). نیکوتین به طور مؤثری باعث آزادسازی استیل کولین از وزیکول های سیناپسی در مغز موش شده و در سلول‌های بتای پانکراس نیز با اثر مستقیم بر رسپتورهای نیکوتینی استیل کولین باعث ترشح انسولین می‌گردد (۱۹). بخش درون ریز غده پانکراس توسط فیبرهای سمتیک و پاراسمتیک عصب دهی می‌شود و فعل نمودن نورون‌های پس‌گانگلیونی اطراف پانکراس باعث ترشح استیل کولین در غده لوزالمعده و تحريك ترشح انسولین می‌گردد (۲۰). مطالعات نشان داده‌اند که مصرف اگونیست‌های کولینزیک، نظیر اگونیست‌های گیرنده‌های نیکوتینی استیل کولین با افزایش فعالیت سیستم‌های سمتیک آدرنال و با تحريك ترشح هورمون‌های کاتکول آمینی باعث افزایش قند خون و ترشح انسولین به وسیله فعالیت مستقیم گلوکز بر سلول‌های بتای پانکراس می‌گردد (۲۱). مطالعات نشان داده است که استیل کولین و اگونیست‌های آن نظیر

نسبت به گروه شاهد تفاوت معناداری دارد (جدول ۲). نتایج آزمون ANOVA و پیگیری Tukey نیز بین میانگین غلظت LDL و HDL در گروه‌های شاهد و تجربی نسبت به گروه LDL در گروه‌های تجربی نیکوتین معناداری را نشان داد. میانگین غلظت LDL در گروه‌های تجربی نسبت به گروه شاهد با افزایش معناداری و بین میانگین غلظت HDL در گروه تجربی ۳ نسبت به گروه شاهد با کاهش معناداری گروه تجربی ۳ نسبت به گروه شاهد با کاهش معناداری روبرو بوده است و در گروه‌های تجربی ۱ و ۲ نسبت به گروه شاهد تفاوت معناداری دیده نشده است (جدول ۲).

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد مصرف نیکوتین باعث افزایش انسولین، گلوکز، پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی ALT، AST و ALP در موش‌های دیابتی شده می‌شود، همچنین نیکوتین در دوزهای مختلف سبب افزایش انسولین شده به نحوی که با افزایش دوز نیکوتین میزان

شرایط هیپرگلیسمی ناشی از دیابت و از طریق افزایش میزان گلایکه شدن آنزیم‌های آنتی اکسیدان، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون، پراکسیداز و کاتالاز، فعالیت آن‌ها در جهت پاکسازی ROS کاهش می‌یابد و افزایش ROS مهم‌ترین عامل ایجاد اختلالات ثانویه دیابت از جمله تخریب ساختار سلول‌های کبدی و افزایش فعالیت آنزیم‌های ALP، AST و ALT به حساب می‌آید (۳۰) لذا با توجه به اثر نیکوتین بر افزایش ROS اثر هم افزایی مصرف نیکوتین با دیابت بر میزان آنزیم‌های ALT، AST و ALP قابل توجیه می‌باشد.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نیکوتین احتمالاً از طریق افزایش ROS و رادیکال‌های آزاد باعث تشديد عوارض ناشی از دیابت از قبیل افزایش میزان قند، کلسترول تام، تری گلیسرید، LDL، HDL و AST، ALT در موش‌های صحرایی دیابتی شده می‌گردد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله نویسنده‌گان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس که در جهت فراهم آوردن امکانات انجام این مطالعه همکاری لازم را مبذول داشتند، کمال تشکر و قدردانی را دارند.

نیکوتین باعث افزایش نوروپپتید CRH از هیپوталاموس می‌شود و نوروپپتید مذکور نیز با واسطه تحریک ACTH و کورتیزول باعث افزایش قند خون و تحریک ترشح انسولین می‌گردد (۲۲) در تحقیقات دیگر نشان داده شد که نیکوتین باعث تقویت اثر استرس بر عملکرد محور هیپوفیز- آدرنال و افزایش ترشح کورتیزول و ACTH و هم‌چنین گلوکاگون می‌شود (۲۳، ۲۴). لذا با توجه به این که دیابت باعث ایجاد استرس هیپرگلیسمی می‌گردد ، اثر نیکوتین نیز در تقویت عوارض ناشی از دیابت از جمله افزایش قند، کلسترول، لیپیدها و برخی از آنزیم‌های کبدی قابل توجیه است. در موافقت با بررسی حاضر، مطالعه دیگر نشان داد که دیابت باعث افزایش میزان تری گلیسرید، کلسترول تام، LDL و کاهش HDL می‌گردد (۲۵) ، هم‌چنین مصرف نیکوتین دارای اثرات منفی بر پروفایل لیپیدی خون می‌باشد (۲۶، ۲۷). مصرف دخانیات حاوی نیکوتین باعث افزایش تری گلیسریدهای سرمی، کلسترول، LDL، افزایش تولید لیپوبروتئین‌های غنی از تری گلیسرید و کاهش HDL می‌شود (۲۸). در موافقت با نتایج پژوهش حاضر نشان داده شده است که دیابت در موش‌های صحرایی باعث افزایش آنزیم‌های ALT و AST می‌گردد (۲۹). هم‌چنین در پژوهشی دیگر بیان گردید که به دلیل برخی آسیب‌های بافتی کبد میزان فعالیت آنزیم‌هایی مانند AST، ALT و ALP تغییر می‌کند که میزان تغییرات فعالیت آنزیم‌ها و دوام آن هنوز به درستی مشخص نیست (۳۰) ، بر اساس مطالعات ، در

References

1. Nakajima K, Nakano T, Tanaka A. The oxidative modification hypothesis of atherosclerosis: The comparison of atherogenic effects on oxidized LDL and remnant lipoproteins in plasma. *Clin Chim Acta*. 2006; 367(1-2): 36-47.
2. Mineur YS, Abizaid A, Rao Y, Salas R, DiLeone RJ, Gundisch D, Diano S, De Biasi M, Horvath TL, Gao XB, et al. Nicotine decreases food intake through activation of POMC neurons. *Science*. 2011; 332(6035):1330-2.
3. Edwards JE, Vincent AM, Cheng HT, Feldman EL. Diabetic neuropathy: mechanisms to management. *Pharmacol Ther*. 2008; 120(1): 1-34.
4. Yu G, Sharp BM. Nicotine self-administration diminishes stress-induced norepinephrine secretion but augments adrenergic-responsiveness in the hypothalamic paraventricular nucleus and enhances

- adrenocorticotropic hormone and corticosterone release. *J Neurochem.* 2010; 112(5): 1327–37.
5. Hosseini S. The effects of nicotine on the serum level of insulin in adult male Wistar rats. *J Shahrekord Univ Med Sci.* 2012; 14(2): 40-6.[Persian]
 6. Choi K, Kim YB. Molecular mechanisms of insulin resistance in obesity and type 2 diabetes. *Korean J Intern Med.* 2010;25(2):119-29.
 7. Sheikhpour R, Jalali B, Yaghmaei P. Evaluation of the effect of zinc supplement on serum lipids level in type II diabetic patients. *J Ardabil Univ Med Sci.* 2011;11, 59-66.[Persian]
 8. Gomez-perez FJ, Aguilar-Salins CA, Almede-Valdes P, Cuevas-Ramos D, Lerman Garber I, Rull JA. HbALc for the diagnosis of diabetics mellitus in a developing country. *Arch Med Res.* 2010; 41(4): 302-8.
 9. Kunjara S, Greenbaum AL, McLean P, Gronbaek H, Flyvbjerg A. Effects of longterm experimental diabetes on adrenal glandgrowth and phosphoribosyl pyrophosphate formation in growth hormone-deficient dwarf rats. *Int J Exp Pathol.* 2012; 93(3):196-201.
 10. Dickinson S, Colagiuri S, Faramus E, Petocz P, Brand-Miller JC. Postprandial hyperglycemia and insulin sensitivty differ among lean young adults of different ethnicities. *J Nutr.* 2002; 132(9):2574-9.
 11. Vozarova B, Stefan N, Lindsay RS, Saremi A, Pratley RE, Bogardus C, Tataranni PA. High alanine aminotransferase is associated with decreased hepatic insulin sensitivity and predicts the development of type 2 diabetes. *Diabetes.* 2002; 51(6): 1889-95.
 12. Hosseini SE, Goodarzi A. Effect of zolpidem medicine on hepatic enzym(ALP,ALT,AST) and weight in male wistar rat. *J animal physiology and development.* 2012;5(4):9-16. [Persian]
 13. Nyblom H, Berggren U, Ballding J, Olsson R. High AST/ALT ratio may indicate advanced alchilic liver disease rather than heavy drinking.*Alcohol Alcohol.* 2004; 39(4): 336-9.
 14. Giannini EG, Testa R, Savarino V. Liver enzyme alteration: A guilde for clinicitons.CMAJ. 2005; 172(3): 367-79.
 15. Zanettini R, Antonini A, Gatto G, Gentile R, Tesei S, Pezzoli G. Valvular heart disease and the use of dopamine agonists for Parkinson's disease. *N Engl J Med.* 2007; 356(1): 39-46.
 16. Lenzen S. The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes. *Diabetologia.* 2008; 51(2):216-26.
 17. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. *PLoS Med.* 2006; 3(11): 442-28.
 18. Szczurkowski A, Kuchinka J, Nowak E, Kuder T. Autonomic innervation of pancreas in egyptilehian Spiny Mouse (Acomys cahirinus, Desmarest). *Acta Vet. Brno.* 2009; 78: 557-61.
 19. Cansev M, Yilmaz MS, Ilcol YO, Hamurtekin E, Ulus IH. Cardiovascular effects of CDP-choline and its metabolites: involvement of peripheral autonomic nervous system. *Eur J Pharmacol.* 2007; 577 (1-3):129-42.
 20. Ilcol YO, Gurun MS, Taga Y, Ulus IH. Choline increases serum insulin in rat when injected intraperitoneally and augments basal and stimulated aceylcholine release from the rat minced pancreas in vitro. *Eur J Biochem.* 2003; 270(5): 991-9.
 21. Cansev M, Ilcol YO, Yilmaz MS, Hamurtekin E, Ulus IH.Peripheral administration of CDP-choline, phosphocholine or choline increases plasma adrenaline and noradrenaline concentrations. *Auton Autacoid Pharmacol.* 2008; 28(1): 41-58.
 22. O'Carroll AM, Howell GM, Roberts EM, Lolait SJ. Vasopressin potentiates Corticotropinreleasing hormone-induced insulin release from mouse pancreatic-cells. *J Endocrinol.* 2008; 197(2): 231-9.
 23. Hosseini S. The effect of interference of Nicotine and immobility stress on performance pituitary-adrenal axis in ,ature male rats. *J Sabzevar Uni Med sci.*2013;20(3):359-66.[Persian]
 24. Hosseini E. .Journal of Animal Biology.2012;4(3):33-40.
 25. Karimzadeh K,Hosseini E,Kavoosi E,Nasihatkon A,Nikseresht M.Hypolipidemic effects of hydroalcoholic extact from walnut male flowers on diabetic rats.Armaghane-danesh,Yasuj University of Medical sciences.2013;18(6):484-92.[Persian]
 26. Nakajima K, Nakano T, Tanaka A. The oxidative modification hypothesis of atherosclerosis: The comparison of atherogenic effects on oxidized LDL and remnant lipoproteins in plasma. *Clin Chim Acta.* 2006;367(1-2): 36-47.
 27. Goldschmidt-Clermont PJ , Creager MA , Lorsordo DW, Lam GK, Wassef M, Dzau VJ. Atherosclerosis: recent discoveries and novel hypoyeses. *Circulation.* 2005; 112(21): 3348-53.
 28. Asgary S, Naderi G, Gharipoor M, Khosravi A. Invitro effect of nicotine and cotinine on susceptibility of LDL to oxidation and hemoglobin glycosylation . *Journal of Qazvin University of Medical sciences.*2005;35:20-5.[Persian]
 29. Cengiz EI, Unlu E. Sublethal effects of commercial deltamethrin on the structure of the gill, liver and gut

- tissues of mosquitofish, *Gambusia affinis*: A microscopic study. Environ Toxicol Pharmacol. 2006; 21(3): 246- 53.
30. Brownlee M. The pathobiology of diabetic complications: a unifying mechanism. Diabetes. 2005; 54(6): 1615-25.

Archive of SID

The effects of nicotine on the serum level of insulin, glucose, lipid profile, Liver Enzymes (ALT, ALP, AST) in streptozotocin-induced diabetic adult male rats

Leila Sayadi

Postgraduate of Animal Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran.

Seyed Ebrahim Hosseini

Associate Professor of Animal Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran.

Alireza Fathi

Assistant Professor of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran.

Received:01/03/2014, Revised:17/03/2014, Accepted:29/05/2014

Corresponding author:

Islamic Azad University, Fars, Iran
Email:
ebrahim.hossini@yahoo.com

Abstract

Background: Nicotine is one of the ingredients in cigarettes. Nicotine is toxic to the brain, cardiovascular system and respiratory tract and the body tissues. The present study aimed to investigate the effect of nicotine on the enzymes alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and alkaline phosphatase (ALP), glucose, and insulin lipid profile in diabetic rats.

Materials and Methods: In this experimental study, 50 Wistar adult male rats weighing 220-250 g were used and divided into five groups of 10, including control (no treatment), diabetic control, and experimental (diabetic mice) groups 1, 2 and 3 that treated with 0.125, 0.25 and 0.5 mg/kg nicotine, respectively. In this study, diabetes was induced by intraperitoneal injection of 60 mg/kg of streptozotocin (STZ). At the end of the treatment period, blood samples were taken from mice and serum enzymes AST, ALP, ALT; and LDL, HDL, cholesterol, triglycerides, insulin and glucose levels were measured. Data analyses were performed in SPSS software 18, using ANOVA and Tukey test.

Results: The results showed a significant increase in the concentration of enzymes ALT, AST and ALP; and glucose, total cholesterol, triglyceride and LDL levels; but a significant decrease in HDL level in the experimental group compared with the control group.

Conclusion: Nicotine increases the complications of diabetes, such as increase in glucose, lipids and liver enzymes ALP, AST and ALT.

Keywords: Nicotine, Insulin, Glucose, Lipid Profile, ALT, AST, ALP.