

## عوامل بالینی و عصب - روانشناختی در دانشجویان مصرف کننده سیگار

شخصیتی و معیارهای بالینی برای ۹۹ زن و ۴۰ مرد دانشجو مورد سنجش قرار گرفته است. برای سنجش عصب - روانشناختی از تست‌های Go/No ، Object Alternation Test ، Porteus ، Design Fluency Test ، Go Task Trail Making Test ، Maze Task بررسی خصوصیات شخصیتی و بالینی از آزمون‌های Mini International Neuropsychiatric Interview تشخیص شخصیت<sup>۱</sup>، پرسشنامه افسردگی Beck، مقیاس اضطراب اجتماعی Liebowitz<sup>۲</sup>، پرسشنامه وسوسی اجباری<sup>۳</sup>، مقیاس علائم فعلی<sup>۴</sup>، پرسشنامه سه بعدی شخصیت<sup>۵</sup>-I، Questionnaire، پرسشنامه شخصیت اسکیزوپاتیا<sup>۶</sup>، مقیاس عقائد جادویی<sup>۷</sup>، مقیاس شخصیت لوب فرونتال<sup>۸</sup> و چک‌لیست سیستم لیمیک<sup>۹</sup> استفاده شده است.


نتایج این مطالعه نشان نداد که افراد سیگاری به طور کلی آسیب شناختی روانی بیشتری از افراد غیر سیگاری داشته باشند، البته میزان سوء مصرف الكل، وابستگی به الكل و سوء مصرف مواد غیر الكلی در افراد سیگاری بیشتر بود. حتی بر خلاف مطالعات قبلی، مصرف کنندگان سیگار از نظر تفکر اسکیزوپاتیا<sup>۶</sup> و تفکرات

اسکیزوفرنی برای بهبود علائم منفی و مشکل شناختی از سیگار استفاده می‌کنند. همچنین ذکر شده که افراد مبتلا به اختلال ییش فعالی - تکانشگری از سیگار برای بهبود عملکرد شناختی خود استفاده می‌کنند. همراهی سیگار با سندروم‌های روان‌پزشکی از این فرضیه که سیگار می‌تواند برای خود - درمانی مورد استفاده قرار گیرد حمایت می‌کند.

**مدل اوریتوفرونال و شخصیت ضداجتماعی:** سیستم اوریتوفرونال در پاسخدهی شخص به خطر و همچنین در بازنمایی قدرت برداشت شخص از پاداش و تنبیه نقش دارد. مصرف تباکو با خصوصیات شخصیتی از جمله: بروونگرایی، تکانشگری، خطرپذیری و شخصیت ضداجتماعی ارتباط دارد. شخصیت ضداجتماعی و خصوصیات مرتبط با این شخصیت و مصرف سیگار می‌توانند بیانگر مشکل در شناسایی سرنخ‌های پاداش و تنبیه برای کنترل رفتار باشند. برای بررسی این دو مدل و فرضیه در این مطالعه مجموعه‌ای از آزمون‌های عصب - روان‌شناختی، پرسشنامه‌های سوی دیگر بعضی از بیماران مبتلا به

به رغم خطرات شدید بهداشتی که مصرف دخانیات دارد، چرا تعداد قابل توجهی از نوجوانان و جوانان اقدام به مصرف سیگار می‌کنند؟ مطالعه حاضر دو مدل نظری از علل مصرف سیگار را مورد آزمون قرار می‌دهد.

**مدل خود درمانی:** از آنجایی که نیکوتین خاصیت لذت‌بخشی دارد، گروهی از محققین عقیده دارند تعدادی از نوجوانان سیگار را برای خود - درمانی مورد استفاده قرار می‌دهند. در این مدل انتظار می‌رود که میزان آسیب شناختی روانی در مصرف کنندگان سیگار بیش از افرادی باشد که سیگار مصرف نمی‌کنند. مصرف سیگار یا وابستگی به آن با چندین اختلال روان‌پزشکی از جمله افسردگی، اختلال دوقطبی، قماربازی، شخصیت ضداجتماعی، اسکیزوفرنی، حالات شخصیت‌های مرزی و اسکیزوپاتیا بیشتر دیده می‌شود. از طرفی مصرف سیگار نیز می‌تواند بعضی از اختلالات روان‌پزشکی را ایجاد یا تشدید کند. از سوی دیگر بعضی از بیماران مبتلا به



مدت مصرف سیگار را نشان می‌دهد. یک احتمال برای آن می‌تواند این باشد که افراد غیرسیگاری حساسیت متفاوتی به خطرات دور دارند. تحقیقات نشان داده‌اند که این تفاوت بین مصرف کنندگان مواد و افرادی که مصرف مواد ندارند بارزتر است. در حال حاضر تحقیقات بسیاری نیز به بررسی ارتباط بین قشر پره‌فرونتال و سوء مصرف مواد اختصاص دارد.

#### پی‌نوشت:

- 1-Personality Diagnostic Questionnaire
- 2-Liebowitz Social Anxiety Scale
- 3-Obsessive Compulsive Inventory
- 4-Current Symptom Scale
- 5-Tridimensional Personality Questionnaire
- 6-Schizotypal Personality Questionnaire-B
- 7-Magical Ideation Scale
- 8-Frontal Lobe Personality Scale
- 9-Limbic System Checklist - 33

سیگاری بیش از افراد غیرسیگاری بود. عملکرد افراد سیگاری در تست Object Alternation Test نیز بیش از افراد غیرسیگاری مختلف بود که این اختلال نیز با عملکرد مختلف اوریتوفرونتال همراهی دارد. تحقیقات اخیر نشان داده است که سیستم اوریتوفرونتال نقش مهمی در پردازش اطلاعات هیجانی به خصوص حساسیت به پردازش و تنبیه دارد و حساسیت به تغییرات، وابستگی (contingency) را میانجیگری می‌کند. در واقع قشر اوریتوفرونتال در بازنمایی قدرت پاداش و تنبیه‌های انتزاعی نقش دارد. مصرف سیگار حداقل در جاتی از ناتوانی در پیش‌بینی عواقب منفی طولانی

جادویی نیز نمره بیشتری بدست نیاوردن. در گروه افراد سیگاری شیوع اختلالات شخصیت پارانوئید و ضداجتماعی بیشتر از گروه غیرسیگاری بود و تفاوت اختلال شخصیت نمایشی و مرزی نیز در دو گروه نزدیک به حد معنی داری بود.

آزمون‌های عصب - روانشناختی نشان دادند که افراد سیگاری اختلال عملکرد در تست‌های عملکرد اجرائی، توجه، مهار پاسخ و توانایی کلی شناختی ندارند، ولی میزان پرفعالیتی - تکانشگری (novelty seeking) آنها بیش از افراد غیر سیگاری بود. نمره مقیاس شخصیت لوب فرونتال در افراد

Dinn, W. M., Aycicegi, A., & Harris, C.L. (2004). Cigarette smoking in a student sample: Neurocognitive and clinical correlates. *Addictive Behaviors*, 29, 107-126.

ترجمه و تلخیص: دکتر علی فرهودیان