

مقاله پژوهشی اصیل

بار اختلال بیش فعالی و کم توجهی در جمعیت ایرانی در سال ۱۳۸۲

دکتر بهنوش دشتی^۱

پژوهشکده علوم شناختی

دکتر فرید ابوالحسنی

معاونت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سید رضا مجذزاده

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر جواد علاقه ندراد

گروه روانپژوهی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسن افتخار

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

هدف: اختلال بیش فعالی و کم توجهی (ADHD) از اختلالات شایع روانپژوهی اطفال می باشد که با توجه به جمعیت جوان کشور ایران، می تواند ناتوانی قابل ملاحظه ای ایجاد نماید. از میان شاخص های تدرستی، DALY (سال های زندگی تعديل شده بر حسب ناتوانی) برای ارزیابی و مقایسه مشکلات و نیازهای بهداشتی ناشی از اختلالات مختلف، مقیاسی کارآمد است که با محاسبه آن می توان بار ناتوانی ناشی از بیماری های مختلف را در جامعه مقایسه کرد. **روش:** DALY برای ADHD، بر اساس اطلاعات مربوط به بروز، شیوع، بهبود و مرگ و میر فردی و با بهره گیری از اطلاعات جمعیت شناسی میانه سال ۱۳۸۲ محاسبه شد. برای سنجش هماهنگی اطلاعات خام و انجام محاسبات نهایی از نرم افزار DisMod II استفاده شد و در نهایت، YLD (سال های زندگی همراه با ناتوانی) به عنوان مقدار برابر با DALY در این اختلال محاسبه گردید. **یافته ها:** YLD در افراد مذکور ۱۵/۷ و در افراد مؤنث ۶/۷ به دست آمد. سال های زندگی تعديل شده بر حسب ناتوانی در دو جنس و در کلیه سنین ۲۲/۴ میانه سال ۳۱/۹ DALY به دست آمد که نشان می دهد با پیش فرض عدم بهبود اختلال پس از دوران بلوغ، YLD مقدار ۲۲/۴، برآورد حداقلی از بار ناتوانی اختلال است. **نتیجه گیری:** به نظر می رسد عامل بخش قابل توجهی از بار اختلالات روانی در کلیه سنین و به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی است.

کلید واژه: اختلال بیش فعالی و کم توجهی، بار بیماری، سال های زندگی تعديل شده بر حسب ناتوانی (DALY)

تعتمدی در مقابل برنامه ریزان سیستم های بهداشت و سلامت قرار داده است. شناخت دقیق وضعیت موجود، همواره از الزامات برنامه ریزی در هر سیستمی است که شامل ارزیابی کیفی و کمی مشکلات، اقدامات در حال انجام و در نهایت، اثرگذاری این اقدامات می باشد. آمار و شاخص های مختلف تدرستی اطلاعات ارزشمندی درباره این گونه ارزیابی ها در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد.

شاخص های کلی تدرستی، از تلفیق اطلاعات مربوط به مرگ و میر و عوارض غیر کشنده به دست می آید و می تواند وضعیت

مقدمه

در دهه های اخیر شاهد تغییرات چشمگیر نیازهای بهداشتی جوامع مختلف بوده ایم. این تغییرات از یک سو باعث افزایش طول عمر انسان ها شده و از سوی دیگر به بالا رفتن شیوع ناتوانی حاصل از بیماری های مزمم گوناگون منجر شده است، لذا آنرا «انتقال اپیدمیولوژیک» نامیده اند. ابعاد وسیع این پدیده در تمام جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه، مشکلات جدی و قابل

۱- نشانی تماس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت شرقی، کوچه پزشک پور، پلاک ۱۷.
Email: dashti@iricss.org

(مانوزا^{۱۳}، کلین^{۱۴}، بسلر^{۱۵}، مالوری^{۱۶} و لاپادولا^{۱۷}، ۱۹۹۳، ۱۹۹۸)، رفتارهای پر خطر جنسی (بارکلی^{۱۸}، گوورمون^{۱۹} و آناستاپولس^{۲۰}، ۱۹۹۳)، ارتکاب جرایم مختلف (مانوزا و کلین، ۱۹۹۹) و شیوع بیشتر تصادفات (بارکلی و همکاران، ۱۹۹۳؛ ویس^{۲۱}، هیچمن^{۲۲}، میلری^{۲۳} و پرلمن^{۲۴}، ۱۹۸۵).

بر اساس نتایج اکثر مطالعات، این بیماری در اوایل کودکی بروز می نماید و تا هفت سالگی برخی از علایم آن قابل مشاهده است؛ این مسئله به ویژه در مورد علایم طیف بیش فعالی صدق می کند (ایپل گیت^{۲۵} و هارت^{۲۶}، ۱۹۹۷).

برخی علایم ADHD، به ویژه علایم بیش فعالی به مرور زمان از بین می روند، اما علایم ناشی از مشکلات تمرکزی عمدتاً دائمی اند و در تمام طول عمر، فرد را به گونه ای در گیر می کنند (بیدرمن^{۲۷}، میک^{۲۸} و فاراون^{۲۹}، ۲۰۰۰).

به طور کلی ADHD را نمی توان اختلالی دوره ای دانست، بلکه مانند بسیاری از اختلالات رشدی دیگر مزمن و پایدار است (کلر^{۳۰} و همکاران، ۱۹۹۲).

در سال های اخیر مطالعات متعددی به بررسی بار مالی، فردی، خانوادگی و اجتماعی ADHD پرداخته اند و نشان داده اند که هزینه سالیانه این بیماران به وضوح بیشتر از گروه مقایسه می باشد. به عنوان مثال، هزینه مراقبت های پزشکی مبتلایان به این اختلال سالانه ۴۹۲۹ تا ۵۶۵۱ دلار، در مقابل ۱۴۷۳ تا ۲۷۷۱ دلار برای گروه کنترل بوده است. همچنین نشان داده شده است که هزینه پنهان مشکلات ADHD و پیامدهای آن مانند هزینه های مربوط به جرایم، از دست دادن شغل و غیره، بار مالی قابل توجهی در پی دارد (ماتزا^{۳۱}، پراساد^{۳۲} و پارامور^{۳۳}، ۲۰۰۵).

فعالی سلامت جامعه تحت بررسی را در قالب یک عدد بیان کند (فیلد^۱ و گلد^۲، ۱۹۹۸).

«سال های زندگی تعديل شده بر حسب ناتوانی» (DALY) که از ترکیب دو شاخص «سال های از دست رفته عمر» (YLL) و سال های سپری شده با ناتوانی^۵ (YLD) به دست می آید، مقیاسی کارآمد برای ارزیابی و مقایسه مشکلات و نیازهای بهداشتی ناشی از اختلالات مختلف است (ابوالحسنی، ۱۳۸۳). برای برآورد میزان از دست رفتن زندگی سالم به دلیل بیماری های غیر کشنده باید بتوان تخمینی از بروز مشکل در دوره زمانی مشخص به دست آورد. سال های از دست رفته زندگی سالم در هر اختلال، از ضرب کردن متوسط دوره بیماری در وزنی که نشانه شدت بیماری و در واقع میزان از دست رفتن زندگی سالم است (که با نظر متخصصان و مردم تعیین می شود) به دست می آید (موری^۶ و لوپز^۷، ۱۹۹۶).

شایان ذکر است که بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت از ارزیابی جامع مرگ و ناتوانی ناشی از بیماری ها و خدمات و عوامل خطر در سال ۱۹۹۰ و برآورد آن تا سال ۲۰۲۰، بیماری های روانی از زمرة بیماری های اصلی و ناتوان کننده می باشد، ولی طبق نتایج این مطالعه شدت این بیماری ها به طور معنی دار کمتر از میزان واقعی برآورد می شود (موری و لوپز، ۱۹۹۶).

در این میان طبیعتاً بیماری های روانی اطفال با توجه به احتمال باقی ماندن تا بزرگسالی و طولانی بودن دوره بیماری، در صورت شیوع زیاد از اهمیت بالایی برخوردار است. شیوع اختلال بیش فعالی و کم توجهی^۸ (ADHD) در مطالعه اسکھیل^۹ و شواب استون^{۱۰} (۲۰۰۰) از مرور ۱۹ مطالعه، بین ۱/۹ تا ۱۴/۴ درصد به دست آمده است. سایر مطالعات در جوامع دیگر نیز شیوع بالایی را برای این اختلال نشان داده اند.

مطالعات مختلف باقی ماندن اختلال را در دوران پس از بلوغ و بزرگسالی بین چهار تا ۷/۵ درصد گزارش کرده اند (اپشتین^{۱۱} و کوری^{۱۲}، ۲۰۰۴)؛ لذا امروزه ADHD صرفًا بیماری دوران کودکی محسوب نمی شود.

مبتلایان به این بیماری در سطوح شناختی، رفتاری و هیجانی دچار پیامدهای متعددی می شوند؛ نظیر ضعف تحصیلی، مشکلات شغلی، احتمال بیشتر برخوز رفتارهای پر خطر نظیر مصرف مواد

1- Field	2- Gold
3- Disability Adjusted Life Years	4- Years of Lost Life
5- Years of Life with Disability	6- Murrey
7- Lopez	9- Scahill
8- attention deficit hyperactivity disorder	11- Epstein
10- Schwab – Stone	13- Mannuzza
12- Corry	15- Bessler
14- Klein	17- Lapadula
16- Mallory	19- Guevermont
18- Barkley	21- Weiss
20- Anastopoulos	23- Milray
22- Heachtman	25- Applegate
24- Perlman	27- Biederman
26- Hart	29- Faraone
28- Mick	31- Matza
30- Keller	33- Paramour
32- Prasad	

مطالعات کشورهای دیگر نیز موجود نبود. لذا محاسبه بار بیماری از روی پیامدهای نهایی میسر نبود و در نتیجه در مدل بیماری محاسبه بار بیماری، ADHD به عنوان یک اختلال کلی با سه زیرنوع کم توجه^۱ (IA)، بیش فعال - تکانشگر^۲ (HI) و ترکیبی^۳ (CT) در نظر گرفته شد و اطلاعات اپیدمیولوژیک آنها به تفکیک استخراج گردید. اهمیت پیامدها در تعیین بار ناتوانی هر یک از زیرنوع ها نیز مورد توجه قرار گرفت.

۳- بررسی منابع و استخراج شاخص های اپیدمیولوژیک

برای محاسبه YLD با رویکرد مبتنی بر بروز^۴، اطلاعات اپیدمیولوژیک مورد نیاز عبارتند از: بروز ناتوانی، مدت زمان ناتوانی، سن شروع و توزیع سنی و جنسیتی زیرگروه های بیماری در هر یک از موارد یاد شده.

برای دست یافتن به اطلاعات یاد شده لازم بود که حداقل از سه متغیر مانند میزان بروز^۵، میزان بهبود^۶، میزان کشندگی فردی^۷ (خط نسبی مرگ) به تفکیک سن و جنس تخمینی وجود داشته باشد. اما آنچه در اغلب مطالعات اپیدمیولوژیک بررسی شده است، شیوه می باشد.

نرم افزار DisMod^۸، در صورت داشتن اطلاعات مربوط به سه شاخص شیوه، بهبود و کشندگی فردی به برآورد بروز و طول مدت بیماری کمک می نماید. لذا، اطلاعات مربوط به شیوه، بهبود و کشندگی فردی به عنوان ورودی نرم افزار DisMod^۹، استخراج گردید.

از آنجا که به نظر می رسد اطلاعات پژوهش داخلی به دلیل گستره باز شیوه به دست آمده (۲۰۰۹/۱۹-۲۰ درصد) در مطالعه علاقمندرا و نقوی (منتشر نشده)، اعتبار کافی برای محاسبه YLD را نداشته باشد، از یافته های مطالعه ولرایش^{۱۰}، مانا^{۱۱}، پینوک^{۱۲}، بومگارتل^{۱۳} و براون^{۱۴} در آمریکا (۱۹۹۶) استفاده شد. شیوه کلی به دست آمده در این مطالعه (۱۱/۴ درصد) با مطالعات داخلی

طبی چند سال اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همگام با سایر کشورها به محاسبه بار بیماری های مختلف پرداخته است که با توجه به اهمیت مشکلات و بیماری های روانی، محاسبه شاخص سال های سپری شده با ناتوانی در مورد اختلال بیش فعالی و کم توجهی می تواند در تعیین اولویت های سیستم بهداشت روان کشور و به ویژه بیماری های روانی شایع دوران خردسالی نقش ویژه ای داشته باشد.

روش

مطالعه حاضر نوعی پژوهش گذشته نگر بود که با استفاده از اطلاعات موجود به محاسبه شاخص DALY برای ADHD پرداخت. برای محاسبه بار اختلال بیش فعالی و کم توجهی مراحل زیر به ترتیب انجام شد:

۱- جستجوی دانش موجود در مورد بیماری

برای درک بهتر و عمیق تر بیماری، منابع مختلف شامل کتاب های مرجع و مقالات خارجی و داخلی بررسی و در موارد ابهام و یا مورد اختلاف، با متخصصان روان پزشکی کودک و نوجوان گفت و گو و از آنها کسب نظر شد.

۲- ساختن مدل بیماری^۱

برای ساختن مدل دینامیک ADHD، از الگوی کلی مدل بیماری های هاروارد استفاده شد. این مدل با تغییرات جزئی، در نرم افزار DisMode-II به کار گرفته شده است. در این مدل، بیماری با میزان بروز مشخصی در جمعیت عمومی ظاهر می گردد. میزان مرگ و میر مستقیم بیماری صفر در نظر گرفته شد، لذا میزان مشخصی از مبتلایان بهبود می یابند و عده ای دیگر تا پایان عمر بیمار باقی می مانند. مرگ و میر مبتلایان به علل دیگری به جز ADHD مربوط می باشد که این علل برای جمعیت عمومی مشابه جمعیت مبتلا به اختلال است.

در برنامه کشوری محاسبه بار بیماری ها، بار ناشی از اغلب پیامدهای بیماری به طور جداگانه محاسبه شده است. لذا محاسبه YLD ناشی از ADHD از روی پیامدها موجب محاسبه دوباره بار این مشکلات می گشت. از سوی دیگر، اطلاعات مربوط به شیوه و بروز هر یک از پیامدها نه فقط در مطالعات داخلی بلکه در

1- disease modeling
3- hyperactive- impulsive
5- incidence-based approach
7- remission
9- Volraich
11- Pinnock
13- Brown

2- inattentive
4- combined
6- incidence rate
8- case fatality
10- Mannah
12- Baumgaertel

۱۹۹۶)، مقادیر زیر در نظر گرفته شد: ناتوانی ناشی از زیرنوع IA در دختر و پسر ۰/۱۶، ناتوانی ناشی از زیرنوع HI در دختر و پسر ۰/۱۴ و ناتوانی ناشی از زیرنوع CT در دختر و پسر ۰/۲. همچنین جهت توزیع یافته‌های اپیدمیولوژیک در جمعیت شناسی کشور و گروه‌های سنی مختلف، از داده‌های مطالعه جمعیت‌شناسی ملی سال ۱۳۸۲ استفاده شد که در آن آمار جمعیتی کشور در میانه سال ۱۳۸۲ ارائه شده است.

۴- ارزیابی پایایی درونی

در این مرحله، هماهنگی شاخص‌های به دست آمده (شامل شیوع، بهبود و کشندگی فردی) با استفاده از نرم‌افزار DisMode II مورد بررسی قرار گرفت.

۵- محاسبات بار بیماری

DALY از جمع بار ناشی از پیامدهای اختلالات غیرکشنده و بار ناشی از مرگ زودرس محاسبه می‌گردد. اگرچه برخی پیامدهای (نظر سوء مصرف مواد مخدر و یا تصادفات) به طور غیرمستقیم می‌توانند به مرگ منجر گردند، ولی همان‌طور که قبلًا نیز اشاره شد، در تعیین بار بیماری ADHD فقط YLD محاسبه شد. برای محاسبه YLD با اطلاعات موجود در مورد ADHD، از صفحه کاری طراحی شده در مطالعه بار جهانی بیماری‌ها (موری و لوپز، ۱۹۹۶) که در نرم‌افزار Excel طراحی شده است، استفاده شد.

۶- تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت^۱ به معنی بررسی این نکته است که ناتوانی به دست آمده چقدر واقعی است و با توجه به شاخص‌های متفاوت موجود یا قابل برآورد (نظری شیوع، بروز و بهبود) حالت‌های دیگر چه مقادیری می‌توانند داشته باشند.

یکی از موارد ابهام در این مطالعه، بهبود ADHD و فروکش کردن بیماری پس از دوره نوجوانی بود. تا کنون مطالعه‌ای که به بررسی سیر بیماری در تمام طول زندگی و پس از دوران بلوغ پرداخته باشد، صورت نگرفته است و لذا سیر بهبود پس از

هماهنگ و قابل مقایسه بود. علاوه بر شیوع کلی، شیوع هر یک از زیرگروه‌ها نیز محاسبه شد (IA=۵/۴، HI=۲/۴، CT=۳/۶). یافته‌های این مطالعه دارای اعتبار مطلوبی می‌باشد و در منابع روان‌پزشکی اطفال نظری منبع لوئیس^۲ (۲۰۰۲) مورد اشاره قرار گرفته است.

طبق یافته‌های همین مطالعه، نسبت شیوع اختلال در پسرها به دخترها در زیرگروه کم توجه دو به یک و در دو زیرگروه بیش‌فعال-تکانشگر و ترکیبی سه به یک می‌باشد. با توجه به نسبت‌های فوق، شیوع اختلال در دخترها و پسرها به دست آمد و با استفاده از سیر میزان بهبود، در گروه‌های سنی توزیع شد.

شاخص دیگر مورد نیاز میزان بهبود بود. هیچ یک از مطالعات داخلی به بررسی بهبود بیماری نپرداخته‌اند و مطالعات بین‌المللی مرتبط نیز اندک است. جامع ترین مطالعه درباره بهبود و نوع علایم به‌وسیله بیدرمن و همکاران (۲۰۰۰) انجام شده است. اطلاعات مربوط به بهبود به تفکیک زیرنوع‌ها، از این مطالعه استخراج گردید و در جداول مربوط به اطلاعات ورودی نرم‌افزار DisMod گردد. ذکر این نکته لازم است که میزان بهبود در این مطالعه (که تنها مطالعه یافت شده بود) فقط برای بیماران مذکور محاسبه شده است. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات کافی در مورد دختران، با پیش‌فرض مساوی بودن میزان بهبود در دو گروه، محاسبات صورت گرفت. شاخص سوم مورد نیاز، میزان مرگ و میر فردی بود. با توجه به اینکه ADHD، مرگ و میر مستقیمی به‌دبیال ندارد، میزان مرگ و میر صفر فرض شد.

وزن ناتوانی از دیگر اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه YLD است ولی در اغلب مطالعات، روان‌پزشکی اطفال به عنوان یک ماده کلی در نظر گرفته شده و بار ADHD به طور اختصاصی محاسبه نگردیده است.

به‌منظور برآورد بار ناتوانی سه زیرنوع ADHD برای مطالعه حاضر، جلسه‌ای با حضور اساتید و صاحب‌نظران روان‌پزشکی اطفال برگزار شد و در آن با مقایسه ناتوانی حاصل از ADHD با مقادیر برآورد شده در مطالعه هلند (ملس^۳، اسینک-بوت^۴، کرامرز^۵ و هویمان^۶ ۲۰۰۰) و نیز ناتوانی ناشی از سایر بیماری‌های روان‌پزشکی برآورد شده در مطالعه بانک جهانی (موری و لوپز،

1- Lewis

2- Melse

3- Essink-Bot

4- Kramers

5- Hoeymans

6- sensitivity analysis

۳۲۸/۸۷ (۹/۹ در ۱۰۰۰ نفر)؛ برای HI، ۱۳۶/۵۲۲ (۴/۱ در ۱۰۰۰ نفر) و برای CT، ۲۷۶/۲۵۵ (۸/۴ در ۱۰۰۰ نفر).

سالهای توأم با ناتوانی برای کل جمعیت در این مطالعه ۷۴۱/۶۴۷ سال (۲۲/۴ در ۱۰۰۰ نفر) به دست آمد. همان‌گونه که ADHD پیش از این ذکر شد، از آنجا که مرگ و میر مستقیمی به منتبث نیست، مقدار YLD محاسبه شده با DALYs برابر می‌باشد. توضیح این نکته لازم است که YLD به دست آمده، با درنظر گرفتن سایر بهبودهای یکسان در سالهای پس از نوجوانی (که برابر با آخرین میزان گزارش شده در سالهای نوجوانی می‌باشد) محاسبه شده است.

به منظور تحلیل حساسیت شاخص به دست آمده، با فرض نداشتن بهبود پس از دوره نوجوانی نیز بار بیماری محاسبه شد. بار زیرگروه‌ها با پیش‌فرض مذکور عبارت‌اند از: YLD زیرگروه IA، ۵۵۳/۷۹۲ (۱۶/۸ در ۱۰۰۰ نفر)؛ YLD زیرگروه HI، ۱۵۴/۴۲۲ (۴/۶ در ۱۰۰۰ نفر) و YLD زیرگروه CT، ۳۴۶/۴۱ (۱۰/۵ در ۱۰۰۰ نفر).

کل YLD ناشی از ADHD در حالت یادشده، ۱۰۵۴/۶۲۴ (۳۱/۹ در ۱۰۰۰ نفر) می‌باشد (جدول ۲). همان‌گونه که مشاهده می‌شود، YLD به دست آمده در تمام زیرگروه‌ها و نیز بار کلی محاسبه شده در حالت اصلی کمتر از حالت دوم می‌باشد.

دوره نوجوانی معلوم نمی‌باشد. در این مطالعه برای تعیین بار اصلی ناشی از اختلال بیش فعالی و کم توجهی با نظر اساتید این رشته این گونه در نظر گرفته شد که سیر بهبود عالیم در دوران زندگی نظیر اوآخر دوران بلوغ می‌باشد و به عبارت دیگر میزان بهبود پس از ۱۹ سالگی ثابت می‌ماند. اما حالت دیگر می‌تواند این باشد که بهبود بیماری کلاً تا پایان بلوغ طول می‌کشد و پس از آن عالیم و شدت اختلال تا پایان عمر به طور ثابت باقی می‌ماند و از این رو میزان بهبود پس از ۱۹ سالگی صفر خواهد شد. با این فرض، یک بار تمام مراحل محاسبه YLD با میزان‌های بهبود جدید انجام گرفت و برای تحلیل حساسیت، میزان YLD به دست آمده با این روش با روش اصلی مقایسه شد.

یافته‌ها

بار ADHD به تفکیک گروه‌های سنی و جنسیت محاسبه شد که نتایج آن در جدول ۱ آورده شده است. محاسبه بار ADHD در این مطالعه بر اساس حاصل جمع YLD سه زیرگروه کم‌تمرکز، بیش‌فعال و تکانشگر و ترکیبی انجام شد. YLD هر یک از زیرگروه‌ها نیز با جمع کردن YLD گروه‌های سنی مختلف دو جنس به دست آمد.

YLD برای هر یک از زیرگروه‌ها عبارت بود از: برای IA

جدول ۱- سالهای از دست رفته به دلیل زندگی توأم با ناتوانی (YLD) برای ADHD به تفکیک جنسیت

سالهای از دست رفته به دلیل زندگی توأم با ناتوانی (YLD) برای ADHD به تفکیک جنسیت						نوع اختلال
کل	مؤنث	مذکر	کل	مؤنث	مذکر	
۲۲/۴	۶/۷	۱۵/۷	۷۴۱/۶۴۶	۲۱۷/۳۱۶	۵۲۷/۳۳۱	اختلال بیش فعالی و کم توجهی
۹/۹	۳/۷	۶/۲	۳۲۸/۸۷	۱۲۱/۲۰۷	۲۰۷/۶۶۳	زیرگروه کم توجه
۴/۴۱	۰/۹	۳/۲	۱۳۶/۵۲۲	۲۸/۸۲۱	۱۰۷/۷۰۱	زیرگروه بیش فعال - تکانشگر
۸/۴	۲/۱	۶/۳	۲۷۶/۲۵۵	۶۷/۲۸۸	۲۰۸/۹۶۷	زیرگروه ترکیبی

جدول ۲ - سالهای از دست رفته به دلیل زندگی توأم با ناتوانی (YLD) برای ADHD به تفکیک جنسیت و زیرگروه؛ با پیشفرض عدم بهبود پس از نوجوانی (به منظور تحلیل حساسیت)

سالهای از دست رفته به دلیل زندگی توأم با ناتوانی (YLD) در ۱۰۰۰ نفر (YLD/۱۰۰۰)						نوع اختلال
کل	مؤنث	مذکر	کل	مؤنث	مذکر	
۳۱/۹	۹/۴	۲۲/۵	۱۰۵۴/۶۲۴	۳۰۵/۹۱۷	۷۴۸۰/۷۱	اختلال بیش فعالی و کم توجهی
۱۶/۸	۵/۶	۱۱/۲	۵۵۳/۷۹۲	۱۸۱/۷۸۵	۳۷۲/۰۰۷	زیرگروه کم توجه
۴/۶	۱/۱	۳/۵	۱۵۴/۴۲۲	۳۷/۲۸	۱۱۷/۱۴۲	زیرگروه بیش فعال- تکانشگر
۱۰/۵	۲/۷	۷/۸	۳۴۶/۴۱	۸۶/۸۵۲	۲۵۹/۵۴۹	زیرگروه ترکیبی

به دست آمده، یک بار نیز YLD با در نظر گرفتن فقدان بهبود پس از دوران نوجوانی محاسبه شد. مقادیر این محاسبه در هر دو جنس و در تمام سنین و نهایتاً به طور کل بیشتر از فرض اول بود ۳۱/۹ در برابر ۲۲/۴، لذا مقدار $= 22/4$ YLD را می‌توان حداقل برآورد ناتوانی ناشی از این اختلال دانست.

این یافته‌ها، لزوم پرداختن بیشتر به این اختلال را در سیستم بهداشتی درمانی کشور مطرح می‌نماید. گرچه آمار دقیقی در دست نیست، اما از آنجا که روانپزشکی کودک و نوجوان در ایران رشته‌ای بسیار جوان است، به نظر می‌رسد تعداد زیادی از بیماران مبتلا به این اختلال ناشناخته باقی مانده و از درمان محروم باشند.

مطالعات گیل مور^۲ و میلن^۳ (۲۰۰۱)، لورد^۴ و پیزلی^۵ (۲۰۰۰) و زوپانسیک^۶ و همکاران (۱۹۹۸) در زمینه هزینه- اثربخشی درمان ADHD، تأثیر درمان را با شاخص سالهای زندگی تعديل شده بر حسب کیفیت زندگی^۷ (QALY) سنجیده‌اند و نشان داده‌اند که

بحث

این مطالعه نشان داد که بار اختلال در مردها بیشتر از زنان است (۱۵/۷ در برابر ۶/۷). بار کلی اختلال در دو جنس و در کلیه سنین در سال ۱۳۸۲ برای جمعیت ایرانی حدوداً برابر ۶۰۰ می‌باشد که این رقم با ناتوانی ناشی از افسردگی در جمعیت ایرانی (۶۰۰) در همین سال قابل مقایسه است (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۲، گزارش منتشر نشده). البته بار اختلال بیش فعالی و کم توجهی نوع ترکیبی که بیشتر مورد توجه و تشخیص روانپزشکان قرار می‌گیرد، در این مطالعه ۲۷۶/۲۵۵ بوده است. همچنین بار ناتوانی ناشی از ADHD، با سالهای از دست رفته عمر ناشی از اختلالات دوقطبی در همین سال قابل مقایسه است. مقایسه بار اختلال در ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد که ناتوانی حاصل از ADHD در کشورمان بسیار قابل توجه است. به عنوان مثال، در گزارش بار بیماری‌های سال ۱۹۹۶ استرالیا، YLD مربوط به ADHD ۱۲/۹۵۹ ذکر شده است (وس^۱ و همکاران، ۲۰۰۱).

در این مطالعه علاوه بر محاسبه YLD با فرض بهبود میزان ثابتی از بیماران پس از دوران بلوغ، برای تحلیل حساسیت شاخص

1- Vos

2- Gilmore

3- Milne

4- Lord

5- Paisley

6- Zupancic

7- Quality Adjusted Life Years

کرد. البته به منظور جلوگیری از خطای زیاد، سعی شد اطلاعاتی انتخاب شود که با اطلاعات هرچند اندک داخلی هماهنگ باشد. همچنین فقدان اطلاعات در زمینه ADHD در دوران بزرگسالی، محدودیت دیگر مطالعه بود که با تحلیل حساسیت تلاش شد این محدودیت کاهش یابد.

سپاسگزاری

این مقاله بخشی از پایان نامه تحصیلی مدرک عالی بهداشت عمومی (MPH) بود که در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ثبت گردیده است.

بدین وسیله از مساعدت همکاران گرامی در کمیته ارزیابی بیماری‌های کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به ویژه جناب آقای دکتر مازیار مرادی، سپاسگزاری می‌شود.

دستیابی به این مقاله بجز اینکه از پایان نامه توانسته باشد، در اینجا معرفت کنندگانی را نیز تشکیل می‌دهد.

دارودرمانی بر افزایش کیفیت زندگی مؤثر است و نیز هزینه‌های درمانی، در مقایسه با هزینه عوارض بیماری کمتر می‌باشد. لذا لزوم اطلاع‌رسانی و نیز آموزش تخصصی بیشتر در این زمینه احساس می‌شود. برنامه‌ریزی آموزشی در دو بعد ارتقای آگاهی خانواده‌ها و اولیای مدارس به منظور شناسایی به موقع علایم و ارجاع بیماران، موارد تحت درمان را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، این آموزش‌ها می‌توانند باعث ارتقای مهارت‌های مدیریت، رویارویی با بیمار و کنترل علایم بیماری بهوسیله والدین و معلمان شود، چرا که این گروه در کاهش ناتوانی ناشی از آن تأثیر بهسزایی داردند. همچنین آموزش‌های تخصصی بیشتر پزشکان عمومی، روان‌پزشکان و متخصصان مغز و اعصاب به منظور درمان بیماری و آموزش خانواده‌ها می‌تواند عوارض و ناتوانی و نیز هزینه‌های تحیلی ناشی از تصادفات، مصرف مواد مخدر، از دست دادن شغل، ترک تحصیل و غیره را کاهش دهد.

مهم‌ترین محدودیت این مطالعه فقدان اطلاعات اپیدمیولوژیک دقیق و معتبر داخلی بود، که محقق را به استفاده از یافته‌های مطالعات بزرگتری که در کشورهای دیگر انجام یافته بود، قادر

منابع

ابوالحسنی، ف. (۱۳۸۳). مدیریت برنامه‌های تندرستی، رویکرد نظام دار برای ارتقاء کارآیی برنامه‌های تندرستی. تهران: انتشارات برای فردا.

Applegate, B. B., & Hart, E. L. (1996). Validity of the age of onset criterion for ADHD: A report from the DSM-IV field trials. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 36, 1211-1221.

Barkley, R. A., Guevermont, D. C., & Anastopoulos, A. D. (1993). Driving related risks and outcomes of ADHD in adolescents and young adults: A 3-5 year follow-up survey. *Pediatrics*, 92, 212-218.

Biederman, J., Mick, E., & Faraone, S. V. (2000). Age-dependent decline of symptoms of attention deficit hyperactivity disorder: Impact of remission definition and symptom type. *American Journal of Psychiatry*, 15, 816-818.

Epstein, J. N., & Corry, J. F. (2004). Neuropsychology of adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review. *Neuropsychology*, 18, 485-503.

Field, M. J., & Gold, M. R. (1998). *Summarizing population health: Directions for the development and application of population metrics*. Washington, D. C.: National Academy Press.

Gilmore, A., & Milne, R. (2001). Methylphenidate in children with hyperactivity: Review and cost-utility analysis. *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*, 10(2), 85-94.

Keller, M. B., Lavori, P. W., & Beardslee, W. R., Wunder, J., Schwartz, C. E., Roth, J., & Biedermanns, J. (1992). The disruptive behavioral disorder in children and adolescents: Comorbidity and clinical course. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 31, 204-209.

Lewis, M. (2002). *Child and adolescent psychiatry*. A comprehensive textbook, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Lord, J., & Paisley, S. (2000). *The clinical effectiveness and cost-effectiveness of methylphenidate for hyperactivity in childhood*. London: National Institute for Clinical Excellence.

Mannuzza, S., Klein, R. G., Bessler, A., Mallory, P., & Lapadula, M. (1993). Adult outcome of hyperactive boys: Educational achievement, occupational rank, and psychiatric status. *Archives of General Psychiatry*, 50, 565-576.

Mannuzza, S., Klein, R. G., Bessler, A., Mallory, P., &

Lapadula, M. (1998). Adult psychiatric status of hyperactive boys grows up. *American Journal of Psychiatry*, 155, 493-498.

Mannuzza, S., & Klein, R. G. (1999). Adolescent and adult outcome in attention-deficit hyperactivity disorder. In: H. C. Quay & A. E. Hogay (Eds.), *Handbook of disruptive behavior disorders*. New York: Kluwer Academic/Plenum publisher.

Matza, L. S., Paramore, C., & Prasad, M. (2005). A review of the economic burden of ADHD. *Cost Effectiveness and Resource Allocation: CIE*, 9, 3-5.

Melse, J. M., Essink-Bot, M. L., Kramers, P. G., & Hoeymans, N. (2000). A national burden of disease Calculation: Dutch disability- adjusted life-years. Dutch Borden of Disease Group. *American Journal of Public Health*, 90 (8), 1241-1247.

Murray, C. J. L., & Lopez, A. D. (1996). *The global burden of disease: A comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries and risk factors on 1990 and projected to 2020*. Cambridge: Harvard University Press.

Seahill, L., & Schwab-Stone, M. (2000). Epidemiology of ADHD in school-age children. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 9, 544-555.

Vos, T., Mathers, C., Herrman, H., Harvey, C., Guerje, O., Bui, O., Watson, N., Begg, S. (2001). The Burden of mental disorders in Victoria, 1996. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 36 (2): 53-62.

Weiss, G., Heachtman, L., Milray, T., & Perlman, T. (1985). Psychiatric status of hyperactives as adults: A controlled prospective 15 year follow up of 63 hyperactive children. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 24(2), 211-220.

Wolraich, M. L., Mannah, J. N., Pinnock, T. K., & Baumgaertel, A., & Brown, J. (1996). Comparison of diagnostic criteria for attention-deficit hyperactivity disorder in a country-wide sample. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 35(3), 319-324.

Zupancic, J. A. F., Miller, A., Raina, P., Lee, S. K., Klassen, A., & Olsen, L. (1998). Economic evaluation of pharmaceutical and psychological/behavioral therapies for attention-deficit/hyperactivity disorder. In A. Miller, S. K. Lee, & P. Raina, *A review of therapies for attention-deficit/hyperactivity disorder*. Ottawa, Canada: Canadian Coordinating Office for Health and Technology Assessment.