

حساسیت و ویرگی وجود نوتروفیل در اپیدرم و لایه شاخه یک کلید تشخیصی هیستوپاتولوژیک در ماتوفیتوزیس

دکتر سیمین شمسی میمندی^۱

چکیده

مقدمه: تشخیص درماتوفیتوز معمولاً بر اساس علائم کلینیکی و تأیید برسی آزمایشگاهی از تراشیدن پوست و مشاهده قارچ با پتاکس می‌باشد. در شرایط نادری مانند علائم کلینیکی آتبیپک و تست KOH منفی، نیاز به تشخیص هیستوپاتولوژیک خواهد شد. تغییرات پاتولوژیک شکل پسوریازیفرم یا اسپونژیفرم بوده و ممکن است نوتروفیل در لایه شاخه اپیدرم مشاهده شود. وجود نوتروفیل یک فاکتور تشخیصی در تشخیص درماتوفیتوز مطرح می‌شود، معمولاً جهت تأیید وجود (Hypae) در لایه شاخه تقاضای رنگ‌آمیزی پرپودیک اسید شیف (PAS) می‌شود.

مواد و روش: هدف از این بررسی حساسیت و ویرگی وجود نوتروفیل یک کلید تشخیصی در تشخیص درماتوفیز می‌باشد. این بررسی یک مطالعه گذشته‌نگر مورد - شاهدی بر روی ۳۰۳ نمونه که دارای تغییرات اسپونژیفرم و پسوریازیفرم بودند و در طول ۲۵ ماه به یکی از مراکز درمان‌پاتولوژی ارجاع داده شده بودند، انجام شد. هشت نمونه درماتوفیتوزیس با نمای پاتولوژی وجود هیفا تأیید گردید. ۹۲ مورد از ۲۹۵ مورد با نمای هیستوپاتولوژی و اسپونژیفرم و پسوریازیفرم انتخاب گردند. با رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و اتوزین (H&E)، وجود نوتروفیل و قارچ در آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: حساسیت و ویرگی وجود نوتروفیل در این بررسی به ترتیب ۶۳٪ و ۵۹٪ تعیین گردید. **بحث:** در نتایج به دست آمده حاکی از این است که وجود نوتروفیل در لایه شاخه از ویرگی و حساسیت بالایی برخوردار نیست و در تمام نمونه‌هایی که تغییرات اسپونژیفرم و پسوریازیفرم را دارند و علتی برای آنها مشخص نیست باید رنگ‌آمیزی PAS، انجام گیرد.

گل واژگان: نوتروفیل - درماتوفیتوزیس، اپیدرم، قارچ

مجله پزشکی ارومیه، سال دوازدهم، شماره یک، ص ۴۹-۵۵، بهار ۱۳۸۰

۱- استادیار گروه پوست و فلئوردرماتوفیاتولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقدمه

پسرویازیفرم بودند و در طول ۳ سال (از آگوست ۱۹۹۷ تا زوئیه ۲۰۰۰) به مرکز درماتوفیتوپاتولوژی بیمارستان سنت پل، ونکور وابسته به دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا ارجاع داده شده بودند، انجام شده است. ۸ مورد با تشخیص درماتوفیتوز که با رنگ‌آمیزی PAS تایید شده بودند در این گروه در طول سه سال موجود بود. مابقی ۲۹۵ مورد که دارای تغییرات اسپوژیفرم و پسرویازیفرم بودند، به عنوان موارد شاهد در همان مدت و تاریخ مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص موارد کنترل شامل پسرویازیس - پیتریازیس روزهآ و درماتیت اگزمازی بود. نمونه‌های پوست پس از تثبیت در ۱۰٪ فرمالین و انجام آب‌گیری بافتی به شکل قالب‌های پارافیته در آمده و برش‌ها، تحت بررسی قرار گرفتند. از هر سه مورد یکی انتخاب شد. بنابراین بر روی ۹۲ مورد از بین ۲۹۵ مورد کنترل، علاوه بر H&E، رنگ‌آمیزی PAS نیز انجام گرفت. تمام ۹۲ مورد از نظر وجود هیفا و نوتروفیل در اپیدرم و لایه شاخی مورد بررسی قرار گرفتند. شوری Bayes جهت تعیین حساسیت و ویژگی وجود نوتروفیل در تشخیص هیستوپاتولوژی درماتوفیتوز استفاده شد.

حساسیت بر اساس ^{مشتبه واقعی}_{منفی واقعی} تعیین شد (۱۱). ویژگی ^{منفی واقعی}_{منفی واقعی + مشتبه کاذب} تعیین شد (۱۱).

نتایج

در گروه شاهد، وجود هیفا در رنگ‌آمیزی PAS در تمام ۹۲ مورد که نماینده ۲۹۵ مورد بودند، منفی گزارش شد. در ۳۸ مورد از ۹۲ مورد آنها نوتروفیل در لایه شاخی مشاهده گردید (جدول ۱). وجود هیفا با رنگ‌آمیزی PAS در تمام موارد درماتوفیتوز

درماتوفیتوز بس به وسیله سه گروه از قارچ‌های سطحی ایجاد می‌شود. ترایکوفیتون - اپدرموفیتون و میکروسپوروم، این قارچ‌ها تمايل به تجمع در لایه شاخی اپیدرم، مو و ناخن را دارند. تشخیص هیستوپاتولوژیک درماتوفیتوز بس تا حدودی مشکل است. وجود نوتروفیل در لایه شاخی و ارتوكراتوز فشرده از کلیدهای تشخیصی پاتولوژی درماتوفیتوز می‌باشد. در ضایعات اولیه و جدید درماتوفیتوزهایا در لایه شاخی بین لایه‌های عمقی ارتوكراتوز فشرده و لایه‌های سطحی حصیری مانند مشاهده می‌شود. این نما به عنوان "علامت ساندویچی" مطرح گردیده است (۱). در سال ۱۹۷۹ "آقای آکرمن" ارتباط وجود نوتروفیل در لایه شاخی را با درماتوفیتوز مطرح نمود (۲). از آنجایی که مشاهده هیفا و اسپور در رنگ‌آمیزی (H&E) مشکل می‌باشد در مواردی که نوتروفیل در لایه شاخی مشاهده شود، رنگ‌آمیزی مخصوص PAS باید انجام گیرد.

رنگ‌آمیزی PAS، پولی ساکاریدهای خنثی را به رنگ قرمز تیره در می‌آورد. این مواد تشکیل دهنده سلولز و کتین دیواره سلولی درماتوفیتوز می‌باشد (۳). این مطالعه نشان داد که وجود نوتروفیل در لایه شاخی از حساسیت و ویژگی بالایی برخوردار نیست. رنگ‌آمیزی PAS باید بر نمونه‌های اسپوژیفرم و پسرویازیفرم که علت خاصی بر اساس نمای کلینیکی و هیستولوژی در آنها پیدا نشده است، انجام گیرد.

روش کار

این بررسی یک مطالعه گذشته‌نگر مورد - شاهدی است که بر روی ۳۰۳ نمونه که دارای تغییرات اسپوژیفرم و

اساس مشاهده نوتروفیل در لایه شاخی به ترتیب 63% و 59% تعیین گردید (جدول ۲).


ثبت بود. در صورتی که ۵ مورد از ۸ مورد درماتوفیتوز نوتروفیل در لایه شاخی و اپiderم مشاهده گردید (شکل ۱ و ۲). حساسیت و ویژگی جهت تشخیص عفونت درماتوفیتوز بر

جدول ۱: نسبت موارد مثبت نوتروفیل در مقایسه با گروه کنترل


نوتروفیل مثبت	تعداد	
۱۷	۶۲	اگزما
۲۱	۲۴	پسوریازیس
۰	۶	پیتریازیس
۳۸	۹۲	روزا
		جمع

جدول ۲: کاربرد تئوری Bayes در ارتباط با وجود نوتروفیل در اپiderم به عنوان یک تست جهت تشخیص درماتوفیتوز

PAS - گروه کنترل	PAS + درماتوفیتوز	
۳۸	۵	نوتروفیل مثبت
۵۴	۳	نوتروفیل منفی



تصویر شماره ۱: نمای میکروسکوپی قالب مانند پاراکراتوز و کراتوز (ساندویچی) همراه با انفلتراسیون نوتروفیل در ناحیه پاراکراتوز (H&E بزرگنمایی $\times 40$)



تصویر شماره ۲: نمای میکروسکوپی اجسام هیفا و اسپور در ناحیه کراتوز (رنگ آمیزی PAS بزرگنمایی $\times 20$)

بحث

درماتوفیتوز نیاز به مشاهده قارچ در بیوپسی پوستی دارد. اما در شرایطی با پاسخ انفلاماتوری شدید قارچ در نمای میکروسکوپی و حتی در کشت مشاهده نمی‌شود (۶، ۷، ۸). تشخیص افتراقی: در چنین مواردی بیماری‌های عفونی و غیر عفونی انفلاماتوری مانند: پسوریاسیس - اگزما - پیتریازیس روزه‌آ و به ندرت پاراپسوریازیس، مایکوزیس فانگوئیدیس، پیتریازیس لیکنوئید، پیتریازیس روبرا پیلاریس، کاندیداز، ایمپتیگو و سیفیلیس می‌باشد (۱، ۲، ۹). بر اساس این طیف وسیع تشخیص افتراقی، کلیدهای تشخیص کلینیکی و هیستوپاتولوژی ارزشمند است. تهاجم توتروفیل به لایه شاخی به نظر می‌رسد یک علامت تشخیص پاتولوژی در

عفونت درماتوفیتوز معمولاً با علائم کلینیکی، استفاده از بررسی آزمایشگاهی به وسیله پتاس، از تراش پوستی و در صورت لزوم با کشت قارچی تشخیص داده می‌شود. در موادی که از نظر بالینی مشکوک به درماتوفیتوز باشد و لیکن بررسی آزمایشگاهی KOH منفی نشان دهد، نیاز به بررسی هیستوپاتولوژیک خواهد بود. تغییرات هیستوپاتولوژیک درماتوفیتوز بستگی به نوع قارچ و پاسخ ایمنی میزان به آسیب لایه شاخی دارد (۴). این تغییرات طیف وسیعی دارد که می‌تواند به شکل هیپرکاتوز خفیف با تغییرات انفلاماتوری مختصر تا هیپرکاتوز فشرده و شدید و پاراکراتوز همراه با پاستول (pustule) میکروسکوپی باشد (۵). تشخیص

درماتوفیتوز نبودند، ۳۸ مورد آنها دارای نوتروفیل بودند. این نتایج نشان می‌دهد که وجود نوتروفیل در لایه شاخی و اپiderم از حساسیت و ویژگی بالایی برخوردار نیست. بنابراین رنگ‌آمیزی PAS باید روی تمام ضایعات اسپوژیفرم و پسرویازیفرم که تشخیص کلینیکی و هیستولوژی مشخصی ندارند، انجام گیرد.

سپاسگزاری

از راهنمایی و هم فکری آقایان دکتر کرافورد و دکتر سیلور که در این بررسی نویسنده را یاری و ارشاد نمودند قدردانی و سپاسگزاری می‌شود.

Reference

- 1- Gotteib GJ, Ackerman AB: The sandwich sign of dermatophytosis. Am J Dermatopathol, 1986, 8(4):347-50.
- 2- Ackerman AB: Subtle clues to diagnosis by conventional microscopy-neutrophils within the cornified layer as clues to infection by superficial fungi. Am J Dermatopathol, 1979, 1: 69-75.
- 3- Lever WF, Schaumburg-Lever G: histopathology of the skin. 8th ed, Philadelphia, JB Lippincott-Raven, 1997: 517-23.
- 4- Rook/Wilkinson/Ebling: Text book of dermatology, mycology. sixth ed., New York, Blackwell publication, 1998: 785-869.
- 5- Graham JH, Barosso-Tobila C: Dermatophytosis. In: Baker RD, ed, The pathologic Anatomy of the Mycosis. Berlin, Springer-Verlag, 1971: 211-35.
- 6- Klingman AM, Mescon H, Delamater ED: The Hotchkiss-Mcmanus stain for the histopathologic diagnosis of fungus diseases. Am J Clin Pathol, 1951, 21: 86.
- 7- Birt AR, Wilt JC: Mycology, Bacteriology and histopathology of suppurative ringworm. Arch Dermatol, 1954, 69: 441.
- 8- Zaslow I, Derbes VJ: The immunologic nature of kerion celsi formation. Dermatol Int, 1971, 8: 1.
- 9- Ollague J, Ackerman AB: Compact orthokeratosis as a clue to chronic dermatophytosis and candidiasis. Am J Dermatopathol, 1982, 4: 359-63.
- 10-Dahl MV: Dermatophytosis and the immune response. J Am Acad Dermatol, 1994, 31:S34-41.
- 11-Binder M, Dreisel S: The interpretation of test results. J Cutan Med and Surg, 2000, 4(1):19-25.

SENSITIVITY AND SPECIFICITY OF THE NEUTROPHILS IN EPIDERMIS AS A CLUE IN HISTOPATHOLOGICAL DIAGNOSIS OF DERMATOPHYTOSIS

SShamsi Meymandi¹, M.D.

Abstract

Introduction: *The diagnosis of dermatophytosis is based on clinical signs and laboratory findings. In rare condition, there is need for histopathological examination. The skin lesion is psoriasiform or spongiform and neutrophils may appear in the keratotic layer or epidermis. The persence of neutrophil as a diagnostic factor is considered in the dermatophytosis and PAS staining is usually required for confirmation of hyphae.*

Methods and Materials: *To evaluate whether the presence of neutrophils within the stratum corneum is a sensitive or specific test for dermatophytosis we performed a retrospective case-control study on 303 cases of spongiotic or psoriasiform dermatitides over a 35-month period seen a regional hospital dermatopathology service. Eight cases of dermatophytosis were diagnosed during this peiod and all were included in the study. From the remaining 295 cases, 92 cases of spongiotic or psoriasiform dermatitides were examined with both Hematoxylin and eosin (H+E) and PAS stains to identify intraepidermal neutrophils and fungi.*

Results: *The sensitivity and specificity for diagnosing*

1. Assistant professor of Dermatology, Afzalipour medical School, Kerman University of Medical Sciences.

dermatophyte infection based upon neutrophils within the stratum corneum were 63% and 59% respectively.

Discussia: *The histologic feature of neutrophils within the stratum corneum is neither sensitive nor specific in facilitating the diagnosis of dermatophytosis. PAS staining should be performed, regardless of the presence or absence of neutrophils, in any spongiotic or psoriasiform dermatitis for which the cause is not apparent on consideration of the clinical presentation and routine histology.*

Key Words: *Neutrophil, Dermatophytosis, Epidermis, Fungus*

Address: *Department of Dermatology, Afzalipour Medical School, Kerman University of Medical Sciences, Kerman , Iran.*

Source: *UMJ 2001; 12(1) 49 - 55 . ISSN: 1027-3727*