

مطالعه روند تغییرات گنادی ماهی سفید دریای خزر (*Rutilus frisii kutum*) در فصل تخم‌ریزی استان گیلان (ناحیه بندرکیاشهر) Kamenskii, 1901)

*سعید شفیعی ثابت^۱

saeedfisheries@gmail.com

محمد رضا ایمانپور^۱

باقر امینیان فتیده^۲

سعید گرگین^۱

تاریخ پذیرش: ۹۴/۷/۲۱

تاریخ دریافت: ۹۴/۲/۲۱

چکیده

زمینه و هدف: در این بررسی خصوصیات بافتی تخدمان ماهی سفید دریای خزر در استان گیلان ناحیه بندرکیاشهر مورد مطالعه قرار گرفت. طول دوره از آغاز صید ماهیان استخوانی (۱۳۸۶/۷/۱۵) در سواحل جنوب غربی دریای خزر شروع شد و تا پایان دوره صید ماهیان استخوانی (۱۳۸۷/۲/۱۵) ادامه یافت. نمونه های مورد نیاز جهت این مطالعه با همکاری بیگان گشت حفاظت از منابع دریایی و صیادان محلی و بازار تهیه گردید.

روش بررسی: تخدمان ۶۴ عدد ماهی سفید پس از صید جداسازی و به منظور بررسی بیولوژیک، پارامترهایی همانند طول، وزن بدن، وزن گناد و مراحل رسیدگی جنسی، اندازه گیری و ثبت گردیده است. بافت تخدمان پس از نمونه برداری، در محلول بوئن تثبیت گردید و

۱- دانشکده شیلات، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان^{*} (مسوول مکاتبات).

۲- موسسه آموزش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت، گیلان.

با استفاده از روش های استاندارد بافت شناسی، آبگیری، شفاف سازی، و پارافینه شده و سپس برش عرضی ۵ میکرونی از آنها تهیه و بوسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.

یافته ها: روند تغییرات تدریجی شاخص وزن گنادوسوماتیک ماهی سفید ماده در طول دوره نمونه برداری نشان داد که شاخص وزنی گناد در ماه بهمن دارای روند افزایش تدریجی بود و در طول ماه های اسفند و فروردین افزایش معنی داری را از خود نشان داد و پس از آن مقدار GSI بطور ناگهانی افت نمود.

بحث و نتیجه گیری : با توجه به نتایج به دست آمده، چهار مرحله جنسی شامل نابالغ در حال رسیدگی مرحله ۲ (Maturing)، در حال توسعه مرحله ۳ (Spawning)، آماده تخم‌ریزی مرحله ۴ (Developing) و در حال تخم‌ریزی مرحله ۵ (virgin) در ماهیان مورد آزمایش مشاهده گردید. در مجموع تعداد ماهی سفید از نوع هماهنگ همزمان یا (Synchronous) می باشد.

واژه های کلیدی: گناد، فصل تخم‌ریزی، ماهی سفید، بندر کیا شهر.

Ovarian development trend in Kutum (*Rutilus frisii kutum* Kamenskii, 1901) during spawning season from Southwestern of Caspian Sea, Guilan province (Bandar-e Kiashahr)

Saeed Shafiei sabet^{1*}

saeedfisheries@gmail.com

Mohammadreza Imanpour²

Bagher Aminian fatideh³

Saeed Gorgin¹

Abstract

Background and Objective: Studies were conducted on the changes occurring in the ovaries of adult female Kutum, (*Rutilus frisii kutum* Kamenskii, 1901) in Bandar-e Kiashahr in Southwestern of Caspian Sea during a yearly cycle (between two spawning period) from October 2007 to May 2008. No abnormalities or pathological changes in the ovarian or body of the investigated fish were detected. The aims of this study were confirm to timing, frequency and duration of the spawning period, monitor changes in the gonado-somatic index(GSI), relate (GSI) to the histological characteristics of the ovaries and describe the stages of Kutum oocyte and ovarian development.

Method: 64 kutum specimens caught and after separation to assess biological parameters such as length, body weight, gonad weight and sexual maturity stages, were measured and recorded. Gonad samples were taken monthly from the females stained with H&E stain and Samples were studied by light microscope. Different stages of oocyte development (nucleus changes, oocyte diameter and forming of yolk vesicle, yolk granules and lipid droplets) were surveyed.

Findings: Gradual trend of Gonadosomatic index in kutum during biopsy showed that Gonadosomatic index (GSI) began to gradual increase in March and reached the highest value (29.47 ± 4.2) significantly in April and then suddenly drop in early may.

Discussion and Conclusion: According to the results gonad development of Kutum was synchronous group. Four maturity stages were observed during our study that included: Maturing virgin (II), Developing (III), Gravid (IV) and Spawning (V).

Keywords: ovaries, seasonal spawning, kutum, badare-kiashahr

1- Fisheries faculty, University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Golestan *(Corresponding Author)

2- Researcher of young researchers club in Islamic Azad University, Lahijan Branch.Guilan

3- Guilan, Fishing Technology Department, Mirza Kochak Vocation & Higher Education Center for Fisheries Sciences and Technology.

مقدمه

بافت پیوندی و ماهیچه ای صاف تشکیل شده و سلول های تخمک را از سطح داخلی و دیواره اتساعی داخل تخمدان که صفحات زاینده نام دارد تولید می کند (۸). مطالعاتی که درباره اعمال فیزیولوژیک انجام شده، نشان داده است که رفتار و صفات ریختی آبزیان با شرایط محیطی منطبق است (۹). به خصوص زمان بندی، فراوانی و طول مدت تخریزی، رشد، میزان هماوری و اندازه و سن بلوغ وابستگی زیادی با محیط دارد (۱۰). بنابراین با تغییر شرایط محیطی، بسیاری از ماهیان برای سازگاری با شرایط جدید، به منظور پایداری نسل واکنش های لازم را از خود نشان می دهند که این مجموعه واکنش ها با گذشت زمان تغییری در اندام ها و بافت های مختلف بدن از جمله تخمدان ها را سبب می گردد. از آن جا که وجود پیچیدگی بیشتر زیستی تخمک و مشکلات به دست آوردن تخمک مورد نیاز برای تکثیر مصنوعی، بارزتر است لذا مراحل تولید تخمک بیشتر مدنظر قرار گرفته است و دانستن بیولوژی تکامل تخمدان از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی روند رشد و تکامل تخمدان ماهی سفید دریایی خزر در ناحیه بندرکیاشهر از طریق مطالعات بافت شناسی می باشد تا بتوان نسبت به ارایه راهکارهای لازم و مناسب بهره برداری بینه و همچنین حفظ ذخائر این گونه ارزشمند گامی برداشت.

مواد و روش ها

این بررسی از میان تعداد ۶۴ عدد ماهی سفید ماده در گروه های طولی-سنی مختلف صورت گرفت. نمونه برداری از ماهیان همزمان با آغاز صید ماهیان استخوانی (۱۳۸۶/۸/۱۵) در سواحل جنوب غربی دریای خزر واقع در بندرکیاشهر آغاز گردید و این کار تا پایان دوره صید ماهیان استخوانی (۱۳۸۷/۱/۱۵) ادامه یافت. نمونه ها با همکاری یگان گشتم حفاظت از منابع آبزیان و صیادان محلی و بازار تهیه گردید. به منظور جمع آوری نمونه و ثبت اطلاعات بیومتریک و وضعیت مولдин ماهیان سفید، با اعزام به رودخانه سفید رود نسبت به انجام عملیات میدانی اقدام گردید. شاخص های کمی با دقت ۱

در حال حاضر مطالعات بافت شناسی در مورد بسیاری از پدیده های زیستی آبزیان نظری تولید مثل به ابداع روش های نوین و موثر در جهت افزایش توان بهره وری از مولдин، افزایش تولید بچه ماهی و در نهایت راندمان بالاتر تکثیر و پرورش ماهیان می شود. تعیین دوره تخریزی و اوج تخریزی در ارزیابی و بهره برداری از ماهیان، شناخت ویژگی های زیستی و چرخه زندگی یک گونه صید همچنین مدیریت و بازسازی ذخائر نقش بسیار مهمی دارد (۱۱). ماهی سفید یکی از گونه های اقتصادی و بومی دریای خزر بوده و بیشترین پراکنش را در سواحل جنوب غربی دریای خزر دارا می باشد (۱۲). این گونه به عنوان گروهی از آبزیان بسیار اقتصادی دریای خزر محسوب می شوند که بعد از ماهیان خاویاری در رتبه دوم درآمدزایی قرار داشته ضمن آن که در زمینه اشتغال و کارآفرینی به عنوان اولین گروه و بالاترین رتبه به شمار می آید (۱۳). در سواحل ایران، تجمع و پراکندگی این ماهی به شدت وابسته به شرایط فیزیکی از قبیل درجه حرارت، جریان های دریایی و مواد غذایی است (۱۴). با توجه به جوان بودن علم بافت شناسی، تاکنون بجز چند مورد، مطالعات جامعی در خصوص بافت شناسی تخمدان ماهی سفید در کشور جهت تعیین رسیدگی جنسی بویژه در سواحل جنوب غربی دریای خزر که بیشترین میزان صید این گونه را به خود اختصاص می دهد، صورت نپذیرفته است. در این تحقیق سعی بر آن است که با ارایه تصاویری از مقاطع بافتی تخمدان به نحوه عملکرد اووزن و الگوی تولیدمثلی ماهی سفید دریایی خزر پی برد. بطورکلی تخمدان ها در ماهیان استخوانی به صورت کیسه ای و دارای کانالی به خارج می باشد و مجرای تخم بر در ماهیان استخوانی به صورت یک مجرای منفرد در می آید. مجرای تخم بر میان مخرج و حفره ادراری به خارج منتهی می شود. البته ساختار تخمدان در ماهیان مختلف متفاوت است. در خانواده کپور ماهیان ماهی دارای یک جفت تخمدان بوده که به صورت متقارن و کیسه ای شکل و چسبیده به کیسه شنا و غشاء سلومیک^۱ می باشد (۱۵). دیواره تخمدان از

1- Ceolomic

روش های مطالعه بافت شناسی

به منظور بررسی تغییرات گنادها لازم بوده که ماهی به صورت تازه با استفاده از تور پره یا سالیک (ماشک)، شیل یا کلهام صید گردیده و بی درنگ گناد از بدن ماهی خارج و در محلول سرم فیزیولوژیک نگهداری شدند. برش ها از چندین گناد در هر مرحله رسیدگی موجود در هر نمونه صورت گرفت. شمارش تعداد تخمک ها معمولاً در مراحل مختلف رسیدگی (اووگونی، تخم های اولیه، تخم های حفره دار، تخم های دارای کیسه زرده و تخم های در حال انهدام^۱) انجام می شود (۱۳). برای نمونه برداری از بافت گناد بخش های ابتداء، میانی و انتهای آن بریده شد. پس از تکه برداری (بیوپسی) از گنادها (از ابتداء، انتهای و میانه تخدمان)، جهت بررسی های بافت شناسی نمونه بافت ها پس از فیکس کردن، در بخش بیوشیمی انسستیتو بین المللی ماهیان خاویاری-رشت از مراحل آبگیری، شفاف سازی، پارافینه شدن، قالب گیری، برش، رنگ آمیزی هماتوکسین و انوزین (H&E) و مانته کردن عبور داده شدند و در نهایت جهت تجزیه و تحلیل های هیستولوژیک توسط میکروسکوپ نوری از نمونه ها تصویر برداری صورت گرفت (۱۳).

قطر تخمک ها با استفاده از لوب مدرج، به گونه ای که مقداری از تخمک های هر ماهی از هر تکرار در روی لام قرار گرفت و با قرار دادن لام در زیر لوب عدد قرائت شد. لازم به ذکر است که به صورت تصادفی ۱۰ عدد از تخمک های موجود روی لام، انتخاب و سپس میانگین قطر تخمک برای هر تکرار از نمونه ها محاسبه گردید.

نتایج

با توجه به نتایج به دست آمده روی مقاطع بافتی در سه ناحیه ابتدایی، میانی و انتهایی تخدمان ماهی سفید اختلاف معنی داری در فرآوانی تخمک ها نشان نمی دهند ($p > 0.01$). کمترین قطر تخمک بین ۲.۸۱ ± ۰.۱۹ تا ۳.۴۸ ± ۰.۲۳ میلی متر و بیشترین دامنه قطر تخمک بین ۱.۴۹ ± ۰.۵۲ تا ۱۹.۳۸ میلی متر اندازه گیری شد. روند تغییرات تدریجی شاخص وزن گنادوسوماتیک^۲ ماهی سفید ماده در طول دوره

میلی متر، ۰.۰۱ گرم و ۱ گرم سنجش و در فرم ها و دفترچه بیومتری ثبت گردیدند. نمونه های فلس در پاکت های کوچک مخصوص و محفظه های مشخص از پیش آماده شده برای مطالعات آزمایشگاهی و تعیین سن نگهداری گردید. فاکتورهای وزنی شامل وزن نمونه های در حالت شکم پر و شکم خالی با استفاده از ترازوی (1 gr) با دقت ۱ گرم و وزن گناد با دقت ۰.۰۱ گرم با استفاده از ترازوی دیجیتال مدل Acculab.V-200 (0/01 gr) تعیین شدند (۱۱).

ماهیان با مراحل بلوغ متفاوت در فصول و ماههای مختلف سال از دریا و رودخانه جمع آوری شده و طول و وزن ماهیان تازه اندازه گیری شدند. با تشريح بدن ماهی تخدمان ها از بدن خارج شدند و با دقت ۱ گرم توزین و ثبت گردیدند. تعداد تخمک در هر گرم با شمارش تخمک های موجود در یک تا دو گرم تخدمان صورت می پذیرد (۵ و ۳۰). در این شمارش کلیه تخمک های با اندازه متفاوت مورد شمارش قرار گرفتند (۱۲) و جهت تعیین هماوری مطلق پس از شمارش تخم ها، به کل وزن تخدمان تعیین داده شدند.

تعداد تخمک در نمونه \times وزن کل تخمک ها = هم آوری مطلق

$$AF = EW \times TE$$

هم آوری نسبی از نسبت تعداد کل تخم به وزن کل ماهی

$$RF = TE / TW \quad \text{به دست می آید}$$

شاخص گنادیک یا گنادوسوماتیک از رابطه


$$GSI = WG / WT \times 100$$

که در آن WG وزن گناد، WT وزن کل ماهی، (۱۲) به دست آمد.

تعیین سن ماهی، از طریق نمونه های فلس گرفته شده از بین فلس های موجود در حد فاصل خط جانبی و باله پشتی انجام گرفت. این فلس های دایره ای شکل^۱ به تعداد ۵ تا ۱۰ عدد عموماً از ناحیه بین باله پشتی و خط جانبی جمع آوری گردیدند سپس فلسها را زیر لوب دو چشمی Nikon گذاشته و با بزرگنمایی های $20x$ و $40x$ از طریق شمارش حلقه های تاریک و روشن تعیین سن شدند (۱۲).


گرم از نمونه تخمدان، رابطه عکس وجود دارد. یعنی با افزایش سن ماهی (که در واقع با افزایش وزن و طول آن همراه است)، تعداد تخم در یک گرم نمونه کاهش می یابد. این مطلب به آن معنا است، که به موازات رشد ماهی و افزایش سن آن، بر میزان وزن و قطر تخمک موجود در تخمدان ماهی، افزوده می شود.

نمونه برداری نشان داد که شاخص وزنی گنداد در ماه بهمن دارای روند افزایش تدریجی بود و در طول ماه های اسفند و فروردین افزایش معنی داری را از خود نشان داد و پس از آن مقدار GSI بطور ناگهانی افت نمود. با مراجعت به نمودار شماره یک، مشاهده می گردد، بین سن ماهی و تعداد تخم در یک



شکل ۱-الف- اووسیت ها در مرحله II (هستک های کناری). ب- مرحله III (وزیکول های زرد). (c) مرحله IV (دانه های زرد). (d) مرحله V (بلوغ). (زنگ ۲۰X، ۴۰X). رنگ اوزین-هماتوکسیلین.

Figure 1. Cross- sections of oocyte at stage II (peripheral nucleous). B, Stage III (yolk vesicles. (20X and 40X). Colloration (Eusin-Hematoxilin).



شکل ۲-الف- اووسیت ها در مرحله IV (دانه های زرد). ب- مرحله V (بلوغ). (زنگ ۲۰X، ۴۰X). رنگ آمیزی اوزین-هماتوکسیلین.

Figure 2. Cross- sections of oocyte at Stage IV (yolk granules) b, Stage V (Mature). (20X and 40X). Colloration (Eusin-Hematoxilin).

جدول ۱- مشخصات رسیدگی جنسی میکروسکوپی برای ماهی سفید دریای خزر.


Table 1- Microscopic characteristics of sexual maturity of Caspian Sea Kutum.

مرحله	درجه رسیدگی	شرح
II	زیستکی کناری	پروتوپلاسم تخمک در حال رشد است، مواد کروماتینی در داخل تخمک قابل مشاهده است، هستک ها به تعداد زیاد و به اندازه کوچک در مجاورت دیواره داخلی غشاء هسته قرار می گیرند، واکوئل ها و لایه نازک فولیکولی به دور هسته تشکیل شده و شدت قلیادوستی تخمک ها کاسته شده است.
III	بزرگ فولیکولی	اندازه تخمک افزایش یافته، در اطراف هسته چند ردیف واکوئل قابل مشاهده است، افزایش ضخامت سلولهای فولیکولی و تشکیل لایه شعاعی، میزان اسیددوستی اوپلاسم افزاییس می یابد.
IV	بزرگ	هستک ها در نواحی مختلف هسته پراکنده و تعداد آنها کاهش می یابد، واکوئل سازی به اتمام رسیده، ضخامت لایه فولیکولی افزایش یافته و دو لایه سلولی تکا و گرانولوزا و لایه شعاعی مشخص تر می گردد. تخمک ها کاملا اسید دوست اند.
V	بزرگ	تخمک ها بیشتر رشد نموده و قطر شان افزایش می یابد، اجسام زرد تجمع یافته، واکوئل ها نیز به هم ادغام شده و یک واکوئل بزرگ را تشکیل می دهد، تخمک ها آبگیری کرده و مهاجرت هسته به سمت قطب حیوانی دیده می شود. لایه فولیکولی در اطراف تخمدان توسعه یافته و به صورت چین خورده مشاهده می گردد.

جدول ۲- بررسی برخی شاخص های زیستی (وزنی) ماهیان سفید دریای خزر (gr).


Table 2. Some biological indices (Weight) of Caspian Sea Kutum (gr).

انحراف استاندارد	میانگین	حداکثر	حداقل	پارامتر آماری	
				فاکتور	وزن گناد
۱۲۸.۳۶۲۹۹	۲۵۶.۶۴۲۵	۶۵۴	۲۳		وزن گناد
۴۴۷.۳۳۴	۹۱۶.۶۸	۲۱۴۱	۲۸۰		وزن شکم خالی
۵۴۶.۹۸۲	۱۱۷۵.۷۸	۲۴۹۸	۴۴۹		وزن کل بدن



نمودار ۱- روند تغییرات مقدار میانگین شاخص گنادی (GSI) در ماهی سفید دریای خزر به تفکیک ماه.


Diagram 1- Average gonado -somatic index (GSI) fluctuation of Caspian Sea Kutum (monthly).



نمودار ۲- میانگین تعداد تخم ماهی سفید دریای خزر در یک گرم نمونه طی سنین مختلف.

Diagram 2- average egg number of Caspian Sea Kutum in different ages (1 gr sample)

هم آوری مطلق (بر حسب هزار عدد تخم)



نمودار ۳- میزان هماوری مطلق ماهی سفید دریای خزر در سنین مختلف.

Diagram 3- absolute fecundity of Caspian Sea Kutum in different ages.



نمودار ۴- میزان هماوری نسبی ماهی سفید دریای خزر در سنین مختلف.

Diagram 4- relative fecundity of Caspian Sea kutum n different ages.

با مشاهده نمودار ۴، مشخص می گردد که هم آوری نسبی با سن ماهی (و پیروان با فاکتورهای بیومتریک طول و وزن) رابطه معکوس دارد یعنی با افزایش سن ماهی، میزان هم آوری نسبی کاهش می یابد. با توجه به تعریف هم آوری نسبی و مقایسه آن با هم آوری مطلق ماهی، در گروه های سنی مختلف، به این نتیجه رسیدیم که در مولدین کمتر از چهار سال، میزان هم آوری نسبی بیشتر از هم آوری مطلق و در مولدین بالای چهار سال میزان هم آوری نسبی کمتر از هم آوری مطلق خواهد بود

بحث

مطالعات گستردۀ ای درباره تغییر ساختار بافتی و مورفوژوژی تخدمان در ماهیان استخوانی طی روند اووژنزن توسط محققین مختلفی انجام شده است (۹) و (۱۵). از جمله آنها می توان به بررسی تغییرات فصلی بافت تخدمان کفال قرمز *Mulus surmuletus* در سواحل جنوبی بریتانیا (۱۶)، چرخه تولید مثلی و زمان تولیدمثل سالانه ماهی سی باس^۱ بر اساس بافت

تخدمان در ماهی سفید با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، شبیه به ماهیان استخوانی دیگر می‌باشد. در این بررسی تغییرات شاخص رسیدگی غدد جنسی^۳ ماده‌ها برای گونه ماهی سفید یک افزایش قابل توجهی در ماه‌های بهمن، اسفند و فروردین را نشان داد و اوج این تغییرات در اسفند و فروردین مشاهده گردید و در اواسط اردیبهشت تا خرداد ماه (GSI) بطور ناگهانی افت نمود. پراکنش قطر تخمک‌ها در طول دوره نمونه برداری قابل توجه بود و بیشترین قطر تخمک‌ها در اسفند ماه و فروردین ماه مشاهده گردید و در اردیبهشت تا خرداد ماه قطر تخمک‌ها کاهش یافت. تغییرات قطر تخمک در ماهیان پیش‌رفته احتمالاً یکی از راهکارهای مهم در تعیین استراتژی فعالیت‌های تولیدمثی و تکثیر آن‌ها می‌باشد (۲۳). یکی از عوامل رشد و بلوغ در ماهیان استخوانی همان‌طور که گفته شد عوامل زیست محیطی از جمله نور، درجه حرارت آب و هوای شوری آب و غیره ... می‌باشد که مجموعه‌ای از این عوامل در شرایط مناسب بر روی محور هیپوپotalamus، هیپوفیز و گناد^۴ اثر گداشته و باعث این محور باعث روند رشد و تکامل اووسیت‌ها می‌شود (۲۴). از آن جایی که ماهیان به طور عمده دارای الگوها و رفتارهای تولید مثی زمانبندی شده‌ای می‌باشند مطالعه روند مراحل بلوغ تکامل تخدمان و رسیدگی جنسی با بررسی بافت شناسی و ریخت شناسی غدد جنسی و تخدمان‌ها قابل پیگیری است. از این روتغییرات ساختمانی و ریخت شناسی در سطح اووسیت‌ها و ساختار تخدمانی می‌تواند معرف و شاخص خوبی برای مراحل مختلف بلوغ در این گونه ارزشمند و سایر گونه‌های ماهیان باشند (۲۶). در کل مشاهدات میکروسکوپی بافت شناسی تخدمان و همچنین منحنی روند تغییرات (GSI) در شکل ۴ نیز بیانگر این مطلب است که تخمک‌ها در فصل تخم‌زی در یک دوره زمانی کوتاه مدت رها می‌شوند. از این رو ماهی سفید از لحظه نحوه تخم‌زی در تقسیم‌بندی (۲۷) گروه تخم‌زی یکدفعه‌ای^۵ و از لحظه بلوغ اووسیت در تقسیم

شناسی و ریخت شناسی تخدمان (۱۷)، مطالعه بافت شناسی تکامل و مراحل تخدمان ماهی بستر (۱۸)، مراحل میکروسکوپی و ماقروسکوپی تکامل تخدمان تاس ماهی سفید (۱۹) و مراحل رسیدگی جنسی لای ماهی *Tinca tinca* بر اساس بافت شناسی (۲۰) اشاره کرد. این تحقیقات نشان می‌دهد که ماهیان استخوانی از دو نوع استراتژی تخم‌زی برخوردار می‌باشند. نوع اول که در بیشتر ماهیان دیده می‌شود مانند قزل آلا و ماهیان آزاد که نوع تخم‌زی آن‌ها همزمان می‌باشد^۱ بدين معنى که تخمک‌های رسیده در یک زمان یا دوره مشخص از تخدمان خارج می‌شوند در حالی که در ماهیان نظیر تون ماهیان تخم‌زی آن‌ها از نوع غیر همزمانی^۲ می‌باشد که به دفعات متعدد و طی زمان‌های مختلف فعالیت‌های تولیدمثی و تخم‌زی خود را انجام می‌دهد. از طرفی تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که ماهی بعد از عمل تخم‌زی از مرحله جنسی VI به مرحله II باز می‌گردد که این مرحله به مرحله برگشتی اطلاق می‌شود. (۲) نشان داد که تشخیص میکروسکوپی گناد بهترین و مطمئن‌ترین راه برای تعیین جنسیت و تشخیص مرحله رسیدگی جنسی اولیه است بعلاوه برای تمایز مرحله II و VI مطالعات بافت شناسی تخدمان راه دقیقی به شمار می‌رود. همانند سایر پژوهش‌ها در مورد این گونه در مرحله I (هستک‌های کروماتینی) وجود هسته بزرگ در مرکز اووسیت، و مقدار انداک اووبلاسم می‌باشد، مرحله II (هستک‌های کناری) پروتوبلاسم تخمک در حال رشد است و هستک‌ها به تعداد زیاد و اندازه کوچک در مجاورت دیواره داخلی غشاء هسته قرار می‌گیرند (۲۱). مرحله III (وزیکول‌های زرده) اندازه تخمک افزایش می‌یابد (۲۲)، مرحله IV (دانه‌های زرده) هستک‌ها در نواحی مختلف هسته پراکنده و تعداد آنها کاهش می‌یابد، در مرحله V (بلوغ) واکوئل‌ها با هم ادغام شده و یک واکوئل بزرگ را تشکیل می‌دهند و مهاجرت هسته به قطب حیوانی دیده می‌شود. در مرحله VI (تخم ریخته) مقدار زیادی فولیکول خالی و تخمک‌های نایاب غشای مشاهده می‌شود. ساختار بافت شناسی فولیکولهای

3- Gonado Somatic Index (GSI)

4- H-P-G

5- Total Spawner

1- Synchronous
2- Asynchronous

- شیلات ایران. شماره ۱. سال دهم. بهار ۱۳۸۰. صفحات ۳۷ تا ۵۴.
۲. ایگری، س. ۱۳۸۱. مطالعه بافت شناسی رشد مواد تناسلی جنس های نر و ماده سس ماهی بزرگ سر *Barbus capito*. پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات. دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی. ۹۶ ص.
۳. آذری تاکامی، ق.، رضوی صیاد، ب. و حسین پور. ن. ۱۳۶۹. بررسی تکثیر مصنوعی و پرورش ماهی سفید *Rutilus frisii kutum* در ایران. مجله دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، دوره ۴۵، شماره ۴۵-۵۲.
۴. رضوی صیاد ، ب . ۱۳۷۴. ماهی سفید. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. ۱۶۴ ص.
۵. شفیعی ثابت، س. ۱۳۸۲. بررسی اثرات نسبت های غدادهی بر روی رشد، بقاء و برخی از شاخص های زیستی ماهی سفید دریای خزر *Rutilus frisii* تا مرحله رهاسازی *kutum Kamenskii*, 1901 به دریا. پایان نامه مقطع کارشناسی. دانشگاه مازندران. ۸۵ ص.
۶. غنی نژاد، داوود . ۱۳۷۲. ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر در سال ۱۳۷۲-۷۳. مرکز تحقیقات شیلات ایران. ۱۹ ص.
۷. ثوقی، غ و مستجیر، ب. ۱۳۷۶. ماهیان آب شیرین. انتشارات دانشگاه تهران. ۳۱۷ ص. صفحات ۲۲۷، ۷۲، ۷۱، ۲۲۷.
۸. عربان. ش. ۱۳۷۶. فیزیولوژی ماهی . دانشگاه تربیت مدرس نور . ۸۰ ص.

9. Aminian Fatideh, B. 2006. Selectivity broodstock kutum (*Rutilus frisii kutum*) in the southern Caspian Sea, using indices of sexual investigation. Dissertation fisheries. University of Agricultural Sciences and Natural Resources Gorgan. 120 P.

بندی (۲۸) جزء گونه هایی است که تخمدان آنها طی یک دوره همزمانی^۱ تخلیه می شود. معمولاً در این گونه ماهیان تنظیم تکامل تخمک واضح است و شامل دو بخش زرده سازی و بلوغ می باشد (۲۹). البته لازم به ذکر است که در بعضی از تخمدان ممکن است تخمک های کوچک و بزرگ در یک زمان دیده شود که این امر دلالت بر تخریزی مرتبه ای نمی کند چون در تعدادی از ماهیان تخمک های کوچک بعد از تخریزی در تخمدان باقی مانده و بتدریج باز جدب می شود (۳۰). اغلب ماهیان دارای اهمیت اقتصادی ، یکبار در سال تخریزی می کنند و دارای فصل تولیدمثیلی کوتاه هستند (۳۲). با این وجود تعداد مراحل جنسی تکاملی ماهی سفید ارتباط نزدیکی با درجه حرارت آب، شوری آب و کلیه عوامل فیزیکی-شیمیایی محیط دارد. از تعداد مراحل تکاملی تولیدمثیلی که توسط برش های بافتی و مقطع گیری تخمدان مورد مطالعه به دست می آید، می توان به روند رشدی قطر اووسیت ها و نهایتاً به الگوی تخریزی و زمان دقیق تخریزی گونه های ماهیان پی برد.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله نگارندها مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاری صمیمانه آقای دکتر صادقی، آقای جلالی و سایر همکاران محترم ایشان در آزمایشگاه تشخیص طبی صادقی شهرستان آستانه اشرفیه همچنین پرسنل محترم آزمایشگاه ماهی شناسی مرکز آموزش عالی علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت ابراز می داریم. در اینجا از خدمات بیدریغ آقای محمد سلسله در تهیه نمونه های مولدین نیز کمال تشکر را داریم.

منابع

۱. حسین زاده صحافی، ه. سلطانی، م. و دادر، ف. ۱۳۸۰. زیست شناسی و تولید مثل ماهی شوروت *Silago sihama* در خلیج فارس. مجله علمی

1- Synchronous

- description. Envir. Biol. Of Fishes.39: Pp.231-247.
18. Mojazi Amiri, Maebayashi, M. Hara, A. Adachi, S. and Yamauchi, K. 1996. Ovarian development and serum sex steroid and vitellogenin profiles in the female cultured sturgeon hybrid the Bester. J. of Fish Biol. 48: pp.1164-1178.
19. Doroshov, S.I. Moberg, G.P. and Venennam, J.P. 1997. Observation on the reproduction cycle of cultured white sturgeon, *Acipenser transmontanus*. Envir. Biol. of Fishes. 48. Pp.265-278.
20. Pimpicka, E. and Tkacz, A. 1997. Course of oogenesis in juvenile tench, *Tinca tinca*, female from Lake Dgal Wielki Neopoland, Folia zoological. 46. 2: Pp.177-187.
۲۱. یوسفیان، م. عربان، ش. فرخی، ف. و عصائیان، ح. ۱۳۸۲. مطالعه رشد تخمک در ماهی کفال پوزه باریک *Liza saliens Risso*، مجله علمی شیلات ایران، سال دوازدهم، شماره ۱. صفحات ۱۳۱ تا ۱۵۲.
22. Nagahama Y. 1983. The functional morphology of teleost gonad. In: Fish physiology (WJ Hoar, DJ Randall, EM Donaldson, Eds), Academic press, NY, USA, 9: pp. 223- 264.
23. Tomasini, J.A. Coolart, D. and Quignard, J.P. 1996. Female reproduction biology of the sand smelt in brackish lagoons of southern France. J. of fish boil. 46: Pp. 94-612.
24. Matty, A.J. 1985 Fish endocrinology, Croom. Helm. 13. 473P.
۲۵. فریدپاک. ف. ۱۳۶۵. دستورالعمل اجرایی تکثیر و پرورش ماهیان گرمایی . پلی کپی دانشگاه تهران.
۲۶. Tyler, C.R. and Smpter, J.P. 1996. Rev. Fish. Bio. 6. 287P.
10. Smith. B. B. and Walker, K.F. 2004. Spawning dynamics of common carp in the River Murray, South Australia, shown by macroscopic and histological staging of gonads. J. Fish Biol. 64: pp. 336-354.
11. Shafiei Sabet, S. Aminian Fatideh, B. Imanpour, M. Gorgin, S. 2009. Relation between gonadal hormones and sexual maturity of female kutum (*Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901*) during spawning season. J. of Cell and Molecular Res. 1. 2: pp. 96-104.
12. Biswas, S.P. 1993. Manual of method in fish biology. South Asian Publisher put Ltd. 145P.
13. Poosti, A. and sadegh Marvdasti, A. 1996. Compurgation histology and histotechique. Tehran University press, first edition. 480P.
14. Rinchard, J. Kesteven, P. and Heine, R. 1997. Comparative study of reproductive biology in single and multiple spawner cyprinid fish. 11. J. of Fish. Biol. 50. Pp: 169-180.
15. Eigdery, Q. 2002. Histology study materials growth genital sex find hermaphrodite fish sauce over large *Barbus capito*. M.Sc. Thesis fisheries. Tehran University. Faculty of Natural Resources. 96P.
16. Deniel, C. and Nda, K. 1993. Sexual cycle and seasonal changes in the ovary of Red Mullet *Mullus surmuletus* from the southern coast of Brittany. J. of Fish Biol. 43. 2: pp.229-244.
17. Guiguen, Y. Cauty, C. Fostier, A. Fuchs, J. and Jalabert, B. 1993. Reproductive cycle and sex inversion of the Sea Bass, *Lates calcalifer*, reared in sea cage French Polynesia, histological and morphometric

- امینیان، ب. ۱۳۸۵. بهگزینی مولدین ماهی سفید ۳۰. خزر با استفاده از شاخصهای رسیدگی جنسی. پایان نامه دکتری شیلات. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ۱۲۰ ص.
31. Nicolsky, G.V. 1963. The ecology of fisher. Academic Press, 350P.
32. Pitcher, T.J. and Hart, P.J. B. 1996. Fisheries ecology. Chapman and Hall, 414P.
27. Prabhu, M.S., 1956. Maturation of intra-ovarian eggs and spawning periodicities in some fishes. Indian Journal of Fisheries, pp. 56-90.
28. Marza, V.D., 1938. Histophysiologie del oogenesis. Herman, Paris, France. 81P.
29. Rinchard, J & Kestemont, P. 1996. Comparative study of reproductive biology in single and multiple spawned cyprinid fish. Morphological and Histological features .J. of Fish. Biol. 49: pp. 173-265.