

مقایسه ویژگیهای حافظه شنیداری کودکان بانارسایی توجه بیشفعالی و عادی

مهدی زمستانی یامچی^{۱*}، دکتر مریم سیف نراقی^۲

پذیرش نهایی: ۱۱/۱۱/۲۳

تجدید نظر: ۲۰/۸/۸۷

تاریخ دریافت: ۱۹/۳/۸۷

چکیده

هدف: هدف کلی این پژوهش، مقایسه توالی حافظه شنوازی- بیانی، تشخیص شنوازی، درک زبانی از جملات امری همزمان و تشخیص صداها در اول، وسط و آخر کلمات کودکان ADHD و عادی است. روش: این تحقیق، از نوع کاربردی و روش انجام آن زمینه‌های است. جامعه آماری این پژوهش را کودکان منطقه ۲ شهر تهران تشکیل می‌دهند که در محدوده سنی ۳ تا ۸ سال قرار داشتند. تعداد کل نمونه ۱۹۵ نفر بود که برای انتخاب نمونه کودکان عادی، از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و برای انتخاب نمونه کودکان ADHD از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از چهار چک لیست تهیه و تنظیم شده توسط سیف‌نراقی و نادری بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گرددآوری شده، از آمار توصیفی (فراوانی، فراوانی تراکمی، درصد و امثال آن) استفاده شده است. از آزمون خی دو برای برسی فرضهای تحقیق بهره گرفته شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که در فرضیه یک و در مقاطع سنی ۳ تا ۴، ۴ تا ۵ و ۵ تا ۶ سال تفاوت معنی‌داری بین کودکان ADHD و عادی در توالی حافظه شنوازی - بیانی مشاهده نشده است، اما در مقاطع سنی ۵ تا ۶ و ۷ تا ۸ سال تفاوت معنی‌داری بین کودکان ADHD و عادی در این زمینه، مشاهده شده است. در فرضیه دوم و در همه مقاطع سنی، تفاوت معنی‌داری بین کودکان ADHD و عادی در تشخیص شنوازی، مشاهده شده است. در فرضیه سوم و در همه مقاطع سنی، به غیر از ۷ تا ۸ سالگی تفاوت معنی‌داری بین کودکان ADHD و عادی در درک جملات امری همزمان مشاهده شده است. در نهایت در فرضیه چهارم در هیچ‌کدام از مقاطع سنی، تفاوت معنی‌داری بین کودکان ADHD و عادی در تشخیص صداها در اول، وسط و آخر کلمات مشاهده نشده است. نتیجه‌گیری: نتایج کلی این تحقیق نشان می‌هد که کودکان ADHD در مقایسه با کودکان عادی در زمینه‌های توالی حافظه شنوازی- بیانی، تشخیص شنوازی و درک جملات امری همزمان، پایین‌تر عمل می‌کنند.

واژه‌های کلیدی: کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHA)، توالی حافظه شنوازی- بیانی ، جملات / امری همزمان

مقدمه

آرزوها و نظریات است. از آنجا که تصورات و افکار و آرزوها، پایه در تجارب و زندگی شخصی دارند، می‌توان گفت که زبان واسطه و گذرگاهی بین تفکر و عمل است (طف‌آبادی، ۱۳۶۵، ص. ۸۳). انسانها نیاز دارند که افکار، احساسات و عواطف خود را به یاری واژه‌ها، به دیگران تفهیم کنند و نیز احتیاج دارند گفتار آنان را درک کنند تا به عقاید و عواطف آنان پی ببرند (سیف نراقی و نادری، ۱۳۷۲). در جهان امروز، سه

پدیده شگفت انگیز یادگیری «گفتار و زبان» که در اکثر موارد به صورت طبیعی انجام می‌گیرد، مقوله بسیار جالب و در خور پژوهشی است. این پدیده به سبب ویژگیهای برجسته «زاپایی»، «پوپایی»، «جهان شمولی» و «بی‌انتهایی» خود، محققین بسیاری را برای مطالعه و پژوهش، جلب کرده است (نیلی پور، ۱۳۸۰). زبان نظام ارتباطی ویژه‌ای برای بیان افکار و تصورات راجع به زندگی عملی و تجارب و واقعیتها و

حالی است که طبق تحقیقات بیج^۶ (۱۹۸۶)، کوهن^۷ (۲۰۰۰)، کاشانی (۱۳۸۰)، (به نقل از اکبری، ۱۳۸۶) نیمرخ روان‌شناختی و زبانی کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و کودکان عادی یکسان است.

با توجه به نقش توجه در حافظه، ناهمگونی یافته‌های پژوهشی مرتبط و ناکافی بودن آنها، این پژوهش قصد دارد کودکان ۳ تا ۸ ساله مبتلا به ADHD و کودکان عادی را از نظر برخی از ویژگیهای حافظه تکلمی – زبانی مورد بررسی قرار دهد و در صدد آزمودن فرضیه‌های زیر است:

- ۱- بین توالی حافظه شنوایی – بیانی کودکان ADHD و کودکان عادی تفاوت معنی‌دار وجود دارد.
- ۲- بین تشخیص شنوایی کودکان ADHD و کودکان عادی، تفاوت معنی‌دار وجود دارد.
- ۳- بین درک زبانی کودکان ADHD از جملات امری همزمان و درک زبانی کودکان عادی از این جملات، تفاوت معنی‌دار وجود دارد.
- ۴- بین تشخیص صدایا در اول، وسط و آخر کلمات کودکان ADHD و کودکان عادی، تفاوت معنی‌دار وجود دارد.

روش

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری

با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و اهداف آن، این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و روش انجام آن زمینه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش را کودکان منطقه ۲ شهر تهران تشکیل می‌دهند که در محدوده سنی ۳ تا ۸ قرار دارند و متعلق به طبقه متوسط جامعه هستند. برای انتخاب نمونه کودکان عادی، از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده و برای انتخاب نمونه کودکان ADHD از روش نمونه‌گیری در دسترس، بهره گرفته شده است. نمونه آماری کودکان عادی ۱۵۰ نفر (برای هر رده سنی ۳ تا ۸ سال ۳۰ کودک) و نمونه آماری کودکان بیش‌فعال ۴۵ نفر

تا چهار هزار زبان وجود دارد که تنها در حدود ۱۵۰ کشور، این زبانها به کار گرفته می‌شوند. (دادستان و مجلدآبادی، ۱۳۷۵). به علت اهمیت پژوهشی که در حیطه زبان وجود دارد، محققان مختلف این موضوع را چه در کودکان عادی و چه در کودکان دچار انواع مختلف نارساییها، بررسی کردند. کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی^۱ گروه بسیار نا متجانسی را تشکیل می‌دهند، اما نسبت فراوانی از آنان، محدودیتهای زبانی، یادگیری و خواندن را نشان می‌دهند که این محدودیتها، بر نتایج آموزشی و شغلی آنان تأثیر منفی می‌گذارد (بارکلی^۲، ۱۹۹۸؛ به نقل از رد موند^۳، ۲۰۰۴).

امروزه نارسایی توجه/بیش فعالی به مثابه یکی از رایج‌ترین مشکلات دوره کودکی، تشخیص داده شده است. کودکان با اختلال ADHD در مقایسه با کودکان عادی، بیشتر در معرض خطر ابتلاء با اختلالات زبانی هستند. در پژوهش‌های همه‌گیرشناصی که از مجموعه آزمونهای زبانی استاندارد استفاده می‌شود، انتظار می‌رود که در ۳۵ تا ۵۰ درصد از کودکانی که نشانگان نارسایی توجه/بیش فعالی را نشان می‌دهند، سطوح بالای اختلال زبان دیده شود (بریر، ۲۰۰۲).

بارکلی (۱۹۸۲) می‌نویسد حدود ۵۴٪ از این کودکان در حیطه زبان مشکل دارند. یافته‌های نشان داده‌اند که این کودکان دارای اختلال‌های ارتباطی چشمگیری هستند و در فهم زبان و یادگیری حرف زدن، کند هستند (بارکلی، ۱۹۸۶، به نقل از علیزاده ۱۳۸۳). پژوهش‌های بیچمن^۴ و همکاران با استفاده از آزمونهای روانی- زبانی و مقیاسهای درجه‌بندی، رفتار همپوشانی قابل ملاحظه‌ای را بین کودکان با نارسایی توجه/بیش فعالی و کودکان با اختلال زبان، گزارش کرده‌اند (بیچمن، ۱۹۸۶، به نقل از رد موند، ۲۰۰۴). لودلو^۵ و همکاران (۱۹۸۰، به نقل از رد موند، ۲۰۰۴) الگوهای زبانی کودکان ۱۲-۶ ساله عادی و کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی را بررسی کردند و تفاوت ناچیزی را بین دو گروه به دست آورده‌اند. این در

.(پیوست شماره ۱) ۱۳۷۲

- آزمون تشخیص شنوازی: این آزمون، شامل فهرستی از کلمات متفاوت و مشابه است که برای تشخیص حساسیت شنوازی دانشآموزان به کار برده می‌شود. لازم به ذکر است که حساسیت شنوازی با قدرت شنوازی تفاوت دارد؛ یعنی ممکن است فردی از لحاظ شنوازی عادی باشد و صدایها را بشنوید، اما از تمیز صدایها مشابه عاجز باشد؛ لذا برای تشخیص این مشکل از این فهرست استفاده می‌شود. روش اجرا به این صورت است که ابتدا یکی از کلمات مانند «مار» برای دانشآموز تلفظ می‌شود، بعد از حدود یک ثانیه کلمه مشابه دیگری مانند «تار» برای وی تلفظ می‌شود. در اینجا اگر دانشآموز بین دو کلمه فرق قائل شد، باید دستش را بالا بیاورد، ولی اگر دو کلمه یکسان بود، مثلاً «مار» و «مار» از اشاره دست استفاده نمی‌کند(سیف‌نراقی و نادری، ۱۳۷۲).^(۲)

- آزمون درک زبانی کودک از جملات امری همزمان: این آزمون شامل فهرستی از جملات امری است که از تک جملات امری ساده شروع و به چندین جمله امری همزمان ختم می‌شود. روش اجرا به این صورت است که ابتدا یک جمله امری مانند «بیا اینجا» برای دانشآموز بیان می‌شود. اگر دانشآموز جمله امری را اجرا کرد، به جملات دیگر می‌پردازیم و آزمون را تا آنجا پیش می‌بریم که دانشآموز بتواند جملات امری را اجرا کند؛ در غیر این صورت آزمون را متوقف می‌کنیم (سیف نراقی و نادری، ۱۳۷۲) (پیوست شماره ۳).

- آزمون تشخیص صدایها در اول، وسط و آخر کلمات: در این آزمون ۲۸ صدای شنیداری زبان فارسی برحسب اینکه در اول، وسط و آخر کلمات قرار دارند، از طریق کلماتی ساده و به گونه‌ای که وجه تشخیصی در آن رعایت شده باشد، مورد آزمایش قرار می‌گیرد. در این آزمایش، آزمایشگر باید در مورد هر صدای سه کلمه مربوط به آن را با تانی بشمارد و با فاصله زمانی مناسب برای آزمودنی بیان کند. آنگاه

(برای هر رده سنی ۳ تا ۸ سال ۹ کودک) است که در مجموع تعداد کل نمونه ۱۹۵ نفر بودند. لازم به ذکر است که کودکان مبتلا به ADHD از بین کودکانی که زیر نظر مرکز مشاوره آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران قرار داشتند و به خاطر ابتلا به ADHD تحت دارو درمانی بودند، انتخاب شدند.

ابزار و روش اجرا

برای جمع‌آوری داده‌ها نخست با مراجعه به مرکز مشاوره آموزش و پرورش منطقه ۲ شهر تهران، دانشآموزانی که دچار بیش فعالی و نقص توجه بودند، انتخاب شدند. پس از آن به صورت انفرادی، آزمونهای زیر بر اساس دستورالعملها و تحت شرایط یکسان بر روی آنان، اجرا شد. روایی صوری و محتوایی آزمونهای مورد نظر را گروهی از متخصصین بررسی کردند. پایانی آنها نیز از طریق بازارآمایی آزمون بر نمونه‌ای ۱۰ نفره از دانشآموزان انجام شد و ضریب همبستگی پیرسون /۸. به دست آمد. ابزارهای این پژوهش عبارت‌اند از:

۱- آزمون تشخیص توالی حافظه شنوازی - بیانی: با این آزمون حافظه کودکان بزرگ‌تر از دو سال در تولید بی در بی، دقیق و مجدد رشته‌ای از اعداد و کلمات که می‌شنوند، سنجیده می‌شود(سیف نراقی و نادری، ۱۳۷۲). این آزمون شامل فهرستی از اعداد و کلمات غیر مرتبط است که به تدریج بر تعداد آنها افزوده می‌شود. آزمایشگر هر دسته از کلمات و اعداد را با تائی می‌شمارد و با زمانی مناسب(یک ثانیه) برای هر کلمه و عدد) برای آزمودنی بیان می‌کند و آزمودنی باید این کلمات و اعداد را بازگو کند در ستون مقابل آن علامت مثبت و اگر نتواند علامت منفی می‌گذارد. پس از سه منفی پشت سر هم، آزمایش متوقف می‌شود و تعداد کلمات آخرین مثبت، در حکم تعداد کلماتی که کودک می‌تواند آنها را به خاطر بسپارد و بیان کند، ثبت می‌شود. پس از اتمام کلمات اعداد نیز به همان صورت انجام می‌شود (سیف نراقی و نادری،

۱- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۳ تا ۴ سال در تشخیص توالی حافظه شنوایی- بیانی (کلمات) وجود ندارد و مقدار خی دو محاسبه شده $0.256/0.250$ با درجه آزادی ۲ و با سطح احتمال خطأپذیری 0.05 کوچکتر از مقدار خی دو بحرانی 0.095 است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را رد کرد.

۲- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۳ تا ۴ سال در تشخیص توالی حافظه شنوایی- بیانی (اعداد) وجود ندارد و مقدار خی دو محاسبه شده $0.129/0.123$ با درجه آزادی ۲ و با سطح احتمال خطأپذیری 0.05 کوچکتر از مقدار خی دو بحرانی 0.095 است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را رد کرد.

۳- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۴ تا ۵ سال در تشخیص توالی حافظه شنوایی- بیانی (کلمات) وجود ندارد و مقدار خی دو محاسبه شده $0.185/0.182$ با درجه آزادی ۲ و با سطح احتمال خطأپذیری 0.05 کوچکتر از مقدار خی دو بحرانی 0.095 است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را رد کرد.

۴- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۴ تا ۵ سال در تشخیص توالی حافظه شنوایی- بیانی (اعداد) وجود ندارد و مقدار خی دو محاسبه شده $0.154/0.152$ با درجه آزادی ۲ و با سطح احتمال خطأپذیری 0.05 کوچکتر از مقدار خی دو بحرانی 0.095 است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را رد کرد.

۵- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۵ تا ۶ سال در تشخیص توالی حافظه شنوایی- بیانی (کلمات) وجود دارد و مقدار خی دو محاسبه شده $0.135/0.111$ با درجه آزادی ۳ و با سطح احتمال خطأپذیری 0.05 بیشتر از مقدار خی دو بحرانی 0.087 است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را

منتظر بماند تا آزمودنی آنها را تکرار کند (سیف نراقی و نادری، ۱۳۷۲) (پیوست شماره ۴).

یافته‌ها

برای پردازش داده‌های جمع‌آوری شده در این پژوهش، از آمار توصیفی و آمار استنباطی (خی دو) استفاده شده است. در این بخش، ضمن یادآوری فرضیه‌های پژوهش، نتایج محاسبات انجام شده برای آزمون آنها و تفسیر این محاسبات ارئه شده است. محاسبات با رایانه و به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است.

فرضیه یک) بین توالی حافظه شنوایی - بیانی کودکان ADHD و کودکان عادی تفاوت معنی‌دار وجود دارد.

جدول ۱- مقایسه توالی حافظه شنوایی - بیانی در کودکان و کودکان عادی ADHD

متغیرها	شاخصهای آماری		
	سطح معناداری	درجات آزادی	مقدار خی دو
حافظه شنوایی - بیانی (کلمات) ۴-۳ سال	۰/۸۸	۲	۰/۲۵۶
حافظه شنوایی - بیانی (اعداد) ۴-۳ سال	۰/۲۱	۲	۰/۱۲۹
حافظه شنوایی - بیانی (کلمات) ۴-۵ سال	۰/۳۳۵	۲	۰/۱۸۵
حافظه شنوایی - بیانی (اعداد) ۴-۵ سال	۰/۳۶	۲	۰/۱۵۴
حافظه شنوایی - بیانی (کلمات) ۵-۶ سال	۰/۰۱۱	۳	۱۱/۱۳۵
حافظه شنوایی - بیانی (اعداد) ۵-۶ سال	۰/۰۱۰	۳	۱۱/۲۵
حافظه شنوایی - بیانی (کلمات) ۶-۷ سال	۰/۰۵۰	۳	۰/۳۴۹
حافظه شنوایی - بیانی (اعداد) ۶-۷ سال	۰/۰۲۹	۳	۰/۷۷۳
حافظه شنوایی - بیانی (کلمات) ۷-۸ سال	۰/۰۰۴	۳	۱۳/۱۹۲
حافظه شنوایی - بیانی (اعداد) ۷-۸ سال	۰/۰۰۷	۳	۱۳/۲۹

در جدول ۱ موارد زیر نشان داده شده است:

خی دو محاسبه شده ۱۳/۲۹ با درجه آزادی ۳ با سطح احتمال خطاطی ۵ ۰/۰ بیشتر از مقدار خی دو بحرانی ۷/۸۲ است؛ بنابراین می‌توان فرض صفر را رد کرد. به سخن دیگر، کودکان عادی بهتر از کودکان ADHD در این زمینه عمل می‌کنند.

فرضیه دو) بین تشخیص شناوی کودکان ADHD و کودکان عادی تفاوت معنی‌دار وجود دارد.

جدول ۲- مقایسه تشخیص شناوی در کودکان ADHD و کودکان عادی

سطح معناداری	درجات آزادی	مقدار خی دو	شاخصهای آماری	
			متغیرها	
۰/۰۰۱	۲	۱۵/۱۴۱	تشخیص شناوی ۳ تا ۴ سال	
۰/۰۴	۱	۴/۹۵	تشخیص شناوی ۴ تا ۵ سال	
۰/۰۳	۱	۶/۴۲	تشخیص شناوی ۵ تا ۶ سال	
۰/۰۰۱	۱	۲۰/۸۹	تشخیص شناوی ۶ تا ۷ سال	
۰/۰۰۰۱	۱	۱۸/۵۵	تشخیص شناوی ۷ تا ۸ سال	

جدول ۲ یافته‌های زیر را نشان می‌دهد:

۱- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سینی ۴ تا ۴ سال در تشخیص شناوی وجود دارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۱۵/۱۴۱ با درجه آزادی ۲ و با سطح احتمال خطاطی ۵ ۰/۰ بیشتر از مقدار خی دو بحرانی ۹/۲۱ است؛ بنابراین می‌توان فرض صفر را رد کرد. به سخن دیگر، کودکان عادی بهتر از کودکان ADHD در این زمینه عمل می‌کنند.

۲- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سینی ۴ تا ۵ سال در تشخیص شناوی وجود دارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۴/۹۵ با درجه آزادی ۱ و با سطح احتمال خطاطی ۵ ۰/۰ بیشتر از مقدار خی دو بحرانی ۳/۸۴ است؛ بنابراین می‌توان فرض صفر را رد کرد. به سخن دیگر، کودکان عادی بهتر از کودکان ADHD در این زمینه عمل می‌کنند.

۳- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان

رد کرد. به سخن دیگر، کودکان عادی، بهتر از کودکان ADHD در این زمینه عمل می‌کنند.

۶- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سینی ۵ تا ۶ سال در تشخیص توالی حافظه شناوی - بیانی (اعداد) وجود دارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۱۱/۲۵ با درجه آزادی ۳ و با سطح احتمال خطاطی ۵ ۰/۰ بیشتر از مقدار خی دو بحرانی ۷/۸۲ است؛ بنابراین می‌توان فرض صفر را رد کرد. به سخن دیگر، کودکان عادی، بهتر از کودکان ADHD در این زمینه، عمل می‌کنند.

۷- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سینی ۶ تا ۷ سال در تشخیص توالی حافظه شناوی - بیانی (کلمات) وجود ندارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۲/۳۴۹ با درجه آزادی ۳ و با سطح احتمال خطاطی ۵ ۰/۰ کوچک‌تر از مقدار خی دو بحرانی ۷/۸۲ است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را رد کرد.

۸- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سینی ۶ تا ۷ سال در تشخیص توالی حافظه شناوی - بیانی (اعداد) وجود ندارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۳/۷۷ با درجه آزادی ۳ و با سطح احتمال خطاطی ۵ ۰/۰ کوچک‌تر از مقدار خی دو بحرانی ۷/۸۲ است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را رد کرد.

۹- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سینی ۷ تا ۸ سال در تشخیص توالی حافظه شناوی - بیانی (کلمات) وجود دارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۱۳/۱۹۲ با درجه آزادی ۳ و با سطح احتمال خطاطی ۵ ۰/۰ بیشتر از مقدار خی دو بحرانی ۷/۸۲ است؛ بنابراین می‌توان فرض صفر را رد کرد. به سخن دیگر، کودکان عادی بهتر از کودکان ADHD در این زمینه عمل می‌کنند.

۱۰- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سینی ۷ تا ۸ سال در تشخیص توالی حافظه شناوی - بیانی (اعداد) وجود دارد و مقدار

جدول ۳ یافته‌های زیر را نشان می‌دهد:

۱- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۳-۴ سال در درک جملات امر همزمان وجود دارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۶/۶۷ با درجه آزادی ۲ و با سطح احتمال ۰/۰۵ بیشتر از مقدار خی دو بحرانی ۵/۹۹ است؛ بنابراین می‌توان فرض صفر را رد کرد. به سخن دیگر، کودکان عادی بهتر از کودکان ADHD در این زمینه عمل می‌کنند.

۲- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۴-۵ سال در درک جملات امر همزمان وجود دارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۳/۴ با درجه آزادی ۲ و با سطح احتمال ۰/۰۵ بیشتر از مقدار خی دو بحرانی ۵/۹۹ است؛ بنابراین می‌توان فرض صفر را رد کرد. به سخن دیگر، کودکان عادی بهتر از کودکان ADHD در این زمینه عمل می‌کنند.

۳- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۵-۶ سال در درک جملات امر همزمان وجود دارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۲/۸۷ با درجه آزادی ۳ و با سطح احتمال ۰/۰۵ بیشتر از مقدار خی دو بحرانی ۱۱/۳۴ است؛ بنابراین می‌توان فرض صفر را رد کرد. به سخن دیگر، کودکان عادی بهتر از کودکان ADHD در این زمینه عمل می‌کنند.

۴- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۶-۷ سال در درک جملات امر همزمان وجود دارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۱۲/۸۹ با درجه آزادی ۳ و با سطح احتمال ۰/۰۵ بیشتر از مقدار خی دو بحرانی ۱۱/۳۴ است؛ بنابراین می‌توان فرض صفر را رد کرد. به سخن دیگر، کودکان عادی، بهتر از کودکان ADHD در این زمینه عمل می‌کنند.

۵- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۷-۸ سال در درک

ADHD و کودکان عادی سنین ۵-۶ سال در تشخیص شناوی وجود دارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۶/۴۲ با درجه آزادی ۱ و با سطح احتمال ۳/۸۴ است؛ بنابراین می‌توان فرض صفر را رد کرد. به سخن دیگر، کودکان عادی بهتر از کودکان ADHD در این زمینه، عمل می‌کنند.

۴- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۶-۷ سال در تشخیص شناوی وجود دارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۲۰/۸۹ با درجه آزادی ۱ و با سطح احتمال ۶/۶۴ بیشتر از مقدار خی دو بحرانی ۰/۰۵ است؛ بنابراین می‌توان فرض صفر را رد کرد. به سخن دیگر، کودکان عادی بهتر از کودکان ADHD در این زمینه، عمل می‌کنند.

۵- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۷-۸ سال در تشخیص شناوی وجود دارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۱۸/۵۵ با درجه آزادی ۱ و با سطح احتمال ۶/۶۴ بیشتر از مقدار خی دو بحرانی ۰/۰۵ است؛ بنابراین می‌توان فرض صفر را رد کرد. به سخن دیگر، کودکان عادی بهتر از کودکان ADHD در این زمینه، عمل می‌کنند.

فرضیه سه) بین درک زبانی کودکان ADHD از جملات امری همزمان و درک زبانی کودکان عادی از این جملات تفاوت معنی دار وجود دارد.

جدول ۳- مقایسه درک جملات امری همزمان در کودکان ADHD و کودکان عادی

متغیرها	شاخصهای آماری		
	سطح معناداری	درجات آزادی	مقدار خی دو
درک جملات امر همزمان ۳-۴ سال	۰/۰۳۵	۲	۶/۶۷
درک جملات امر همزمان ۴-۵ سال	۰/۰۴۲	۲	۶/۳۴
درک جملات امر همزمان ۵-۶ سال	۰/۰۰۱	۳	۲۸/۶۶
درک جملات امر همزمان ۶-۷ سال	۰/۰۰۰۳	۳	۱۲/۸۹
درک جملات امر همزمان ۷-۸ سال	۰/۲۹۴	۳	۳/۹۳

احتمال خطاپذیری ۵/۰٪ کوچک‌تر از مقدار خی دو بحرانی ۵/۹۹ است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را رد کرد.

۴- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین عたاً‌سال در تشخیص صدایا در اول، وسط و آخر کلمات وجود ندارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۵/۶۶ با درجه آزادی ۲ و با سطح احتمال خطاپذیری ۵/۰٪ کوچک‌تر از مقدار خی دو بحرانی ۵/۹۹ است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را رد کرد.

۵- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۷تاً‌۸سال در تشخیص صدایا در اول، وسط و آخر کلمات وجود ندارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۳/۴۲ با درجه آزادی ۱ و با سطح احتمال خطاپذیری ۵/۰٪ کوچک‌تر از مقدار خی دو بحرانی ۳/۸۴ است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را رد کرد.

بحث و نتیجه‌گیری

این مطالعه توالی حافظه شنوازی- بیانی، تشخیص شنوازی، درک زبانی از جملات امری همزمان و تشخیص صدایا در اول، وسط و آخر کلمات کودکان مبتلا به کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) را مورد بررسی قرارداد.

این پژوهش در دو مرحله اجرا شد: نخست با مراجعته به مرکز مشاوره آموزش و پرورش منطقه ۲ شهر تهران دانش‌آموزانی که دچار بیش فعالی و نقص توجه بودند و تحت دارودرمانی قرار داشتند، شناسایی شدند؛ در مرحله بعد آزمونهای تشخیص توالی حافظه شنوازی- بیانی، تشخیص شنوازی، درک زبانی از جملات امری همزمان و تشخیص صدایا در اول، وسط و آخر بر اساس دستورالعملهای مربوط و تحت شرایط یکسان بر روی کودکان ADHD اجرا شد. پس از تحلیل داده‌ها نتایج زیر، به‌دست آمد:

در فرضیه یک و در مقاطع سنی ۳ تا ۴، ۴ تا ۵ و

جملات امری همزمان وجود ندارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۳/۹۴ با درجه آزادی ۳ و با سطح احتمال خطاپذیری ۵/۰٪ کوچک‌تر از مقدار خی دو بحرانی ۷/۸۲ است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را رد کرد.

فرضیه چهار) بین تشخیص صدایا در اول، وسط و آخر کلمات کودکان ADHD و عادی تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول ۴- مقایسه تشخیص صدایا در اول، وسط و آخر کلمات در کودکان ADHD و کودکان عادی

متغیرها	شاخصهای آماری	مقدار خی دو	درجات آزادی	سطح معناداری
تشخیص صدا ۳تاً ۴	۴/۷۲	۲/۷۲	۳	۰/۳۵
تشخیص صدا ۴تاً ۵سال	۵/۸۰۲	۵/۸۰۲	۳	۰/۱۲۲
تشخیص صدا ۵تاً ۶سال	۵/۴۱۵	۵/۴۱۵	۲	۰/۶۷
تشخیص صدا ۶تاً ۷سال	۵/۶۶	۵/۶۶	۲	۰/۵۹
تشخیص صدا ۷تاً ۸سال	۳/۴۲۱	۳/۴۲۱	۱	۰/۲۳۱

جدول ۴ یافته‌های زیر را نشان می‌دهد:

۱- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۳تاً ۴سال در تشخیص صدایا در اول، وسط و آخر کلمات وجود ندارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۲/۷۲ با درجه آزادی ۳ و با سطح احتمال خطاپذیری ۵/۰٪ کوچک‌تر از مقدار خی دو بحرانی ۷/۸۲ است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را رد کرد.

۲- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۴تاً ۵سال در تشخیص صدایا در اول، وسط و آخر کلمات وجود ندارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۵/۸۰۲ با درجه آزادی ۳ و با سطح احتمال خطاپذیری ۵/۰٪ کوچک‌تر از مقدار خی دو بحرانی ۷/۸۲ است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را رد کرد.

۳- تفاوت معنادار آماری بین دو گروه کودکان ADHD و کودکان عادی سنین ۵تاً ۶سال در تشخیص صدایا در اول، وسط و آخر کلمات وجود ندارد و مقدار خی دو محاسبه شده ۴/۱۵ با درجه آزادی ۲ و با سطح

ردموند، ۲۰۰۴) تفاوت بسیار ناچیزی را بین کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و کودکان عادی، در این زمینه به دست آوردند.

در پژوهش حاضر نیز تفاوتی در زبان بیانی کودکان ADHD و عادی در سه گروه سنی ۳ تا ۴، ۴ تا ۵ و ۶ تا ۷ سال مشاهده نشد ولی در مقاطع سنی ۵ تا ۶ و ۷ تا ۸ سال تفاوت معنی‌داری در این زمینه بین کودکان ADHD و عادی به دست آمد(فرضیه یک).

کارت و همکاران(۱۹۹۰، به نقل از بارکلی، ۱۹۹۸) بیان کردند که کودکان با نارسایی توجه/بیش فعالی در آزمونهای بیانی، بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. فیشر و همکاران(۱۹۹۶، به نقل از بارکلی ، ۱۹۹۸) بیان کرده‌اند که تفاوت در یافته‌ها تا اندازه‌ای می‌تواند به علت نوع آزمون به کار رفته در این زمینه باشد. آزمونهایی که در آنها آزمودنیهای کلماتی را در مقوله‌های معنایی تولید می‌کنند، نظری نامهایی برای جانوران یا گیاهان، در مقایسه با آن دسته از آزمونهایی که در آنها از علائم بسیار سازمان یافته و ظرفیتی نظیر حروف، استفاده می‌شود، آسان‌تر هستند و احتمالاً قادر به تفکیک کودکان با نارسایی توجه/بیش فعالی از کودکان گروه کنترل نیستند.

ردموند(۲۰۰۴) اظهار می‌دارد که کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی اغلب دشواریهایی در تشخیص شنواهی دارند و بنابراین ممکن است در مورد آنان خود به خود تشخیص اختلال شدید در پردازش شنواهی داده شود. نتایج حاصل از این پژوهش نیز بیان کننده این مطلب است که تشخیص شنواهی کودکان با اختلال ADHD در سطح پایین‌تری از کودکان عادی است(فرضیه دو). اختلال به اصطلاح اشکال در پردازش علائم شنواهی نمی‌تواند مربوط به حساسیت گوش میانی یا نقص هوشی باشد. نکته اصلی این است که اختلال عمدۀ پردازش شنواهی می‌تواند مربوط به حواس‌پرتی و بی‌توجهی و نیز دشواریهایی در حافظه، خواندن، تلفظ کردن و زبان نوشتاری باشد(بارکلی، ۱۹۹۸).

۶ تا ۷ تفاوت معنی‌داری بین کودکان ADHD و عادی مشاهده نشد؛ یعنی در این مقاطع سنی بین دو گروه کودکان ADHD و عادی در توالی حافظه شنواهی- بیانی تفاوت معنی‌دار آماری وجود ندارد، اما در مقاطع سنی ۵ تا ۶ و ۷ تا ۸ تفاوت معنی‌داری بین کودکان ADHD و عادی مشاهده شد؛ یعنی در این مقاطع سنی، کودکان عادی در زمینه توالی حافظه شنواهی- بیانی بهتر از کودکان ADHD عمل می‌کنند. در فرضیه دوم در همه مقاطع سنی، تفاوت معنی‌داری بین کودکان ADHD و عادی مشاهده شد؛ بنابراین فرضیه دو مبنی بر وجود تفاوت معنی‌دار بین تشخیص شنواهی کودکان ADHD و عادی تأیید می‌شود و کودکان عادی در زمینه تشخیص شنواهی بهتر از کودکان ADHD عمل می‌کنند. در فرضیه سوم در همه مقاطع سنی به غیر از ۷ تا ۸ سالگی، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه کودکان ADHD و عادی مشاهده شد؛ یعنی کودکان عادی در زمینه درک جملات امری همزمان بهتر از کودکان ADHD عمل می‌کنند. در نهایت در فرضیه چهارم در هیچ‌کدام از مقاطع سنی، تفاوت معنی‌داری بین کودکان ADHD و عادی در تشخیص صدایها در اول، وسط و آخر کلمات مشاهده نشد و فرضیه چهارم را می‌شود.

جونز و همکاران(۱۹۹۸)، رابطه دو سویه رشد زبان و تکانشگری را مورد بحث قرار دادند. کوهن و همکاران(۱۹۹۸)، ادبیات مربوط به اختلالات زبان و تکلم را در کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی مورد بررسی قرار داده‌اند. آنها الگوی ثابتی از میزان بالارونده اختلالات زبان و تکلم در افراد با نارسایی توجه/بیش فعالی و میزان بالارونده نارسایی توجه/بیش فعالی در افراد با اختلالات زبان / تکلم را پیدا کردند.

ردموند(۲۰۰۴) بیان می‌کند که کودکان با نارسایی توجه/بیش فعالی مشکلاتی را در زبان بیانی دارند. بارکلی و همکاران(به نقل از ردموند، ۲۰۰۴) تولیدات محاوره‌ای این کودکان را متناسب با انتظارات سنی آنها بیان کرده‌اند. همچنین لودلو و همکاران(به نقل از

- 4) Beitchman
 5) Ludlow et al
 6) Beach
 7) Nancy cohen

منابع

- اکبری، سارا(۱۳۸۴). نیمرخ رشد زبان دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
- باطنی، محمد رضا(۱۳۶۷). مجموعه مقالات زبان‌شناسی. تهران: انتشارات آگاه.
- دادستان، پریخ و مجتبی‌آبادی فراهانی، زهره(۱۳۷۵). بررسی توانایی‌های کودکان غیر فارسی زبان در بدو ورود به نظام آموزشی. پژوهشی با نظرات مریم سیف نراقی و حمایت مالی وزارت آموزش و پرورش.
- سیف نراقی، مریم و نادری، عزت الله(۱۳۸۶). روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی. ویرایش پنجم تهران: انتشارات ارسباران.
- سیف نراقی، مریم و نادری، عزت الله(۱۳۷۲). بررسی روند رشد تکلم و زبان فارسی کودکان از تولد تا ۲ سالگی. ارائه شده در نخستین کنفرانس زبان شناسی نظری و کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی. علیزاده، حمید(۱۳۸۳). اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی: ویژگیها، ارزیابی و درمان. تهران: انتشارات رشد.
- نیلی پور، رضا(۱۳۸۰). زبان شناسی و آسیب شناسی زبان. تهران: انتشارات هرمس.
- لطف آبادی، حسین(۱۳۶۵). روانشناسی رشد زبان. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

ردمند (۲۰۰۴) بیان می‌کند که کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی مشکلاتی در درک و معنا نشان می‌دهند. پژوهش حاضر این یافته را نشان می‌دهد که کودکان با نارسایی توجه /بیش فعالی در زمینه درک جملات پایین‌تر از کودکان عادی عمل می‌کنند(فرضیه سه).

با توجه به نتایج پژوهش‌های کوهن (۲۰۰۱)، ردمند (۲۰۰۴)، کودکان با نارسایی توجه /بیش فعالی نصبهای زبانی نشان می‌دهند. همچنین تأخیرات دریافتی و بیانی زبان بر افت تحصیلی کاملاً نشان داده شده است(ردمند، ۲۰۰۴؛ جونز و همکاران، ۱۹۹۸، بارکلی، ۱۹۹۸). با درنظر گرفتن این نتایج و یافته‌های تحقیق حاضر، کاربرد پژوهش حاضر به این صورت است که: با شناسایی نصبهای زبانی کودکان با نارسایی توجه/ بیش فعالی در مراحل اولیه و اصلاح آن، می‌توان از افت تحصیلی این کودکان جلوگیری کرد.

محدودیتهای پژوهش حاضر این موارد را در بر می‌گیرد: ۱) این پژوهش محدود به سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ است. ۲) پژوهش حاضر محدود به پنج گروه سنی ۳ تا ۸ سال است ۳) کوچک بودن حجم نمونه از دیگر محدودیتهای این پژوهش است. پیشنهادهایی نیز در زمینه این تحقیق ارائه می‌شود:

- ۱- پژوهش‌های دیگری در همین زمینه با نمونه‌های بزرگ‌تر به عمل آید تا تعمیم نتایج ممکن شود.
- ۲- پژوهش‌هایی در این زمینه در مقاطع سنی دیگر و در نقاط جغرافیایی گستردere به اجرا درآید.
- ۳- در پژوهش‌های دیگر، سایر ویژگیهای تکلمی - زبانی کودکان با نارسایی توجه/بیش فعالی مورد ارزیابی قرار گیرد.

یادداشتها

- 1) Attention- Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD)
- 2) Barkley, A.R
- 3) Redmond, S.M

-
- Breier,J.I.(2002). "Perception of speech and non speech stimuli children with and without reading disability and attention deficit hyperactivity disorder". *Journal of Experimental Child Psychology*, 82.226-231.
- Cohen. N.J.(2003).Overlap of communication impairments and social-emotional problems in infants . *Newsletter of the Infant Mental Health Promotion Project*, 37,19-21.
- Redmond,S.M.(2004).conversational profiles of children with ADHD ,SLI and typical development. *Journal Clinical Linguistics and Phonetics* , 18(2),107-125.