

سلاح اورانیومی تهدیدی برای سلامت

*شهلا علیاری^۱، میترازنده‌گله^۲

خلاصه:

سابقه و هدف: اورانیوم ضعیف شده که یکی از فرآوردهای زائد اورانیوم غنی شده می‌باشد. چندین مورد مصرف نظامی و غیر نظامی دارد. دردهه اخیر، اورانیوم ضعیف شده برای نفوذ در تجهیزات زرهی درجنگ‌ها استفاده شده است. برخی محققین، علل بیماریهای بوجود آمده درین نظامیان که تحت عنوان سندرم جنگ خلیج و سندرم بالکان معروف می‌باشند را به اورانیوم ضعیف شده نسبت می‌دهند. دراین مقاله ضمن بحث درمورد تولید واستفاده از اورانیوم ضعیف شده و اثرات آن بر سلامت، راههای پیشگیری و کاهش عوارض این سلاحها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها: تحقیق به روش مروری (Review article) با جستجوی کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام گرفت. واکلمات کلیدی (DU) Depleted uranium و weapons uranium دراینترنت در سایت pub med از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ جستجوی مقالات و تحقیقات انجام شد. تعداد بیش از ۱۷ منبع بدست آمد و از آنها در تنظیم مقاله استفاده گردید.

نتیجه گیری و توصیه ها: تعدادی از سربازان و غیرنظامیان بویژه کودکان مناطق آلوده ممکن است صدمات کلیوی ناشی از اورانیوم ضعیف شده را در صورت تنفس مقادیر کافی یا خوردن آب یا مایعات آلوده نشان دهند. خطر ایجاد کانسر دراثر اورانیوم ضعیف شده با سایر فلزات سنگین کارسینوژنیک قابل مقایسه است. علاوه بر این مردم مناطق آلوده به دلیل ماندگاری اورانیوم در فضا و اجسام سالها با مشکلات عدیده ژنتیکی روبرو خواهد بود. جهت پیشگیری و کاهش عوارض این سلاحها این موارد توصیه می‌گردد: نمونه برداری سالیانه از آب مناطق آلوده، بررسی سلامت نظامیانی که در معرض اورانیوم ضعیف شده بوده اند، پاکسازی محیط، بررسی شیوع کانسر بویژه لوکمیا و لنفوکام در افراد در معرض خطر، اطلاع رسانی، حمایت سیاسی از کشورهای درگیر، مشارکت سازمانهای مسئول و تحریم تولید اینگونه سلاحها

كلمات کلیدی: اورانیوم ضعیف شده، سلاحهای اورانیومی، سندرم خلیج

مقدمه:

تانک بکار گرفته شد. کارشناسان معتقدند گلوله‌های اورانیوم فقیر شده به همان آسانی که کارد می‌تواند کره را بشکافد، می‌توانند به تانکها، زره پوشها، ناوشکن‌ها و زیر دریائیها وارد شوند.^(۲) سلاحهای اورانیومی در جنگ خلیج فارس و در بالکان استفاده شده است. وزارت دفاع انگلیس تاکید کرده است که هیچ سلاح اورانیومی توسط نیروهای انگلیس در نبرد افغانستان استفاده نشده است ولی هنوز روشن نیست که آیا آمریکا از این سلاحها استفاده کرده است یا خیر?^(۳) بعضی از نظامیان شبه جزیره بالکان دچار سردرد و کم خوابی شده

اورانیوم قبل از آنکه بعنوان سوخت سلاحها و یا راکتورهای هسته‌ای بکار گرفته شود، بایستی با روش‌های مختلف غنی سازی گردد، به نحوی که درصد اورانیوم ۲۳۵ آن به حدود ۷٪ تا بیش از ۹٪ درصد بررسد. محصول چنین فرایندی فقط اورانیوم غنی شده نبوده و مواد جانبی نیز تولید می‌شوند. این مواد جانبی که مجموعاً اورانیوم فقیر شده یا Depleted Uranium نامیده می‌شوند حاوی حدود ۰٪ درصد اورانیوم ۲۳۵ بوده و باقیمانده آن عمدتاً اورانیوم ۲۳۸ می‌باشد.^(۱) در دهه ۱۹۸۰ اورانیوم ضعیف شده برای استفاده در گلوله‌های

۱- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت مادران و نوزادان (*نویسنده مسئول)

۲- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشکده پرستاری، گروه مدیریت

مواد و روشها:

تحقیق به روش مروری (Review article) انجام گرفت. با کلمات کلیدی Depleted Uranium و Uranium Weapons در اینترنت در سایت pubmed از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ جستجوی مقامات و تحقیقات انجام شد. علاوه بر جستجوی اینترنتی، جستجوی کتابخانه ای نیز در مورد موضوع مورد نظر بعمل آمد. تعداد بیش از بیست منبع بدست آمد و با توجه به دستیابی به کل مقامات از آنها در تنظیم مقاله استفاده گردید.

یافته ها و بحث:

اثرات اورانیوم ضعیف شده بر سلامت عبارتنداز:

الف - اثرات اورانیوم بر کلیه :

رادیو اکتیویته DU ممکن است به مشکلات سلامتی جدی نظیر سرطان سالها بعداز تماس منجر شود . ولی سمیت شیمیایی DU بزرگترین تهدید برای سلامت در مدت کوتاه (طی هفته ها یا ماهها) بعد از تماس محسوب می شود . کلیه ارگان هدف برای سمیت شیمیایی اورانیوم می باشد. (۸ و ۹)

اورانیوم در کلیه بطور اولیه بر روی توبول نزدیک (Proximal Tubule) اثر می کند. ترکیبات محلول اورانیل - کربونیت در این محیط اسیدی به یونهای اورانیل $^{+2}$ (UO_2) و بیکربنات $^{(-3)}$ (HCO_3) تجزیه می شود. همانند چیوه ، کادمیوم و سایر یونهای فلزات سنگین ، یونهای اورانیل فونکسیون گلومرولی، ترشح توبولار یونهای منفی آلی یا ارگانیک (مواد زاید متاپولیک اسیدی مانند لاتکات، سیترات و غیره) و باز جذب گلوکر و اسیدهای آمینه فیلتره شده در توبول پروکزیمال را کاهش می دهد.

وقتی که کادمیوم غیر آلی ، چیوه یا سایر فلزات سنگین به شریان کلیوی تزریق شود، این یونهای فلزی سریعاً به ماکروملکولهای غیرقابل انتشار همانند پروتئین های پلاسمما متصل شده و در گلومرولها غیر قابل دفع می شود. یونهای اورانیل محلول ، همانند سایر فلزات سنگین با ترکیبات chelating قابل انتشار مجدداً ترکیب شده و ترکیبات نسبتا ثابت و خنثی را تشکیل می دهند. این ترکیبات chelating، فیلتره شده و در ادرار ترشح می شود. تجویز ترکیبات به حیوانات آزمایشگاهی بلا فاصله بعد از تماس با اورانیوم سبب افزایش دفع اورانیوم در موشها گردیده است. (۸)

ب - دفع اورانیوم و رسوب در ارگانها :

بعضی دیگر بخاطر سرطان خون یا بیماریهای بد خیم فوت نمودند. علاوه بر سریازان حافظ صلح ناتو که در بالکان حضور داشتند، افراد بومی که در منطقه ساکن می باشند بطور جدی در معرض خطر اورانیوم ضعیف شده قرار گرفته اند. بر طبق آمارهای منتشره، در سال ۱۹۹۹ نیروهای ناتو حدود ۳۱ هزار گلوله محتوی اورانیوم ضعیف شده را در جنگ بالکان علیه نیروهای یوگسلاوی در بوسنی استفاده کرده اند.

طبق گزارشات منتشره در بین نظامیان آمریکائی که در جنگ خلیج فارس (عملیات سپر صحراء و طوفان صحراء) شرکت داشتند، مواردی از علائم غیر اختصاصی شامل درد عضلانی، ضعف، خستگی مفرط، پاراستزی، بی حسی در اندامها، درد مفاصل، سردرد، تظاهرات پوستی و ... مشاهده گردید. DU به عنوان یکی از علل احتمالی ایجاد کننده سندروم خلیج مطرح می باشد. (۵ و ۶)

رادیو دولتی روسیه با اشاره به دروغ پردازی فرماندهی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس درباره میزان بمب های خوش ای بکار گرفته شده در جنگ عراق افزود: اطلاعات و مستندات موجود نشان می دهد که آمریکا بالغ بر ۵ هزار بمب خوش ای دارای اورانیوم ضعیف شده را در طول جنگ بر سر مردم شهرهای عراق فروریخته است. (۶) جذب DU از راه استنشاق ذرات موجود در غبار دود، خوردن ذرات یا آلدگی زخم، خطر آلدگی هسته ای و مسمومیت را بالا می برد. یک بار تماس با یک تاسه میکرو گرم اورانیوم به ازای هر گرم وزن کلیه می تواند آسیبهای غیر قابل ترمیم به کلیه ها وارد کند. آستانه مسمومیت تماس طولانی با فلز اورانیوم مشخص نیست. آسیب کلیوی در بین مجروحین جنگ خلیج فارس تایید شده است. (۷) یکی دیگر از راههای انتشار این ذرات حل شدن آنها در آب است. آن دسته از ذراتی که می توانند در آب حل شوند، می توانند در آبهای سطحی یا زیر زمینی پراکنده شوند. نوشیدن یا استفاده از چنین آبهای آلدگی ای برای شستشو و یا حتی استفاده های دیگر باعث انتشار آلدگی می شود. نتیجه نهایی آلدگی آب یا هوا با DU، با قیماندن DU در خاک خواهد بود. پس از آن، DU آنقدر در خاک می ماند تا توسط عامل دیگری جابجا شده و باعث گسترش آلدگی شود. علاوه بر ذرات غبار اورانیومی که توسط اصابت گلوله به هدف تولید می شوند، قطعات بزرگتر حاصل از این گلوله ها و همچنین گلوله های سالم نیز خطرناک می باشند. (۲)

غلظت اورانیوم در نمونه های جامد در منطقه مشابه بود. فقط غلظت متوسط اورانیم در ذرات جامد سطح هوا برابر با 0.24 ng/g نانو گرم بود که بالاتر از مقادیر معمولی (0.1 ng/g) می باشد. محققین در پایان نتیجه گرفتند که غلظتها اورانیوم در کویت و جنوب عراق با مقادیر متوسط جهانی تفاوتی ندارد. (۱۱) در مطالعات دیگر غلظت اورانیوم در کلیه سربازان جنگ خلیج ۵ روز بعد از جنگ، نزدیک به مقدار تووصیه شده NRC برای سمیت شیمیایی اورانیوم بود. در حالیکه 3 mg/m^3 برابر بیشتر از مقادیر تووصیه شده توسط Occupational Safety and Health Administration (OSHA) برای استنشاق اورانیوم و 17 mg/m^3 برابر بیشتر از Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) در مورد حداقل سطح دریافتی برای جمعیت عادی بوده است. (۸)

ج - تماس مزمن با اورانیوم

در یک مطالعه در مورد اثرات بلع مزمن اورانیوم در آب آشامیدنی بر روی انسان نشان داده شده که عملکرد کلیه توسط مقدار اورانیوم دریافته که قبلاً به استناد مطالعات حیوانی بی خطر عنوان می شد، تحت تاثیر قرار می گیرد. واحدهای مورد پژوهش در این مطالعه به ۲ گروه تقسیم شده بود. گروه تماس کم (۲۰ مورد) که از سیستم آب شهری که حاوی کمتر از $1 \mu\text{g}/\text{L}$ اورانیوم بود، می نوشیدند و گروه تماس بالا (۳۰ مورد) که از آب چاه شخصی که حاوی $1 \mu\text{g}/\text{L}$ اورانیوم بود، استفاده می کردند. این سطوح اورانیوم منجر به دریافت قابل توجهی گلوکریستال نسبت به گروه کنترل در ادارار دفع کردند. دفع آلکالین فسفاتاز (نشان دهنده سمیت سلول) و β -میکرو گلوبولین (نشان دهنده فونکسیون توبولهای پروگریمال) بطور مثبت با دریافت اورانیوم مرتبط بود. (۸)

اثرات مشاهده شده لزوماً منجر به نارسایی کلیه یا بیماری آشکار نخواهد شد، بلکه ممکن است در اولین مرحله منجر به صدمه پیشرونده یا غیرقابل برگشت کلیه شود. افرادی که قبلاً در تماس با اورانیوم بوده اند ممکن است در معرض خطر بیشتری برای ابتلاء به بیماری کلیوی بعدی باشند زیرا مشاهده شده است که بیش از ۲۵ درصد فونکسیون کلیه قبل از کشف عارضه و بیش از ۷۵ درصد ممکن است قبل از شروع علائم کلینیکی واضح کاهش یافته باشد. دورانت و پوگلیز شبیه سازی کامپیوتری را برای تخمين خطرات

اورانیوم محلول (طبیعی یا ضعیف شده) جذب شده توسط گردش خون، سریعاً از طریق کلیه در ادارار دفع می شود. در حدود ۶۷ درصد در اولین روز بدون رسوب در ارگانها دفع می شود. تقریباً ۱۱ درصد بطور اولیه در کلیه تجمع یافته و با نیمه عمر 15 روز دفع می شود. از 22 درصد باقیمانده قسمت اعظم آن (بیش از 20 درصد) بطور اولیه در استخوان تجمع می یابد که محل ذخیره اصلی محسوب می شود و باقیمانده در سایر ارگانها و بافت ها پخش می گردد. اورانیوم تجمع یافته در استخوانها و سایر ارگانها مجدداً با حدائق دو نیمه عمر متفاوت به گردش خون آزاد می شود. که هر دو طولانی تر از نیمه عمر دفع کلیه می باشد. همانند سایر فلزات سنگین (نظیر جیوه) ایجاد کننده مشکلات نور و توکسیک، اورانیوم می تواند از سد خون مغز عبور نماید. در مطالعات با حیوانات آزمایشگاهی، اورانیوم در جفت، جنین و شیر آنها و همینطور در بافتها و ادارار نوزادان تغذیه کننده از این حیوانات آلوده یافت شده است. (۸ و ۱۰) سرمانویک و همکاران شیوع ناهنجاریهای مادرزادی عمدہ را در غرب هرزگوین بلا فاصله و 5 سال بعد از فعالیتهای نظامی (۱۹۹۱-۱۹۹۵) که از سلاحهای اورانیوم ضعیف شده استفاده شده بود، بررسی نمودند. مطالعه تمام نوزادان زنده و نوزادان مرده بدنیا آمده را شامل می شد، اختلاف معنی داری در شیوع ناهنجاریهای مادرزادی بعد از جنگ در این منطقه مشاهده نگردیده با این وجود در مادرانی که علائم مسمومیت شیمیایی داشتند، اثرات از LBW تا آنومالیهای اسکلتال دیده شده است. اورانیوم ضعیف شده همچنین در نمونه های منی برخی از نظامیان جنگ خلیج که در معرض DU بوده اند، یافت شد. (۱۱)

دکتر ایرج خسروونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران معتقد است: جنگهای پایانی در منطقه حاوار میانه موجب بروز اختلالات ژنتیک شده و مردم این مناطق را بشدت تهدید می کند. (۱۲) غلظت واقعی DU دریافته به سرعت ورود سربازان به مناطق انفجار، نوع فعالیتهای جنگی و مدت زمان حضور در مناطق آلوده بستگی دارد. بم و همکارانش نتایج اندازه گیری های اورانیوم را در نمونه های محیطی مختلف توسط محققین در کویت بعد از جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱ منتشر نمودند. بر اساس مطالعات آنها غلظت اورانیوم در خاک سطحی بین 0.025 تا 0.075 mg/g با متوسط 0.06 mg/g بود که بسیار پایینتر از متوسط جهانی با میزان 0.028 mg/g می باشد.

پاکسازی که برای جمع آوری بقایای جنگ وارد منطقه می شوند، خطرناک باشد.

پروفسور برین اسپارت از کالج سلطنتی لندن و یکی از محققین گزارش انجمن رویال می گوید: کودکان بویژه در معرض خطر می باشند. نگرانی اصلی کودکانی می باشند که مقادیر زیادی خاک را به هنگام بازی بلع می کنند. بلع خاک شدیداً آلوده می تواند سطوح بالایی از اورانیوم در کلیه ایجاد کند که می تواند سبب صدمه به کلیه شود.^(۳)

همچنین جیانا دادی با ارزیابی دوز متوسط موثر در اعمق ۱، ۱۰ و ۲۰ سانتی خاک آلوده در مناطق کشاورزی و مسکونی، استنشاق و بلع خاک را بعنوان روش‌های پر خطر و کودکانی را که با خاک بازی می کنند بعنوان گروههای پر خطر تشخیص داد .^(۱۷) مشکل دیگر آلودگی آب می باشد. ساکنین بومی محل در صورت نفوذ اورانیوم ضعیف شده به منابع آب ممکن است در معرض خطر باشند. برای پیشگیری و کاهش عوارض این سلاحهای اورانیومی موارد زیر توصیه می شود:

- نمونه برداری از آب مناطق آلوده به منظور بررسی نفوذ اورانیوم به ذخایر آب، هر ساله تا ۴۰ سال انجام شود.^(۳)

- در منطقه جنگی که در آن DU استفاده شده است، باید مثل منطقه شیمیابی برخورد شود.

- نظامیان برخلاف جهت باد و باماسک و لباسهای محافظتی وارد منطقه شوند و از نوشیدن آب مناطق آلوده خود داری نمایند.^(۲)

- سربازانی که در معرض DU بوده اند، باید از نظر وجود اورانیوم در کلیه ها و ادرار بررسی شوند.

- خطرات سلامتی ناشی از سلاحهای اورانیوم ضعیف شده بویژه استنشاق ذرات ریز اورانیومی باید توسط متخصصین علوم و پزشکی حداقل به میزان اهمیت خطرات ناشی از گازهای شیمیابی ارزیابی شوند.^(۸)

- پاکسازی محیط نیز از مسائل مهم می باشد. پاکسازی محوطه ای که با DU آلوده شده است شامل دو مرحله است، در مرحله اول سطح روی خاک باید برداشته شود و در مرحله دوم این خاک جمع آوری شده باید در ظرفهای مخصوص بعنوان یک ماده زائد رادیواکتیو نگهداری شود. البته مخارج عمل پاکسازی نجومی می باشد. برای مثال هزینه پاکسازی ۲۰۰ هکتار از زمینهای Indiana که با ۶۹۰۰۰

رادیولوژیک ناشی از سلاحهای اورانیومی ضعیف در سناریوهای مختلف جنگی طراحی نمودند. حتی در بدترین سناریو، سمیت شیمیابی بطور عمده بیشتر از خطر رادیولوژیکال بود. این شبیه سازی کامپیوترا نشان داد که خطر رادیولوژیکال کمی در ارتباط باستفاده از سلاحهای اورانیومی ضعیف وجود دارد، بیشترین خطر با آلودگی آب در صورت شستشوی اورانیوم در آبهای زیرزمینی بوده است.^(۱۴)

د- ایجاد کانسر در اثر DU

در یک مطالعه سلولهای استئوپلاستیک انسانی در معرض یونهای اورانیل در آزمایشگاه قرار گرفتند. تنها ۱ مورد در ۷۰۰۰۰ هسته سلول توسط ذرات آلفا مورد حمله قرار گرفت با این وجود یونهای اورانیل قادر به تغییر این سلولهای استئوپلاستیک بودند، سلولهای تغییر شکل یافته بارشد نا متناسب، تشکیل تومور در موشها، سطوح بالای انکوژن ها، کاهش تولید پروتئین متوقف کننده تومور و سطوح بالای تبادلات کروماتید خواهر مشخص می شدند. ^(۸)

الکساندر میلر رادیولوژیست انتیتو تحقیقات رادیوبیولوژی نیروهای نظامی در Bethesda اعلام نمود: اولین تاثیر مستقیم اشعه ناشی از DU، صدمه به کروموزوم ها می باشد.^(۱۵)

پزشکان عراقی نیز بعد از استفاده آمریکا و انگلیس از سلاح اورانیومی در جنگ اخیر عراق در مورد افزایش میزان سرطان در جنوب این کشور هشدار دادند. به گفته آنها میزان مرگ ناشی از سرطان ۳۴ مورد در سال ۱۹۸۸، ۴۵۰ مورد در سال ۱۹۹۸ و ۶۰۳ مورد در سال ۲۰۰۱ بوده است.^(۱۵)

دکتر جنان قلیب حسن که در بخش سرطان بیمارستان مادر و کودک بصره کار می کند می گوید: من از سال ۱۹۸۰ در این بیمارستان کارکرده ام و هرگز تا این حد سرطان ندیده بودم. بعد از سال ۱۹۹۱ من موارد بسیار زیادی سرطان دیده ام. او گفت به دلیل اینکه سرطان معمولاً بعد از ۵ سال ظاهر می شود، اثرات جنگ اخیر را باید بعد از ۲۰۰۸ مشاهده نمود. به اعتقاد من شیوع سرطان به بیش از ۱۰ برابر یا حتی بالاتر افزایش خواهد یافت و این یک جنایت است.^(۱۵)

اغلب افراد در معرض خطر سربازانی هستند که سطوح بالایی از ذرات DU را (که به هنگام برخورد شدید مهمات اورانیومی با اهداف، تولید می شود) استنشاق کرده اند و یا کاملاً در معرض تماس با DU قرار داشته اند.^(۱۶)

همچنین این ذرات ممکن است به اطراف پخش شده و برای تیم های

- باید پرسنل پزشکی را به و سایل آشکار سازی اشعه مجهر نمود.
- عراق، یوگسلاوی و سایر کشورهای درگیر باید از نظر سیاسی حمایت شوند تا بتوانند بطور مؤثر با فجایع محیطی و سلامتی ناشی از جنگ مقابله نمایند. سازمانهای مسئول نیز باید برای از بین بردن آلوودگی مشارکت نمایند.
 - برای حمایت از سیاست محیط زیست سالم یا اولین قدم در کنترل استفاده نامحدود از این سلاحهای رادیواکتیو و سمی، باید آزمایشات سلاحهای اورانیوم ضعیف شده در آمریکا و سایر کشورها بطور کامل تحریم شود.

References:

1. Peter Diehl . Depleted Uranium : a by - Product of the Nuclear chain:Laka Foundation May 1999 .
- 2- ساعی پور محمد هادی، پور حیدری غلامرضا سلاحهای اورانیومی جدید: تهدیدی دیگر برای انسان و محیط زیست طب نظامی ، ۱۳۸۰ ، بهار و تابستان (۳) ۴۱-۳۵
- 3.uranium weapons health warning; BY BBC news online's Ania lichtarowicz, 12 march 2002
- 4- حلی ساز محمد تقی، ارزیابی نظامیان جنگ خلیج فارس مبتلا به علائم نوروپاتی محیطی طب نظامی ، ۱۳۸۱ بهار (۴) ۴۶-۴۳
- 5.Durakovic A. ' on depleted uranium : gulf war and alkansyndrome' Croat Med J.2001 Apr:42(2):130-4
- 6- امریکا ۵هزار بمب خوشه ای دارای اورانیوم بر سر مردم عراق ریخته است. Pso mehr.sharif.edu سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۲
- 7- نجفی پور فرشاد، فرزام پور شاهرخ، درمان ماجروحین حملات هسته ای، چاپ اول، اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۸۲
- 8.Vladimir S. Zajic 'Review of Radioactivity,Military use and health Effects of Depleted uranium' http://www.ratical.org/radiation/vzajic July 1999
- 9.Cantaluppi C,Degetta S.'civilian and military uses of depleted uranium:environmental and health problems' Ann Chim 2000 Nov-Dec;90(11-12):666-76
- 10 .Arlen DP,still KR, Ritchie GD'review of the

کیلوگرم DU آلووده شده بود، چیزی در حدود ۴-۵ میلیارد دلار بوده است.

- مسئولین نظامیان باید یک مطالعه آماری کانسر در مورد سربازان جنگ خلیج انجام دهند. اگر هرگونه افزایش در لنفوما (Lymphomas) (Leukemias) و سایر کانسرها یافت شده، تمام سربازان مناطق آلووده بالقوه در معرض خطر DU قرار دارند و باید بطور مداوم یا طولانی مدت پیگیری شوند.
- برای محافظت کافی سربازان و بومیان نسبت به DU باید آموزش‌های لازم به آنان داده شود. علاوه بر تهیه لباسهای محافظتی و ماسک،

effects of uranium and depleted uranium exposure on reproduction and fetal development' , Toxicol Ind Health 2001 Jun;17(5-10):180-91

- 11.Sumanovic-Glamuzina D and etal 'Incidence of major congenital malformations in a region of Bosnia and Herzegovina allegedly polluted with depleted uranium' Croat Med J. 2003 oct;44(5):576-84
12. J @ mejam Daily News paper

مردم خاوریانه در معرض خط اختلالات ژنتیکی سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۲

- 13.Bem H ,Bou-RabeeF.'Environmental and health consequences of depleted uranium use in the 1991 Gulf war.Environ Int. 2004 Mar;30(1):123-34
- 14.Durante M, Pugliese M.'Estimates of radiological risk from depleted uranium weapons in war scenarios', Health Phys.2002 Jan;82(1):14-20
- 15.Larry Johnson , 'Use of depleted uranium weapons lingers as health concern' Seattlepi.com,Monday August 4, 2003
- 16.Bleise A, Danesi PR, Bur Kart W.'properties,use and health effects of depleted uranium (DU):a general overview ' J Environ Radioact. 2003;64(2-3):93-112
- 17.Giannardi C, Dominici D.'Military use of depleted uranium :assessment of prolonged population exposure, J Environ Radioact. 2003;64(2-3):227-36

The uranium weapons, the health warning

*Shahla Aliary¹, Mitra Zand Begle²

Abstract :

Background : Depleted uranium (DU), a waste product of uranium enrichment, has several civilian and military applications. It was used as armor, piercing, ammunition in international military conflicts and was claimed to contribute to health problems, known as the Gulf War syndrome and the Balkan syndrome.

In this essay we discuss the use and production of depleted uranium and its effects on human health and also the way to reduce the side effect of these weapons will be discussed.

Materials and methods : For this review article, we have searched through internet by the following key words; depleted uranium, uranium weapons. We have found more than 20 related articles.

Results : Some soldiers, civilians and specially children who live in polluted area might suffer from kidney damage from depleted uranium if sufficient amount are breathed in, or contaminated soil and water. Are swallowed. The risk of cancer from internalized DU is comparable to other carcinogenic heavy metals. Since DU remains in air and objects people who live in polluted area will suffer from different genetic problems for many years.

Conclusion : Our recommendations include annual water sampling in areas of high contamination, Frequent health evaluation of veterans who have been exposed to DU, environmental clean up, Survey of the outbreak of cancer, especially Lymphomas and Leukemia, in people who are in danger, participation of the responsible organizations and inhibition of production of such weapons.

Key words : Depleted Uranium, Uranium Weapons, Gulf war syndrome.

1- Instructor department of nursing management, army university of medicine. (* Corresponding author)