

مطالعه اثرات مکملی دارچین بر روی هیپوگلیسمی ایجاد شده توسط انسولین در راههای نر دیابتی شده توسط استرپتوزوسین

* محمد رضا پرویزی

چکیده

سابقه و مصرف: درمان سنتی بیماری دیابت با استفاده از گیاهان طبیعی و یا عصاره‌های آن در سرتاسر جهان شناخته شده است. در میان آنها دارچین بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات مکملی دارچین بر روی هیپوگلیسمی ایجاد شده توسط انسولین در راههای نر دیابتی شده توسط استرپتوزوسین می‌باشد.

مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، تعداد ۴۰ رات نر دارای وزن متوسط ۲۲۰ گرم انتخاب و به چهار گروه دهتایی تقسیم شدند. گروه کنترل، آب و رژیم غذائی معمولی دریافت نمودند. گروه دیابتی، بوسیله تزریق داخل صفاقی استرپتوزوسین (۴۰ mg/kg) دیابتی شدند. گروه دیابتی + انسولینی، پس از دیابتی شدن تنها انسولین NPH (۵ u/kg) دریافت کردند. گروه دیابتی + انسولینی + دارچینی، علاوه بر انسولین، سوسپانسیون دارچین (۶۰ mg/kg) به صورت خوارکی داده شد. میزان گلوکز خون رات‌ها به روش Glucose Oxidize Method سنجش شد. داده‌ها توسط نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: میزان گلوکز خون در گروه دارچینی در مقایسه با گروه انسولینی بیشتر کاهش یافت، و این اختلاف در سطح $P < 0.01$ معنی دار بود.

نتیجه‌گیری: در دارچین ترکیبات بیواکتیوی (احتتمالا MCHP) وجود دارد که احتمالاً سبب تقویت اثر انسولین در گروه دارچینی می‌گردد. شاید در آینده بتوان از فرم استخراج شده دارچین به عنوان راه درمان طبیعی در برابر بیماری دیابت استفاده کرد. در نتیجه‌گیری صرفاً به اثر دارچین و نتایج آن در این مطالعه اشاره شود.

کلمات کلیدی: استرپتوزوسین، انسولین، دارچین، دیابت، هیپوگلیسمی

مقدمه

ادرار و برخی علائم دیگر مشخص می‌گردد^(۳). در صورت عدم درمان عوارض آن از جمله آسیبهای عصبی، قلبی، عروقی، کلیوی و گانگرون پاها بروز می‌کند^(۴). درمان آن شامل رژیم غذائی، ورزش و دارو می‌باشد^(۳). درمان سنتی دیابت با استفاده از برخی گیاهان و یا عصاره‌های گیاهی در سرتاسر جهان شناخته شده است^(۵). اثرات پایین آورنده قند خون بوسیله دارچین از چندین سال قبل مورد مطالعه قرار گرفته است^(۲). دارچین خوارکی از ساقه یک درخت آسیائی بنام سیناموم زیلانیکوم از گونه لوراسه می‌باشد و از

بیماری دیابت یکی از شایعترین اختلالات غدد درون ریز می‌باشد، که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون نفر را مبتلا می‌کند، این بیماری هفتمنی علت مرگ شناخته شده است^(۱). اکثر افراد از شروع بیماری خود آگاهی ندارند و موقعی پی به بیماری خود می‌برند که بدن قادر به کنترل قند خون نیست و بیماری پیشرفت خود را کرده است^(۲). بیماری دیابت با علائمی مانند هیپرگلیسمی، پرادراری، پرنوشی، کاهش وزن، تاخیر در التیام زخمها، تاری دید، افزایش گلوکز در

* مریم، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی
تلفن: ۸۰۲۸۳۵۰ دورنگار: ۸۸۰۱۳۶۸ آدرس الکترونیک: m_parviz2000@yahoo.com

ایران) که وزن آنها بین ۱۸۰-۲۵۰ گرم بود استفاده شد. رات‌ها در شرایط روشانی و تاریکی ۱۲ ساعته در قفس و در درجه حرارت و رطوبت مناسب نگهداری شدند و آب و غذا بصورت آزادانه دریافت می‌کردند. کوییده پوست گیاه دارچین از فروشگاههای معتبر بصورت میکردند. کوییده پوست گیاه دارچین از فروشگاههای معتبر بصورت پودر تهیه شد. این پودر مربوط به دارچین سیلانی است و پس از غربال مناسب بصورت سوسپانسیون مناسب بصورت خوارکی به حیوانات خورانده شد. داروی استرپتوزوسین (Sterptozocine) از شرکت سیگما (sigma) بصورت ویالهای یک گرمی لیوفیلیزه و آمپول انسولین (NPH) بصورت ویالهای ۱۰۰ واحدی تهیه گردید.

روش کار

حیوانات به چهار گروه ده تائی تقسیم شدند. لازم به ذکر است در گروههای چهار گانه وزن رات‌ها بطور روزانه کنترل می‌شد. میزان مصرف آب اندازه گیری می‌شد. در شرایط طبیعی از آنها خونگیری عمل آمد. گلوکز خون به روش آنژیمی سنجش می‌شد.

گروه اول (گروه کنترل): رات‌های این گروه با غذای معمولی تغذیه می‌شدند و هیچگونه داروئی دریافت نمی‌نمودند.

گروه دوم (گروه دیابتی): رتها به وسیله داروی استرپتوزوسین (stz) با دوز ۴۰ mg/kg بصورت داخل صفاقی (IP) دیابتی شدند و سطح گلوکز پلاسمای پس از یک هفته افزایش یافت (۱۳).

گروه سوم (گروه دیابتی + انسولینی): رات‌های این گروه پس از دیابتی شدن بوسیله استرپتوزوسین، تحت درمان با انسولین NPH با دوز ۵ U/kg بصورت داخل صفاقی قرار گرفتند.

گروه چهارم (گروه دیابتی + انسولینی + دارچینی): در این گروه علاوه بر انسولین با همان دوز قبلی، دارچین بصورت سوسپانسیون با دوز ۶۰ میلی گرم در کیلوگرم در روز و به مدت ۳ هفته بصورت خوارکی توسط لوله‌های مخصوص به رات‌ها داده شد.

روش تهیه محلول استرپتوزوسین: با افزودن ۹/۵ میلی لیتر محلول کلرید سدیم ۰/۹ درصد به ویالهای یک گرمی استرپتوزوسین یک محلول استوک تهیه شد که هر میلی لیتر آن حاوی ۱۰۰ میلی گرم استرپتوزوسین بود. برای تزریق این ماده از طریق داخل صفاقی به رات‌ها یک میلی لیتر از ویال برداشته و به حجم بالاتر رسانده شد.

بعد از یک هفته با خون گیری و آزمایش گلوکز پلاسمای و رسیدن قند خون به بالاتر از 300 mg/dl (۱۶/۶ مولار) دیابتی شدند. پس از سنجش غلظت گلوکز بر حسب (mg/dl) در چهار گروه مذکور،


قدیمی‌ترین گیاهان دارویی است بطوریکه قدمت آن در چین به ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد. در چین باستان از دارچین برای بهبود دردهای مفصلی و نارسانیهای تنفسی استفاده می‌شده است و هنوز هم برای کنترل تب، اسهال و مشکلات قاعدگی استفاده می‌شود (۶). لقمان حکیم جوشانده دارچین را برای بیماریهای معده، روده، عصبانیت شدید و در شرایط پرخاشگری تجویز مینمود چون سبب تصفیه خون از سموم می‌شد. خواص داروئی دیگر دارچین شامل مواردی مانند رفع التهاب مفاصل، عفونتهای مثانه، دندان درد، بهبود سرما خوردگی و آنفلانزا می‌باشد (۳). خاصیت ضد باکتری، ضد ویروسی و ضد قارچی دارچین به دلیل دارا بودن اوژنول می‌باشد. دارچین در درمان عفونتهای واژینال ایجاد شده توسط کاندیدا آلبیکانس، زخم معده ناشی از هلیکوباتریلوری و نیز مسمومیتهای غذایی توسط باکتری E.Coli موثر است (۷ و ۸). امروزه دارچین به دلیل دارا بودن سینثول بعنوان ادویه غذایی رایج در اکثر نقاط جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و در امریکا رایج‌ترین ادویه مصرفی است (۲).

مطالعات نشان میدهد دارچین موثرتر از فرآورده‌های گیاهی دیگر نظری چای سبز، روغن زیتون، دانه سیر و پیاز در تنظیم متابولیسم گلوکز می‌باشد (۷ و ۹). تحقیقاتی که به تازگی بر روی دارچین صورت گرفته است، توانایی آن را در کاهش قند خون تقویت بخشیده است (۲). یک مطالعه نشان می‌دهد تجویز عصاره دارچین در رات‌های نر که تحت رژیم غذایی «فروکتوز فراوان» قرار گرفته اند، سبب کاهش مقاومت به انسولین احتمالاً از طریق فعالیت گیرنده انسولین می‌گردد (۱۰). پژوهشی که اخیراً انجام شده است، مشخص گردیده است دارچین به تنهایی سبب کاهش گلوکز خون در رات‌های دیابتی شده توسط استرپتوزوسین می‌گردد (۱۱).

اخیراً مشخص شده است استفاده از دارچین موجب تقویت اثرات انسولین در بیماری دیابت شده و در نتیجه متابولیسم گلوکز را بالا می‌برد (۱۲). شواهد فوق ما را برآن داشت که اثرات دارچین بر روی میزان گلوکز خون حیوانات دیابتیک به همراه انسولین به بوته آزمایش گذاشته شود.


مواد و روشها

در این مطالعه تجربی از ۴۰ سر رات نر نژاد NMRI (شرکت رازی؛



نمودار ۲- مقایسه غلظت گلوکز (mg/dl) در گروه دیابتی و گروه دیابتی + انسولینی $P<0.0001$

نمودار ۳ کاهش داد، انسولین به همراه دارچین موجب کاهش بیشتر قند خون به میزان ۴۱/۴ mg/dl شد. نمودار ۳ میانگین قند خون در دو گروه فوق را نشان میدهد.



نمودار ۳- مقایسه غلظت گلوکز (mg/dl) در دو گروه دیابتی + انسولینی و گروه دیابتی + انسولینی + دارچینی $P<0.01$


بحث و نتیجه‌گیری

تحقیقات بعمل آمده نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ ترکیب مختلف در دارچین وجود دارد که بیش از همه ماده‌ای بنام (Methyl Hydroxy Chalcone Polymer MHCP) در متابولیسم گلوکز اهمیت دارد(۱۲). این ماده به عنوان یک تقسیم‌کننده اثر انسولین شناخته شده است(۱۳). ادعا شده است ماده فوق همراه با انسولین سبب افزایش ورود گلوکز به داخل سلول می‌شود و با افزایش پاسخ به انسولین، مصرف گلوکز توسط سلول را حدود ۲۰ برابر بیشتر می‌کند(۷).

اطلاعات مربوط وارد کامپیوتر شده و به کمک نرم افزار Excel پردازش شدند. تجزیه و تحلیل آماری بین هر دو گروه توسط آزمون آماری Pair t-test و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. در آزمایشات فوق از دستگاه‌های اسپکتروفوتومتر (UV-Visible) مدل انکوباتور مدل بهداد - ساخت ایران، ترازوی دیجیتال مدل Sartrious و نیز دستگاه سانتریفیوژ استفاده شد.

یافته‌ها

با مقایسه میزان گلوکز خون در چهار گروه کنترل، گروه دیابتی، گروه دیابتی + انسولینی و گروه دیابتی + انسولینی + دارچینی نتایج زیر بدست آمد. نتایج داده‌های حاصل از گروه کنترل و گروه دیابتی نشان میدهد سطح گلوکز خون یک هفت‌پس از تریک استرپتوزوسین در گروه دیابتی با اختلاف معنی داری ($P<0.0001$) بالاتر از گروه کنترل بود. تریک داخل صفاقی استرپتوزوسین سبب افزایش قند خون از سطح متوسط ۸۸/۸ به ۴۰۰/۹ mg/dl شد. نمودار سه‌تمنی ۱ میانگین قند خون دو گروه فوق را نشان میدهد.



نمودار ۱- مقایسه غلظت گلوکز (mg/dl) در دو گروه کنترل و دیابتی $P<0.0001$

مقایسه داده‌های گروه دیابتی و گروه دیابتی + انسولینی نشان میدهد را تهائی که تحت درمان با انسولین قرار گرفتند کاهش معنی داری $P<0.0001$ در سطح گلوکز خون داشتند. انسولین سبب کاهش قند خون از سطح متوسط ۶۹/۶ mg/dl به ۴۰۰/۹ mg/dl گردید (نمودار ۲). نتایج بدست آمده از دو گروه دیابتی + انسولینی و گروه دیابتی + انسولینی + دارچینی نیز تفاوت معنی داری را با سطح $P<0.01$ نشان داد. در حالی که انسولین به تنهائی قند خون را به سطح متوسط

آنژیم کیناز-۳ PI است، سبب کاهش پاسخ بیولوژیک به انسولین و دارچین بطور مشابه میگردد(۱۷). در پژوهش دیگری آمده است که اثرات ترکیبی انسولین و دارچین میتواند موثرتر از اثرات هر یک به تنهائی باشد، یعنی آنها اثر سینergic دارند(۱۰). مشاهدات ما نیز این نتایج را بدنبال داشت (جدول و نمودار^۳). به هر حال ممکن است دارچین سبب کاهش قند خون در نمونه‌های دیابتیک گردد، ولی نمی‌توان مطمئن بود که در حیوانات غیر دیابتی نیز این اثر را داشته باشد(۱۱).

بعنوان نتیجه‌گیری کلی، با توجه به کاهش بیشتر قند خون در گروه دارچینی نسبت به گروه انسولینی میتوان گفت در افراد مبتلا به دیابت، استفاده از ماده MHCP و یا مشتقات دیگر موجود در دارچین ممکن است عملکرد انسولین را در آنها تقویت کند. در صورت حصول اطمینان از چنین نتیجه‌ای شاید بتوان در آینده از این ماده بیواکتیو در کترول بیماران دیابتی که مقاوم به انسولین هستند استفاده کرد و بدین ترتیب موجب کاهش ریسک فاكتورهای مرتبط با دیابت و بیماریهای قلبی - عروقی گردد.

References

- Day C, Baily C J, A. Diabetologist's herbal, Current medicine.Lit.diabetes, Roy. Soc Med 1998; (31):5:38
- Bailey, C J. Day, C. Traditional treatments for diabetes, Diabetes care 12 1989 553-564.
- میرزائی منصور. فارماکولوژی کاترونگ - ترور، چاپ پنجم، ۱۹۹۸، ص ۳۸۹
- Almedia H G, Campus J J, Souza M M. Profile of patients with diabetes type-I: insulinotherapy and self monitoring. Rev Assoc Mrd Bras 2002, 42(2):151-155.
- Gray A M, Flatt P R. Action of the traditional antidiabetic plant, Agrimony eupatoria(Agrimony): Effects on hyperglycemia, cellular glucose metabolism and insulin secretion. Br J Nutr 1998, 80(1): 109-114.
- آئینه‌چی یعقوب. مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران. ۱۳۶۵، ص ۲۶۱
- Quale J M, Landman, D, Zaman, M M, et.al. Invitro activity of Cinnamomum zeylanicum against azole resistant and sensitive Candida species and a pilot study of cinnamon for oral candidiasis., Am.J. Clin.Med, 1996; 24:103-109.
- Tabak M, Armon, R, Potasman I, Neeman I. Invitron inhibition of helicobacter pylori by extracts of thyme. J Appl Bacteriol 1996, 80(6): 667-672.
- Kulas DT, Zhang WR, Insulin receptor signaling is augmented by antisense inhibition of protein tyrosine phosphatase.J Biol Chem1995, 770(6):2435-8.
- Khan A, Safdar M, Ali Khan MM, Khattak KN, Anderson RA.Cinnamon improves glucose and lipids of people with type 2 diabetes. Diabetes Care 2003; 26(12):3215-8.
- Broadhurst CL, Polansky MM. Insuline- like biologicak activity of culinary and medicinal plant aquous extracts in vitro. J Agrc Food/Chem 2000, 48(3):849-52.
- Karalee J, Jarvill-Taylor, A. Hydroxchalcone drived from cinnamon functions asa mimetic for insulin in 3t3-L1 administration. Human Nutrion Res Center USDA 2001.
- Leung, A Y, Foster S, Encyclopedia of common Natural Ingredients used in foods, Drugsand cosmetics, 2ded. New York: john Wiley and sons, 1996; P:168-170.
- Lemus I, Garcia R, Delvillar E. Hypoglycemic activity of four plants used in children popular medicine. Phytother Res 1999; 13(2): 91-95.
- Onderoglu S, Sozer S, Mine Erbil, K, Ortac R, Lermioglu F. The evaluation of long-term effects of cinnamon bark and olive leaf on toxicity induced by streptozotocin administration to rats, J Pharm Pharmacol 1999; 51: 1305-1312.
- Lamers R, Moller NP. The transmembrane protein tyrosin phosphatase alpha dephosphorylates the insulin receptor in intact cells. FEBS Tett. 1997, 40(1): 37-40
- Imparl- Radosevich J, Deas S, Polansky MM. Regulation of ptp-I and insulin receptor kinase fractions from cinnamon. Implication for cinnamon regulation of insulin signaling. Horm Res 1998, 59(3):177-182.

The study of complementary effects of cinnamon on hypoglycemia induced by insulin in male diabetized rats using streptozotocin

*Parvizi M.R; MSc

Abstract

Background: Traditional treatments for diabetes with natural plants and or its derivatives such as cinnamon are known throughout the world. The assessment of cinnamon bark on decreasing blood glucose treated by insulin in male streptozotocin-diabetized rats.

Methods and materials: 40 male rats with average weight of 220 gr. were divided into four groups of 10: Control group, was taken only water and regular food. Diabetic group which is diabetized with 40 mg/kg intraperitoneal streptozotocin. Diabetic and insulin group, was treated by insulin NPH (5U/kg) after diabolized by streptozotocin. Diabetic and insulin and cinnamon group, was co-treated with insulin and oral cinnamon suspension. Plasma glucose was assayed using a glucose oxidase method.

Results: In cinnamon group, the blood sugar was decreased significantly more than insulin group($p<0.01$).

Conclusions: It is suggested, the bioactive compound(s) from cinnamon (probably MCHP-Methyl Hydroxy Chalcone Polymer) may potentiate the function of insulin in cinnamon group. However, the bioactive product(s) of cinnamon might provide a natural remedy against diabetes in future.

Keywords: Cinnamon, Diabetes, Hypoglycemia, Insulin, Streptozocin