

روش‌های جلوگیری از انتقال ارگانیسم‌های بیماری زا در بیمارستان و مواجهه با حمله‌های بیوتروپیستی

*دکتر مراد علی آهنگر^۱، دکتر محمد درویشی^۲

تاریخ اعلام قبولی مقاله: ۸۸/۸/۲۱

تاریخ اعلام وصول: ۸۸/۷/۱

دو برابر شود، بروز عفونت‌های بیمارستانی ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد (۴، ۶).

- از نظر میکروبیولوژی، میکرو ارگانیسم‌های پوست دو دسته‌اند (۵):

۱- فلور موقتی (Transient Flora)

میکروارگانیسم‌های موقتی بیماری‌زایی بالا دارند و علل شایع عفونت‌های بیمارستانی هستند، به راحتی با تماس دست منتقل می‌شوند و به سمتی به پوست متصل می‌باشند و به راحتی با شستن پوست کنده می‌شوند.

۲- فلور مقیم (Resident Flora)

میکرو ارگانیسم‌های مقیم بیماری‌زایی (ویرولانس) پایین دارند و به ندرت به بیماران دیگر منتقل می‌شوند (مگر اینکه توسط اقدام‌های تهاجمی منتقل شوند). این ارگانیسم‌ها به ندرت با شستن دست بر طرف می‌شوند (۶).

محلول‌هایی با پایه الکلی (Alcohol-based Hand Rubs) به عنوان عوامل پیشنهادی در بهداشت دست در بیمارستان توصیه شده‌اند. در مواردی که دست به وضوح با مواد عفونی آلوده شده باشد (Soil) باید دست را با آب و صابون شست، ضد عفونی دست باید قبل و بعد از تماس با بیمار و بلافاصله پس از در آوردن دستکش انجام گیرد (۳).

ب - دستکش (Gloves):

پوشیدن دستکش باعث جلوگیری از انتقال میکروارگانیسم‌ها به دست معاینه کننده می‌شود و این به نوبه خود مانع از انتقال آن به سایر بیماران و کادر درمانی دیگر خواهد شد. ولی پوشیدن

مقدمه

هدف از ایزولاسیون در بیمارستان جلوگیری از انتقال میکرو ارگانیسم‌های بیماری زا از بیماران عفونی پا واجد عفونت کولونیزه به سایر بیماران، ملاقات کنندگان و کادر درمانی می‌باشد. چون این روند گران، وقت گیر و باعث اختلال در مراقبت پزشکی (Medical care) بیماران می‌شود، بنابراین موقعی باید انجام شود که لازم باشد. از طرف دیگر عدم انجام این روند در بیماری که نیاز به آن دارد باعث موربیدیتی و مورتالیتی در بیماران می‌شود.

براساس توصیه‌های (CDC (Center of Disease Control) (۱۳، ۱) ایزولاسیون دو مرحله‌ای (Two- Tiered Approach) است:

۱- احتیاط‌های استاندارد (Standard Precaution)

این احتیاط‌های در موقع مواجهه با تمام بیماران باید رعایت شود. وقتی احتمال تماس دست‌ها با هر ترشحی از بیمار (جزء عرق) وجود داشته باشد، به طور حتم باید دستکش دست کرد (چه ترشحات به خون آلود باشد یا نباشد و چه از پوست باشد و یا از مخاط باشد) (۱). دست‌ها بلا فاصله پس از در آوردن دستکش‌ها و در فاصله بین ویزیت دو بیمار نیز باید شسته شوند. برای کارهایی که احتمال پاشیدن (Splash) وجود داشته باشد باید محافظت از چشم و صورت (Face Shield) و نیز پوشیدن گان (Gown) را در نظر داشت.

الف) - بهداشت دست (Hand Hygiene)

شستن دست‌ها مهمترین راه جلوگیری از انتقال عفونت‌های بیمارستانی (Nosocomial Infections) می‌باشد (۲). ولی رعایت آن فقط در ۵۰٪ کارکنان ICU ادیله می‌شود (۳). تحقیق‌های نشان داده است اگر رعایت شستن دست توسط کادر درمانی ICU

۱- استادیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشکده پزشکی، گروه طب اورژانس، بیمارستان بعثت (نویسنده مسؤول)

تلפון: ۰۲۱-۳۹۹۵۰۴۰۰ آدرس الکترونیک: dr_ahangar@armyums.ac.ir

۲- استادیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشکده پزشکی، گروه بیماری‌های عفونی و گرمیسری، بیمارستان بعثت

جدول ۱- اقدام‌های اساسی ایزو لاسیون

contact	Droplet	Airborn
اتاق اختصاصی.	اتاق اختصاصی.	اتاق اختصاصی که تهويه با فشار منفی آن به بیرون ساختمان راه داشته باشد.
برای اعمالی که احتمال پاشیدن خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretion) و ماده دفعی (Excretion) وجود دارد.	ماسک جراحی برای کسانی که وارد اتاق می‌شوند و یا بیماری که از اتاق بیرون برده می‌شود.	در اتاق همیشه بسته باشد.
برای اعمالی که احتمال پاشیدن خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretion) و ماده دفعی (Excretion) وجود دارد.	استفاده از ماسک N95 یا رسپیراتور قابل حمل برای کسانی که وارد اتاق می‌شوند.	استفاده از ماسک (Mask) ماسک جراحی روی دهان بیمار وقتی خواستیم وی را به بیرون اتاق منتقل کنیم.
برای اعمالی که احتمال پاشیدن خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretion) و ماده دفعی (Excretion) وجود دارد.	برای اعمالی که احتمال پاشیدن خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretion) و ماده دفعی (Excretion) وجود دارد.	محافظه چشم و صورت (Face / Eye Protection) برای اعمالی که احتمال پاشیدن خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretions) و ماده دفعی (Excretion) وجود دارد.
برای اعمالی که احتمال پاشیدن خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretions) و ماده دفعی (Excretion) وجود دارد.	برای اعمالی که احتمال پاشیدن خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretions) و ماده دفعی (Excretion) وجود دارد.	گان (Gown) برای اعمالی که احتمال تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretions) و ماده دفعی (Excretion) وجود دارد.
برای اعمالی که احتمال تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretions)، ماده دفعی (Excretion)، آلوده وجود دارد.	برای اعمالی که احتمال تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretions)، ماده دفعی (Excretion)، مخاطها و زخم آلوده وجود دارد.	دستکش (Glove) برای اعمالی که احتمال تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretions)، ماده دفعی (Excretion)، مخاطها و زخم آلوده وجود دارد.
پس از تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretions)، ماده دفعی (Excretion) و موارد آلوده و بلا فاصله (Excretion) پس از درآوردن دستکش و بین معاینه بیماران باید دست‌ها شسته شود.	پس از تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretions)، ماده دفعی (Excretion) و موارد آلوده و بلا فاصله (Excretion) پس از درآوردن دستکش و بین معاینه بیماران باید دست‌ها شسته شود.	بهداشت دست (Hand Hygiene) پس از تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات (Secretions)، ماده دفعی (Excretion) و موارد آلوده و بلا فاصله (Excretion) پس از درآوردن دستکش و بین معاینه بیماران باید دست‌ها شسته شود.

از ۵ میکرون می‌باشد که در هوا به صورت معلق مانده و به مسافت‌های دور دست پراکنده می‌شود. اگر از طریق هوا وارد ریه میزانی شود باعث عفونت می‌شود. بیماری‌هایی مثل سل (TB)، سرخک،... از این دسته می‌باشند.

این بیماران باید در اتاق خصوصی قرار گیرند که فشار هوای منفی دارد و هر ساعت ۶ بار هوای اتاقش عوض شود. در ورودی اتاق آنها باید همیشه بسته باشد. هوای اتاق خصوصی باید به خارج ساختمان تهويه شود. کلیه کسانی که وارد اتاق می‌شوند باید ماسکی بزنند که

دستکش هرگز نمی‌تواند جای بهداشت دست را بگیرد.
۲- احتیاط‌های اختصاصی Based (Transmission - Precaution)

گاهی اوقات در بعضی بیماران علاوه بر احتیاطات استاندارد، بر اساس راه انتقال عامل عفونی آن بیماری به احتیاط اختصاصی خاص نیز نیازمندیم (۱). جدول (۲):
الف) بیماری‌هایی که از طریق هوا منتقل می‌شود (Airborne Diseases) در این بیماری‌ها، اساس انتقال به وسیله قطرات کمتر

جدول ۲- اندیکاسیون‌های اختیاط‌های اختصاصی (Indications for Transmission- Based Precautions)
 الف) ستاریوهای بالینی که اختیاج به اجرا کردن اختیاط‌های امپریکال (Empirical) دارند:

Contact Precaution	Droplet Precautions	Airborne Precautions
۱) اسهال حاد با بی اختیاری	۱) منژیت.	۱) راش وزیکولر.
۲) راش وزیکولر.	۲) راش پنثی یا اکیموز به همراه تب.	۲) راش ماکولوپاپولر با تب و کوریزا.
۳) اسهال بالغین با مصرف آنتی بیوتیک اخیر سرفه، تب و ارتشاج لوب فوکانی ریه.	۳) سرفه قطاری شدید در بیمار سیاه سرفه.	۳) سرفه، تب و ارتشاج لوب فوکانی ریه.
۴) وجود آبسه یا زخمی که قابل پوشاندن نمی‌باشد.		۴) سرفه تب و ارتشاج ریوی در ایدز.
۵) احتمال عفونت با پاتوژن مقاوم به چند دارو.		

ب) وقتی که بیماری یا پاتوژن شناخته شده یا مشکوک در کار است:

Contact Precaution	Droplet Precautions	Airborne Precautions
۱) آبسه با درناث غیر قابل کنترل	۱) آدنو ویروس	۱) سرخ
۲) آدنو ویروس	۲) دیفتری حلقی	۲) سل
۳) سلولیت با درناث غیرقابل کنترل	۳) منژیت و اپی گلوتیت هموفیلوسی	۳) آنفلوانزا مرغی
۴) اسهال کلستریدیایی		۴) آبله
۵) ورم ملتحمه ویروسی حاد	۵) منتگوکوک	۵) آبله مرغان
۶) زخم بستر عفونی و ترشح دار	۶) اوریون	۶) تب خونریزی دهنده ویروسی
۷) دیفتری پوستی	۷) مایکوپلاسما	۷) زونا
۸) زرد زخم	۸) سیاه سرفه	
	۹) طاعون (پنومونی)	

ج) بیماری‌های که از طریق تماس مستقیم منتقل می‌شوند
 (Contact Precaution)

این اختیاط‌ها برای بیماری‌هایی اعمال می‌شود که با تماس مستقیم (لمس بیمار) و یا تماس غیر مستقیم (تماس با اجسام آلوده در محیط بیمار) منتقل می‌شوند. از این دسته ارگانیسم‌ها می‌توان به ارگانیسم‌های مقاوم به چند دارو (Multi Drug Resistant Organism) به طور مثال انتروکوک مقاوم به وانکومایسین و یا استاف طلایی مقاوم به متی سیلین اشاره نمود. اندیکاسیون‌های دیگر اختیاج به مراقبت تماسی عبارتند از: انتریت کلستریدیایی، عفونت دهانی- مدفوعی در کسانی که بی اختیاری مدفوع دارند، عفونت ناحیه کشاله ران و پرنیه دارند و بیماری اسهال حاد (که احتمال کشنده بودن آن زیاد است).

باید با وارد شدن به اتاق بیمار دستکش پوشید و بلافصله پس از در آوردن دستکش، دست خود را شست. اگر بیمار اسهال، کولوستومی و درناث زخم دارد باید گان پوشید. قبل از خروج از

اجسام ۱میکرون را با قدرت حداقل ۹۵٪ فیلتر کند (N95 Mask).

ب) بیماری‌هایی که از طریق قطرات بزرگ منتقل می‌شوند (Droplet Precautions)

گاهی اوقات قطرات حاوی میکروب بزرگ می‌باشند و به صورت Aerosol در آمده و در پی صحبت کردن بیمار، سرفه و عطسه کردن این قطرات روی مخاط بینی، دهان و چشم می‌نشینند و باعث عفونت می‌شود. بنابراین انتقال آنها از طریق معلق ماندن در هوای نمی‌باشد. این بیماران نیز باید اتاق خصوصی داشته باشند ولی مراقبت تهويه‌ای مخصوص لازم ندارند. بیماران با عفونت‌های مشابه این گونه را می‌توان در یک اتاق نگهداری کرد. احتیاج به بستن درب اتاق نمی‌باشد. در موقعی که می‌خواهیم نزدیک‌تر از ۳ فوت (نود سانتی‌متر) با بیمار کار کنیم باید ماسک جراحی استاندارد بزنیم. در انتقال این بیماران به خارج اتاق باید به وی ماسک زده شود. از جمله این بیماری‌ها می‌توان به منتگوکوک، پنو موکوک، سیاه سرفه و.... اشاره کرد.

تولارمی (*Francisella Tularensis*) و تب خونریزی دهنده ویروسی (*Arenaviruses*) اشاره کرد. در موقع بیوتروریسم، در تمام موارد فوق به احتیاط‌های استاندارد نیاز داریم ولی در مواردی که پنومونی طاعون مطرح باشد به احتیاط‌های Droplet (۹) و در مواردی که آبله و تب خونریزی دهنده مطرح باشد به احتیاط‌های Airborne (۱۰) و Contact (۱۱) نیاز داریم. (جدول-۳)

۲- عوامل دسته B (Category B Agents)

پاتوژن‌هایی هستند که احتمال انتقال فرد به فرد پایین دارند و میزان موربیدی و مورتالیتی پایین تری دارند.

از آن جمله می‌توان به بروسلوز (*Brucella Spp.*), توکسین کلستریدیوم، پیستاکوز (*Chlamydia Psittaci*) و تب Q (Coxiella Burnetii) نام برد. در موقع بیوتروریسم با این عوامل، فقط به احتیاط‌های استاندارد در مواجهه با بیماران نیاز داریم (جدول-۳).

اتاق ایزوله گان باید در آورده شود. وسایل مورد استفاده معاینه (گوشی پزشکی، کاف فشار سنج) باید در اتاق ایزوله بماند و در اتاق‌های دیگر استفاده نشود.

بیوتروریسم

احتیاط‌های ایزولاسیون در مواجهه با عفونت‌های مرتبط با بیوتروریسم (Bioterrorism – Associated Infections) براساس نوع عفونت دخیل متفاوت می‌باشد. مرکز کنترل بیماری‌ها (CDC) عوامل بیوتروریسم را به دو دسته A و B تقسیم‌بندی می‌کند:

۱- عوامل دسته A (Category A Agents)

اینها پاتوژن‌هایی هستند که به راحتی از یک فرد به فرد دیگر منتقل می‌شوند، مورتالیتی بالا دارند و اثرهای (Impacts) سنگینی روی سلامت جامعه بر جای می‌گذارند (۸).

از آن جمله می‌توان به آنتراکس (*Bacillus Anthracis*), بوتولیسم (*Variola*), طاعون (*Yersinia Pestis*), *Clostridium Botulinum*)

جدول-۳- احتیاط‌های ایزولاسیون در مواجهه با عفونت‌های مرتبط با بیوتروریسم (Isolation precautions for Bioterrorism – Associated Infections)

احتیاط‌ها				عامل (Agent)
CONTACT	DROPLET	AIR BORN	STANDARD	
				عوامل دسته A (Category A Agents)
		X		(۱) آنتراکس (<i>Bacillus anthracis</i>)
		X		(۲) بوتولیسم (<i>Clostridium toxin</i>)
X		X		(۳) طاعون (<i>Yersinia pestis</i>)
X	X	X		(۴) آبله (<i>Variola</i>)
		X		(۵) تولارمی (<i>Francisella tularensis</i>)
X	X	X		(۶) تب خونریزی دهنده ویروسی (<i>Frloviruses, Arenaviruses</i>)
				عوامل دسته B (Category B Agents)
		X		(۱) بروسلوز (<i>Brucella spp.</i>)
	X			(۲) توکسین کلستریدیوم (<i>Clostridium perfringens toxin</i>)
	X			(۳) پیستاکوز (<i>Chlamydia psittachi</i>)
	X			(۴) تب Q (<i>Coxiella burnetii</i>)
	X			(۵) تیفوس (<i>Rickettsia prowazekii</i>)
	X			(۶) آنسفالیت ویروسی (<i>Venezuelan equine</i>)

References

- 1- Garner JS. Hospital infection control practices advisory committee. Guidline for isolation precautions in hospitals. Infect control hosp Epidemiol 1996;17:53-80.
- 2- Bauer TM, Ofner E, Just HM, et al. An epidemiological study assessing the relative importance of airborne and direct contact transmission of micoorganismin in a medical intensive care unit. J Hosp Infect 1999;15:301- 9.
- 3- Boyee JM, Pittet D. Health care infection control practices advisory committee, Society for healthcare Epidemiology of America, Association for professionals in infection control, infectious Disease society of America Hand Hygiene task force. Guidline for Hand Hygiene in health – care settings: Recommendations of the Health care infection control practices advisory committee and HICPAC / SHEA/ APIC/ IDSA Hand Hygiene task force. Infect control hosp Epidemiol 2002;23(suppl):s3-s40.
- 4- Doebbeling BN, Stanley GL, Sheetz CT, et al. Comparative efficacy of alternative hand – washing agents in reducing nosocomial infections in intensive care units. N ENGL J MED 1992;327:88.
- 5- Price PB. The bacteriology of normal skin, a new quantitative test applied to a study of the bacterial flora and the disinfectant action of mechanical cleaning. J infect Dis 1988;63:301.
- 6- Streere AC, Mallison GF. Hand – washing practices for prevention of nosocomial infections. Ann Intern Med 1975;8:683-90.
- 7- Center for disease control and prevention. guidelines for preventing the transmission of mycobacterium tuberculosis in health – care facilities. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1994;43:1-132.
- 8- Center for disease control and prevention. Public health emergency preparedness and response;biological agents / diseases. Available at: <http://www.bt.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp# a>.
- 9- Inglesby TV, Dennis DT, Henderson DA, et al. Plague as a biological weapon;Medical and public health management. JAMA 2000;283:2281-90.
- 10- Henderson DA, Inglesby TV, Bartlett JG. et al. Smallpox as a biological weapon; Medical and public health management. JAMA 1999;2127-290.
- 11- Borio L, Inglesby T, Peters CJ, et al. Hemorrhagic fever viruses as a biological weapons; Medical and public health management. JAMA 2002;287:2391–405.

روش‌های جلوگیری از انتقال ارگانیسم‌های بیماری زا در بیمارستان و مواجهه با حمله‌های بیوتورویستی

د - اسهال حاد با بی اختیاری

سوال ۸: کدامیک از بیماری‌های زیر نیاز به احتیاطات Airborne ندارد؟

- الف - سرخک
- ب - زونا
- ج - آبله
- د - اوریون

سوال ۹: کدامیک از عفونت‌های مرتبط با بیوتورویسم زیر، براساس

تقسیم‌بندی CDC از عوامل دسته A نمی‌باشد؟

- الف - بروسولوز
- ب - آبله
- ج - طاعون
- د - آنتراسک

سوال ۱۰: کدامیک از عفونت‌های مرتبط با بیوتورویسم تنها به احتیاطات استاندارد نیاز دارد؟

- الف - بوتولیسم
- ب - آبله
- ج - تب خوبنیزی دهنده ویروسی
- د - طاعون

پاسخ نامه					شماره سوال
د	ج	ب	الف		
					۱
					۲
					۳
					۴
					۵
					۶
					۷
					۸
					۹
					۱۰

نام و نام خانوادگی پاسخ‌دهنده:

آدرس پستی و تلفن تماس پاسخ‌دهنده:

.....

خواهشمند است جهت کسب امتیاز بازآموزی پاسخ‌های خود را به

آدرس: تهران خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتماده، جنب

بیمارستان امام رضا (ع) (۵۰۱)، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم

پزشکی ارشد جمهوری اسلامی ایران، طبقه سوم، دفتر مجله ارسال

نمایید.