



بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا

مهدی ناصری تفتی^{۱*}، فاطمه یوسفی^۱، محمد رضازاده^۱، حسین سبزی^۱، رامین اوجانی^۲

۱- مرکز تحقیقات کشاورزی و بیوشکی هسته‌ای، سازمان افزای اتمی ایران، صندوق پستی: ۳۱۴۸۵-۴۹۸، کرج - ایران

۲- مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، تحقیقات دانه‌های روغنی، کرج - ایران

چکیده: لاین‌های خالص جهش‌یافته^(۱) زودرس سویا که حاصل جهش زایی در اثر پرتودهی گاما به وسیله ⁶⁰Co با دزهای جذبی ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ گری بودند، به منظور ارزیابی صفات زراعی و مقایسه عملکرد آنها با دو رقم تجاری کلارک و ویلیامز، در دو منطقه کرج و الشتر (خرم آباد) در قالب طرح آزمایشی شبکه‌ای ساده ۷×۷ متر در دو تکرار کاشته شدند. در کرج، یعنی عملکرد لاین‌های جهش‌یافته و عملکرد آنها در مقایسه با رقم ویلیامز تفاوت معنی دار آماری در سطح ۱٪ و با رقم کلارک در سطح ۵٪ وجود داشت. لاین شماره ۴۷ با عملکرد ۴۷۸۲ کیلوگرم دانه در هکتار، رتبه اوّل و لاین شماره ۳۸ با ۴۷۲۲ کیلوگرم دانه در هکتار رتبه دوم را داشت و تعدادی از لاین‌ها ۱۰ تا ۱۲ روز نسبت به ارقام تجاری شاهد زودرس تر شدند. در الشتر، عملکرد دانه‌ای لاین‌های جهش‌یافته نسبت به رقم تجاری و پرمحصلو ویلیامز تفاوت معنی دار آماری در سطح ۵٪ داشت. بالاترین عملکرد دانه‌ای به لاین ۴۷ اختصاص داشت که معادل ۳۱۴۷ کیلوگرم در هکتار بود. دوره رویش آن نیز حدود دو هفته نسبت به رقم زودرس کلارک کوتاه‌تر بود. تجزیه و تحلیل عملکردهای دانه‌ای دو منطقه کرج و الشتر نشان دادند که عملکردهای دانه‌ای لاین جهش‌یافته نسبت به رقم تجاری کلارک و ۳۶ لاین جهش‌یافته نسبت به رقم تجاری ویلیامز برتری داشتند. لاین جهش‌یافته ۱۸ با عملکرد دانه‌ای ۳۶۴۳ کیلوگرم در هکتار رتبه اوّل را داشت و در هر دو منطقه نسبت به دو رقم تجاری شاهد (کلارک و ویلیامز) زودرس تر بود.

واژه‌های کلیدی: سویا، زودرسی، دز جذبی، جهش زایی^(۲)، جهش زایی^(۳)

Evaluation of Soybean Mutants Evolved from Gamma Irradiation

M. Naseri Tafti*, F. Yousefi, M. Rezazadeh, H. Sabzi, R. Ojani

1- Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine, AEOI, P.O.Box: 31485-498, Karaj – Iran
2- Seed and Plant Improvement Institute, Karaj - Iran

Abstract: Pure early soybean mutants evolved through mutagenesis (Co-60) from cultivar Clark irradiated with doses 100Gy, 150Gy, 200Gy and 250Gy (absorbed dose) were evaluated for agronomical traits and compared with two commercial cultivars ; Clark and Williams in two regions, Karaj and Alishtar. Experimental design was conducted in a simple lattice (7m x 7m) with two replications. A significant statistical difference in yield existed at 1 and 5 percent level among mutant lines and between mutants – Williams and mutants – Clark, respectively in Karaj. The mutant line number 47 placed itself at the top of the list with the yield of 4782 Kg/hect., followed by mutant line number 38 with 4722 Kg/hect. A number of mutant lines matured between 10 to 12 days earlier than the commercial soybean cultivars used as checks in the experiment. In Alishtar seed yield of mutant lines compared to the cultivar Williams showed a significant difference at 5% level. The highest seed yield of 3147 Kg/hect. belonged to the mutant line 47 which also matured two weeks earlier compared to the cultivar Clark. The compound analysis of seed yield in Karaj and Alishtar showed superiority of 15 mutant lines over the cultivar Clark and 36 mutant lines over the cultivar Williams. The mutant line number 18 producing seed yield of 3643 Kg/hect. ranks first in the list while, it matured earlier than both check cultivars, Clark and Williams.

Keywords: soybean, early maturity, absorbed dose, mutagen, mutagenesis

۳- بحث و نتیجه گیری

زودرس کردن گیاه، با توجه به کوتاه کردن دوره رویش آن، معمولاً باعث کاهش عملکرد بهنه گیاه می‌شود. در پاره‌ای از موارد، ترکیهای تازه‌ای از تأثیر عامل جهش‌زا (پرتودهی گاما) ایجاد می‌شوند که با وجود کوتاه شدن دوره رویش، تأثیر منفی بر عملکرد ندارند، بلکه باعث افزایش ژنهای مؤثر در فرایند عملکرد می‌شوند.

کوتاه کردن مدت گل‌دهی و زودرس کردن گیاه به روش جهشی به وسیله پرتودهی گاما به عنوان عامل جهش‌زا گزارش شده است [۲]. به طور کلی احتمال ایجاد گلهای زودرس فیزیولوژیکی نسبت به ایجاد دیررسی، کمتر است [۳ و ۴]. بررسی‌های عملکرد گیاه، از جمله صفت کمی و تغییرات حاصل در مدت سبلده‌دهی یا به غلاف رفتن مواد ژنتیکی پرتودهیده، یانگر این است که احتمال پیدایش این تغییرات برای هر دو صفت زودرسی و دیررسی یکسان است و در موارد دیگر، چنین تغییراتی بیشتر در جهش‌یافته‌های دیررسی به وجود می‌آیند [۶]. بعضی از صفات، به ویژه عملکرد دانه، ممکن است در اثر زودرسی تغییر کند و در آخر کاهش یابد [۵]. تعدادی از محققان مدعی ایجاد بسیاری از جهش‌یافته‌های زودرس هستند که به لحاظ عملکرد دانه نسبت به رقم مادر کمبودی نداشته‌اند. بین عملکرد (دانه + بوته) و هنگام رسیدگی فیزیولوژیکی همبستگی یافت می‌شود، همبستگی عملکرد دانه به عملکرد کل گیاه (دانه + بوته) نیز وجود دارد [۷ و ۸].

همبستگی معنی‌دار بین زودرسی و ارتفاع بوته نیز گزارش شده است [۹]. همچنین کاهش تعداد گره‌ها و کاهش "میان گره" در پایه و افزایش آن در رأس بوته، و در نتیجه تغییر ارتفاع بوته گزارش شده است [۵]. صفات زراعی دیگر مانند طول خوش، وزن هزار دانه، تعداد دانه‌ها در خوش، پایداری ساقه، مقدار پروتئین در جهش‌یافته‌های زودرس نیز تغییر یافته‌اند [۲].

با توجه به وسعت و راثت‌پذیری صفت زودرسی، با وجود مغلوب شدن جهش‌یافته‌های درشت زودرس در مقایسه با ساختار ژنتیکی منشاء آنها، جهش‌یافته‌های زودرس غالب و نیمه غالب گزارش شده است [۱۰ و ۱۱]، Boros و Szymer [۱۱] دو رقم سویای لهستانی و کانادایی را به منظور کوتاه کردن دوره رویش

۱- مقدمه

سویا گیاهی است از راسته Fabales، تیره Fabaceae (بالقلابی) و سرده Glycine که به دو زیر جنس Soya و Glycine تقسیم می‌شود. زیر جنس Soya دارای دو گونه G. max و G. soya می‌باشد. G. max گونه‌ای زراعی است که به صورت وحشی دیده نشده است. سویا در اوایل قرن بیست میلادی به عنوان گیاه "دانه روغنی" شناخته شده است و اکنون یکی از منابع اصلی تولید روغن و پروتئین در جهان محسوب می‌شود [۱].

در حال حاضر، سویا در سطحی حدود صد هزار هکتار در ایران کشت می‌شود که $\frac{1}{80}$ آن به صورت کشت دوم، یعنی بعد از برداشت غلات است. در این کشت سویا باید ارقام زودرس تری بکار روند که قابلیت تولید محصول بیشتری دارند. یکی از راههای دستیابی به این ارقام، بهره‌وری از فناوری جهشی (موتاپسیون) به وسیله پرتودهی گاما به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در یاخته‌های زایای (ژرم پلاسم) این گیاه است.

۲- مواد و روش تحقیق

در این کار پژوهشی، تعداد ۴۷ لاین جهش‌یافته خالص سویا از رقم کلارک که با دزهای جذبی ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ گری، به عنوان عامل جهش‌زا پرتودهی گاما شده بودند، در یک طرح آزمایشی شبکه‌ای ساده 7×7 متر در دو تکرار در مناطق کرج و الشتر کاشته شدند. هر تیمار در یک کرت آزمایشی مشتمل بر ۴ خط ۴ متری، به فاصله ۶۰ سانتی‌متر از هم طراحی شد. عمل برداشت از قسمتهای وسط دو خط میانی در باکتری مخصوص آگشته و سپس به طور ردیف کاشته شدند. در مدت دوره رویش، همه صفات زراعی و ریخت شناختی (تیمارها یادداشت و ثبت شدند. پس از برداشت، عملکرد دانه‌ای، وزن هزار دانه، دوره رویش، درصد روغن و پروتئین آنها نیز معین شدند، و براساس کلیه عاملهای مورد نظر، تیمارهای مناسبی به منظور بررسی ایستگاهی در چند منطقه و در مدت دو سال برگزیده شدند. تجزیه و تحلیل آماری براساس طرح شبکه‌ای ساده 7×7 متر عملکرد دانه‌ای، برای هر منطقه به طور جداگانه و برای دو منطقه کرج و الشتر با هم انجام گرفت.



(۴۴۰۲ و ۲۸۸۴ کیلوگرم در هکتار) و نسبت به رقم کلارک ۱۵ تا ۲۰ روز زودرس تر است، علاوه بر این، عملکرد بالاتری را نیز نشان می‌دهد.

پرتودهی کردند و موفق به دستیابی به تنوع در طول دوره روش و عملکرد دانه نسبت به ارقام مادری شدند. Bhatnagar و Tivari [۱۲] دو رقم سویا به نامهای Bhat و Bragg را با دزهای ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ گرمی پرتودهی گاما کردند. لاین‌های جهش‌یافته حاصل از انتخاب در مقایسه با ارقام مادری، علاوه بر ۱۵ روز زودرس تر بودن، از عملکرد برتری نیز برخوردار شدند. Mohandgiev [۱۳] تأثیر توأم جهش‌زاهای فیزیکی (پرتوهای یوننده) و شیمیابی را به منظور اصلاح پارهای از صفات مانند زودرسی، مقاومت در مقابل بیماری و تحمل آن، ترکیب آمینو اسیدهای پروتئین را به لحاظ ایجاد طیف وسیعتر جهش‌یافته‌های مطلوب پیشنهاد کرده است.

ذاکری [۱۴] با استفاده از جهش‌زاهای فیزیکی و شیمیابی در تنوع‌های سویا، دو لاین جهش‌یافته خالص را جدا کرد که ارتفاع بوته‌های آنها نسبت به رقم مادری کوتاه‌تر بود. یکی از این لاین‌ها علاوه بر عملکرد بیشتر، برتری دیگر آن بر رقم مادری، زودرسی قابل توجه، حدود ۱۴ روز، بود.

عملکرد دانه‌ای لاین‌های جهش‌یافته نشان می‌دهد که نسبت به چون تأثیر مقدار دُر پرتودهی جهش‌زا بستگی به زادمن [۵] دارد. لاین جهش‌یافته که ارتفاع بوته آن در حد رقم ویلیامز ولی نسبت به رقم کلارک ۷ سانتیمتر کوتاه‌تر است. بیشتر لاین‌های جهش‌یافته از رقم کلارک و تعدادی از آنها از رقم ویلیامز زودرس ترند.

گیاه مورد بررسی دارد نمی‌توان دُر معینی را برای همه زادمنهای گیاه مورد بررسی انتخاب کرد.

۴- نتیجه تجزیه و تحلیل مرکب عملکرد دانه‌ای در دو منطقه کرج و الشتر
لاین جهش‌یافته ردیف ۱۸ در هر دو منطقه زودرس تر از رقم کلارک است (جدول ۱) و بالاترین عملکرد، یعنی ۳۶۴۳ کیلوگرم در هکتار را دارد. در مجموع، از میان ۴۷ لاین جهش‌یافته، ۱۸ لاین براساس عملکرد دانه‌ای، طول دوره روش، ارتفاع بوته، کیفیت بذری، وزن هزار دانه، میزان درصد روغن و پروتئین انتخاب شدند. این لاین‌ها براساس نتایج حاصل از محصول دو منطقه و نگرش کلی به کیفیت آنها در تجزیه و تحلیل واریانس ساده در هر منطقه و تجزیه و تحلیل واریانس مرکب انتخاب شدند. نتایج این تجزیه و تحلیل‌ها در جدولهای ۲ تا ۶ مندرج است.

عملکرد دانه‌ای لاین‌های جهش‌یافته نشان می‌دهد که نسبت به عملکردهای دانه‌ای دو رقم ویلیامز و کلارک تفاوت معنی‌دار آماری به ترتیب در سطح ۱٪ و ۵٪ داشته‌اند. در مجموع، عملکرد دانه‌ای ۲۰ لاین جهش‌یافته در مقایسه با رقم کلارک و عملکرد دانه‌ای ۳۵ لاین جهش‌یافته در مقایسه با رقم ویلیامز بیشتر بوده است. لاین ردیف ۷ از تیمارهای ۱۰۰ گرمی بیشترین عملکرد دانه‌ای را دارد (۴۷۸۲ کیلوگرم در هکتار). ارتفاع بوته این لاین ۱۰۰ سانتیمتر است که نسبت به رقم کلارک ۵ سانتیمتر بلندتر است، لیکن طول دوره روش آن با رقم کلارک تفاوت محسوسی ندارد. لاین ردیف ۳۸ با عملکرد ۴۷۲۲ کیلوگرم در هکتار در مربه بعد قرار دارد. این لاین نیز از نظر ارتفاع بوته و طول دوره روش با رقم کلارک تفاوتی ندارد. تعدادی از لاین‌های جهش‌یافته رقم کلارک، ۱۰ تا ۱۳ روز زودرس تر شده‌اند که برترین آنها لاین ردیف ۱۸ است. این لاین در هر دو منطقه کرج و الشتر از عملکرد قبل ملاحظه‌ای برخوردار است

جدول ۱ - عملکرد دانه‌های جهش بافته خالص سویاًی کرج و الشتر - ۱۳۷۶

عملکرد در هکتار (کیلوگرم)	پرتودهی (گروی)	رقم	ردیف	عملکرد در هکتار (کیلوگرم)	پرتودهی (گروی)	رقم	ردیف
۳۱۵۰	۱۰۰	Clark	۲۶	۳۱۸۳	۱۰۰	Clark	۱
۲۹۸۵	"	"	۲۷	۲۶۷۱	"	"	۲
۳۱۲۳	"	"	۲۸	۳۰۳۴	"	"	۳
۲۹۸۵	"	"	۲۹	۳۲۸۹	"	"	۴
۳۰۸۰	۱۰۰	"	۳۰	۳۰۸۴	"	"	۵
۲۸۸۵	"	"	۳۱	۲۷۸۰	"	"	۶
۲۸۲۲	"	"	۳۲	۳۰۶	"	"	۷
۳۲۱۷	"	"	۳۳	۲۹۲۰	"	"	۸
۲۷۲۳	"	"	۳۴	۲۷۸۸	"	"	۹
۳۰۲۰	"	"	۳۵	۲۹۶۹	"	"	۱۰
۲۹۰۶	۲۰۰	"	۳۶	۲۲۲۶	"	"	۱۱
۲۰۰۶	"	"	۳۷	۳۲۸۶	"	"	۱۲
۲۰۲۰	۲۰۰	"	۳۸	۳۲۸۱	"	"	۱۳
۳۶۲۰	"	"	۳۹	۳۱۹۳	"	"	۱۴
۲۷۰۰	"	"	۴۰	۲۹۱۳	"	"	۱۵
۳۰۸۱	"	"	۴۱	۳۰۶۸	"	"	۱۶
۳۲۱۰	"	"	۴۲	۲۵۸۹	"	"	۱۷
۲۰۲۲	"	"	۴۳	۳۶۴۳	"	"	۱۸
۲۷۰۲	"	"	۴۴	۲۸۲۰	"	"	۱۹
۳۰۰۲	"	"	۴۵	۳۲۶۱	"	"	۲۰
۲۹۷۰	"	"	۴۶	۳۰۱۰	"	"	۲۱
۲۹۰۱	"	"	۴۷	۲۰۴۲	"	"	۲۲
۲۹۰۴	"	Williams	۴۸	۳۱۰۱	"	"	۲۳
۳۲۱۰	"	Clark	۴۹	۳۱۸۳	"	"	۲۴
				۳۰۶۱	"	"	۲۵

جدول ۲ - تجزیه و تحلیل واریانس کرج

میانگین مربعات	مجموع مربعات	درجه آزادی	منبع تغیرات
	۰/۹۹۸	۱	تکرار
	۲۶/۳۰۹	۴۸	تیمار
	۷/۲۷۴	۱۲	بلوک
۰/۶۰۶	۸/۲۷۷	۳۶	اشتباه بین بلوکها
۰/۲۳۰	۴۰/۹۰۸	۹۷	جمع

C.V=۶/۶۴



جدول ۳ - تجزیه و تحلیل برای تیمارهای کرج

F حساب شده	میانگین مربعات	مجموع مربعات	درجه آزادی	منبع تغییرات
	۰/۴۸۲	۲۳/۱۸۲	۴۸	تیمار
	۰/۲۳۰	۸/۲۷۷	۳۶	اشتباہ بین بلوک

$$\% LSD = 1/0.1 T_{/ha}$$

$$\% LSD = 1/133 T_{/ha}$$

جدول ۴ - تجزیه و تحلیل الشتر

F حساب شده	میانگین مربعات	مجموع مربعات	درجه آزادی	منبع تغییرات
		۰/۳۲۴	۱	تکرار
۲/۱۸۹	۰/۱۲۵	۷/۰۲۰	۴۸	تیمار
	۰/۱۱۸	۱/۴۱۷	۱۲	بلوک
	۰/۱۰۷	۲/۰۶۲	۳۶	اشتباہ بین بلوک
		۹/۸۲۴	۹۷	جمع

جدول ۵ - تجزیه و تحلیل برای تیمارهای الشتر

F حساب شده	میانگین مربعات	مجموع مربعات	درجه آزادی	منبع تغییرات
۲/۰۰۹	۰/۱۴۷	۷/۰۳۷	۴۸	تیمار
	۰/۰۵۷	۲/۰۶۲	۳۶	اشتباہ بین بلوکها

$$\% LSD = 0/0.1 T_{/ha}$$

$$\% LSD = 1/160 T_{/ha}$$

جدول ۶ - تجزیه و تحلیل مربوط به داده های کرج و الشتر

F حساب شده	میانگین مربعات	مجموع مربعات	درجه آزادی	منبع تغییرات
۱۳۷/۹۸۴	۲۸/۷۹۰	۲۸/۷۹۰	۱	تکرار
۰/۸۲۸	۰/۱۷۳	۸/۲۹۰	۴۸	تیمار
	۰/۲۰۹	۱۰/۰۱۰	۴۸	اشتباہ
		۴۷/۰۹۰	۹۷	جمع

$$C.V = \sqrt{14/89}$$

$$SD = 0/4567$$

$$\% LSD = 0/917 T_{/ha}$$

$$\% LSD = 1/224 T_{/ha}$$

پی‌نوشت‌ها:

۱-mutant
۲-mutagen
۳-mutagenesis

۴-morphologic
۵-genotype

References:

- ۱- دانه‌های روغنی ای. آ. وایرز (Weiss.E.A), ترجمه فرشته ناصری، مشهد، آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی (۱۳۷۰).
2. B. Sigurbjornsson and A. Micke, "Progress in mutation breeding, induced mutations in plants," Proc. Symp. Pullman, IAEA, Vienna, pp. 673-698 (1974).
3. A. Gustafsson, "Studies on the utility of artificial mutations in plant breeding," Jpn. J. Breed. **10**, pp. 153-162 (1974).
4. H. Yamagata and K. Syakudo "Application of mutation breeding in plants, gamma - ray sensitivity," Jpn. J. Breed **12**, pp. 125-129 (1975).
5. A. Gustafsson, U. Lundquist and I. Hagberg, "The viability reaction of gene mutations and chromosome translocations in comparison," Mutations in Plant Breeding Proc. Panel Vienna, 1966, IAEA, Vienna, pp. 103-107 (1964).
6. R. Abrams and J. Velez-Fortuno, "Radiation research with Pigeon peas (*cajanus cajan*): results on X3 and X4 generations," J. Agric. Univ. Puerto Rico **46**, pp. 34-42 (1967).
7. K. Aastveit, "Induced mutations in barley," Meld. Norg. Landbrhoisk. **44**, pp. 1-31 (1965).
8. F. Scholz, "Experiments on the use of induced mutants to hybridization breeding in barley," Proc. Symp. Induction of mutations and the mutation process. Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, pp. 73-79 (1965).
9. R. Abrams and K. J. Frey, "Variation in quantitative characters of oats (*Avena sativa L.*) after various mutagen treatments," Agron. J. **4**, pp. 163-167 (1964).
10. H. Notzel, "Genetische untersuchungen an rontgeninduzierten Gerstenmutanten," Kuhn-Archiv **66**, pp. 72-132 (1958).
11. J. Szymer and J. Boros, "Performance of early maturing soybean lines obtained from a mutation breeding programme," Plant Breeding and Acclimatization Institute, Radzikow, Warsaw, Ponland (1987).
12. P. S. Bhatnagar and S.P. Tivari, "Soybean improvement through mutation breeding in India," National Research Center for Soybean, Indian Council of Agriculture Research, Indore, India (1978).
13. A. D. Mohandjiev, "Application of experimental mutagenesis in soybean," Institute of Genetics, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria. IAEA-SM-311/49P (1986).
14. A. H. Zakri, "Breeding high yielding soybean using induced mutations," Department of Genetics, university of Kebangsaan, Bongi, Selangor, Malayis, IAEA - SM - 311/75P (1989).