



## فرموله کردن کپسول خوراکی ید-۱۲۳

علی ستاری<sup>\*</sup>، کیومرث کمالی مقدم، محمد میرزایی، غلامرضا اصلانی، عباس بهرامی، امیرعباس رجامند  
پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: ۳۱۴۸۵-۴۹۸، کرج - ایران

**چکیده:** ید-۱۲۳ یکی از رادیوایزوتوپ‌های شناخته شده در پزشکی هسته‌ای است که برای مطالعه غده تیروئید و متاستازهای آن بکار می‌رود. این رادیوایزوتوپ در سیکلوترون از بمباران گاز زینون-۱۲۴ غنی شده به وسیله بروتون تولید می‌شود. از آنجایی که یکی از موارد مصرف این رادیوایزوتوپ کپسول خوراکی یُدید سدیوم است بر آن شدیدم تا با استفاده از ید-۱۲۳ تولید شده، کپسول خوراکی آن را تهیه کنیم، پس از بمباران و شستشوی هدف، با بکارگیری بافر مناسب و تنظیم pH در محدوده ۷، یُدید سدیوم (ید-۱۲۳) تهیه شد. بررسی نتایج بدست آمده از آزمایش‌های کنترل کیفیت و مقایسه آنها با فارماکوپه آمریکا، بیانگر خلوص بالای رادیوهسته‌ای ۹۹.۹۹٪ و رادیوشیمیابی ۹۸٪ این محصول بود. محصول تهیه شده به میزان ۲۰۰ میکروکوری در هر کپسول بسته‌بندی و به بیمارستان ارسال شد.

**واژه‌های کلیدی:** ید-۱۲۳، سدیوم آیدید، کپسول ید-۱۲۳، رادیوداروها

## Formulation of Sodium Iodide ( $\text{Na}^{123}\text{I}$ ) Oral Capsule

A. Sattari<sup>\*</sup>, K. Kamali Moghadam, M. Mirzaie, G. Aslani, A. Bahrami, A. Rajamand  
Agricultural, Medical and Industrial Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute,  
AEOI, P.O. Box: 31485-498, Karaj - Iran

**Abstract:** I-123 is a well known radioisotope used for thyroid and its metastases studies. Nowadays this radioisotope produces from Proton bombardment of enriched Xenon 124 by Cyclotron. In this article formulation and quality of the  $\text{Na}^{123}\text{I}$  has been mentioned. After bombardment, the target was rinsed by distilled water and a clear and colorless acidic solution containing Iodin-123 was obtained. In order to adjust the pH value on 7 and for preparation of  $\text{Na}^{123}\text{I}$ , a buffer was added to the solution. The results of the quality control were according to the U.S pharmacopoeia, as well as, the high radionuclide purity of 99.99% and radiochemical purity 98%. The solution was added to the capsules that had already filled by the inert powder. Each capsule contained 200  $\mu\text{Ci}$  of  $\text{Na}^{123}\text{I}$ , and was sent to be used in hospital.

**Keywords:**  $^{123}\text{I}$ , Sodium Iodide,  $^{123}\text{I}$  Capsule, Radiopharmaceuticals

\*email: asattari@nrcam.org

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۴/۷/۴ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۵/۴/۱۵

جدول ۱- مشخصات فیزیکی ید-۱۲۲.

ثابت و اپاشی	نیمه عمر	طریقه و اپاشی	انرژی گامای بارز
$0.0533 \text{ h}^{-1}$	۱۳/۲ ساعت	تسخیر الکترونی	۱۵۹ keV

جدول ۲- پارامترهای بماران.

بازده تولید	مدت بماران	مجموع بماران	شدت جریان بماران	انرژی بماران
۷mCi/ $\mu\text{Ah}$	۲ ساعت	۴۰ $\mu\text{Ah}$	۲۰ $\mu\text{A}$	۲۸ MeV

## ۲-۲-۱- ماده سازی محیط تولید از دیدگاه فیزیک بهداشت


قبل از شروع کار، کلیه مراحل تولید از دیدگاه فیزیک بهداشت مورد بررسی قرار گرفت. جهت رعایت اصل ALARA (<sup>(۱)</sup> هر چه کمتر موجه شدنی) تولید در شرایط کنترل شده انجام گرفت؛ برای این منظور سیستم تهویه اتاق ید را در بیشترین حالت مکش خود نگهداشت و مسیر ورودی ید به گرمانه (هات سل) تولید با حفاظت سریع پوشانده شد. کارکنان تولید از ماسک مجهز به صافی کربن استفاده کردند. در مدت تولید از هوای درون آزمایشگاه نمونه برداری شد. هوای خروجی گرمانه نیز از فیلترهای کربنی عبور کرده و از طریق دودکش تخلیه می شد.

## ۲-۳-۱- تولید و فرموله کردن

پس از اتمام بماران، ۶ ساعت سپری شد. این وقفه ۶ ساعته، مدت زمان لازم برای تبدیل زینون-۱۲۳ به ید-۱۲۳ بود. با عبور دادن آب دیونیزه <sup>(۲)</sup> با رسانایی ۵ میکرو زیمنس از مجفظه هدف، محلولی شفاف، بی رنگ و نسبتاً اسیدی که ناشی از حل رادیوایزوتوپ تولید شده در آن بود تهیه شد. محلول حاصل تحت شرایط این، از نظر فیزیک بهداشت، به گرمانه ویژه انتقال داده شد. ابتدا، جهت بررسی خلوص رادیوهسته ای، مقدار آکتیویته و درجه خلوص شیمیایی در محلول نمونه گیری تعیین شد. چون ید حاصل می باشد، با استفاده از سیترات سدیوم، یدید سدیوم ۱۰۰ میلی گرم سیترات سدیوم به ۱۰ میلی لیتر محلول تولید شده اضافه شد تا pH این محلول به حد خشی یا کمی بازی برسد. در این شرایط عده ید تولیدی که بدلیل اسیدی بودن محیط به صورت یدات یا هیویدیت بود به یدید سدیوم که موردنظر ما بود تبدیل شود. سپس محلول فوق به درون کپسول ژلاتینی (شکل ۱) که از قبل با پودر بی اثری پر شده بود اضافه شد.

## ۱- مقدمه

ید-۱۲۳ از رادیوایزوتوپ های شناخته شده در پزشکی هسته ای است. این رادیوایزوتوپ برای مطالعه غده تیروئید و متاستازهای آن بکار می رود. در مقایسه با سایر ایزوتوپ های ید، به علت نیمه عمر کوتاه، فقدان تابش بتا و فوتون های کم انرژی، دُر تابشی کمتری به بیمار تحمیل می کند. در جدول ۱ مشخصات فیزیکی ید-۱۲۳ درج شده است. ید-۱۲۳ به صورت <sup>۱۳۳</sup>I-MIBG برای تصویربرداری در بیماری فرتو کرومومسیوما و نوروبلاستوما کاربرد دارد [۱ تا ۴]. همچنین از ترکیب ید-۱۲۳ با هیپوریک اسید و آمفتابین به ترتیب در مطالعه کارآیی کلیه ها و تصویربرداری از مغز استفاده شده است [۵، ۶ و ۷]. گرچه این رادیوایزوتوپ در مقایسه با تکنیسیوم-۹۹ مصرف کمتری دارد ولی تولید آن از شاخصه های ارزیابی توان مراکز تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی بشمار می رود. این رادیوایزوتوپ از بماران تلوریم-۱۲۳، یا زینون-۱۲۴ در سیکلوترون تولید می شود [۸]. امروزه در مراکز تولید رادیوداروها از هر دو روش استفاده می شود. مهمترین واکنش های هسته ای برای تولید ید-۱۲۳ به قرار زیر است [۸].



ید-۱۲۳ به صورت کپسول خوراکی با دُزهای ۳/۷ تا ۱۴/۸ مگا بکرل، معادل ۱۰۰ تا ۴۰۰ میکرو کوری، برای لایه نگاری بکار می رود. در این مقاله به فرموله کردن، کنترل کیفی، تهیه کپسول و تصویربرداری از ید-۱۲۳ تولید شده در بخش سیکلوترون و پزشکی هسته ای پژوهش کده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج پرداخته شده است.

## ۲- روش کار

### ۱- تولید ید-۱۲۳

ید-۱۲۳ از بماران گاز زینون-۱۲۴ غنی شده با پروتون دارای انرژی ۲۰ میلیون الکترون ولت در بخش سیکلوترون پژوهش کده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج، طی واکنش هسته ای زیر تولید شد. شرایط اعمال شده در این تولید، در جدول ۲ درج شده است.



### ۳-۳-کنترل شیمیایی

چون جداسازی رادیوایزوتوپ تولید شده از محفظه هدف به روش شستشوی هدف صورت گرفت نه به روش تصعید متداول، نیاز به کنترل محلول یُد حاصله از نظر وجود عناصر جزئی<sup>(۳)</sup> احتمالی بود. با آنالیز شیمیایی به وسیله پلاروگرافی، وجود عناصر احتمالی بررسی شد [۱۱]. انتخاب نوع عناصر مورد آنالیز بر اساس نوع آلیاژ بکار رفته در ساخت هدف، که در اینجا آلیاژ آلمینیوم-نیکل بود، صورت گرفت.

**۳-۳-۱ شرایط تعیین مس با دستگاه پلاروگرام**  
**الکتروولیت:** سدیوم EDTA ۰/۰۱ مولار در pH=۴/۵ محلول تنظیم کننده pH: سدیوم هیدروکسید ۰/۱ مولار و اسید کلریدریک ۰/۱ مولار  
**جنس الکتروود:** الکترود جیوه‌ای  
**الکتروود مرجع:** کلرید پتاسیوم ۳ مولار  
**ولتاژ پیک مس:** ۳۱۰ میلیولت

**۳-۳-۲ شرایط تعیین نیکل با دستگاه پلاروگرام**  
**الکتروولیت:** کلرید آمونیوم دارای pH=۹/۳ + محلول دی‌متیل گلی‌اکسیم ۰/۰۵ مولار  
**محلول تنظیم کننده pH:** آمونیاک ۳ مولار و اسید کلریدریک ۱ مولار  
**جنس الکتروود:** الکترود پلاتینی  
**الکتروود مرجع:** کلرید پتاسیوم مولار  
**ولتاژ پیک نیکل:** ۹۶۰ میلیولت

**۳-۳-۳ شرایط تعیین کبالت با دستگاه پلاروگرام**  
**الکتروولیت:** کلرید آمونیوم دارای pH=۹/۳ + محلول دی‌متیل گلی‌اکسیم ۰/۰۵ مولار  
**محلول تنظیم کننده pH:** آمونیاک ۳ مولار و اسید کلریدریک ۱ مولار  
**جنس الکتروود:** الکترود پلاتینی  
**الکتروود مرجع:** کلرید پتاسیوم مولار  
**ولتاژ پیک نیکل:** ۱۱۵۰ میلیولت

### ۳-۳-نتایج

#### ۱-کنترل رادیوھسته‌ای


یُد-۱۲۳ دارای انرژی گامای بارز ۱۵۹ کیلو الکترون ولت است [۹]. کنترل رادیوھسته‌ای با استفاده از آشکارساز ژرمانیوم فرا خالص صورت گرفت. تنها پیک مشاهده شده در ناحیه ۷۰ keV تا ۱۵۰ keV پیک بارز ۱۵۹ keV مربوط به یُد-۱۲۳ بود که در نمودار ۳ درج شده است.

#### ۲-کنترل رادیوشیمیایی

نمونه‌ای از محلول تولید شده به روش کروماتوگرافی روی کاغذ واتمن با حلal اتانول ۸۵٪ به عنوان فاز متحرک بررسی شد. پس از پایان عمل، کاغذ کروماتوگرام خشک و رادیوکروماتوگرافی انجام شد [۹ و ۱۰]. خلوص رادیوشیمیایی ۹۸ درصد که حاکی از وجود یُدید سدیوم Na<sup>۱۳۳</sup>I می‌باشد بر اساس فتوپیک ۱۵۹ کیلو الکترون ولت در Rf=۰.۷ بدست آمد.



شکل ۱- کپسول و ظروف سربی حامل آن.



نمودار ۳- طیف گامای حاصل از یُد-۱۲۳ تولید شده با استفاده از دتکتور HPGGe.

#### ۴- بحث و نتیجه‌گیری

بطوریکه اشاره شد، ید-۱۲۳ از دو روش بمباران زینون و تلوریوم با استفاده از شتاب‌دهنده سیکلوترون بدست می‌آید. استفاده از تلوریوم بدلیل ارزان بودن مناسب‌تر است ولی در کنار آن امکان بوجود آمدن رادیوایزوتوب‌های دیگر ید که به عنوان ناخالصی بشمار می‌روند از نکات قابل تأمل در این روش است. استفاده از گاز زینون روشی بسیار گران است ولی در عوض امکان وجود ناخالصی‌های رادیوهسته‌ای را تا حد صفر کاهش می‌دهد. از آن جایی که به هنگام نصب سیستم تولید ید-۱۲۳، خلوص رادیوهسته‌ای با کیفیت بالا مدنظر بود لذا روش تولید به وسیله زینون-۱۲۴ غنی شده مورد موافقت و بهره‌برداری قرار گرفت. اکنون با بکارگیری روش جدید غنی‌سازی، امکان تهیه ارزان تلوریوم غنی شده، همچنین درجه خلوص بالای ید-۱۲۳ تولیدی فراهم می‌باشد. مقدار ید-۱۲۳ تولید شده پس از ۲ ساعت بمباران با شدت جریان ۲۰ میکروآمپر-ساعت، ۱۰۰ میلی‌کوری بود. مطلب قابل بحث در این مورد، مقدار نسبتاً پایین آکتیویته در واحد حجم یعنی  $1\text{mCi}/1\text{ml}$  می‌باشد. این امر ناشی از کوتاهی مدت بمباران بود که در تولیدات بعد با افزایش این مدت قابل جبران است.

دز خوراکی ید-۱۲۳، ۱۲۳ تا ۲۰۰ میکروکوری است؛ بنابراین هر کپسول، محتوی ۲۰۰ میکرولیتر ید-۱۲۳ با آکتیویته  $200 \pm 5$  میکروکوری تهیه شد. کپسول‌ها درون حفاظ سربی با برچسب حاوی اطلاعات لازم قرار گرفت. کپسول‌های تهیه شده به یکی از مرکز پژوهشی هسته‌ای ارسال و به چند بیمار تجویز شد. یکی از بیماران مردی ۴۵ ساله با برداشتن تیروئید لب چپ و بیمار دیگر مردی ۵۵ ساله با متاستاز منتشر شده تیروئید بود. بر اساس اظهارنظر سرپرست تیم پژوهشی هسته‌ای نتایج تصویربرداری رضایت‌بخش بوده است (شکل‌های ۲ و ۳).

#### تشکر و قدردانی

لازم است از آقایان دکتر نشاندار ریاست و دکتر شفیعی و دکتر تابعی پرسنل بخش پژوهشی هسته‌ای بیمارستان طالقانی به سبب همکاری در تجویز این فرآورده به بیماران و تصویربرداری کمال تشکر را نماییم.

#### ۳-۴-۴ شرایط تعیین روی با دستگاه پلاروگرام

الکترولیت: کلرید سدیوم٪ ۰/۰۹ با pH ۱ الی ۲ محلول تنظیم کننده pH: اسید کلریدیک ۱ مolar جنس الکترود: جیوه‌ای الکترود مرجع: کلرید پتاسیوم ۳ مolar ولتاژ پیک نیکل: ۱۱۰۰ میلی‌ولت

#### ۳-۴-۵ شرایط تعیین آهن II با دستگاه پلاروگرام

الکترولیت: فسفات دی‌هیدرید سدیوم pH=۹ محلول تنظیم کننده pH: بافر فسفات جنس الکترود: پلاتین الکترود مرجع: کلرید پتاسیوم ۳ مolar ولتاژ پیک نیکل: ۳۶۰ میلی‌ولت

نتایج حاصل در جدول ۴ درج شده است. نتایج کنترل کیفی محصول بدست آمده پس از فرموله کردن و مقایسه با استاندارد فارماکوبه ۲۰۰۵ آمریکا، در جدول ۵ آورده شده است. بررسی نتایج، حاکی از استاندارد بودن و درجه خلوص بالای رادیوهسته‌ای و رادیوشیمیایی رادیوداروی فوق است.

جدول ۴- مشخصات شیمیایی ید-۱۲۳ تولید شده.

مشخصات ظاهری	آکتیویته ویژه	آهن	روی کمتر از $2 * 10^{-8} \text{ gr}$
محلول شفاف، بی‌رنگ	lmCi/ml	$1/9 * 10^{-5} \text{ gr}$	
نیکل کمتر از $2 * 10^{-8} \text{ gr}$	کبات کمتر از $2 * 10^{-8} \text{ gr}$	مس کمتر از $2 * 10^{-8} \text{ gr}$	

جدول ۵- نتایج کنترل کیفیت ید-۱۲۳ تولید شده و مقایسه آن با استاندارد بین‌المللی.


فارماکوبه آمریکا USP (2005)	نتایج کنترل کیفیت ید تولید شده از زینون غنی‌شده
خصوصیات ظاهری: محلول شفاف، pH=۷/۵ تا ۹	pH=۷/۷ محلول شفاف
خلوص رادیوشیمیایی: $\text{Na}^{131}\text{I} \geq ۹۵\%$	$\text{Na}^{131}\text{I} = ۹۸\% < \text{I}^-$
خلوص رادیوهسته‌ای: $^{131}\text{I} \geq ۸۵\%$	$^{131}\text{I} = ۹۹/۹۹\%$



## References:

1. A. Wafelman and M. Konings, "Synthesis, radiolabeling and stability of radioiodinated m-iodobenzylguanidine, a Review," *Appl. Radiat. Isot.*, Vol 45, No 10. 997-1007 (1994).
2. R. Marirs, Sh, Cunningham, "No-carrier-added I-131 MIBG: evaluation of the therapeutic preparation," *J. Nucl Med* 36: 1088-1095, (1995).
3. C. Hoefnagel, J. Dekraker, "Preoperative I-131 MIBG therapy of neuroblastoma at diagnosis," *J. Nucl Bio Med* 35: 248-251, (1991).
4. J. Farahati, M. Lassmann, "Effect of specific activity on organ uptake of I-123 MIBG in human," *International Journal of Oncology* 10: 518-519 (1997).
5. H. Iida, H. Itoh, "Quantitative mapping of regional cerebral blood flow using iodine-123 IMP and SPECT," *Journal of Nuclear Medicine*, Vol 35, Issue 12. 2019-2030 (1994).
6. A. Imperiale, C. Olianti, "<sup>123</sup>I-Hippuran renal scintigraphy with evaluation of single-kidney clearance for predicting renal scarring after acute urinary tract infection: comparison with <sup>99m</sup>Tc-DMSA scanning," *Journal of Nuclear Medicine* Vol.44, No.11 1755-1760 (2003).
7. S. Vlajkovic, M. Bogicevic, M. Rajic, "The significance of radiopharmaceutical choice on the estimation of the absolute renal function in different stages of renal failure," *Med. Principles Pract*;10:29-33 (2001).
8. G. Pfennig, H. Klewe-Nebenius, W. Seelmann-Eggebert, "Karlsruher Nuklidkarte (Chart of the Nuclides)," Nov. (1995).
9. United states Pharmacopiea, Version 27, (2005).
10. United States Drug Information (1993).
11. Methrom Application Note, Polarography 757VA (2004).

شکل ۲ - تصویر بدست آمده از تجویز ۴۰۰ میکروکوری کپسول خوراکی ید-۱۲۳ بر روی بیماری با تیروئیدکتومی لب چپ.



شکل ۳ - تصویر بدست آمده از تجویز ۴۰۰ میکروکوری کپسول خوراکی ید-۱۲۳ در بیماری با متاستاز تیروئید.



## پی‌نوشت‌ها:

۱- As Low As Reasonability Achievable

۲- Demineral Water

۳- Trace