

تأثیر روش بیهوشی در بروز هیپوگلیسمی نوزادان مادران دیابتی

*دکتر سید حسین یحیی^۱ دکتر طاهره پارسا^۲ دکتر بدیع الزمان رادپی^۳ دکتر فناه پیر محمدی^۳

گروه بیهوشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

^۳ پزشک عمومی

چکیده:

مقدمه: هیپوگلیسمی از مشکلات عمدۀ نوزادان مادران دیابتی است. با توجه به این مسئله در این مطالعه میزان گلوکز سرم و شیوع هیپوگلیسمی در نوزادان متولد شده به روش سزارین با ۲ روش بیهوشی عمومی و بی حسی منطقه ای ازنوع spinal مورد مقایسه قرار گرفت.

هدف: هدف این تحقیق بررسی نقش و ارتباط روش بیهوشی با بروز و شیوع هیپوگلیسمی در نوزادان مادران دیابتی بوده است.

روش بررسی: این پژوهش روی ۲۲ خانم باردار دیابتی که به خوبی کنترل شده بودند و جهت سزارین بیهوشی عمومی یا بی حسی اسپاینال استاندارد دریافت کرده بودند، انجام شد. از این تعداد ۱۱ نفر تحت بیهوشی عمومی و ۱۱ نفر تحت بی حسی اسپاینال قرار گرفتند و گلوکز سرم در تمام نوزادان طی ۱-۳ ساعت و ۲۴-۳ ساعت بعد از تولد اندازه گیری گردید.

نتایج: شیوع هیپوگلیسمی در نوزادان گروه بیهوشی عمومی ۱۶/۷٪ و در نوزادان گروه بی حسی نخاعی ۶/۶۳٪ بود که با $P_{value} < 0.05$ شیوع بیشتر هیپوگلیسمی از نظر آماری در گروه بی حسی نخاعی مشاهده شد.

نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها می توان گفت نوزادان مادران دیابتی که به روش سزارین با بی حسی نخاعی متولد می شوند به علت بالاتر بودن خطر هیپوگلیسمی به مراقبت بیشتری نیاز دارند اما نمی توان براستفاده از روش بیهوشی عمومی در این بیماران تأکید کرد.

کلید واژه ها: ۱- بیهوشی عمومی- ۲- بی حسی اسپاینال- ۳- هیپوگلیسمی- ۴- نوزاد مادر دیابتی

در شکسته شدن ترکیبات ساختمانی سلول های مغزی برای آزادشدن آمینواسیدها و اسیدهای چرب آزاد و درنهایت اختلال در عمل کرد غشای سلول های مغزی رخ می دهد که موجب اختلال دائمی در عمل کرد و رشد مغزی می گردد. این ضایعات نورولوژیک به صورت عقب ماندگی ذهنی و تشنج های تکرار شونده بروز می کند) (۱) برای نوزادان مادران دیابتی اقدامات پیش گیرانه

مقدمه:

هیپوگلیسمی از عوارض مهم در نوزادان مادران دیابتی است و نوزادان مبتلا به هیپوگلیسمی علامت دار، بیش آگهی بدتری از نظر تکامل مغزی در آینده نسبت به نوزادان بدون علامت دارند. (۱) مکانیسم ایجاد هیپوگلیسمی در نوزادان مادران دیابتی، هیپر انسولینیمی می باشد. در زمان هیپوگلیسمی کاهش مصرف اکسیژن مغزی، افزایش

تقسیم بندی White، نوع درمان، وضعیت کنترل دیابت، نوع سزارین، نوع بیهوشی، سرم دریافتی، بیماری های همراه و علت سزارین ثبت گردید. بیماران با کنترل ضعیف، کلاس C وبالاتر تقسیم بندی White، اکلامپسی شدید، دیسترس جنینی و PROM (پاره شدن زودرس کیسه آب)، نوزادان نارس و بدحال و LBW (وزن پایین حین تولد) و مبتلا به دیسترس تنفسی و بیماران قلبی سیانوتیک و نوزادان شدیداً هیپوتون که تغذیه نشده بودند و نوزادانی که بعداز ۲۴ ساعت دچار هیپوگلیسمی شده بودند و قبل و در زمان سزارین سرم قندی دریافت کرده بودند، از مطالعه حذف شدند. درنهایت ۲۳ نوزاد در مطالعه باقی ماندند که مادران ۱۱ نوزاد بیهوشی عمومی و ۱۲ نوزاد بی خسی موضعی از نوع اسپاینال دریافت کرده بودند. (در گروه بی خسی موضعی یک مورد دوقلویی وجود داشته است). اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای مقایسه موارد هیپوگلیسمی نوزادان در ۲ گروه بیهوشی عمومی و بی خسی منطقه ای از آزمون فیشر، برای مقایسه موارد هیپوگلیسمی براساس نوع عمل سزارین از آزمون Chi-square، برای مقایسه نمره آپکاردقیقه اول و پنجم نوزادان در ۲ گروه بیهوشی عمومی و بی خسی منطقه ای (اسپاینال) از آزمون Mann Whitney و برای بررسی مقایسه میانگین غلظت گلوکز سرم نوزادان در ۲ گروه از آزمون T-test استفاده شد.

نتایج:

میانگین سنی در گروه بیهوشی عمومی (GA) $29/9 \pm 5/64$ سال و در گروه بی خسی نخاعی (SA) $4/72 \pm 28/1$ سال بود. میانگین وزنی در گروه GA، $84/7 \pm 6/39$ کیلوگرم و در گروه SA $4/94 \pm 84/7$ ، میانگین سن حاملگی در گروه GA برابر $38/5 \pm 0/69$ هفته و در گروه SA، $38/1 \pm 0/54$ به دست آمد. میانگین وزن حین تولد در گروه GA، 516 ± 50 گرم و در گروه SA، 732 ± 3436 گرم ($P > 0/05$) و میانگین آپکار دقیقه اول در گروه GA، $29/28 \pm 8/92$ به

مانند بستری کردن نوزادان مادران دیابتی در NICU و کنترل قندخون در ۱ ساعت اول تولد، سپس هر ۲-۱ ساعت تا ۸ ساعت، هر ۶ ساعت تا ۲۴ ساعت بعداز تولد واجتناب از تجویز سرم های حاوی قند قبل از تولد نوزاد و کنترل خوب قندخون مادرطی حاملگی به صورت کلاسیک توصیه می گردد. (۱، ۲)

از نظر تئوری هورمون های استرس حین بی خسی منطقه ای در مادر متوقف شده و موجب تشید اثر انسولین و کاهش قندخون هنگام سزارین می شود که به دنبال آن در نوزاد نیز قندخون کاهش می یابد در حالی که هنوز میزان انسولین بالاست. این فرایند نوزاد را مستعد هیپوگلیسمی بعداز تولد می کند. (۳، ۴)

در مطالعات متعددی اثرات بیهوشی عمومی و بی خسی منطقه ای در سزارین بیماران دیابتی بررسی شده است (۵ و ۶) و تنها در یک مورد نشان داده شده که هیپوگلیسمی در نوزادان مادران دیابتی که با سزارین تحت بی خسی منطقه ای به دنیا آمده اند، بیش تراز گروه بیهوشی عمومی بوده است. (۷) بنابراین برآن شدیم تا مطالعه حاضر را به صورت گذشته نگر روی نوزادان به دنیا آمده از سزارین از مادران دیابتی به روش سزارین که قندخون آن ها اندازه گیری شده بود انجام دهیم.

روش بررسی:

در این مطالعه که به صورت Cross sectional انجام شد، اطلاعات موردنیاز از پرونده نوزادان مادران دیابتی که در طی سال ۱۳۸۰ در بیمارستان جواهری به روش سزارین به دنیا آمده بودند و قندخون آن ها اندازه گیری شده بود، استخراج گردید و در یک فرم مخصوص که شامل علائم، قندسرم، وزن، آپکار، ساعت تولد، ساعت کنترل قندسرم بود، ثبت شد.

پرونده مادران نیز جهت استخراج اطلاعات مادری مورد استفاده قرار گرفت و سن، کلاس دیابت (بر حسب

از نظر آماری معنی دار بود. ($P<0.05$) در گروهی که به صورت انتخابی سزارین شده بودند، قندخون در ۹ نوزاد طبیعی و در ۷ نوزاد پایین بود در گروهی که به صورت اورژانس سزارین شده بودند در ۲ نوزاد طبیعی و در ۴ نفر پایین مشاهده شد که از این نظر تفاوت آماری معنی داری بین ۲ گروه وجود نداشت ($P>0.05$). (جدول شماره ۱).

ودر گروه SA، $SA = 0.65 \pm 0.05$ بود. ($P>0.05$) میانگین قندسرم در ۸ ساعت اول در گروه GA، $GA = 0.53 \pm 0.09$ میلی گرم در دسی لیترو در گروه SA، $SA = 0.41 \pm 0.05$ میلی گرم در دسی لیتر به دست آمد ($P>0.05$). از نظر آماری هیچ تفاوت معنی داری بین ۲ گروه در رابطه با متغیرهای ذکر شده وجود نداشت.

هیپوگلیسمی در گروه GA، در ۲ نفر (۱۶٪) و در گروه SA در ۷ نفر (۶۳٪) دیده شد که در ۲ گروه این تفاوت

جدول شماره ۱: تقسیم بندی دیابت که در زمان بارداری ظاهر می شود.

درمان	قندخون ۲ ساعت پس از صرف غذا	قندخون ناشتا	زمان شروع	تیپ
رژیم	کم تراز $102 \text{ میلی گرم در دسی لیتر}$	کم تراز $105 \text{ میلی گرم در دسی لیتر}$	زمان بارداری	A ₁
انسولین	بیش تراز $120 \text{ میلی گرم در دسی لیتر}$	بیش تراز $105 \text{ میلی گرم در دسی لیتر}$	زمان بارداری	A ₂
درمان	بیماری های عروقی	طول مدت (سال)	سن شروع	تیپ
انسولین	هیچ کدام	کم تراز ۱۰ سال	بیش از ۲۰	B
انسولین	هیچ کدام	۱۹ تا ۱۰	۱۹ تا ۱۰	C
انسولین	رتینوپاتی خوش خیم	بیش تراز ۲۰ سال	قبل از ۱۰	D
انسولین	نوروپاتی	هر زمانی	هر زمانی	F
انسولین	رتینوپاتی پرولیفراتیو	هر زمانی	هر زمانی	R
انسولین	قلب	هر زمانی	هر زمانی	H

این مادران در ۲ گروه GA و SA از نظر وزن زمان تولد و آپگار دیقیقه اول و پنجم و تغذیه نیز مشابه بودند. تعداد نوزادان ماکروزوم در گروه GA بیش تر بود اما در مقایسه شیوع هیپوگلیسمی در نوزادان گروه SA بیش تر از گروه GA به دست آمد که از نظر آماری معنی دار بود. ($P<0.05$). اما قندخون با فواصل کمتر و دقت بیش تری باید در این گروه انجام شود. اما به علت عوامل متعدد موثر در انتخاب روش بیهوشی و با توجه به تئوری مطرح شده و نتایج حاصل از مطالعه Ramanathan وهم کارانش

بحث:

در این مطالعه سعی شد تا عوامل مداخله گر در شیوع هیپوگلیسمی نوزادان مادران دیابتی حذف شود و مادران نوزادان شرایط مشابهی داشته باشند که با توجه به این مطلب مادران در ۲ گروه GA و SA از نظر سن، وزن، سن حاملگی و کنترل دیابت در شرایط یکسان قرار داشتند. نوزادان

و مستعد تر به هیپوگلیسمی نیاز به مطالعه وسیع تری در این زمینه دارد هم چنین به علت احتمال بیش تر هیپوگلیسمی در نوزادان متولد شده با روش SA ، می توان پیشنهاد کرد این گروه از مراقبت اولیه بیش تر بر خوردار شوند نمی توان بر استفاده از روش خاص بیهوشی تأکید کرد(۹).

(۸) نتایج حاصل از مطالعه حاضر می توان به متخصصان توصیه کرد در صورتی که ممانعتی برای انجام شدن بیهوشی عمومی وجود نداشته باشد، در مادران دیابتی از GA استفاده شود تاموجب کاهش نسبی احتمال هیپوگلیسمی در نوزادان گردد. ذکر این نکته لازم است که تعیین این نتیجه به نوزادان مادران سالم و مادران دیابتی با خطر بالاتر

REFERENCE:

1. Behrman R. Nelson Textbook of pediatrics. 16th Ed. Philadelphia: W.B Saunders; 2000. P:439-450
2. David H, Chestnut, Obstetric Anesthesia, 2nd Ed .St.Louis,Missouri :Mosby Inc; 1999. P620-1
3. Abboud Tk; Artal.R;Henriksen ;EH;Eavl.S;Kammula.RK. Effects of spinal anesthesia on maternal circulating catecholamines. Am J Obstet Gynecol, 1982 Feb.1; 142(3): 252-4.
4. Shnider SM;Abboud.TK; Artal.R; Henriksen.EH; Stefani.SJ;Levinson.G. Maternal catecholamines decrease during labor after lumbar epidural anesthesia. Am J Obstet Gynecol . 1983 ; Sep.1: 107 (1): 5-13.
5. Datta S;Brown.Wujr; Ostheimer.GW; Weiss.JB; Alper.Mtt. Epidural anesthesia for cesarean section in diabetic parturients: Maternal and neonatal acid- base status and bupivacaine concentration. Anesth Analg 1981 , Aug; 60(8):574-8.
6. Datta S.Brown Wujr.Acid-base status in diabetic mothers and their infants following general or spinal anesthesia for cesarean section. Anesthesiology 1977 Sep;47(3):272-6.
7. Datta S ;kitzmiller.JL;Naulty.JS; Osthomer .GW ; Weiss.JB. Acid- base status of diabetic mothers and their infants following spinal anesthesia for cesarean section.Anesth Analg 1982 ; 1(8): 662-5.
8. Ramanthan S,Khoo P,Arismendy J. preoperative material and neonatal acid base status and glucose metabolism in patients with insulin-dependent diabetes mellitus.Anesth Analg 1991 Auy;73(2):105-11.
9. Miller R;editors Miller Anesthesia-Volum2.5 thed Philadelphia, Pensylvania : Churchill Living Stone publication; 2000.2046-56.

Abstract

Effect of Anesthesia Techniques for Cesarean section on Hypoglycemia in Neonates of Diabetic Mothers

S.H. Yahyavi MD^I T.Parsa,MD^{II} B.Z.Radpay.MD^{III} F.Pirmohammadi,MD^{III}

^I Associate professor of anesthesiology,Jawaheri Hospital,shariati Ave,Islamic Azad university of medical sciences:Tehran ,Iran.(Corresponding Author)

^{II} Assistant professor of Anesthesiology, Islamic Azad university of medical sciences.Tehran,Iran

^{III} General physician

Introduction: Hypoglycemia is an important cause of morbidity in neonates of diabetic mothers.

Objective: The present study compared the serum glucose level and incidence of hypoglycemia in neonates of diabetic mothers following general and regional(spinal)anesthesia (GA and SA) for cesarean section.

The purpose of this study was to show the role and association between anesthesia techniques with incidence of hypoglycemia in these neonates.

Material&methods: Subjects of the study were 22 well-controlled diabetic parturient patients that 50% of them received G.A and 50% SA for cesarean section.

Serum glucose were measured for all their neonates during 1-3rd and 3-24th hour of life.

Results: Post partum neonatal hypoglycemia developed in 2(16.7%) of GA group compared with 7(63.6%)of SA group.

There was a significant association ($p < 0.05$) between the incidence of neonatal hypoglycemia and anesthesia techniques.

Conclusion: On the basis of this study we consist on close observation for neonates of diabetic mothers after spinal anesthesia for cesarean section.But we cannot consist on the technique of anesthesia in these patients.

keywords: 1- General Anesthesia(G.A)2-Spinal Anesthesia(S.A)3- Hypoglycemia 4-Neonates of diabetic mothers.