

گزارش یک مورد آپاندیسیت حاد پرفوره در نوزاد نارس

دکتر فاطمه امید^۱، دکتر عبدالرضا ملک^۱، دکتر محمدعلی رئیس السادات^۲

^۱ استادیار، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
^۲ استادیار، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

چکیده

آپاندیسیت وضعیت بالینی بسیار نادری در نوزادان است که بیشتر نوزادان پسر و پره ترم را مبتلا می‌سازد. این بیماری اغلب همراه با وضعیت‌های جراحی دیگر مثل هیرشپرونگ و آنتروکولیت نکروزانت دیده می‌شود. چون علائم بیماری در این دوره غیراختصاصی است، تشخیص آن به تاخیر افتاده و اکثرأ به پرفوراسیون منجر خواهد شد، بطوری که پرفوراسیون در ۸۵٪ موارد روی می‌دهد. درمان شامل آماده‌سازی بیمار قبل از عمل جراحی و سپس آپاندیسیوم و شستشوی در موارد پرفوراسیون همراه با پریتونیت است. پیش‌آگهی این بیماری بسیار بد بوده و میزان مرگ و میر آن ۷۰٪^۱ گزارش شده است. ما در این مقاله، یک نوزاد پسر نارس ۱۳ روزه قل II را گزارش می‌کنیم که پرفوراسیون آپاندیس و پریتونیت داشت و با توده حساس و دردناک اینگواییال چپ تظاهر یافت. بیمار به صورت موفقیت آمیزی درمان شد و با حال عمومی خوب مرخص گردید.

واژگان کلیدی: آپاندیسیت، سوراخ شدگی، نوزاد نارس

نوزادی نبوده است (۲). در طی ۱۰ سال بررسی آینده نگری که در مکزیک در بخش جراحی اطفال بر روی کودکان زیر ۳ سال انجام شد، هیچ موردی از آپاندیسیت حاد در بین نوزادان مشاهده نگردید (۳). در مطالعه ۳۰ ساله ای نیز که در سوئیس صورت گرفت، فقط ۳ مورد نوزاد مبتلا آپاندیسیت حاد در بیمارستان دانشگاهی جراحی اطفال زوریخ تحت جراحی قرار گرفت (۴).

معرفی بیمار

نوزاد پسر پره ترم ۳۴ هفته قل دوم حاصل حاملگی دوقلویی به روش زایمان طبیعی و با آپگار ۶-۷ در زایشگاه بیمارستان ۲۲ بهمن مشهد متولد شد. وزن وی ۱۳۰۰ گرم، قد ۴۷ سانتیمتر و دور سر ۲۸ سانتیمتر بود. علایم حیاتی در بدو تولد عبارت بودند از: تنفس ۶۵ بار در دقیقه، ضربان قلب ۱۴۰ بار در دقیقه و درجه حرارت رکتال ۳۷ درجه سانتیگراد. نوزاد به علت سیانوز و مشکلات تنفسی همراه با کاهش رفلکس‌های نوزادی در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان بستری شد و تحت اقدامات حمایتی و اکسیژن درمانی و درمان

مقدمه

گرچه ایجاد آپاندیسیت حاد در بچه‌ها و نوجوانان شایع است، ولی در شیرخواران کمتر از یک‌سال به خصوص در دوره نوزادی بسیار ناشایع می‌باشد. علایم بالینی مبهم در کودکان منجر به تاخیر در تشخیص شده و در اکثر موارد بیماری منجر به عوارضی همچون پرفوراسیون و پریتونیت می‌گردد. شیوع بالای سوراخ شدن آپاندیس در نوزادان منجر به مرگ و میر بالای آنها خواهد شد.

تعداد موارد گزارش شده آپاندیسیت دوره نوزادی در مقالات علمی منتشر شده در سطح دنیا بسیار محدود می‌باشد. تا حال در هند فقط ۴ مورد نوزاد مبتلا به آپاندیسیت حاد گزارش شده است (۱). همچنین در مدت ۱۰ سال بین ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ میلادی از بین آپاندیسیت هایی که در دوره شیرخوارگی در تایوان جراحی شده‌اند، هیچ موردی در دوره

آدرس نویسنده مسئول: مشهد، بیمارستان ۲۲ بهمن، دکتر فاطمه امید

(email: vida_omid@yahoo.com)

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۵/۳/۱۶

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۵/۸/۲۵

همراه با مقادیری مایع در اطراف آن در ناحیه میانی کانال اینگواینال چپ گزارش شد. در این زمان آزمایشات نوزاد شامل ABG، قند، سدیم، پتاسیم، اوره، کراتینین و هماتوکریت طبیعی بودند ولی تعداد پلاکت‌ها کاهش ۸۲۰۰۰ در هر میلی‌متر مکعب) و تعداد نوتروفیل‌ها افزایش ۵۱۰۰ در هر میلی‌متر مکعب) یافته بود. بیمار بطور اورژانسی پس از مشاوره با جراح فوق‌تخصص اطفال و نوزادان و با تشخیص شکم حاد و تشخیص احتمالی تورسیون بیضه یا هرنی استوانگوله به اطاق عمل برده شد و لایپراتومی با انسزیون قسمت چپ و پائین شکم صورت گرفت. ترشحات چرکی خارج گردید که ناگزیر به وسیع کردن انسزیون لایپراتومی جهت اکسپلوراسیون گردیدند. در بررسی شکم، پرفوراسیون آپاندیس همراه با آگرودا و فیبرین مشاهده شد که آپاندکتومی انجام گردید و سپس اورکیدوپیکسی و هرنیوتومی نیز انجام شد و بعد از شستوشوی ترشحات شکمی جدار شکم ترمیم گردید.

پس از ۳ روز از عمل جراحی و مراقبت‌های NICU تغذیه خوراکی بطور آهسته و با حجم کم مطابق قبل برای نوزاد آغاز و در حالی که نوزاد در حال وزن گیری بود، با حال عمومی خوب در روز ۱۴ بعد از عمل مرخص گردید. در گزارش نمونه‌برداری در ماکروسکوپی آپاندیس به طول ۱/۵ و قطر ۰/۲ سانتی‌متر و در میکروسکوپی آپاندیس با مخاط نازک، لومن باریک، هیپرپلازی لایه عضلانی و ارت翔 پلی‌مرفونوکلئرها در لومن آپاندیس و بافت عضلانی و سروز گزارش گردید.

بحث

آپاندیسیت یک وضعیت بالینی بسیار نادر در نوزادان است. کمتر از ۰/۰۴ درصد موارد بیماری در کودکان زیر یک‌سال اتفاق می‌افتد و تعداد خیلی کمی از این بیماران را نوزادان تشکیل می‌دهند^(۸). نادر بودن آپاندیسیت در کودکان را به شکل محرومی آن در این سنین نسبت می‌دهند. بیماری در نوزادان پره‌ترم پسر بطور شایعتری اتفاق می‌افتد^(۹). آپاندیسیت در نوزادان اغلب در همراهی با اختلالاتی مثل بیماری هیرشپرونگ، آنتروکولیت نکروزان، پلاک مکونیال، فتق نافی یا مغبنی اتفاق می‌افتد^(۱۰-۷).

Swamy و همکاران یک مورد از درگیری آپاندیس را در نوزاد پره‌ترمی که دچار آنتروکولیت نکروزان شده بود، گزارش کردند که بطور شدید نکروزان تا محل زائده آپاندیس گسترش پیدا کرده بود^(۵). Martin و همکاران ۳ مورد آپاندیسیت پرفوره را متعاقب جراحی هیرشپرونگ انسدادی گزارش کردند^(۱۰).

عفونت با آنتی‌بیوتیک‌های آمپی‌سیلین و جنتاماکسین قرار گرفت.

در شرح حال، والدین نسبت فامیلی دخترعمه - پسردایی داشتند و مادر طی بارداری فقط از قرص آهن و کلسیم استفاده نموده بود. در معاینه نوزاد علاوه بر علایم ذکر شده، کریپتوکیدیسم دوطرفه نیز وجود داشت. دو روز بعد از تولد با بهتر شدن وضعیت تنفسی و عمومی، تغذیه خوراکی با شیر مادر با حجم ۲۰ سی‌سی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر روز از طریق گاواز آغاز شد. در این زمان نوزاد دفع مکونیوم داشت. در روز سوم تولد در حالی که با بهتر شدن وضعیت تنفسی اکسیژن‌درمانی قطع شده بود، دچار ترشحات خونی - قهقهه ای رنگ شد. در نتیجه تغذیه خوراکی بیمار قطع شد (NPO) گردید و آزمون‌های انعقادی بررسی شد. آزمایشات PTT و WBC نوزاد طبیعی بودند. در این زمان رانیتیدین و FFP تجویز شد.

مجدداً از روز ۶ تولد تغذیه با شیر مادر خیلی آهسته و با حجم ۲ میلی‌لیتر هر ۲ ساعت از طریق دهانی آغاز شد و روز بعد به ۱۵ سی‌سی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن افزایش داده شد. در روز هشتم تغذیه ۱۰ سی‌سی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن اضافه گردید. نوزاد در تمامی این مدت دفع مدفعه روزانه داشت، تا این که در روز نهم تولد بدلیل اتساع شکمی، استفراغ صفوایی و کاهش رفلکس‌های نوزادی مجدداً NPO شده، سوند معده فیکس گذاشته شد و تحت بررسی کامل به لحاظ عفونت‌ها و آنتروکولیت نکروزانیت قرار گرفت. کشت خون، ادرار، مدفعه، مایع مغزی نخاعی و خون مخفی در مدفعه منفی بودند. آنتی‌بیوتیک‌های بیمار تعویض و به سفالوتین و سفتازیدیم تغییر پیدا کرد. در روز یازدهم تولد بدلیل ادامه اتساع شکمی علیرغم اقدامات انجام شده، تصویربرداری ساده شکم و بررسی از نظر انسدادهای دستگاه گوارش از نوزاد به عمل آمد که تصویر اتساع مختص در قوسهای روده به ویژه در رکتوم در حفره لگن گزارش گردید. پس از دو روز، با اقدامات انجام شده و دفع مدفعه حال عمومی نوزاد بهتر، رفلکس‌ها طبیعی و تغذیه مجدد با حجم کم مشابه دفعه قبل آغاز گردید. در معاینه روز سیزدهم تندرنس در لمس شکم نوزاد وجود داشت و در ناحیه اینگواینال چپ توده دردناک و قرمزی به ابعاد ۱X1 سانتی‌متر مس شد. با تشخیص شکم حاد جراحی و جهت رد مواردی نظیر پیچ خورده بیضه، فتق استرانگوله و پریتونیت، سونوگرافی شکم به عمل آمد که در آن کبد و کیسه صفراء، کلیه‌ها، طحال و پانکراس طبیعی بودند و تصویر بیضه چپ

در مطالعه ما و نیز گزارشات Bar و Golladay و همکارانشان، همراه با آپاندیسیت، هرنی اینگواینال گیر افتاده وجود داشت که موجب انسداد روده ای نوزاد شده بود (۱۲، ۱۳).

در برخورد با این نوزادان باید سریعاً اقدامات آماده سازی قبل از جراحی شامل مایع درمانی مناسب، اصلاح اختلالات متابولیک، اسید و باز و الکترولیتی صورت گیرد و قبل از انجام آپاندکتومی برای بیمار آنتی بیوتیک وسیع الطیف شروع شود و در صورتی که پروفوراسیون اتفاق افتاده بود جهت جلوگیری از پریتونیت درناز کافی ترشحات حین عمل انجام شود (۵، ۸، ۱۰). گرچه پیش آگهی بروز آپاندیسیت پروفوره دوره نوزادی در اکثر مراجع بد گزارش شده است و مرگ و میر حدود ۷۰ درصد را در موارد آپاندیسیت و ۹۰ درصد را در موارد پروفوراسیون گزارش کرده‌اند (۱۴)، بیمار ما ۱۴ روز بعد از جراحی از NICU با حال عمومی خوب مرخص شد و در پیگیری‌های چند ماهه بعدی از رشد مناسبی برخوردار بود.

احتمال پروفوراسیون (سوراخ شدن) آپاندیس در نوزادان بسیار بیشتر از بقیه سنین است (۸۵٪) که این مساله معمولاً به تأخیر در تشخیص نسبت داده می‌شود. تصویر بالینی آپاندیسیت و پروفوراسیون آن در نوزادان و شیرخواران بسیار غیراختصاصی است (۸، ۱۱-۱۳). شایع‌ترین یافته‌های بالینی در این سنین شامل اتساع شکم با تندرنس موضعی و ادم شدید جداره شکم است.

Shaul و همکاران به مانند بیمار ما یافته‌های بالینی ادم و اریتم جدار قدامی شکم را گزارش کردند و این تورم بیشتر ناحیه تحتانی راست شکم (RLQ) را در برگرفته بود (۱۱). رادیوگرافی شکم در نوزادان مبتلا معمولاً تمامی گاز همراه با توده مدفوعی (فکالیت) را در فضای شکمی بخصوص در RLQ نشان می‌دهد. همچنین مایع آزاد در داخل شکم و هوای آزاد زیر دیافراگم می‌تواند در تصاویر رادیوگرافی بیمار راهنمای خوبی برای پروفوراسیون آپاندیس باشد. آزمایش ادرار بیمار نیز می‌تواند نمای غیرطبیعی داشته باشد (۱).

REFERENCES

- Karunakara BP, Ananda Babu MN, Maiya PP, Rijwani A, Sunil L. Appendicitis with perforation in a Neonate. Indian J pediatr 2004;71:355-56.
- Lin YL, Lee CH. Appendicitis in infancy. Pediatr Surg Int 2003;19:1-3.
- Baeza Herrera C, Guido Ramires O, Guido Ramires O, Gonzalez Galieia JA, Rojas Aro E. Appendicitis in children under 3. Rev Gastroenterol Mex 1994;59(3): 213-17.
- Stiefel D, stallmach T, sacher P. Appendicitis in neonates: complication or morbus sui generis? Pediatr surg Int 1998;14:122-23.
- Swamy PM, Pejaver pk, Babu A, Maiya PP, Rizwani A. Appendicular perforation in necrotizing enterocolitis. Indian pediatr 1998;35:59-61.
- Yadav k, Narang A, Rao KLN, Kumar S. Neonatal appendicular perforation. Indian Pediatr 1983;20:373-75.
- Rao NK, Mitra SK, Pathak IC. Antenatal appendicular perforations. Postgrad Med J 1987;63:1001-3.
- Kottmeier PK. Appendicitis. In Welch JK, Randolph GJ, Ravith MM, O'Neil JA, Rowe MI (eds). Text Book of pediatric surgery. 4th ed. Philadelphia: Year book Medical publishers Inc; 1986: 989-95.
- Tabrisky J, Westerfeld R, Charles ST, Cavanagh J. Appendicitis in the newborn. Am J Dis Child 1966;111:557-58.
- Martin Lw, Perrin EV, Neonatal perforation of the appendix in association with hirschsprungs disease. Ann surg 1963;166:799-802.
- Shaul W, Wash S. Clues to the early diagnosis of neonatal appendicitis. J Paediatr 1981;98:437-76.
- Bar JA, Moar A, Zeltzer M. Acute appendicitis located in a scrotal in a scrotal hernia of a premature infant. J Pediatr Surg 1978;13:181-82.
- Golladay ES, Roskes S, Donner L, Alex J. Intestinal obstruction from appendiceal abscess. J Pediatr Surg 1980;15:200-202.
- Persons JM, Miscall BG, Mcsherry CK. Appendicitis in the newborn infant. Surgery 1970;67(5):841-43.