

## تشخیص سریع سندرم تریزومی ۲۱ با استفاده از تکنیک Real-time PCR کمی

احمد رضا کامیاب<sup>۱</sup>، ناصر مسروری<sup>۲</sup>، مینا حیات نوسعید<sup>۲</sup>، سمیه جمالی<sup>۳</sup>، مهرداد هاشمی<sup>۴</sup>،  
مرتضی کریمی پور<sup>۵</sup>، غلامرضا جوادی<sup>۶</sup>، رضا مهدیان<sup>۵</sup>

<sup>۱</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران  
<sup>۲</sup> کارشناس ارشد ژنتیک، گروه پزشکی مولکولی، انستیتو پاستور ایران  
<sup>۳</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال  
<sup>۴</sup> استادیار، گروه ژنتیک مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران  
<sup>۵</sup> استادیار، گروه پزشکی مولکولی، انستیتو پاستور ایران  
<sup>۶</sup> دانشیار، گروه ژنتیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

## چکیده

**سابقه و هدف:** پیشگیری از تولد بیماران مبتلا به سندرم داون (تریزومی ۲۱) از اولویتهای وزارت بهداشت می باشد. هدف این مطالعه، تشخیص سریع بیماران مبتلا به سندرم داون با استفاده از تکنیک Real-time PCR کمی به منظور پایه گذاری روشی جدید برای تشخیص قبل از تولد است.

**روش بررسی:** در این مطالعه تجربی، ابتدا از افراد مورد مطالعه نمونه خون گرفته شد. پس از استخراج DNA ژنومی، میزان ژن *DYRK1A2* در لنفوسیت های افراد مبتلا به سندرم داون و طبیعی با تکنیک Real-time PCR کمی سنجش شد. یافته ها: نسبت ژنی *DYRK1A2/PMP22* در لنفوسیت های افراد طبیعی و بیماران مبتلا به تریزومی ۲۱ به ترتیب  $1 \pm 0.09$  و  $1.13 \pm 0.068$  به دست آمد ( $p < 0.001$ ) که حضور سه کپی از ژن *DYRK1A2* در افراد تریزومی ۲۱ را نشان داد. نتیجه گیری: نسبت ژنی *DYRK1A2/PMP22* مبتلایان به سندرم داون به طور معنی داری بیشتر از افراد طبیعی است. بنابراین از تکنیک Real-time PCR کمی با استفاده از DNA ژنومیک می توان بعنوان روشی بسیار دقیق، معتبر و نوین در تشخیص سریع تریزومی ۲۱ استفاده کرد.

**واژگان کلیدی:** سندرم داون، تریزومی ۲۱، میزان ژنی، تشخیص سریع و پیش از تولد، Real-time PCR

## مقدمه

اوایل نوزادی از بین می روند. مارتینز- فریاس گزارش داد که به نظر می رسد اولین شواهد مربوط به سندرم داون مربوط به تمدن تلتکا مکزیک در سال ۵۰۰ میلادی است (۱). علت زمینه ای اصلی بروز این بیماری در همه جمعیت ها و نژادها سن بالای مادر گزارش شده است. در مادران بالای ۴۵ سال خطر تولد نوزاد مبتلا به سندرم داون بسیار افزایش یافته و به ۱:۴۰ می رسد (۲). بیماران مبتلا به سندرم داون بیشتر از افراد طبیعی در معرض بیماری هایی چون لوسمی، آلزایمر زودرس، بیماریهای عفونی و مشکلات تنفسی قرار می گیرند

سندرم داون (تریزومی ۲۱) یکی از ناهنجاری های کروموزومی شایع (۱ در هر ۸۰۰ تولد) است که تشخیص و پیشگیری از تولد بیماران مبتلا به این سندرم از اولویتهای وزارت بهداشت می باشد. بیشتر مبتلایان در دوره جنینی یا

آدرس نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، احمدرضا کامیاب  
(email: kamyab10000@gmail.com)

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۱۱/۲۹

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۸/۴/۳

۶ مولار و سانتی‌فیوژ، به ترتیب اتانول ۹۶ و ۷۰ درصد (Merk) اضافه گردید. در نهایت به DNA استخراج شده بافر TE (Tris ) EDTA 1 mM , PH=7-8 , 10 mM) افزوده و انکوباسیون انجام گرفت. سپس غلظت DNA تخلیص شده با دستگاه اسپکتروفوتومتر نانودراپ (ND-1000) تعیین گردید.

در طراحی پرایمر، پس از اخذ توالی ژن‌های هدف و مرجع، برای ژن DYRK1A2 مستقر در ناحیه اساسی (Critical Region) کروموزوم ۲۱ (21q22.2) به عنوان ژن هدف، و ژن PMP22 واقع بر کروموزوم ۱۷ (17p11.2) به عنوان ژن مرجع پرایمرهای مناسب طراحی شد. توالی پرایمرها در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱- توالی و نوع الیگونوکلئوتیدهای ژن هدف و مرجع.

نام ژن	نوع الیگونوکلئوتید	توالی پرایمر
PMP22	Fw	GGAGGAGAGAAGGCTGAATGC
PMP22	Rv	GTTCCACATGCACACAGAAACG
DYRK1A2	Fw	AATGGTGTGCACAGGATGTGAAC
DYRK1A2	Rv	ATTCCGGTGAACAAGTCATGAAG

در این مطالعه از دستگاه Real-time PCR مدل ABI 7300 استفاده شد. واکنش Real-time-PCR کمی با استفاده از DNA ژنومی به صورت سه‌تایی (Triplicate) در پلیت ۹۶ چاهکی و در حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر انجام شد. مخلوط واکنش‌ها شامل ۱۲/۵ میکرولیتر Sybr-Green Master Mix (Applied Biosystems)، یک میکرولیتر از هر پرایمر Forward و Reverse اختصاصی ژن‌های مورد نظر و ۱۰ نانوگرم DNA ژنومیک بود. به این مخلوط آب مقطر افزوده شد تا به حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر برسد. برنامه زمانی-گرمایی دستگاه در سه مرحله انجام شد. مرحله اول ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۰ دقیقه، مرحله دوم ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ ثانیه و ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱ دقیقه برای ۴۰ سیکل متوالی و مرحله نهایی ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ ثانیه، ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ ثانیه و ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ ثانیه انجام شد.

در آنالیز کمی Real-time PCR، بر اساس سیکل‌های آستانه (Ct) به دست آمده از نمونه‌های مورد آزمایش (سندرم داون) و نمونه‌های شاهد (طبیعی) و با استفاده از فرمول  $\Delta\Delta Ct$ ، نسبت ژن هدف به ژن مرجع از طریق  $ratio = 2^{-\Delta\Delta Ct}$  محاسبه گردید.

جهت محاسبات آماری از برنامه Excel شرکت میکروسافت، Student T-test و بسته نرم افزاری Real-time (SDS v 2.1) PCR ABI7300 استفاده گردید.

(۳،۴). در افراد بالغ، عموماً علائم پیری زودرس به همراه کاهش فعالیت و عملکرد تیموس دیده می‌شود (۸-۵).

با توجه به اهمیت تشخیص پیش از تولد در پیشگیری از تولد کودکان مبتلا به این سندرم، روش‌های مختلف تشخیصی بکارگرفته شده است. روش آنالیز کروموزومی سیتوژنتیک یا شمارش کروموزومی (کاریوتیپ)، اولین روشی بود که در تشخیص تریزومی ۲۱ استفاده شد. در اواخر دهه ۸۰ میلادی برای شناسایی تریزومی ۲۱ تکنیک FISH معرفی شد (۱۱-۹). پس از ابداع تکنیک واکنش زنجیره پلیمرز (PCR) و اتمام پروژه ژنوم انسان، روش‌های مولکولی نوینی جهت تشخیص و شناسایی افراد مبتلا به تریزومی ۲۱ ایجاد گردیدند. تکنیک QF-PCR یکی از روش‌های معمول است که بر مبنای تکثیر نشانگرهای مولکولی واقع بر کروموزوم ۲۱ عمل می‌کند (۱۲،۱۳). در حال حاضر علاوه بر روش‌های ذکر شده، از تکنیک Multiplex PCR نیز به عنوان روشی سریع در تشخیص تریزومی ۲۱ استفاده می‌شود (۱۴،۱۵). این روش‌ها در کنار مزایا و قابلیت‌های تشخیصی، محدودیت‌های خاص خود را دارند. لذا معرفی روشی مولکولی که در زمان کوتاه و با دقت زیاد امکان تشخیص تریزومی ۲۱، بویژه در بارداری‌های پر خطر را فراهم کند، ضروری به نظر می‌رسد. تحقیق حاضر به منظور بررسی توانایی تکنیک Real-time PCR در افتراق نمونه‌های بیماران مبتلا به تریزومی ۲۱ از نمونه‌های افراد سالم طراحی و اجرا گردید تا با استفاده از نتایج آن راه برای تشخیص قبل از تولد تریزومی ۲۱ هموارتر گردد.


## مواد و روشها

در این مطالعه تجربی، با همکاری آزمایشگاه‌های خصوصی ژنتیک و مراکز مشاوره، ۲۰ فرد مبتلا به سندرم داون انتخاب و پس از اخذ رضایت نامه از خانواده بیماران، از هر بیمار ۲ میلی‌لیتر خون محیطی گرفته شد. هم‌چنین ۱۰ فرد طبیعی نیز به عنوان گروه شاهد بررسی شدند.


استخراج DNA از خون محیطی با استفاده از روش رسوب گذاری با نمک اشباع انجام شد. در این روش ابتدا نمونه خون با آب مقطر سرد (۴ درجه سانتی‌گراد) شستشو شد. پس از مرحله یخچال، با دستگاه سانتی‌فیوژ (Eppendorf 4804R) لنفوسیت‌ها را رسوب داده و به آن بافر لیز کننده هسته (NaCl 150 mM, Tris 15mM, EDTA 10 mM PH=7.5)، شوینده SDS ده درصد، آنزیم پروتئیناز K (20 mg/ml) افزوده و به صورت شبانه انکوبه شد. پس از افزودن کلرید سدیم

## یافته‌ها

برای تعیین کیفیت واکنش‌های انجام شده توسط دستگاه Real-time PCR، رسم منحنی استاندارد (Standard curve) لازم و ضروری است. بنابراین از رقت‌های متوالی DNA استاندارد (طبیعی) جهت ترسیم منحنی استاندارد استفاده شد. نسبت ژنی DYRK1A2/PMP22 در لنفوسیت‌های افراد طبیعی و بیماران مبتلا به تریزومی ۲۱ به ترتیب  $1 \pm 0.09$  و  $1/68 \pm 0.13$  به دست آمد ( $p < 0.001$ ) که حضور سه کپی از ژن DYRK1A2 در افراد تریزومی ۲۱ را نشان داد. در این مطالعه میزان کارایی واکنش زنجیره پلیمرز هر دو ژن هدف و مرجع ۹۹ درصد به دست آمد (نمودارهای ۱ و ۲).



نمودار ۱- منحنی استاندارد ژن DYRK1A2. شیب خط،  $R^2 = 0.98$



نمودار ۲- منحنی استاندارد ژن PMP22. شیب خط،  $R^2 = 0.99$

## بحث

در این مطالعه بیماران مبتلا به سندرم داون و گروه شاهد طبیعی جهت سنجش نسبت ژنی با دستگاه Real-time PCR به صورت کمی مورد مطالعه قرار گرفتند. ژن‌های مورد مطالعه در این تحقیق شامل ژن هدف (DYRK1A2) واقع بر کروموزوم ۲۱ انسانی، و ژن مرجع (PMP22) واقع بر کروموزوم ۱۷ بودند. در این مطالعه، امکان تفکیک نمونه‌های

بیماران مبتلا به سندرم داون از گروه شاهد طبیعی فراهم آمد و حضور سه کپی (نسخه) از کروموزوم ۲۱ در گروه بیماران تایید شد. این یافته علمی با روش‌های استاندارد متداول شامل آنالیز کروموزومی سیتوژنتیک (کاریوتیپ) تایید گردید.

از روش Real-time PCR در سنجش میزان بیان ژنی (۱۵) و سنجش میزان ژنی (۱۳، ۱۷) در تشخیص تریزومی ۲۱ استفاده شده است. Yali Hu و همکارانش بر روی هفت نمونه بیمار مطالعه کردند و ژن GAPDH را به عنوان ژن مرجع انتخاب نمودند (۱۷) که بیشتر در مطالعات بیان ژنی استفاده می‌شود و برای مطالعات ژنومیک و سنجش میزان ژنی مناسب نمی‌باشد. انتخاب ژن مرجع در مطالعات سنجش میزان ژنی اهمیت بسیاری دارد، زیرا میزان ژن هدف نسبت به این ژن مقایسه و محاسبه می‌گردد. بنابراین بایستی میزان ژن هدف به صورت نرمال و دایزومی باشد. از این رو در مطالعه انجام شده ژن PMP22 به عنوان ژن مرجع انتخاب گردید. این ژن دارای ویژگی‌های لازم به عنوان ژن مرجع است و هر گونه تغییری در میزان ژنی (حذف یا اضافه شدن) به صورت فنوتیپ بیماری بارز می‌شود و نیازی به آزمایشات ژنتیک مولکولی جهت شناسایی افراد سالم برای این ژن نمی‌باشد. حذف در ژن PMP22 منجر به بیماری HNPP و مضاعف شدن منجر به بیماری شارکوت-ماری توث می‌شود.

در تشخیص بیماری سندرم داون از روش‌های متفاوتی استفاده می‌شود. در حال حاضر از روش‌های آنالیز سیتوژنتیک (کاریوتیپ) و تکنیک FISH به عنوان روشی استاندارد و دقیق در تشخیص بعد و پیش از تولد سندرم داون استفاده می‌شود. این روش‌ها دقت زیادی دارند، اما با این وجود از نظر بالینی بسیار کاربر، پرهزینه و زمان‌بر هستند. همچنین به سلول زنده جهت کشت سلولی نیاز دارند. در تکنیک QF-PCR پس از پروسه تکثیر با واکنش زنجیره پلیمرز، یک مرحله پساتکثیری نیز ضروری است، اما در تکنیک Real-time PCR نیاز به این مرحله نمی‌باشد و تمامی پروسه کاری در یک مرحله انجام می‌شود. همچنین در تکنیک HGQ-PCR با تکثیر دو ژن همولوگوس مثل فسفوفروکتوکیناز I کبدی و عضلانی (که بر روی کروموزوم ۱ و ۲۱ قرار دارند) و مقایسه کیفی شدت باندهای تکثیری، به میزان ژنی کروموزوم ۲۱ پی می‌برند. امروزه تکنیک‌های دقیق، آسان و سریع جایگزین تکنیک‌های دشوار و زمان‌بر شده‌اند. تکنیک Real-time PCR یکی از جدیدترین روش‌های مولکولی است که در زمینه‌های متفاوتی از آن استفاده می‌شود (۱۶، ۱۸). از مزایای تکنیک Real-time PCR نسبت به روش‌های ذکر شده می‌توان دقت زیاد، حساسیت بالا، آسان بودن پروسه آزمایش، تشخیص بیماری در مدت زمان بسیار

روشی دقیق، قابل اعتماد و با حساسیت بالا در تشخیص سریع سندرم تریزومی ۲۱ استفاده نمود.

کم، بررسی و آنالیز هم‌زمان نمونه‌های زیاد (ظرفیت پذیری بالا) و عدم نیاز به سلول‌های زنده را نام برد.

از یافته‌های فوق نتیجه‌گیری می‌شود که تکنیک Real-time PCR یکی از جدیدترین روش‌های مولکولی است که قادر است با دقت زیاد، حساسیت بالا و در مدت زمان بسیار کم، نمونه‌های زیادی را به طور هم‌زمان و بدون نیاز به سلول‌های زنده آنالیز نماید. بنابراین می‌توان از این تکنیک به عنوان

### تشکر و قدردانی

از بیماران، خانواده محترم آنها و از همکاران گرامی در بخش پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران کمال تشکر را داریم. قابل ذکر است که این پروژه با شماره ثبت ۴۱۷ و کمک هزینه مالی انستیتو پاستور ایران انجام یافته است.

### REFERENCES

- Martinez-Frias ML. The real earliest historical evidence of Down syndrome. *Am J Med Genet A* 2005;132:231.
- Mueller RF, Young ID. *Emery's elements of medical genetics*. Edinburgh Übersicht: Churchill Livingstone; 1995.
- Epstein CJ. The consequences of chromosome imbalance Principles, mechanisms, and models. In: Barlow P, Green PB, Wylie CC, editors. *The consequences of chromosome imbalance Principles, mechanisms, and models*. Cambridge: Cambridge University Press; 1986.
- King RA, Rotter JJ, Motulsky AG. *The genetic basis of common diseases*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2002.
- Larocca LM, Valitutti S, Castellino F, Maggiano N, Musiani P. Alterations in thymocyte subpopulations in Down's syndrome (trisomy 21). *Clin Immunol Immunopathol* 1988;49:12.
- Lau LL, Spain LM. Altered aging-related thymic involution in T cell receptor transgenic, MHC-deficient, and CD4-deficient mice. *Mech Ageing Dev* 2000;114:101-21.
- Rabinowe SL, George KL, Adri MN, Eisenbarth GS. Trisomy 21 (Down's syndrome): autoimmunity, aging and monoclonal antibody-defined T-cell abnormalities. *J Autoimmun* 1989;2:6.
- Seger R, Stroder J. On the influence of age on immunity in Down's syndrome. *Eur J Pediatr* 1977;124:11.
- Acar H, Yildirim MS, Kaynak M. Reliability and efficiency of interphase-fish with alpha-satellite probe for detection of aneuploidy. *Genet Couns* 2002;13:11-17.
- Li F, Wu B, Wang J, Zhong H, Heng W. Molecular cytogenetic detection of trisomy 21 in interphase nuclei and metaphase chromosomes. *Chin Med J (Engl)* 1999;112:5.
- Witters I, Legius E, Matthijs G, van Schoubroeck D, van Assche FA, Fryns JP. Rapid prenatal diagnosis of trisomy 21 in 5049 consecutive uncultured amniotic fluid samples by fluorescence in situ hybridisation (FISH). *Prenat Diagn* 2002;22:5.
- Mansfield ES. Diagnosis of Down syndrome and other aneuploidies using quantitative polymerase chain reaction and small tandem repeat polymorphisms. *Hum Mol Genet* 1993;2:43-50.
- Yang YH, Yang ES. Rapid prenatal diagnosis of trisomy 21 by real-time quantitative polymerase chain reaction with amplification of small tandem repeats and S100B in chromosome 21. *Yonsei Med J* 2005;46:5.
- Blake D, Tan SL, Ao A. Assessment of multiplex fluorescent PCR for screening single cells for trisomy 21 and single gene defects. *Mol Hum Reprod* 1999;5:1166-75.
- Findlay I, Toth T, Quirke P, Papp Z. Same day diagnosis of Down's syndrome and sex in single cells using multiplex fluorescent PCR. *Mol Pathol* 1998;51:4.
- Bustin SA. Absolute quantification of mRNA using real-time reverse transcription polymerase chain reaction assays. *J Mol Endocrinol* 2000;25:169-93.
- Hu Y, Zheng M, Xu Z, Wang X, Cui H. Quantitative real-time PCR technique for rapid prenatal diagnosis of Down syndrome. *Prenat Diagn* 2004;24:704-707.
- ponchel F, Leong FT, Douglas SH. Real-time PCR on SYBR-Green I fluorescence: An alternative to the TaqMan assay for a relative quantification of gene rearrangement, gene amplifications and micro gene deletions. *BMC Biotechnol* 2005;3:18.