

میان کنش بین ویتامین A و پیلوکارپین بر فرایند به یادآوری حافظه در موش‌های صحرایی نر بالغ

اکرم عیدی^۱، مهسا جولائیان^۲، علی حائری روحانی^۳، طاهره اشراقی^۲

^۱ دانشیار، دکترای فیزیولوژی جانوری، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

^۲ کارشناسی ارشد فیزیولوژی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

^۳ استاد، دکترای فیزیولوژی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

سابقه و هدف: تحقیقات متعددی نشان داده مصرف اسید رتینوئیک و یا رزیم غذایی غنی از ویتامین A موجب بهبود حافظه کاهش یافته در دوران پیش از شود. کمبود ویتامین A موجب کاهش یادگیری و میزان LTP هیپوکامپی در موش می‌شود. در تحقیق حاضر، میان کنش بین ویتامین A و پیلوکارپین (آگونیست گیرنده موسکارینی) بر میزان به یادآوری حافظه در موش‌های صحرایی نر بالغ بررسی شد.

روش برسی: تزریقات درون بطنی پس از جلسه آموزش در تمامی حیوانات انجام گردید. میزان به یادآوری حافظه با استفاده از روش یادگیری احترازی غیرفعال در موش‌های تر بالغ ارزیابی شد.

یافته‌ها: ویتامین A (دوز ۱۰۰۰ IU/rat) و پیلوکارپین (دوز ۱ µg/rat) به یادآوری حافظه را افزایش دادند. پیلوکارپین پاسخ‌دهی به ویتامین A را افزایش داد. پاسخ‌دهی به ویتامین A توسط پیلوکارپین تقویت شد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق حاضر احتمالاً میان کنشی بین ویتامین A و سیستم کولینرژیک در فرایند به یادآوری حافظه وجود دارد.

واژگان کلیدی: ویتامین A، پیلوکارپین، یادگیری احترازی غیرفعال، موش صحرایی

مقدمه

ترکیب بسیاری از میوه‌ها، β -کاروتون فراوان ترین پروویتامین A فعال است. β -کریپتوگرانتین کاروتونوئید پروویتامین A نیز به وفور در آب میوه‌ها وجود دارد (۱). لوتئین، مشخص‌ترین کاروتونوئید در سبزیجات است. لیکوپن در گوجه‌فرنگی یافت می‌شود. کاروتونوئیدهای غیرفعال دیگری در سبزیجات یافت می‌شوند که شامل یوپلاگانتین، زناتاکاروتون است. فرآورده‌های شیری، زرده تخم مرغ و بوست ماهی محتوی کاروتونوئیدهایی است که در مواد غذایی وجود دارند (۲). ویتامین A در کبد به صورت استرهای رتینول ذخیره شده و در هنگام نیاز به داخل خون می‌ریزد و به وسیله پروتئین‌های متصل شونده به رتینول از خون به سایر بافت‌ها حمل می‌شود (۳). ویتامین A دارای اثرات فیزیولوژیک بر سیستم بنیابی (۴)، سیستم ایمنی (۵)،

ویتامین A گروه فرعی از ترکیبات محلول در چربی است که ترجیحاً به عنوان اسید رتینوئیک (Retinoic acid, RA) معروفی می‌گردد. ترکیب اصلی این ویتامین رتینول با فرمول عمومی $C_{20}H_{30}O$ و وزن مولکولی ۲۸۶/۴۴ است (۱). ویتامین A در فرم اصلی فقط در منابع حیوانی مانند شیر، تخم مرغ و جگر یافت می‌شود. پیش‌سازهای این ویتامین به میزان زیاد در سبزیجات با برگ‌های سبز رنگ و میوه‌های به رنگ نارنجی مانند هویج و پرتقال دیده می‌شوند. در اغلب سبزیجات و در

آدرس نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دکتر اکرم عیدی

(email: eidi@srbiau.ac.ir)

تاریخ دریافت مقاله: ۹۱/۶/۱

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۱/۱۱/۲۳

رتینوئیک از طریق دو دسته گیرنده RAR (گیرنده اسید رتینوئیک) و RXR (گیرنده X رتینوئیدی) اثرات خود را در سلول‌های بدن القاء می‌کنند. هر کدام از این گیرنده‌ها سه زیر گونه α , β و γ دارند. این گیرنده‌ها در قسمت‌های مختلفی از جمله مغز و نخاع بیان می‌شوند (۱۹). در هسته سلول گیرنده اسید رتینوئیک پس از الحق به عناصر پاسخی (ATRA response elements, RAREs)، اسید رتینوئیک اثرات خود را بر بیان ژن القاء می‌کند. اسید رتینوئیک هم چنین سبب افزایش فسفوریلاسیون آنزیم‌های کینازی نظری extracellular-regulated kinase 1/2 (ERK1/2) می‌شود (۲۰). گیرنده‌های رتینوئیدی در اعمال مغز در موش‌ها و همچنین اعمال سیستم عصبی مرکزی در انسان نقش دارند (۲۱). بخش‌هایی از مغز که در اثر کاربرد اسید رتینوئیک، علائم سیگنال‌دهی را از خود بروز می‌دهند، سیستم لیمبیک به خصوص هیپوکامپ و بخش‌های تalamوس و هیپوتalamوس می‌باشند (۲۲)، نواحی مختلف مغزی که در سیگنال‌دهی اسید رتینوئیک نقش دارند، دارای قابلیت انعطاف‌پذیری عصبی بالایی هستند (۲۳، ۲۴). انعطاف‌پذیری یکی از توانایی‌های مغز است که الگوی اتصالات عصبی را مجدد تنظیم نموده و برای حافظه و یادگیری ضروری است. برای این منظور لازم است تغییراتی در مقاومت سیناپتیک ایجاد شود که توسط تقویت دراز مدت، (Long-term potentiation, LTD) (Long-term depression, LTD) و تضعیف دراز مدت (LTP) قابل اندازه‌گیری هستند. چنین فرایندهای پویایی باعث شکل‌گیری مغز در جنین می‌شوند. برخی از این فرایندها مانند LTP، LTD و رشد زوائد نورونی (۲۵، ۲۶) یا نوروزنر (۲۷) توسط اسید رتینوئیک تنظیم می‌شوند.

مطالعات زیادی بر روی تاثیر ویتامین A و سیستم کولینرژیک صورت گرفته است که تمامی آنها بر اثر تقویتی ویتامین A و سیستم کولینرژیک بر روند حافظه تأکید دارند. این نکته مشخص نمی‌باشد که آیا ویتامین A با تاثیر بر سایر سیستم‌های نوروتراپسیتری بر روند حافظه تاثیر می‌گذارد. لذا در تحقیق حاضر ابتدا تزریق درون بطنی ویتامین A و پیلوکارپین (به عنوان آگونیست گیرنده موسکارینی) بر فرایند به یادآوری حافظه در مosh‌های صحراوی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفته و سپس به منظور ارزیابی نحوه عملکرد ویتامین A، میانکنش آن با داروی پیلوکارپین مورد بررسی قرار گرفت.

استخوان‌سازی (۶)، رشد و نمو (۷)، ترشحات طبیعی بدن (۴)، انسجام بافت اپی‌تلیالی (۸) و تولید مثل است. مدارک زیادی نشان دهنده نقش سیستم کولینرژیک مرکزی در فرایند یادگیری و حافظه است (۹). مطالعات زیادی که بر روی این سیستم توسط محققان سلولی انجام گرفته، نشان می‌دهند که آگونیست‌های کولینرژیک فعالیت‌های شناختی را ارتقا می‌بخشد، درحالی که آنتاگونیست‌های کولینرژیک ایجاد اختلال در این فرایند می‌نمایند (۱۰). حافظه ارتباط نزدیکی با یادگیری دارد و عبارت از ذخیره‌سازی و به یادآوری تجربیات قبلی است. تمامی یادگیری‌ها نشانی از تجربه دارند و با فراموش شدن تمامی تجربه‌های قبلی یادگیری صورت نمی‌گیرد (۱۱). حافظه ویژگی از مغز است که نواحی مختلفی مانند کورتکس مغزی و چندین بخش از سیستم لیمبیک در آن دخالت دارند (۱۲). لوب گیجگاهی و تشکیلات هیپوکامپی جهت انتقال حافظه‌های کوتاه مدت به دراز مدت در گیر می‌باشند (۱۲). نئوکورتکس و بخش‌های مختلفی از سیستم لیمبیک در ذخیره‌نمودن حافظه دراز مدت دخالت دارند. کورتکس پاراهیپوکامپ با نواحی ارتباطی حسی از یک طرف و هیپوکامپ از طرف دیگر در ارتباط است (۱۳). این ارتباطات احتمالاً کورتکس پاراهیپوکامپ را مناسب برای تثبیت حافظه می‌نماید (۱۴). اکثر عملکردهای رتینوئیدی از رتینوئیدی فرایند رونویسی در RA و فعال سازی گیرنده‌های خاص RA صورت می‌پذیرد (۱۵). رتینول موجود در پلاسمما به سلول وارد می‌شود و برای اولین بار اکسید و به رتینالدهید تبدیل می‌شود و این کار به کمک رتینول دهیدروژناز به RA اکسید می‌شود (۱۶). کمک رتینالدهید دهیدروژناز به RA متصل سپس RA وارد هسته شده و به گیرنده‌های RA متصل می‌شود، تا باعث فعال شدن فرایند رونویسی ژن شود (۱۷). گیرنده‌های RA (RARs) بخشی از گیرنده‌های هسته، که شامل گیرنده‌هایی برای استروژن، آندروجن، مینرالکورتیکوئید، گلوكورتیکوئید و هورمون تیروئید هستند. تمامی این گیرنده‌ها به یک روش عمل می‌کنند. گیرنده‌های موجود در هسته یا آنهایی که از سیتوپلاسم به هسته منتقل می‌شوند به یک عامل واکنشی متصل می‌شوند و باعث پیش‌روی ژن‌های واکنشی می‌شوند. در حضور لیگاند، گیرنده تغییر ساختار می‌دهد و به هم پیوستگی کرومانتین از بین می‌رود و رونویسی به صورت خودکار صورت می‌گیرد و این عمل همچنان ادامه می‌یابد (۱۸). ویتامین A و مشتقات آن از جمله اسید

مواد و روشها

حیوانات

به تمامی حیوانات اجازه داده شد تا یک ساعت قبل از آزمایش در دستگاه شاتل باکس قرار گرفته و آزادانه در هر دو محفظه حرکت نمایند. جلسات آموزش و آزمایش‌ها بین ساعت ۰۸:۰۰ و ۱۳:۰۰ انجام گرفت. پس از گذراندن جلسه عادت، حیوان به آرامی در فضای روشن برای ۵ ثانیه قرار گرفته، سپس در گیوتینی بسته شدند و زمان تاخیر برای عبور حیوان به فضای تاریک ثبت شد. حیواناتی که بیشتر از ۱۰۰ ثانیه برای عبور به طرف دیگر تعلل می‌کردند، از آزمایش حذف شدند. به محض ورود حیوان با چهار پنجه به اتاق تاریک، در بسته می‌شد و موش از فضای تاریک خارج می‌شد. بعد از گذشت ۳۰ دقیقه، حیوان در اتاق روشن قرار گرفته و به محض ورود به اتاق تاریک شوک پایی ($1/5$ s, 50 mA) دریافت می‌کرد. بعد از ۲۰ ثانیه، موش از دستگاه برداشته می‌شد و موقتاً در قفس گذاشته می‌شد. دو دقیقه بعد، موش به همان روش قبلی دوباره آزمایش می‌گردید. اگر موش در طول ۱۲۰ ثانیه وارد فضای تاریک نمی‌شد، فراغیری موفقی از پاسخ احترازی غیرفعال ثبت می‌شد.

تزریق درون بطن مغزی (i.c.v.)

حیوان تزریق درون بطن مغزی را فوراً پس از دوره فراغیری از طریق کانولا دریافت کرد. موش‌ها به آرامی توسط دست نگه داشته شده و تزریق با سوزنی به ضخامت Guage ۲۷ صورت گرفت. تزریق از طریق یک لوله پلی‌اتیلنی متصل به سرنگ گامیلتون انجام شد. حجم تمامی تزریقات ۱ میکرولیتر بود. جهت اطمینان از تزریق دارو، ۳۰ ثانیه پس از تزریق، سوزن تزریق در موقعیت کانولا نگه‌داشته می‌شد.

اندازه‌گیری میزان به یادآوری حافظه

۲۴ ساعت بعد از آموزش، آزمایش تعیین میزان به یادآوری حافظه انجام گرفت. حیوان در محفظه روشن گذاشته شده و مدت زمان تاخیر ورود به محفظه تاریک (Step through latency, STL) در مراحل آزمایش در باز بود. آزمایش وقتی تمام می‌شد که حیوان وارد محفظه تاریک می‌شد و یا برای ۳۰۰ ثانیه در فضای روشن باقی می‌ماند. در طول این دوره هیچ شوک الکتریکی اعمال نشد.

گروه‌ها

حیوانات به ۱۴ گروه تقسیم شدند: گروه ۱ (یا گروه کنترل): حیوانات این گروه دست نخورد و بدون تیمار بودند.

در تحقیق حاضر از موش‌های نر نژاد ویستار، با وزن اولیه ۲۰۰-۲۵۰ گرم استفاده شد. حیوانات در هر قفس در گروه‌های پنچ تایی با دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری می‌شدند. موش‌ها در اتاق حیوانات با دمای 32 ± 2 درجه سانتی‌گراد و سیکل نوری ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی نگهداری می‌شدند. همه آزمون‌های رفتاری در فاصله زمانی بین ساعت ۰۸:۰۰ و ۱۳:۰۰ انجام گردید. هر حیوان فقط یکبار استفاده شد. در هر گروه ۷ سر حیوان وجود داشت.

داروها

ویتامین A (شرکت داروسازی اسوه)، پیلوکارپین (شرکت سینا دارو) و روغن کنجد (Henrylamot Germany) خریداری گردیدند. تمامی داروها بلا فاصله بعد از دوره آموزش در حجم $1 \mu\text{l/rat}$ تزریق شدند.

جراحی به منظور کاشت کانولا راهنمای


یک کانولای استیل ضد زنگ با ضخامت Gauge ۲۱ در بطن جانبی راست تمامی حیوانات کاشته شد (وسایل David Kopf، آمریکا). حیوانات با هیدروکسی کاتامین (۴۰ mg/kg) و زایلزین (۸۰ mg/kg) بی‌هوش شدند. جهت تزریق درون بطن جانبی یک عدد کانولا با استفاده از دستگاه استریوتاکسی در مختصات $0/8$ میلی‌متر خلفی، $1/6$ میلی‌متر جانبی و $3/4$ میلی‌متر شکمی نسبت به نقطه برگما بر اساس اطلس پاکسینوس قرار داده شد که با استفاده از پیچ‌های مینیاتوری و اکریل دندانپزشکی کانولا در موقعیت خود ثابت شد.

دستگاه شاتل باکس


آموزش در یک محفظه شرطی‌سازی با دو فضای روشن و تاریک با اندازه یکسان ($30\times 20\times 20\text{ cm}$) انجام گردید که یک در گیوتینی در فاصله بین دو فضا قرار داشته که می‌تواند توسط ناظر باز یا بسته شود. شبکه‌های فلزی ضدزنگ (با ضخامت $2/5$ میلی‌متر) در فاصله‌های ۱ سانتی‌متری (فاصله بین شبکه‌ها) روی کف فضای تاریک برای ایجاد شوک پایی قرار داده شد. یک شبکه شوکدهنده پا (با شدت 2 mA و مدت زمان $1/5$ s و فرکانس 50 Hz) به میله‌های فلزی فضای تاریک ارتباط داده شد.

آزمون رفتاری یادگیری احترازی غیرفعال

القا شده توسط ویتامین A در دوزهای ۲۰۰۰ IU/rat و ۱۰۰۰ میگردد (نمودار ۳).



نمودار ۱- اثر تزریق درون بطنی ویتامین A با دوزهای ۲۰۰۰ IU/rat، ۱۰۰۰، ۷۵۰ و ۵۰۰ بر میزان STL در موش صحرایی نر بالغ. تزریقات فورا پس از دریافت شوک در جلسه آموزش صورت گرفت. حیوانات کنترل هیچگونه تیماری دریافت نکردند. حیوانات گروه Sham، روغن کنجد را به عنوان حلال دریافت نموده‌اند. نتایج بر اساس میانگین و انحراف معیار هر گروه تنظیم شده است. تعداد حیوانات در هر گروه ۷ سر بود. $P < 0.05$ و $P < 0.001$ اختلاف از گروه شاهد را نشان می‌دهد.



نمودار ۲- اثر تزریق درون بطنی پیلوکارپین با دوزهای ۰/۵، ۱، ۲ و ۱/۰ میکروگرم بر رت بر میزان STL در موش صحرایی نر بالغ. تزریقات فورا پس از دریافت شوک در جلسه آموزش صورت گرفت. حیوانات کنترل هیچگونه تیماری دریافت نکردند. حیوانات گروه Sham، سرم فیزیولوژیک را به عنوان حلال دریافت نموده‌اند. نتایج بر اساس میانگین و انحراف معیار هر گروه تنظیم شده است. تعداد حیوانات در هر گروه ۷ سر بود. $P < 0.001$ ، $P < 0.01$ و $P < 0.05$ اختلاف از گروه شاهد را نشان می‌دهد.

بحث

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ویتامین A موجب افزایش معنی‌داری بر میزان تشییت و بهبود آوری حافظه می‌گردد. در

گروه ۲ و ۳ (یا گروه‌های Sham): حیوانات این گروه جراحی شده و سرم فیزیولوژیک یا روغن کنجد را دریافت نمودند.

گروه‌های ۴-۷ (یا گروه‌های دریافت کننده ویتامین A): حیوانات این گروه‌ها ویتامین A را در دوزهای ۲۰۰۰، ۱۰۰۰، ۷۵۰، ۵۰۰ دریافت نمودند.

گروه‌های ۸-۱۱ (یا گروه‌های دریافت کننده پیلوکارپین): حیوانات این گروه‌ها پیلوکارپین را در دوزهای ۲، ۱، ۰/۵، ۰/۱ میکروگرم بر رت دریافت نمودند.

گروه‌های ۱۲-۱۴ (یا گروه‌های دریافت کننده توام ویتامین A و پیلوکارپین): حیوانات این گروه‌ها به صورت توام دوزهای مختلف ویتامین A و پیلوکارپین (دوز ۰/۵ میکروگرم بر رت) را دریافت نمودند.

بافت‌شناسی

در خاتمه آزمایش، تمامی موش‌ها ۲ میکرولیتر متیلن بلو را در بطن جانبی دریافت نمودند، سپس با اتر بی‌هوش شده و به طور transcardial بافر محلول نمکدار فسفاتی را دریافت نمودند (pH=۷/۴) و فرمالدئید (۱۰٪) تزریق گردید. سر تمامی موش‌ها قطع شده و مغزشان در فرمالدئید (۶٪) قرار گرفت. بعد از گذشت سه روز، مغزها با ضخامت ۶۰ میکرومتری برش داده شدند. داده‌های رفتاری موش‌هایی که مکان کانولا صحیح نبود، بررسی نشد.

آنالیز آماری

تمامی داده‌ها به صورت میانگین \pm انحراف معیار ارائه شده و با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند. $P < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

حیوانات گروه‌های Sham تغییر معنی‌داری بر میزان STL در مقایسه با گروه کنترل نشان ندادند، یعنی عمل جراحی کاشت کانولا و تزریق سرم فیزیولوژیک یا روغن کنجد تاثیر معنی‌داری بر سطح یادگیری ایجاد نمی‌کند. ویتامین A در دوزهای ۱۰۰۰ IU/rat و ۲۰۰۰ موجب افزایش معنی‌داری بر میزان STL در مقایسه با گروه شاهد شد (نمودار ۱). همچنین پیلوکارپین در دوزهای ۲ و ۱ میکروگرم بر رت موجب افزایش معنی‌داری بر میزان STL در مقایسه با گروه شاهد گردید (نمودار ۲). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پیلوکارپین در دوز ۰/۵ میکروگرم بر رت موجب افزایش معنی‌داری بر پاسخ

رتینول منجر به نقص عملکرد در یادگیری فضایی و عملکرد حافظه می‌گردد (۳۱). تیمار اسید رتینوئیک به برگداندن کاهش LTP هیپوکامپی در موش مسن کمک می‌کند (۳۲). اسید رتینوئیک موجود در هیپوکامپ، نورون‌زایی هیپوکامپ را تنظیم می‌کند (۳۰). اسید رتینوئیک اضافی در موش احتمالاً با سیستم سیگنال‌دهی اندوزن مداخله کرده و منجر به کاهش در نوروژن می‌شود (۲۷). کمبود رتینول منجر به کاهش یادگیری و حافظه می‌گردد (۳۲، ۳۱). ویتامین A در تغییرات میزان LTP در هیپوکامپ لازم می‌باشد (۳۳).

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پیلوکارپین به عنوان آگونیست گیرنده موسکارینی به صورت وابسته به دوز باعث افزایش تشبیت حافظه می‌گردد. در همین راستا مطالعات بسیاری انجام گرفته که نتایج تحقیق حاضر را تایید می‌کند (۳۴). در مطالعات انجام شده توسط Patel و همکارانش در سال ۱۹۹۴ مشخص شد که پیلوکارپین باعث افزایش هیدرولیز اینوزیتول فسفات بعنوان پیامبر ثانویه در نورون‌های کولینرژیک مغز موش می‌گردد و از این طریق آبشاری از وقایع داخل سلولی را به راه می‌اندازد که در نهایت موجب افزایش حافظه می‌گردد (۳۵). همچنین Bymaster در سال ۲۰۰۳ نشان داد که پیلوکارپین اثر تقویتی خود را از طریق افزایش هیدرولیز اینوزیتول فسفات به انجام می‌رساند (۳۶). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانکنش معنی‌داری بین تزریق توازن ویتامین A و پیلوکارپین بر میزان تشبیت و به یادآوری حافظه وجود دارد. پیلوکارپین اثر تقویتی ویتامین A را بر روند به یادآوری حافظه افزایش معنی‌داری می‌دهد.


تشکر و قدردانی

بدین وسیله از حوزه معاونت پژوهشی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل حمایت مالی و ارائه امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی جهت انجام این پژوهش در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد سپاسگزاری می‌گردد.

REFERENCES

- Heirs GH, Weiser H. The vitamin A activity of carotenoid. Int J Vitam Nutr Res 1967; 55: 5-13.
- Olson U, Isler O. Vitamins A and carotene. In: Sebrell WH, Harris RS, Editors. The vitamins chemistry, Physiology, Pathology, Methods. 2nd ed. New York: Academic Press; 1996. p.5-99.
- Sebrell WH, Harris RS, Editors. The vitamins chemistry, Physiology, Pathology, Methods. 2nd ed. New York: Academic Press; 1967. p.158.
- Jacobson SG, Cideciyan AV, Regunath G. Night blindness insorsby's fundus dystrophy by vitamin A. Nature Gen 1995;11: 27-35.

سال‌های اخیر مطالعه بر اثرات ویتامین A بسیار افزایش یافته است. اسید رتینوئیک تنها رتینوئیدی است که در مغز موش بالغ یافت شده و گیرنده‌های اسید رتینوئیک را فعال می‌کند (۲۸). گیرنده‌های اسید رتینوئیک بطور وسیعی در مغز موش بالغ گسترش یافته‌اند (۲۹)، بنابراین اسید رتینوئیک برای انجام عملکرد مغزی لازم است (۳۰).



نمودار ۳- اثر تزریق درون بطنی ویتامین A با دوزهای ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ در حضور یا عدم حضور پیلوکارپین با دوز ۵/۰ میکروگرم بر رت بر میزان STL در موش صحرایی نر بالغ. تزریقات فوراً پس از دریافت شوک در جلسه آموزش صورت گرفت. حیوانات کنترل هیچگونه تیماری دریافت نکردند. حیوانات گروه Sham، روغن کنجد را به عنوان حلal دریافت نمودند. نتایج بر اساس میانگین و انحراف معیار هر گروه تنظیم شده است. تعداد حیوانات در هر گروه ۷ سر بود. $P < 0.001$ و $P < 0.05$ * اختلاف از گروه شاهد را نشان می‌دهد. $P < 0.001$ و $P < 0.05$ ** اختلاف از گروه شاهد را نشان می‌دهد.

نواحی نورونی سیگنال‌دهی اسید رتینوئیک انعطاف پذیری بالایی دارند (۲۴، ۲۳). انعطاف پذیری مغزی برای بازآرایی الگوهای ارتباطات عصبی، یادگیری و حافظه و همچنین ترمیم آسیب مغزی ضروری است. رتینول و احتمالاً اسید رتینوئیک بر LTP و LTD اثر می‌گذارند. کاهش میزان ویتامین A در موش‌های مورد آزمایش موجب از دست رفتن انعطاف پذیری سیناپسی دراز مدت می‌شود (۲۲). همچنین کاهش بیان

5. Semb RD. The role of vitamin A and related retinoid in immune function. *Nutr Rev* 1998; 56: S 38-42.
6. De Klerk NH. Vitamin A and cancer prevention II: comparison of the effects of retinol and beta-carotene. *Int J Cancer* 1998; 75: 362-367.
7. Wolf G. A history of vitamin A and retinoids. *FASEBJ* 1996; 10: 1102-07.
8. Acott TS, Weleber RG. Vitamin A mega therapy for retinal abnormalities. *Nature Med* 1995; 1: 884-85.
9. Gold PE. Acetylccholine modulation of neural systems involved in learning and memory. *Neural learn Mem* 2003; 80: 194-210.
10. Fornari RV, Moreira KM, Oliveira MG. Effects of the selective M1 muscarinic receptor antagonist dicyclomine on emotional memory. *Learning and Memory* 2000; 7: 287-92.
11. Wang JH, Gladys YPK, Kelly T. Cellular and molecular base of memory: Synaptic and neural plasticity. *J Clin Neurophysiol* 1997; 14: 264-93.
12. Desimone R. The physiology of memory: recording of things past. *Science* 1992; 258: 242-46.
13. Zola-Morgan S, Squire LR, Clower RP, Rempel NL. Damage to the perirhinal cortex exacerbates memory impairment following lesions to hippocampal formation. *Neurosci* 1993; 13: 251-265.
14. Klinberg T, Roland PE, Kawashima R. The human entorhinal cortex participation in associative memory. *Neuro Report* 1994; 6: 57-60.
15. Duester G. Families of retinoid dehydrogenases regulating vitamin A function: production of visual pigment and retinoic acid. *Eur J Biochem* 2000; 267: 4315-4324.
16. Idres N, Marill J, Flexor MA, Chabot GG. Activation of retinoic acid receptor-dependent transcription by all-trans-retinoic acid metabolites and isomers. *J Biol Chem* 2002; 277: 31491-98.
17. Bastien J, Rochette-Egly C. Nuclear retinoid receptors and the transcription of retinoid-target genes. *Gene* 2004; 328: 1-16.
18. Krezel W, Kastner P, Chambon P. Differential expression of retinoid receptors in the adult mouse central nervous system. *Neuroscience* 1999; 89: 1291-300.
19. Aggarwal S, Kim SW, Cheon K, Tabassam F, Joon JH, Koo JS. Nonclassical action of retinoic acid on the activation of the camp response element-binding protein in normal human bronchial epithelial cells. *Mol Biol Cell* 2006; 17: 566-575.
20. Werner EA, Deluca HF. Retinoic acid is detected at relatively high levels in the CNS of adult rats. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2002; 282: 672-78.
21. Mc-Caffery PJ, Adams J, Maden M, Rosa-Molinar E. Too much of a good thing: retinoic acid as an endogenous regulator of neural differentiation and exogenous teratogen. *Eur J Neuro science* 2003; 18: 457-72.
22. Misner DL, Jacobs S, Shimizu Y, de Urquiza AM, Solomin L, Perlmann T. Vitamin A deprivation results in reversible loss of hippocampal long-term synaptic plasticity. *Proc Natl Acad Sci USA* 2001; 98: 11714-19.
23. Thompson Haskell G, Maynard TM, Shatzmiller RA, Lamantia AS. Retinoic acid signaling at sites of plasticity in the mature central nervous system. *J Comp Neurol* 2002; 452: 228-41.
24. Mc-Caffery P, Zhang J, Crandall JE. Retinoic acid signaling and function in the adult hippocampus. *J Neurobiol* 2006; 66: 780-91.
25. Corcoran J, Maden M. Nerve growth factor acts via retinoic acid synthesis to stimulate neurite outgrowth. *Nat Neurosci* 1999; 2: 307-308.
26. Hunter K, Maden M, Summerbell D, Eriksson U, Holder N. Retinoic acid stimulates neurite outgrowth in the amphibian spinal cord. *Proc Natl Acad Sci USA* 1991; 88: 3666-70.
27. Crandall J, Sakai Y, Zhang J, Koul O, Mineur Y, Crusio WE, et al. 13-cis-retinoic acid suppresses hippocampal cell division and hippocampal-dependent learning in mice. *Proc Natl Acad Sci USA* 2004; 101: 5111-16.
28. Kane MA, Chen N, Sparks S, Napoli JL. Quantification of endogenous retinoic acid in limited biological samples by LC/MS/MS. *Biochem J* 2005; 388: 363-369.
29. Zetterstrom RH, Simon A, Giacobini MMJ, Ericksson U, Olson L. Localization of cellular retinoid-binding proteins suggests specific roles for retinoids in the adult central nervous system. *Neuroscience* 1994; 62: 899-18.
30. Mey J, Mc-Caffery P. Retinoic acid signaling in the nervous system of adult vertebrates. *Neuroscience* 2004; 10: 409-421.

31. Cocco S, Diaz G, Stancampiano R, Diana A, Carta M, Curreli R, et al. Vitamin A deficiency produces spatial learning and memory impairment in rats. *Neuroscience* 2002; 115: 475-82.
32. Etchamendy N, Enderlin V, Marighetto A, Vouimba RM, Pallet V, Jaffard R, et al. Alleviation of a selective age-related relational memory deficit in mice by pharmacologically induced normalization of brain retinoid signaling. *J Neurosci* 2001; 21: 6423-29.
33. Chiang MY, Misner D, Kempermann G, Schikorski T, Giguere V, Sucov HM, et al. An essential role for retinoid receptors RAR beta and RXR gamma in long-term potentiation and depression. *Neuron* 1998; 21: 1353-61.
34. Riekkinen PJ, Jäkälä P, Sirviö J, Riekkinen P. The effects of increased serotonergic and decreased cholinergic activities on spatial navigation performance in rats. *Pharmacol Biochem Behav* 1991; 39: 25-29.
35. Patel S, Freedman SB. The muscarinic-receptor agonist L-658,903 modulates the in vivo accumulation of inositol monophosphates in mouse brain. *Eur J Pharmacol* 1994; 267: 329-34.
36. Bymaster FP, Carter PA, Yamada M, Gomeza J, Wess J, Hamilton SE, et al. Role of specific muscarinic receptor subtypes in cholinergic parasympathomimetic responses, in vivo phosphoinositide hydrolysis, and pilocarpine-induced seizure activity. *Eur J Neurosci* 2003; 17: 1403-10.

Archive of SID