

# توسعه راهکاری مکانمند به منظور تحلیل بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر مبنای آمار فضایی

فاطمه مشتاقی نژاد<sup>۱</sup>، حسین آقا محمدی<sup>۲\*</sup>، سعید بهزادی<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات مکانی - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران  
moshtagh\_1980@yahoo.com

<sup>۲</sup> استادیار گروه سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات مکانی - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران  
{hossein.ghamohammadi, behzadi.iau}@gmail.com

(تاریخ دریافت مرداد ۱۳۹۵، تاریخ تصویب تیر ۱۳۹۶)

## چکیده

بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که بحران آب و بارش در آنجا جدی است. به‌خاطر مقابله با این بحران‌ها، محققان در علم اقلیم‌شناسی به اطلاعات بارندگی، تحلیل الگوها و مدل‌سازی روابط فضایی، داده‌کاوی مکانی و همچنین برآورد و تخمین بارش به جهت مدیریت و مقابله با این شرایط به شدت نیازمندند. از طرفی دیگر، تنوع مکانی الگوهای بارش، حاصل عوامل متنوعی همچون موقعیت جغرافیایی، ارتفاع، ویژگی‌های توپوگرافی منطقه مانند شیب و... است که بررسی این پدیده را دشوارتر نموده و موجب شده که در مطالعات گذشته به‌طور جامع به آن پرداخته نشود یا تنها تاثیر برخی عوامل همانند ارتفاع بررسی گردد. از این‌رو در این مقاله قصد داریم تا با کمک ابزارها و تکنیک‌های مختلف علم زمین‌آمار و با در نظر گرفتن عوامل محیطی و مکانی مختلف موثر بر بارش، راهکار مکانمند جامعی برای توصیف این عارضه جغرافیایی توسعه دهیم. از این‌رو، حوضه آبریز دریاچه ارومیه به دلیل شرایط بحرانی که در سالیان اخیر با آن مواجه بوده‌است، به عنوان منطقه مطالعه موردی انتخاب گردید. ابتدا بارش ابتدا با کمک انواع روش‌های سنتی و زمین‌آمار، میان‌یابی شده و کریجینگ معمولی با کمک اعتبارسنجی تقاطعی و RMS برابر با ۴,۱۵ به عنوان بهترین روش انتخاب شد. سپس با کمک روش‌های مختلف آمار فضایی، از جمله تحلیل خوشه‌ای، نواحی جنوب و جنوب‌غربی این دریاچه به عنوان قسمت‌های داغ و پربارش شناسایی شدند. در پایان نیز، از جهت مدل‌سازی روابط مکانی، رگرسیون عمومی بر بارش برازش داده‌شد و متغیر عرض جغرافیایی به عنوان تاثیرگذارترین متغیر وابسته بر بارش شناسایی گردید.

**واژگان کلیدی:** برآورد بارش، میان‌یابی، زمین‌آمار، مدل‌سازی روابط مکانی، تحلیل خوشه‌ای

\* نویسنده رابط

## ۱- مقدمه

بارش نقش مهمی در چرخه آب و انرژی جهانی دارد. بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که بحران آب در آنجا جدی است. [۱]. کشور ما ایران نیز در کمربند خشک جهانی واقع شده و بارشی تنها معادل یک‌سوم متوسط جهانی دارد [۲]. به گزارش فائو، در سال ۲۰۱۳ میلادی به‌طور میانگین ۸۹۰ میلی‌متر باران در جهان باریده‌است؛ در حالی که این میزان بارش باران در ایران به‌طور میانگین ۲۶۰ میلی‌متر بوده و حکایت از یک بحران جدی در کشورمان دارد [۳]. به‌خاطر بحران‌های ناشی از کم‌آبی، محققان همواره به اطلاعات بارندگی برای پهنه‌بندی بارش، تحلیل الگوهای بارش و همچنین برآورد و تخمین آن به جهت مدیریت و مقابله با شرایط مختلف به شدت نیازمندند [۴].

به‌همین جهت، با توجه به اهمیت این موضوع و اطلاع از میزان بارندگی به جهت انجام تحلیل‌ها، در کنار ایستگاه‌های سینوپتیک و کلیماتولوژی در اکثر مناطق، شبکه ایستگاه‌های باران‌سنجی به‌طور فزاینده‌تری این پارامتر را اندازه‌گیری می‌نمایند، ولی محققان، غالباً به‌دلیل تنوع مکانی و زمانی بارش، بویژه تغییرپذیری آن در اقلیم‌های مختلف، به مشکلاتی بویژه چگونگی میان‌یابی و پهنه‌ای کردن داده‌های نقطه‌ای بارش مواجهند [۵]. همچنین برآورد دقیق‌تر بارش به عنوان ورودی بسیاری از مدل‌های تحلیلی برای اهداف متعدد در اقلیم‌شناسی ضروری است. لیکن، با توجه به تغییرات قابل‌ملاحظه بارندگی در زمان و مکان از یک سو و کم‌بودن ایستگاه‌های باران‌سنجی برای ثبت میزان بارندگی روزانه از سوی دیگر، ضرورت تبیین مدل‌های دقیق‌تر تخمین بارندگی و همچنین تحلیل الگوهای بارش در زمان و مکان اجتناب‌ناپذیر است [۶].

از همین‌رو، محققان این حوزه برای برآورد و تخمین و تحلیل متغیرهایی از این دست، روش‌های مختلفی ابداع نموده‌اند که برخی از آنها مبتنی بر روش‌های زمین‌آمار و ژئومتری است. طی چند دهه اخیر مبانی علم زمین‌آمار به خوبی گسترش یافته و توانایی‌های این شاخه از آمار در بررسی و پیش‌بینی متغیرهای مکانی، آمار مکانی بارش نام نهاده شده‌است [۷].

برای فهم آمار مکانی بارش، می‌بایست تعامل عمیق، پیچیده و مداوم بارش را با سایر عناصر و عوامل اقلیمی در

نظر گرفت که سبب تغییر و تنوع این عنصر در بعد زمان و مکان شده‌است. این تغییر و تنوع در رفتار آشکار و نهان بارش، توجه اقلیم‌شناسان و نیز اندیشمندان علوم مرتبط با اقلیم‌شناسی را به خود معطوف داشته‌است [۸]. یکی از رویکردهای مطالعاتی در مطالعه تنوع مکانی بارش، توصیف تنوع مکانی با استفاده از آماره‌های مکانی این عنصر اقلیمی است. کشف نظام حاکم بر تغییرات مکانی رویدادهایی نظیر بارش و هر عنصر اقلیمی دیگر، به‌منظور درک فرآیندهای مرتبط با آن و برآورد الگوها و مدل‌سازی رفتاری آن از شالوده‌های کاربرد آمار مکانی در اقلیم‌شناسی است [۹]. باید توجه داشت که تمامی رویدادهای مکانی، مؤلفه زمان را نیز در خود دارند [۳].

آمار مکانی برخلاف آمار کلاسیک، مشخصات آماری یعنی توزیع و پراکنش یک پدیده را نیز بر روی نقشه نشان می‌دهد. از این‌رو امکان توجه و تأکید بر تفاوت و شباهت‌های مکانی و نیز تشخیص نقاط خاص و منحصر به فرد یا مناطق همگن مهیا خواهد شد. در این راستا تعیین اندازه یا وسعت پدیده‌های مکانی امکان‌پذیر خواهد بود [۸]. با توجه به اهمیت و کاربرد تحلیل‌های مکانی، تاکنون با توجه به اهمیت و کاربرد تحلیل‌های مکانی، تاکنون محققین بسیاری در سطح جهان و ایران، به مطالعه و تحلیل مکانی عنصر اقلیمی بارش مبادرت ورزیده‌اند. از جمله، برآورد الگوهای رفتار بارش و مدل‌سازی آن از بنیادهای اصلی در تحقیقات مکانی اقلیمی است. در این راستا، یک تلاش عمده مورد توجه اقلیم‌شناسان بوده و آن پهنه‌بندی، تخمین و همچنین تحلیل الگوهای بارش در مطالعات است تا با شناخت بیشتر پدیده موردنظر در مناطق مختلف، بتوان بهتر شرایط موجود را مدیریت نمود.

## ۲-۱- مبانی نظری

## ۱-۲-۱- میان‌یابی

از جمله روش‌هایی که در سالیان اخیر، به‌خصوص با توجه به توسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی، در برآورد مکانی عناصر آب‌وهوایی به‌کار گرفته شده‌است، روش‌های میان‌یابی است [۳].

میان‌یابی به فرایند برآورد ارزش‌های کمی، برای نقاط بدون داده، به کمک نقاط مجاور و معلوم (که به نام پیمونگه، نمونه و یا مشاهده موسوم‌اند) گویند. این فرایند به دلیل محدودیت داده‌های نقطه‌ای و ضرورت تدوین نقشه

قطعی، مقادیر تخمینی فاقد خطاست، ولی در روش‌های احتمالی، برآورد حاوی خطاست [۱۱].

محققان در یک دسته‌بندی کلی‌تر دیگر، روش‌های میان‌یابی را به دو دسته روش‌های کلاسیک و روش‌های زمین‌آمار تقسیم می‌نمایند [۱۲]. در روش‌های آمار کلاسیک نمونه‌هایی که از کل جامعه به منظور شناخت برداشت می‌شوند، فاقد داده‌های موقعیت مکانی هستند. در حالی که در روش‌های زمین‌آمار که یک درون‌یابی غیردقیق یا احتمالاتی است، افزون بر مقدار یک کمیت معین در یک نمونه، موقعیت مکانی نمونه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در روش‌های کلاسیک که از آمار سنتی برای تخمین استفاده می‌نمایند، به دلیل عدم کفایت اطلاعات و آمار موجود و دقت پایین اندازه‌گیری‌ها، تخمین حاصله چندان رضایت‌بخش نیست؛ در صورتی که در روش‌های زمین‌آمار، تخمین بر اساس ساختار فضایی موجود در محیط مورد نظر صورت می‌پذیرد. از آنجا که آمار کلاسیک قادر به در نظر گرفتن توزیع مکانی پارامترها نبوده لذا زمین‌آمار به عنوان تکنیکی مناسب برای این هدف استفاده می‌شود [۱۲]. در این روش‌ها، از مدلی به نام واریوگرام یا پراش‌نگار<sup>۷</sup> برای توصیف پیوستگی فضایی داده‌های ورودی و تخمین مقدار مکان‌های اندازه‌گیری نشده یا برای مدل‌نمودن همبستگی مکانی متغیرهای مورد بررسی استفاده می‌نمایند [۱۳]. از جمله مهمترین روش‌های زمین‌آمار روش کریجینگ<sup>۸</sup> است. کریجینگ یک روش تخمین است که بر منطق میانگین متحرک وزن‌دار استوار بوده و بهترین تخمین گر خطی نا اریب با کمترین پراش تخمین است. این تخمین گر اختلالات ناشی از تمرکز زیاد نقاط اندازه‌گیری را به طور خودکار رفع می‌نماید. همچنین این روش یکی از تکنیک‌های بسیار مناسب و پیشرفته برای تحلیل فضایی و توزیع منطقه‌ای داده‌های مکانی بوده و یک روش برآورد پهنه است که متغیرهای استفاده شده در آن تا حدودی تصادفی است و از تابع هندسی مشخصی نیز تبعیت نمی‌نماید [۱۲]. با توضیحات فوق، می‌توان انواع روش‌های میان‌یابی را مطابق شکل تقسیم بندی نمود:

از کل یک پهنه، به منظور تهیه نقشه‌های هم‌ارزش (همباران، همدما و...) انجام می‌گیرد. این کار معمولاً برای یک شبکه، گره، یا تمامی سلول‌های یک پهنه صورت می‌پذیرد. بنابراین، میان‌یابی به معنای تبدیل داده‌های نقطه‌ای به داده‌های پهنه‌ای است. در تعیین ارزش یک نقطه تمامی نقاط مجاور و معلوم به گونه‌ای یکسان و همسان موثر نیستند. لذا، هر یک از نقاط یادشده به تناسب تاثیرشان بر ارزش نقطه مجهول، حامل وزنی خواهند بود. روش‌های تعیین وزن‌های مرتبط با هر یک از نقاط، سبب تکوین روش‌های گوناگونی در درون‌یابی شده‌است [۱۰].

روش‌های درون‌یابی از هر نوع، می‌توانند به صورت معادله‌ای خطی یا غیرخطی باشند. معادله کلی میان‌یابی به صورت معادله (۱) است و تفاوت روش‌های مختلف نیز در نحوه برآورد فاکتور وزنی معادله می‌باشد [۱۰]:

$$\hat{Z}(s_0) = \sum_{i=1}^N \lambda_i Z(s_i) \quad (1)$$


که در آن  $\hat{Z}(s_0)$  مقدار برآوردشده در موقعیت  $Z(s_i|s_0)$  مقدار اندازه‌گیری شده در موقعیت  $s_i$  معرف نقاط اندازه‌گیری شده و  $N$  تعداد کل ایستگاه‌هاست.

درون‌یابی را به چندین شیوه می‌توان طبقه‌بندی نمود. در ابتدا می‌توان این روش‌ها را به دو گروه جهانی<sup>۱</sup> (یا همگانی) و محلی<sup>۲</sup> (یا موضعی) طبقه‌بندی کرد. درون‌یابی جهانی، تمامی نقاط معلوم را برای برآورد ارزش نقاط نامعلوم بکار می‌گیرد. در حالی که روش محلی برای برآورد هر نقطه نامعلوم، تنها نمونه‌هایی از نقاط معلوم را بکار می‌برد [۱۱]. در طبقه‌بندی دیگر، دقت روش، ملاک طبقه‌بندی است. در روش‌های دقیق<sup>۳</sup> مقادیر برآوردشده به مشاهدات نزدیکتر است، در حالی که در روش‌های غیر-دقیق<sup>۴</sup>، تقریبی از ارزش‌ها بوده و سطحی را برآورد می‌کند که از پیمونگاه می‌گذرد [۱۲].

سومین ملاک طبقه‌بندی روش‌های درون‌یابی، مبتنی بر قطعی<sup>۵</sup> یا احتمالی<sup>۶</sup> بودن تخمین است. در روش‌های

۱ Global  
۲ Local  
۳ Exact  
۴ Inexact  
۵ Deterministic  
۶ Stochastic

۷ Variogram  
۸ Kriging



شکل ۱- انواع روش های میان یابی

بررسی و ارزیابی قرارگیرند [۱۵]. به همین منظور، برای مقایسه نتایج بدست آمده از میان یابی، روش های پرشماری وجود دارند. یکی از روش های مناسب و پرکاربرد، روش اعتبارسنجی تقاطعی<sup>۱۱</sup> است. در این روش با حذف هر یک از نقاط اندازه گیری شده (در اینجا ایستگاه باران سنجی)، که معمولاً تنها ابزار مقایسه می باشند، عملیات میان یابی مجدداً انجام می گیرد و تفاوت مقدار برآورد شده و مقدار واقعی به عنوان معیاری از خطا محاسبه می شود. به همین ترتیب برای تمام نقاط برآورد صورت می پذیرد و خطای حاصل برای کلیه نقاط بدست می آید [۱۶]. روش اعتبارسنجی تقاطعی از پارامترهای مختلفی جهت مقایسه بهره می برد. در این مقاله، از روش RMS<sup>۱۲</sup> که در تمامی روش های میان یابی قابل محاسبه است، استفاده می شود.

### ۱-۲-۲- خوشه بندی و تحلیل الگوهای بارش

در این پژوهش قصد داریم که از میان یابی به عنوان یک پیش نیاز برای انجام برخی دیگر از تحلیل های الگوهای بارش و همچنین برآورد و مدل سازی بارش استفاده نماییم. محققان برای تحلیل الگوهای بارش، از الگوریتم های متنوعی شامل شاخص میانگین نزدیکترین همسایگی، آماره عمومی جی<sup>۱۳</sup> یا خوشه های بالا/پایین، تحلیل خوشه فضایی چندفضایی چندفاصله ای یا تابع k ریبلی<sup>۱۴</sup>، تحلیل خود همبستگی فضایی آماره موران عمومی<sup>۱۵</sup> استفاده می نمایند.

با کمک این تحلیل ها می توان رفتار خوشه ای پدیده ها را بررسی نمود [۱۷]. برخی از این تحلیل ها نوع رفتار خوشه ای یا متمرکز و تصادفی بودن عوارض جغرافیایی با مقدار خصیصه ارزشی آنها را به شکل یک گزارش آماری و برخی دیگر بر روی نقشه ارائه می نمایند [۱].

بعد از تحلیل الگوی پراکنش پدیده ها و نحوه توزیع فضایی آنها به صورت آماره های فضایی و توزیع z استاندارد، محققان همچنین نیاز دارند تا نحوه توزیع خوشه ای یا متمرکز و نیز الگوی پراکندگی عوارض با مقدار خصیصه آنها را بر روی نقشه نشان دهند [۳]. ابزارهای متعددی جهت تهیه نقشه خوشه ها وجود دارند که پرکاربردترین آنها عبارتند از:

روش های میان یابی کلاسیک مانند روش وزن دهی معکوس فاصله<sup>۱</sup>، توابع شعاع محور<sup>۲</sup>، چند جمله ای جهانی<sup>۳</sup> و چند جمله ای محلی<sup>۴</sup> همگی جز روش های قطعی هستند. روش های زمین آمار همانند روش کریدجنگ ساده<sup>۵</sup>، معمولی<sup>۶</sup>، عام<sup>۷</sup>، قطعه ای<sup>۸</sup>، کوکریدجنگ<sup>۹</sup>، همچنین روش های اسپلاین<sup>۱۰</sup> کاملاً منظم، با کشش و صفحه نازک همگی جز روش های احتمالی و غیرقطعی طبقه بندی می شوند [۱۱]، [۱۳]، [۱۴].

برای شروع درون یابی پیش نیازهایی لازم است. بدین منظور، ابتدا باید بررسی های ذیل بروی داده ها صورت پذیرد [۱۴]:

۱. آیا داده ها توزیع نرمال دارند؟ اگر داده ها توزیع نرمال ندارند، باید با استفاده از توابع موجود به توزیع نرمال تبدیل شوند.
۲. آیا در داده ها روند وجود دارد؟ اگر در داده ها روند مشاهده شود می بایست با توابع موجود روندزدایی صورت پذیرد. قابل ذکر است برخی روش های میان یابی، تنها در صورت وجود روند در داده ها، قابل بکارگیری هستند.

همچنین می بایست بعد از بکارگیری تکنیک های میان یابی، این روش ها از این منظر که بتوانند مقادیر یک نقطه اندازه گیری شده را با دقت بالایی تخمین بزنند، مورد-

۱ Inverse Distance Weighting  
 ۲ Radial Basis Functions  
 ۳ Global Polynomial Interpolation  
 ۴ Local Polynomial Interpolation  
 ۵ Simple Kriging  
 ۶ Ordinary Kriging  
 ۷ Universal Kriging  
 ۸ Block Kriging  
 ۹ Co-Kriging  
 ۱۰ Spline

۱۱ Cross Validation  
 ۱۲ Root Mean Square  
 ۱۳ Getis Ord General G  
 ۱۴ Multi Distance Spatial Cluster Analysis (K Function)  
 ۱۵ Moran I

• تحلیل خوشه با شاخص موران محلی انسلین

• تحلیل لکه‌های داغ<sup>۱</sup> یا آماره جی استار

همان‌گونه که بیان شد آماره موران عمومی تنها رفتار خوشه‌ای را بر روی بارش سالانه نشان می‌دهد و نمی‌تواند بیانگر نوع رفتار فضایی پدیده مورد نظر ضمن شناخت از رفتار خوشه‌ای بارش سالانه بر روی نقشه باشد؛ لذا برای آشکارسازی نحوه رفتار بارش سالانه از نظر الگوی توزیع پراکندگی‌های فضایی بر روی نقشه از آماره محلی موران استفاده می‌شود. تحلیل لکه‌های داغ نیز به عنوان یکی دیگر از روش‌های تهیه نقشه خوشه‌ها، آماره جی استار را برای کلیه عوارض موجود در داده‌ها محاسبه می‌نماید. امتیاز یا آماره Z محاسبه شده، نشان می‌دهد که در کجای ناحیه مورد مطالعه یا داده‌ها مقادیر زیاد یا کم به صورت خوشه‌های داغ یا سرد تجمع یافته‌اند [۳].

### ۱-۲-۳- مدل سازی روابط فضایی

یکی از روش‌های پرکاربرد و محبوب برای مدل‌سازی روابط فضایی عوارض جغرافیایی از جمله بارش، روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی<sup>۲</sup> (OLS) است [۱]، [۳]، [۱۷]. در مفهوم رگرسیون، فرض می‌شود که یک متغیر مثل Y را در طول زمان یا در بین واحدهای مختلف مشاهده کرده و داده‌های مربوط به آن را به دست آورده‌ایم، می‌خواهیم چگونگی تغییرات آن را تفسیر کنیم [۱]. برای این متغیر وابسته، متغیر یا متغیرهایی را در نظر بگیریم که بتوانند این تغییرات را توضیح دهند. فرض کنید [۱۹]:

$$y_t = f(x_{1,t}, \dots, x_{k,t}) \quad (2)$$

معادله (۲)، یک مدل ریاضی است چرا که فقط رابطه ریاضی بین متغیر وابسته (Y) و متغیرهای مستقل (X) را منعکس کرده است. اگر تابع f نسبت به متغیرهای  $X_1$  تا  $X_k$  خطی باشد یعنی به فرم:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{1,t} + \dots + \beta_k x_{k,t} \quad (3)$$

معادله (۳)، یک مدل ریاضی خطی نامیده می‌شود. اینکه چه متغیرهایی باید به عنوان متغیرهای توضیح-دهنده استفاده شوند، می‌تواند به تئوری‌های به کار گرفته شده و با برداشت شخصی مدل ساز بستگی داشته باشد [۱].

روش رگرسیون حداقل مربعات عمومی، یک شکل از رگرسیون خطی برای پیش‌بینی یا برای مدل‌سازی متغیر وابسته در ارتباط با مجموعه‌ای از متغیرهای مستقل یا توضیحی می‌باشد. شناخت و ارزیابی ارتباط بین دو دسته متغیر باعث فهم بهتر ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل می‌شود، و نشان می‌دهد که در یک مکان چه چیزی در حال رخداد است. رگرسیون مربعات عمومی شناخته شده‌ترین تکنیک رگرسیون‌هاست [۱۸]، [۱۹]. رگرسیون با فراهم نمودن یک مدل جهانی از متغیرها یا فرآیندی که ما درصدد پیش‌بینی و فهم ارتباط بین متغیرها هستیم، تنها یک معادله را برای نشان دادن این فرآیند نمایش می‌دهد [۱]، [۳].

### ۱-۳- مرور ادبیات

در زمینه میان‌یابی، تحلیل و برآورد بارش در سطح ملی و بین‌المللی مطالعات فراوانی صورت پذیرفته است که اغلب آنها کاربردهای GIS و روش‌های زمین آماری را در تهیه نقشه‌های همباران و همچنین نقشه‌های برآورد بارش ارائه نموده‌اند؛ برای مثال کارایوسف اوقلو و همکاران (۲۰۱۰) به بررسی و تخمین پارامترها و توزیع مکانی بارش در حوضه سولاکلی کشور ترکیه با استفاده از روش‌های میان‌یابی از جمله وزن‌دهی عکس فاصله، توابع پایه شعاعی و کریجینگ پرداختند که روش کریجینگ از دقت بالاتری نسبت به بقیه روش‌ها برخوردار بوده است. یاوز و اردوغان (۲۰۱۲)، به دلیل همبستگی معنی‌دار بارندگی با ارتفاع، مناسب‌ترین روش برای برآورد میانگین بارندگی‌های روزانه، ماهانه و سالانه را روش کوکریجینگ معمولی تشخیص داده و بیان نمودند که در زمینه برآورد بارش، متغیر ارتفاع بهتر از متغیر فاصله از ساحل عمل می‌نماید. ابوماشر و همکاران (۲۰۱۴) نیز برای میان‌یابی بارش از داده‌های ۶۸۴ ایستگاه هواشناسی در چین و از روش‌های رگرسیون خطی عمومی و روش کریجینگ استفاده نمودند. برای انتخاب شش متغیر کمکی از جمله طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع، شیب، زبری سطح و تراکم رودخانه از روش رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد و با بررسی دقت پیش‌بینی روش‌های مورد استفاده، روش کریجینگ عملکرد بهتری داشته است.


عساکره (2008) به کاربرد روش کریجینگ در

درون‌یابی بارش برای تهیه نقشه همباران کشور ایران پرداخته و از ۱۱ روش زمین‌آماري مختلف با سه فرض

<sup>۱</sup> Hot Spot Analysis

<sup>۲</sup> Ordinary Least Square

این دریاچه نمونه‌ای شاخص از یک حوضه آبریز بسته است که کلیه رواناب‌های جاری در رودخانه‌های حوضه به آن تخلیه می‌گردد. این دریاچه با مساحت ۵۱۸۷۶ کیلومتر مربع، یکی از شش حوضه آبریز اصلی کشور است که بین استان‌های آذربایجان غربی (۴۶٪)، آذربایجان شرقی (۴۳٪) و کردستان (۱۱٪) قرار دارد. همچنین این دریاچه، در ردیف ۲۵ امین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار گرفته، بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه بزرگ آب‌شور دنیاست. وضعیت توپوگرافی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شکل نمایش داده شده است:



شکل ۲- منطقه مورد مطالعه

با وجود اهمیت منحصر به فرد این دریاچه در کشورمان، متأسفانه از اواسط دهه ۱۳۸۰ شروع به خشک شدن نموده است و امروزه در خطر خشک شدن کامل قرار دارد. عوامل متعددی از جمله میزان بارش، جریان رودخانه‌ها، تبخیر و دما بر این فرآیند تاثیرگذارند. به همین جهت، این حوضه به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب و بارش به عنوان یکی از عوامل موثر بر این رخداد خشکی این دریاچه، میان‌یابی، پهنه‌بندی، بررسی و تحلیل خواهد شد.

## ۲-۲- داده های مورد نیاز

برای انجام این پژوهش، از داده‌های سالیانه بارش ۲۱ ایستگاه سینوپتیک سازمان هواشناسی و بارانسنجی وزارت نیرو طی دوره مشترک آماری ۶۳ ساله از سال ۱۹۵۱ تا ۲۰۱۴ میلادی استفاده و سپس بر مبنای این آمار، میانگین بارش سالیانه ایستگاه‌ها به عنوان متغیر وابسته محاسبه شده است. (لازم به ذکر است که برای برخی از ایستگاه‌های جدیدالتاسیس، برای دوره ۶۳ ساله داده موجود نبوده است، لذا از میانگین تعداد داده‌های در

نبود روند در داده‌ها، وجود روند خطی و روند درجه دو بررسی شد. او با بررسی میزان خطای برآوردی و درصد آن و انحراف استاندارد نقشه‌ها نشان داد که برازش مدل خطی بر نیمه‌پراش‌نگار، بهترین الگو برای میان‌یابی بارش بر اساس روش کریجینگ است. عیوضی و همکاران (۲۰۱۲)، در منطقه گلستان، تغییرات بارش را با استفاده از روش‌های کریجینگ ساده، معمولی و عام با بهره‌گیری از متغیرهای ارتفاع، عرض جغرافیایی، شیب و فاصله از خطالرأس بررسی و بیان نمودند که با وجود هماهنگی نسبی بین بارش و ناهمواری، بیشینه بارش بر حداکثر ارتفاع ناهمواری‌ها منطبق نیست. در این مقاله، کریجینگ معمولی با متغیرهای کمکی عرض جغرافیایی و فاصله از خطالرأس بهترین روش برای برآورد تشخیص داده شد.

با بررسی مقالات پیشین می‌توان دریافت که دو تلاش عمده در این حوزه مورد توجه محققان پیشین بوده است؛ یکی پهنه‌بندی بارش و دیگری تحلیل تغییرات زمانی- مکانی بارش. در مجموع، در اغلب مقالات، برای میان‌یابی بارش غالباً از متغیر ارتفاع به عنوان متغیر کمکی استفاده شده است که این یک نقیصه است؛ چرا که میزان بارش در هر ناحیه، تابع عوامل زیادی است و اگر چه ارتفاع عاملی مهم در بارش محسوب می‌شود، ولی عامل کافی نمی‌تواند باشد. همچنین مطالعات اخیر در مورد انتخاب بهترین روش میان‌یابی و تهیه نقشه‌های اقلیمی نشان می‌دهد که انتخاب نوع میان‌یابی بستگی به شرایط جغرافیایی منطقه دارد و برای هر منطقه بایستی به‌طور جداگانه بررسی شود تا یکی از روش‌های میان‌یابی به عنوان روشی با عملکرد بهتر شناسایی شود. به همین منظور برای رفع کاستی‌های مطالعات پیشین، در این مقاله، هم پهنه‌بندی بارش و هم تحلیل آمار فضایی و تخمین بارش مورد توجه خواهد بود. همچنین برای بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر بارش، علاوه بر ارتفاع، از متغیرهای توپوگرافیک دیگری همچون طول و عرض جغرافیایی، شیب، میزان وزش باد و میانگین دمای هوا نیز به‌طور همزمان در مدل تخمین بهره خواهیم برد.

## ۲- مواد و روش‌ها

### ۲-۱- منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز دریاچه ارومیه از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین اکوسیستم‌های آبی ایران و جهان به شمار می‌آید. اکوسیستم

۱. میان یابی بارش با انواع روش های کلاسیک و زمین آمار

۲. انتخاب بهترین روش میان یابی با اعتبارسنجی تقاطعی

۳. تحلیل الگوهای پراکندگی و توزیع بارش با آمار فضایی

۴. استخراج و تحلیل نقشه های خوشه یندی بارش

۵. مدل سازی روابط فضایی با روش های رگرسیونی

شکل ۳- روشگان اجرای پژوهش

### ۳- نتایج


#### ۳-۱- میان یابی بارش

برای انجام بسیاری از روش های میان یابی، ابتدا نیاز است یک سری آزمون های آماری اولیه را بر روی داده ها بررسی نماییم. این تست های آماری عبارتند از:

- بررسی نرمال بودن داده های بارش در ایستگاه ها و نرمال سازی آنها در صورت نیاز
- بررسی روند و حذف آن در صورت وجود

#### ۳-۱-۱- بررسی نرمال بودن داده ها

نرمال بودن داده های بارش در ایستگاه ها را با کمک آزمون کلموگروف-اسمیرنوف بررسی می نماییم؛ با توجه به نتایج شکل ۱ که میزان Sig. را بیشتر از 0.05 نشان می دهد، می توان نتیجه گرفت که داده های مزبور نرمال بوده و نیازی به نرمال سازی داده ها وجود ندارد.



Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
مغوسط بارش سالانه به میلیمتر	.122	21	.200 <sup>*</sup>	.941	21	.226

شکل ۱- بررسی نرمال بودن داده های بارش حوضه دریاچه ارومیه

#### ۳-۱-۲- بررسی وجود روند در داده ها


شرط دیگر برآورد با برخی روش های زمین آمار، عدم وجود روند در داده های متغیر مورد برآورد (در اینجا بارش)

دسترس برای آن ایستگاه ها استفاده شده است). علاوه بر این داده ها، طول و عرض جغرافیایی به همراه ارتفاع و شیب هر ایستگاه و همچنین متوسط دمای سالانه و متوسط سالانه سرعت باد به عنوان متغیرهای مستقل استخراج گردیده است. شکل محدوده مورد مطالعه و موقعیت ایستگاه های مورد استفاده را نمایش می دهد.

### ۳-۲- روشگان اجرای پژوهش

با توجه به مطالب بیان شده در بخش های قبلی، می توان روشگان و گام های اجرای این پژوهش که دربرگیرنده یک راهکار مکانمند برای تحلیل عارضه جغرافیایی بارش است را در شکل خلاصه نمود. انجام هر مرحله از این درختواره، می تواند به پژوهشگران، چارچوب و راهکاری مکانمند با ابزارهای مختلف بر پایه تحلیل های آمار فضایی در اختیار دهد تا عارضه بارش را با دیدی همه جانبه و جامع بررسی نمایند. این چارچوب نه تنها برای بارش، بلکه برای تحلیل و بررسی سایر عوارض جغرافیایی نیز قابل بکارگیری است. در این چارچوب ابتدا داده های بارش با کمک روش های مختلف زمین آمار و کلاسیک میان یابی شده و سپس با استفاده از اعتبارسنجی تقاطعی بهترین روش به عنوان ورودی سایر تحلیل ها انتخاب خواهد شد. در گام سوم، الگوهای بارش با کمک چهار شاخص میانگین نزدیکترین همسایگی، آماره عمومی جی یا خوشه های بالا/پایین، تحلیل خوشه فضایی چندفضایی چندفاصله ای یا تابع k ریبیلی و تحلیل خود همبستگی فضایی آماره موران عمومی تحلیل و بررسی می شود. بعد از تحلیل الگوی پراکنش پدیده ها و نحوه توزیع فضایی آنها به صورت آماره های فضایی و توزیع Z استاندارد، برای نمایش نحوه توزیع خوشه ای یا متمرکز و نیز الگوی پراکندگی عوارض با مقدار خصیصه آنها را بر روی نقشه از دو تحلیل تحلیل خوشه با شاخص موران محلی انسلین و تحلیل لکه های داغ درگام چهارم بهره برده خواهد شد. سپس در گام نهایی با کمک روش رگرسیون حداقل مربعات عمومی، روابط فضایی عارضه بارش مدل سازی خواهد شد. این رابطه فضایی به صورت یک معادله خطی و همچنین بر روی نقشه ارائه می شود. همان طور که قابل رویت است، گام های این راهکار، دیدی همه جانبه و جامع از عارضه بارش ارائه می دهد.

با توجه به نتایج بدست آمده، روش کریجینگ معمولی با تابع نیم تغییر نمای Holl Effect و با کمترین RMS، به عنوان بهترین روش میان یابی بارش در حوضه دریاچه ارومیه انتخاب می شود. بدین ترتیب، نقشه میان یابی مربوط به آن در شکل ۳ نمایش داده می شود:



شکل ۳- نقشه میان یابی بارش حوضه دریاچه ارومیه به روش کریجینگ معمولی


### ۳-۲- داده کاوی مکانی و تحلیل آمار فضایی بارش در حوضه دریاچه ارومیه

بعد از میان یابی بارش در بخش قبل، در این قسمت با کمک تحلیل های آمار فضایی به بررسی نحوه توزیع بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه خواهیم پرداخت. این بخش، گام های سه و چهار چارچوب شکل را پوشش خواهد داد. برای بکارگیری این تحلیل ها ابتدا لازم است، داده های مورد استفاده در آنها که شامل داده های نقطه ای (پیکسل مینا) است، از نقشه پهنه بندی بارش حوضه دریاچه ارومیه (شکل ۳) تهیه گردد.

### ۳-۲-۱- تحلیل الگوی بارش با شاخص میانگین نزدیکترین همسایگی

تحلیل الگوی بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش میانگین نزدیکترین همسایگی، مبین این واقعیت می باشد که با توجه به مقدار  $Z > 1/96$  و بزرگتر بودن این مقدار که در دنباله توزیع  $Z$  در ناحیه قرمز رنگ شکل ۴ قرار گرفته و مقدار آن  $187,832$  می باشد و آماره  $P$ -Value صفر، نشان دهنده این است که الگوی بارش سالانه حوضه دریاچه ارومیه از الگوی پراکنده با مقدار بالای میانگین

است. در صورت وجود روند، باید با استفاده از روش های مناسب آنرا حذف نمود. با کمک ابزار Trend Analysis در نرم افزار ArcGIS، همان طور که در شکل ۲ مشاهده می شود، از غرب به شرق روند مشاهده نمی شود و از شمال به جنوب، روند از نوع چندجمله ای درجه دو وجود دارد که لازم است در برخی از روش های میان یابی از جمله کریجینگ و کوکریجینگ عام روندزایی صورت پذیرد.



شکل ۲- بررسی روند در داده های بارش حوضه دریاچه ارومیه


### ۳-۱-۳- میان یابی بارش در حوضه دریاچه ارومیه

بعد از بررسی آزمون های اولیه آماری بر روی داده ها، در این بخش انواع روش های میان یابی کلاسیک و زمین-آمار را بر روی داده ها اعمال نموده و با کمک اعتبارسنجی تقاطعی بهترین نقشه هم باران را استخراج می نماییم. قابل ذکر است در روش IDW، توان بهینه مورد استفاده ۲ و نوع همسایگی، استاندارد در نظر گرفته شده است. در روش RBF از توابع کرنل مختلفی استفاده نموده و آن تابعی که کمترین خطا را ایجاد نموده، به عنوان بهترین برآورد انتخاب شده است. در روش های زمین آمار نیز انواع مدل های نیم پراش نگار، مورد استفاده قرار گرفته و آنکه کمترین خطا را ایجاد کرده، انتخاب گردیده است. نتایج پیاده سازی این روش ها به همراه برآورد دقت هر روش به کمک اعتبارسنجی تقاطعی در جدول ۱ ارائه می شود:

جدول ۱- پیاده سازی روش های مختلف میان یابی بارش برای حوضه دریاچه ارومیه

RMS	روش میان یابی مورد استفاده
4.63	IDW
4.43	RBF با تابع کرنل Inverse Multi Quadric
4.62	GPI
5.02	LPI با تابع کرنل Exponential
4.15	کریجینگ معمولی با تابع نیم تغییرنمای Holl Effect
4.31	کریجینگ ساده با تابع نیم تغییرنمای Stable
5.67	کریجینگ عام با تابع نیم تغییرنمای Circle
4.31	کوکریجینگ معمولی با تابع نیم تغییرنمای Exponential
4.33	کوکریجینگ ساده با تابع نیم تغییرنمای Holl Effect
4.72	کوکریجینگ عام با تابع نیم تغییرنمای Spherical






شکل ۵- تحلیل الگوی بارش حوضه دریاچه ارومیه با آماره جی

### ۲-۳- شاخص تحلیل خوشه فضایی چندفاصله‌ای

برای تفسیر نتایج این تحلیل و با توجه به شکل ۶، چنانچه ملاحظه می‌شود خط قرمز رنگ داده‌های مشاهده‌شده در تمامی فواصل بالاتر از خط آبی رنگ موردانتظار واقع شده که مبین یک الگوی خوشه‌ای در رفتار بارش حوضه دریاچه ارومیه را نشان می‌دهد.




شکل ۶- تحلیل خوشه فضایی چند فاصله ای یا تابع K ریبلی برای داده‌های بارش حوضه دریاچه ارومیه

### ۲-۴- تحلیل خودهمبستگی فضایی آماره موران عمومی

برای تفسیر نتایج تحلیل خودهمبستگی فضایی با کمک آماره موران (شکل ۷) با توجه به اینکه مقدار آماره استاندارد  $z > 1/96$  در سطح ۱ درصد بزرگتر از عدد  $1/96$  می باشد و در دنباله توزیع در ناحیه قرمز رنگ واقع شده‌است، رفتار بارش سالانه حوضه دریاچه ارومیه از الگوی خوشه‌ای با تمرکز بالا برخوردار است. به طوری که مقدار p-value صفر نشان از یک الگوی خوشه‌ای با تمرکز بالا را می‌دهد. آماره عمومی موران جهانی نیز  $0/99$  درصد به دست آمد. آماره موران با استفاده از یک ضریب همبستگی بیان می‌شود و مقدار آن بین اعداد  $+1$  تا  $-1$  در

نزدیکترین همسایگی به میزان  $1,476$  برخوردار است. همچنین مقدار میانگین فاصله موردمشاهده از مقدار میانگین فاصله مورد انتظار بزرگتر بوده که خود گواهی دیگر از الگوی پراکنندگی بارش سالانه حوضه دریاچه ارومیه به روش میانگین نزدیکترین همسایگی است.




شکل ۴- تحلیل الگوی بارش حوضه دریاچه ارومیه با شاخص میانگین نزدیکترین همسایگی

### ۲-۲-۳- آماره عمومی جی یا خوشه‌های بالا/پایین


تحلیل الگوی بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از آماره عمومی جی نشان می‌دهد که با توجه به اینکه مقدار آماره استاندارد  $z > 1/96$  در سطح ۱ درصد بزرگتر از عدد  $1/96$  می‌باشد و در دنباله توزیع در ناحیه قرمز رنگ واقع شده‌است (شکل ۵)، رفتار بارش سالانه حوضه دریاچه ارومیه از الگوی خوشه‌ای با تمرکز بالا برخوردار است. به طوری که مقدار p-value و همچنین واریانس صفر نشان از یک الگوی خوشه‌ای با تمرکز بالا را می‌دهد. آماره عمومی جی نیز بسیار نزدیک به صفر به دست آمده و مقادیر مورد انتظار و مشاهده شده نیز تقریباً صفر است. چنانچه مقدار آماره z استاندارد در دنباله چپ توزیع با مقدار منفی قرار می‌گرفت این نوع الگو از یک رفتار با تمرکز خوشه‌ای پایین پیروی می‌کرد. میانه نمودار زنگوله‌ای شکل، حاکی از یک الگوی تصافی و غیر معنی‌دار آماری است.

محسوب می‌شوند. سایر مناطق که به صورت نقاط خاکستری رنگ در نقشه توزیع شده‌اند، نیز از حیث نقاط بالا-بالا، پایین-پایین، بالا-پایین و پایین-بالا الگویی را نشان نداده و از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشند.




شکل ۸- تحلیل خوشه و ناخوشه برای داده‌های بارش حوضه دریاچه ارومیه با شاخص آماره موران محلی انسلین

همچنین با کمک تحلیل لکه‌های داغ یا جی‌استار که نقشه مربوط به آن در شکل ۹ مشاهده می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که لکه‌های داغ محدوده‌های بیشتری از جنوب و جنوب‌غربی منطقه مورد مطالعه را از نظر مقادیر بارش با خوشه‌های بالا که نشان‌دهنده بارش بالا از نظر خودهمبستگی فضایی بوده‌اند، تشکیل می‌دهند. تمرکز خوشه‌های با تمرکز نسبتاً کمتر از خوشه‌های بالا نیز در دامنه قرمز رنگ پراکنش بارش، نیز در برخی از نواحی فوق نمایان است. لکه‌های سرد واقع شده که از نظر امتیاز ۹۹ تا ۹۰ درصد معنی‌دار می‌باشند در ناحیه شمال و مرکزی حوضه دریاچه ارومیه و دو لکه جافتاده در مناطق سراب و سلماس دیده می‌شود که لکه‌های سرد با تمرکز پایین مقدار بارش و الگوی خوشه‌ای را تشکیل می‌دهند. سایر مناطق نیز از الگوی فضایی خاصی پیروی نکرده و از نظر آماری معنی‌دار نیستند.



شکل ۹- تحلیل لکه‌های داغ داده‌های بارش حوضه دریاچه ارومیه

نوسان است. به طوری که اگر مقدار آماره موران به سمت +۱ حرکت کند نشان از یک الگوی خوشه‌ای بالا و متمرکز در بیشتر ناحیه مورد مطالعه دارد. اگر آماره موران به سمت -۱ حرکت نماید مبین یک الگوی پراکنده بر روی عارضه جغرافیایی که در اینجا بارش سالانه خواهد بود، می‌باشد. مقدار نزدیک به صفر گویای یک الگوی تصادفی و غیرمعنی‌دار در سطح اطمینان مورد نظر است.



Global Moran's I Summary	
Moran's Index:	0/990311
Expected Index:	-0/000024
Variance:	0/000012
Z-score:	287/506368
p-value:	0/000000

شکل ۷- تحلیل خودهمبستگی فضایی داده‌های بارش حوضه دریاچه ارومیه با آماره موران عمومی

### ۳-۲-۵- تهیه نقشه خوشه‌ها و تحلیل آنها

در بخش‌های قبلی، انواع روش‌های تحلیل الگوی پراکنش پدیده‌ها و نحوه توزیع فضایی آنها به صورت آماره‌های فضایی و توزیع Z استاندارد بررسی شد، ولی نحوه توزیع خوشه‌ای یا متمرکز و الگوی پراکندگی عوارض با مقدار خصیصه آنها بر روی نقشه نشان داده نشده است. به همین منظور در این بخش، با کمک دو روش تحلیل شامل روش خوشه و تکدانه یا شاخص موران محلی انسلین و تحلیل لکه‌های داغ یا آماره جی‌استار، نقشه خوشه‌ها را استخراج می‌نماییم. هر دو نوع این روش‌ها برای شناخت و آگاهی از نحوه رفتار فضایی داده‌های جغرافیایی به همراه خصایص آنها بر روی نقشه با توزیع‌های آماری، معنی‌داری و عدم معنی‌داری است.


تحلیل خوشه و ناخوشه برای داده‌های بارش حوضه دریاچه ارومیه با شاخص آماره موران محلی انسلین در شکل ۸ نشان می‌دهد که خوشه‌های بالا-بالا یعنی همان قسمت‌های پربارش، نواحی جنوب و جنوب‌غربی این دریاچه را تشکیل می‌دهند. مرکز حوضه دریاچه ارومیه و همچنین دو لکه جدا افتاده در نواحی ایستگاه‌های سراب و سلماس جز خوشه‌های پایین-پایین و نقاط کم‌بارش

### ۳-۳- مدل سازی روابط فضایی بارش

جدول ۳- ضرایب مدل رگرسیون برای پیش بینی بارش در حوضه دریاچه ارومیه

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	302.952	3.432		88.277	.000
	X	-.545	.039	-.072	-13.915	.000
	Y	-6.724	.056	-.801	-119.851	.000
	ارتفاع	.002	.000	.147	43.564	.000
	شیب	-6.278E-8	.000	-.018	-5.404	.000
	سرعت باد	.674	.105	.047	6.447	.000
	دما متوسط	-.354	.008	-.145	-43.979	.000

همچنین شکل ۱۰ نشان دهنده توزیع تقریباً نرمال در باقی مانده های حاصل از مدل OLS است و نشان می دهد که مدل رگرسیون برای مسئله پژوهش ما، قابل بکارگیری است.



شکل ۱۰- نمودار هیستوگرام باقی مانده های حاصل از مدل OLS

در نتیجه با کمک ستون B در جدول ۳ که همان ضرایب مدل رگرسیونی را نشان می دهد، معادله رگرسیونی پیش بینی بارش در حوضه دریاچه ارومیه عبارتند از:

$$\begin{aligned} \text{بارش} = & 302.952 - 0.545 * (\text{طول}) - 6.724 \\ & * (\text{عرض}) + 0.002 * (\text{ارتفاع}) \\ & - 6.278E - 8 * (\text{شیب}) + 0.674 \\ & * (\text{دما}) - 0.354 * (\text{باد}) \end{aligned}$$

حال نقشه برآورد یا تخمین بارش در حوضه دریاچه ارومیه با روش OLS مطابق شکل ۱۱ ارائه می شود. چنانچه مشاهده می شود، میزان برآورد تخمین مدل به صورت پیش بینی بیشتر از حد واقعی یا کمتر از حد واقعی در تمامی مناطق پراکنده می باشد. اما میزان برآورد کمتر از حد واقعی نسبت به مقادیر بیشتر از حد واقعی در سطح منطقه، نسبت های بیشتری را به خود اختصاص د

در گام پنجم، برای مدل سازی روابط فضایی بارش در حوضه دریاچه ارومیه از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده می شود. به همین منظور در این بخش، ابتدا با کمک داده های گزیده شده، مدل رگرسیون را با کمک نرم افزار SPSS23 استخراج می نماییم. متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده شامل، طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع، شیب، متوسط دما و وزش باد سالیانه و متغیر وابسته نیز بارش است.

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۲، مقدار  $R^2$  که نشان می دهد چه مقدار از متغیر وابسته بارش، می تواند توسط متغیرهای مستقل تبیین شود، برابر با مقدار ۶۰ درصد است که در واقع مقدار نسبتاً مناسب و چشم گیری است. همچنین با توجه به نتایج جدول ANOVA، میزان معناداری (sig) در مسئله ما کمتر از ۰,۰۵ بدست آمده و بیان گر این است که مدل رگرسیونی می تواند به طور معناداری تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی نماید.


جدول ۲- خلاصه و جدول ANOVA مدل رگرسیون بارش در حوضه دریاچه ارومیه

Model Summary			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.778 <sup>a</sup>	.605	.605

a. Predictors: (Constant), ارتفاع, دمای متوسط, شیب, عرض, طول

ANOVA <sup>a</sup>					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	861111.438	6	143518.573	10507.936
	Residual	562891.818	41213	13.658	
	Total	1424003.255	41219		

همچنین مطابق نتایج جدول ۳، مشاهده می شود که مقدار ثابت و همه متغیرهای مستقل در مدل با توجه به مقدار Sig معنادار شده اند. با کمک ستون بتا می توانیم سهم نسبی هر متغیر را در پیش بینی متغیر وابسته مقایسه کرده و تعیین نماییم که کدام متغیرها بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته دارند. همان طور که مشخص است متغیر عرض جغرافیایی بیشترین سهم و متغیرهای طول جغرافیایی و سرعت وزش باد کمترین تاثیر را در میزان بارش در حوضه دریاچه ارومیه داشته اند.



شکل ۱۱- نقشه برآورد یا تخمین مدل با کمک OLS

#### ۴- نتیجه گیری

در این پژوهش، با بکارگیری انواع روش‌های داده‌کاوی مکانی و آمار فضایی، به تحلیل همه‌جانبه و جامعی از عارضه بارش در حوضه دریاچه ارومیه پرداخته شده است. ابتدا با کمک اعتبارسنجی تقاطعی، از میان انواع روش‌های میان‌یابی کلاسیک و زمین‌آمار، بهترین روش میان‌یابی بارش انتخاب گردید. سپس با کمک تحلیل‌های متنوع، نحوه توزیع، خوشه و الگوهای بارش در این منطقه بررسی و ارزیابی و تحلیل شد. سپس با کمک روش رگرسیون حداقل مربعات عمومی، روابط فضایی آنها مدل‌سازی گردید که با دستاوردهای زیر همراه بوده است:

- میان‌یابی داده‌های بارش حوضه دریاچه ارومیه و انتخاب روش کریجینگ معمولی به عنوان بهترین روش میان‌یابی در این منطقه
- تحلیل الگو و خوشه‌بندی داده‌های بارش حوضه دریاچه ارومیه
- شناسایی نواحی جنوبی و جنوب‌غربی به عنوان خوشه‌های بالا-بالا (لکه‌های داغ) و قسمت‌های پربارش حوضه دریاچه ارومیه
- شناسایی ناحیه شمالی و مرکزی حوضه دریاچه ارومیه و همچنین دو لکه جدا افتاده در نواحی ایستگاه‌های سراب و سلماس جز خوشه‌های پایین-پایین (لکه‌های سرد) و نقاط کم‌بارش در این منطقه
- مدل‌سازی روابط فضایی داده‌های بارش حوضه دریاچه ارومیه با کمک روش رگرسیونی
- بررسی میزان همبستگی متغیرهای وابسته به بارش مانند طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع، شیب، دما و میزان وزش باد بر روی میزان بارش حوضه دریاچه ارومیه به عنوان متغیر مستقل.

- شناسایی متغیر "عرض جغرافیایی" به عنوان تاثیرگذارترین متغیر وابسته به بارش در حوضه دریاچه ارومیه

- شناسایی متغیرهای طول جغرافیایی و سرعت وزش باد به عنوان کم تاثیرترین متغیرها بر میزان بارش در حوضه دریاچه ارومیه

با شناسایی خوشه‌های پربارش و کم‌بارش در این منطقه، مدیران می‌توانند برنامه‌ریزی‌های متعددی را جهت مدیریت بهینه منابع آب اتخاذ نمایند. علاوه بر دستاوردهای ذکر شده، باید اذعان نمود که اکثر روش‌هایی که در مقالات متعدد پیشین برای میان‌یابی و تخمین بارش به کار گرفته شده است، بر پایه تحلیل‌های آماری است؛ در حالی که در این مطالعه هدف اصلی نویسندگان، استفاده از روش‌ها و بررسی‌های مکانمند در کنار روش‌های آماری برای تحلیل بهتر و دقیق‌تر موضوع پژوهش بوده است. نتایج این پژوهش نیز ثابت کرده است که روش‌های زمین‌آمار دقت بهتری را نسبت به روش‌های سنتی در میان‌یابی بارش در حوضه دریاچه ارومیه دارند. از سوی دیگر متغیرهای وابسته و عوامل محیطی در نظر گرفته شده در مقالات پیشین عمدتاً شامل متغیر ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی بوده است؛ در حالی که در این پژوهش، علاوه بر فاکتورهای فوق، متغیرهای شیب، دما و سرعت باد نیز به عنوان متغیرهای وابسته به بارش در نظر گرفته شده و عامل عرض جغرافیایی بیشترین اثرگذاری بر میزان بارش را داشته است. علاوه بر این در این مقاله، به مدل‌سازی روابط فضایی داده‌های بارش، داده‌کاوی مکانی، تحلیل الگو و بررسی و تحلیل میزان همبستگی بارش با متغیرهای وابسته پرداختیم که جر نوآوری‌های این تحقیق محسوب می‌شود. از جمله مهمترین پیشنهاداتی که برای انجام تحقیقات آتی می‌تواند در نظر گرفته شود، عبارتند از:

- شناسایی و استفاده از سایر متغیرهای وابسته به بارش در مدل رگرسیون برای برآورد بهتر
- جمع‌آوری داده‌های بیشتر از سایر ایستگاه‌های باران‌سنجی و سینوپتیک در منطقه مورد مطالعه به منظور دقت بیشتر نتایج
- استفاده از تبدیلات پیچیده ریاضی به منظور حذف هم‌خطی و خودهمبستگی در داده‌ها و امکان به کارگیری روش رگرسیون موزون جغرافیایی به منظور مدل‌سازی دقیق‌تر روابط فضایی داده‌های بارش نسبت به مدل OLS.

- [1] Bostan, P. A., Heuvelink, G. B. M. and Akyurek, S. Z. (2012), "Comparison of Regression and Kriging Techniques for Mapping the Average Annual Precipitation of Turkey." *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, Vol. 19, PP.115-126.
- [2] Eivazi, M. and Mosaedi, A. (2012), "An Investigation on Spatial Pattern of Annual Precipitation in Golestan Province by Using Deterministic and Geostatistics Models." *Journal of Water and Soil*, Vol. 26. PP. 53-64, (in Persian).
- [3] Maris, F., Kitikidou, K., Angelidis, P. and Potouridis, S. (2013), "Kriging Interpolation Method for Estimation of Continuous Spatial Distribution of Precipitation in Cyprus." *British Journal of Applied Science and Technology*, Vol. 3, No.4, PP.126-1300.
- [4] Moral, F.J. (2010), "Comparison of Different Geostatistical Approaches to Map Climate Variables: Application to Precipitation." *International Journal of Climatology*. Vol.30, No. 4, PP. 620-631.
- [5] Saghafiyan, B. (2011), "Investigation of Annual Rain Regional Variability by Geostatistic Methods Application. (Case Study: Fars Province)." *Journal of Water Resource Engineering*. Vol. 4, PP.118-132, (in Persian).
- [6] Subyani, A.M. and Al-Dakheel, A.M. (2009), "Multivariate Geostatistical Methods of Mean Annual and Seasonal Rainfall in Southwest Saudi Arabia." *Arabian Journal of Geosciences*, Vol. 2, No. 1, PP. 19-27.
- [7] Yavuz, H and Saffet, E. (2012), "Spatial Analysis of Monthly and Annual Precipitation Trends in Turkey." *Water Resources Management*, Vol. 26, No. 3, PP. 609-621.
- [8] Sun, Y., Kang, S., Li, F. and Lu, Z. (2009), "Comparison of interpolation methods for depth to groundwater and its temporal and spatial variations in the Minqin oasis of northwest China." *Environmental Modelling & Software*, Vol.24, PP.1163-1170.
- [9] Abo-Monasar, A. and Al-Zahrani, M.A. (2014), "Estimation of Rainfall Distribution for the Southwestern Region of Saudi Arabia." *Hydrological Sciences Journal*, Vol.59, No.2, PP. 420-431.
- [10] Angulo-Martínez, M., López-Vicente, M., Vicente-Serrano, S. M., and Beguería, S. (2009), "Mapping Rainfall Erosivity at a Regional Scale: A Comparison Of Interpolation Methods in The Ebro Basin (NE Spain)." *Hydrology and Earth System Sciences*, Vol. 13, PP.1907-1920.
- [11] Bajat, B., Pejović, M., Luković, J., Manojlović, P., Ducić, V and Mustafić, S. (2013), "Mapping Average Annual Precipitation in Serbia (1961-1990) by Using Regression Kriging." *Theoretical and Applied Climatology*, Vol. 112, No (12), PP.1-13.
- [12] Cheng, K.-S., Lin, Y.-C. and Liou, J.-J. (2008), "Rain-Gauge Network Evaluation and Augmentation Using Geostatistics." *Hydrological Processes*, Vol. 22, PP.2554-2564.
- [13] Crochet, P., Jóhannesson, T., Jónsson, O., Sigurðsson, H., Björnsson, F and Barstad I. (2007), "Estimating the Spatial Distribution of Precipitation in Iceland Using a Linear Model of Orographic Precipitation." *Journal of Hydrometeorology*, Vol. 8, PP.1285-1306.
- [14] Diodato, N. and Ceccarelli, M. (2005), "Interpolation processes using multivariate geostatistics for mapping of climatological precipitation mean in the Sannio Mountains (southern Italy)." *Earth Surface Processes and Landforms*, Vol.30, PP. 259-268.
- [15] Krishna, M. (2007), "Geostatistical analysis for estimation of mean rainfalls in Andhra Pradesh India." *International journal of geology*. Vol. 3, No.1, PP. 35-51.
- [16] Taesombat, W. and Sriwongsitanon, N. (2009), "A real Rainfall Estimation Using Spatial Interpolation Techniques." *Science Asia*. Vol. 35, PP.268-275.
- [17] Feng-guang, Y., Shu-you, C., Xing-nian, L. and Ke-jun, Y. (2008), "Design of groundwater level monitoring network with ordinary kriging." *Journal of Hydrodynamics*. Vol. 20, No.3, PP.339-346.
- [18] Karayusufoglu, S. (2010), "Estimation of basin parameters and precipitation distribution of solalki basin, turkey." *Wseas Transactions on Environment and Development*. Vol. 5, No. 6.
- [19] Asakereh, H. (2008). "Kriging interpolation method for Estimation of Precipitation in Iran", *Geography and Development*, Vol. 12, PP. 25-42. (In Persian).