



اسپوندیلیت سلی و سل نخاع

چکیده

دکتر علی مقتدری^{*}،
دکتر رویا علوی نائینی^{**}،
دکتر محمد درویشی^{***}،
دکتر محمد علی داورپناه^{***}،
^{*}استادیار گروه بیماری های
معز و اعصاب،
^{**}استادیار گروه
بیماری های عفونی،
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،
^{***}استادیار گروه
بیماری های عفونی ،
دانشگاه علوم پزشکی ارتش،
^{***}استادیار گروه
بیماری های عفونی،
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نویسنده مسؤول:

دکتر علی مقتدری
 Zahedan, Biomedical Sciences
 Faculty, Zahedan University of Medical Sciences,
 Iran

تلفن: ۰۵۴۱-۳۲۳۴۵۵۱

E-mail: moghtaderi@zdmu.ac.ir

مقدمه: سل ستون فقرات یا اسپوندیلیت سلی، یکی از شایع ترین گونه های سل اسکلتی است. عوارض سل ستون فقرات و طناب نخاعی، شامل تخریب مهره های ستون فقرات، تغییر شکل آن و پاراپلزی است. با توجه به این که، در برخی بیماران، تظاهرات بالینی بیماری سل، به صورت غیر معمول بوده و سبب تأخیر در تشخیص درست می گردد و از سویی، تشخیص و درمان بهنگام این بیماری می تواند از پیامدهای وخیم آن پیشگیری کند، مواردی از تظاهرات غیر معمول سل در سال های ۱۳۷۷-۱۳۸۲ در شهر زاهدان بررسی شده است. **روش کار:** این پژوهش به صورت گذشته نگر بوده و داده های مربوط به ویژگی های همه گیر شناختی، علایم بالینی، تصویر برداری، بررسی های آزمایشگاهی، آسیب شناسی و پاسخ به درمان مربوط به بیماران دارای سل ستون فقرات و سل نخاع با پرسشنامه گرد آوری گردید. **یافته ها:** از ۳۶ مورد در گیری سل ستون فقرات و نخاع، ۲۹ مورد، سل ستون فقرات پنج مورد رادیکولومیلیت سلی، یک مورد توبرکولومای ایترامدولری نخاع و یک مورد سیرنگوکومیلی گزارش شد. بیماری در ۵۳ درصد موارد، در مردان و در ۷۰ درصد موارد در سنین ۳۵ تا ۵۵ سال مشاهده شد. تب و درد کمر در بیشتر از ۸۰ درصد موارد دیده شد. Purified Protein Derivative (PPD) بالای ۱۰ میلی متر و سرعت رسوب گلوبولی بالاتر از ۴۰ میلی متر در ساعت نخست، در بیشتر از ۸۰ درصد موارد گزارش شد. در ۱۳ بیمار، نتایج آسیب شناسی، اسمیر و کشت بافت آسپیره شده، با تشخیص سل همخوانی داشت. شایع ترین جای در گیری مهره ها، گرفتاری مهره های پشتی-کمری بود (۴۱ درصد). هشت بیمار (۲۲ درصد) نیاز به عمل جراحی پیدا کردند. و در ۲۹ بیمار (۸۰ درصد)، بهبود کامل بالینی به دست آمد. در دیگر موارد، بهبود با عوارضی همراه بود. **نتیجه:** این بررسی نشان داد که پایه ای تشخیص بیماری، علایم بالینی، بررسی های

اسپوندیلیت سلی و سل نخاع

تصویر برداری (رادیولوژی و سی تی اسکن)؛ آسیب شناسی و پاسخ به درمان ضد سل، است. بنابراین، در مناطق بومی، با توجه به عوارض عصبی وخیم ناشی از بیماری، حضور ذهن پزشکان در باره‌ی تظاهرات نامعمول، برای تصمیم گیری سرع در راستای تشخیص و در پایان درمان بیماری سل، لازم است.

کلید واژه‌ها: سل، اسپوندیلیت، نخاع

شده است [۴]. در سال ۱۷۸۲، پرسیوال پات (Sir Percivall Pott) بر پایه‌ی معاینه‌ها و کالبد

شکافی‌ها، برای نخستین بار سل ستون فقرات را شرح داد [۵]. در حدود یک سوم موارد سل استخوانی، به صورت سل ستون فقرات نمایان می‌گردد. در مراحل آغازین که گرفتاری محدود به استخوان و دیسک بوده، معمولاً بیماران از درد و حساسیت ناحیه‌ی درگیر شاکی هستند. با پیشرفت بیماری، عالیم عصبی گرفتاری نخاع و ریشه‌های آن پدیدار می‌گردد [۴،۶]. اما گرفتاری طناب نخاعی در جریان سل به همین جا پایان نمی‌پذیرد و درگیری آن به صور گوناگون مانند توپرکولوم نخاع [۶-۸]، آراکنوئیدیت، رادیکولومیلت و سیرنگومیلت بدون درگیری مهره، ایجاد می‌گردد. این عوارض که می‌توانند عارضه منژیت سلی باشند کمیاب و خطرناک هستند و تنها در صورت تشخیص و درمان زودرس منجر به بهبودی کامل می‌شوند [۹-۱۱].

بر پایه‌ی آمار موجود در مرکز بهداشت استان سیستان و بلوچستان، در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳، میزان بروز سالانه‌ی کل موارد سل، ۷۰ تا ۸۰ درصد هزار نفر و میزان بروز سالانه‌ی سل خارج ریوی، ۱۴ تا ۱۹/۵ درصد هزار نفر بر آورد شده

مقدمه

سل، یکی از علل شایع مرگ و میر در جوامع بشری است، به گونه‌ای که در سال ۱۹۹۳، سازمان بهداشت جهانی (WHO) سل را یک فوریت بهداشت همگانی معرفی کرد [۱]. ۲۰ تا ۱۵ درصد موارد این بیماری را سل خارج ریوی تشکیل می‌دهد [۲] اما پرعارضه ترین شکل آن، ابتلای دستگاه عصبی مرکزی بوده که در صورت عدم تشخیص و درمان دیر هنگام، پیامدهای وخیمی برای بیمار به همراه دارد [۳]. گاهی به علت گنج و ناشناخته بودن عالیم بالینی، تشخیص بیماری دیر هنگام و یا حتی در برخی موارد اشتباه داده می‌شود. بنابراین، به آگاهی بالینی و حضور ذهن نسبت به این بیماری باید همیشه توجه شود تا بیمار به پیامدهای خطرناک ناشی از آن دچار نگردد [۳].

یکی از گونه‌های سل دستگاه عصبی مرکزی، سل طناب نخاعی است، که بیشتر به دنبال درگیری سل ستون فقرات (اسپوندیلیت سلی) به وجود می‌آید. سل ستون مهره‌ها (Pott's Disease) در مومیایی‌های مصری که دارای پیشینه‌ای در حدود سه هزار سال پیش از میلاد مسبح هستند، گزارش

ریفامپین به مدت ۷ تا ۱۰ ماه بودند. بیماران به مدت دست کم یک سال پی گیری شدند.

یافته ها

از ۳۶ بیمار مبتلا به سل ستون فقرات و سل نخاع، ۷۰ درصد بیماران در دامنه‌ی سنی ۳۵ تا ۵۵ سال بود و ۵۳ درصد آنها مرد بودند. تب بالای ۳۷/۸ درجه‌ی سانتی گراد، شایع ترین علامت بالینی بود (۸۹ درصد). درد کمر در ۸۳ درصد موارد دیده شد.

دیگر تظاهرات بالینی در جدول ۱ نشان داده شده است. در ۱۵ بیمار (۴۲ درصد) موارد، سل دیگر دستگاه‌های بدن (Multiorgan) نیز گزارش شد.

جدول ۱: فراوانی علایم بالینی در ۳۶ بیمار مبتلا به سل ستون فقرات و سل نخاع

فرافوایی نسبی	فرافوایی مطلق (درصد)	علایم بالینی
۸۹	۳۲	تب
۸۳	۳۰	درد کمر
۴۴	۱۶	درد اندام
۴۴	۱۶	کیفوز
۴۲	۱۵	تعريق
۴۲	۱۵	بی اشتھایی
۳۹	۱۴	سرفه
۳۹	۱۴	ضعف اندام (پارزی)
۲۵	۹	فلج اندام (پلژی)
۱۹	۷	بابنسکی
۱۴	۵	بی اختیاری ادرار
۸	۳	بی اختیاری مدفوع

است. با توجه به بومی بودن سل در این استان و میزان بالای بروز بیماری نسبت به دیگر نقاط کشورکه خود به خود با افزایش تظاهرات نامعمول بیماری (که هدف این بررسی است)، نیز، همراه می باشد، تصمیم گرفته شد تا پژوهشی در زمینه‌ی بیماران با درگیری سل ستون فقرات و طناب نخاعی، انجام شود و به تظاهرات بالینی آنها توجه گردد، تا در آینده، در رویارویی با این علایم، با تشخیص زود رس بیماری، بتوان از عوارض وخیم آن جلوگیری کرد.

مواد و روش

این پژوهش گذشته نگر بر روی ۳۶ بیمار مبتلا به سل ستون فقرات و سل دستگاه عصبی مرکزی (رادیکولومیلت، توبرکولوم نخاع و سیننگومیلی) انجام شد. این بیماران در دو بیمارستان خاتم (ص) و بوعلی شهر زاهدان در پنج سال، ۱۳۷۷-۸۲ بستری شده بودند. داده‌های مردم شناختی شامل سن، جنس، شکایت اصلی هنگام مراجعه، از پرونده‌ی بیماران استخراج و در پرسشنامه ثبت گردید. یافته‌های معاینه‌ی بالینی شامل بود یا نبود کیفوز، نا亨جاري حرکتی ماهیچه‌ای - اسکلتی، نا亨جاري اسفنتری و علامت بابنسکی در همه‌ی بیماران بررسی شد و یافته‌های بالینی، آزمایشگاهی، آسیب شناسی و تصویر برداری ثبت گردید. همه‌ی بیماران در حال درمان چهار دارویی ایزوپنیازید، ریفامپین، اتامبوتول و پیرازینامید به مدت دو ماه و سپس ایزوپنیازید و

اسپوندیلیت سلی و سل نخاع

مهره های گردنی به تنها یی (دو مورد)، مهره های گردنی-پشتی (یک مورد) و مهره های ساکرال (یک مورد) بود. از ۲۹ بیمار با سل ستون فقرات، ۱۳ مورد نمونه برداری از مهره های درگیر انجام شد، علایم آسیب شناختی در نه مورد با تشخیص سل (گرانولوم با یا بدون کازئوز) همخوانی داشت. اسمیر و کشت از آسپیراسیون بافت، (در میان بیماران مبتلا به سل ستون فقرات) در چهار مورد از نظر باکتری سل، مثبت گزارش گردید.

ب- هفت بیمار مبتلا به سل نخاعی از هفت مورد سل طناب نخاعی، پنج مورد رادیکولومیلیت سلی، یک مورد توبرکولوم ایترامدولری و یک مورد سیرنگومیلی نخاع همراه منژیت سلی بود. پنج مورد رادیکولومیلیت سلی (سه زن و دو مرد) بدون درگیری مهره ها وجود داشت که در سه مورد، همراه با منژیت سلی بودند. علایم بالینی بیماری، شامل تب، درد کمر، پاراپلزی، اختلال اسفنکتری و بابنوسکی مثبت بود. تشخیص قطعی در سه مورد با روش آزمون

PCR (Polymerase Chain Reaction)

مثبت در مایع مغزی نخاعی داده شد. در یک مورد کشت مثبت باکتری سل در مایع مغزی نخاعی گزارش شد. تشخیص در مورد آخر، با توجه به همراهی سل ریوی اسمیر خلط مثبت و پاسخ به درمان ثابت شد [۱۲]. نفر ششم این گروه، یک مورد کمیاب توبرکولوم ایترامدولری نخاع در زنی ۲۱ ساله بود که در آغاز با تشخیص منژیت سلی بسترهای گردید و پس از آغاز درمان طبی و استقرار

که نه مورد سل ریوی و شش مورد آدنیت (غدد لنفاوی) سلی، داشتند. در ۳۶ بیمار مورد بررسی، ۶۴ درصد، دارای شمارش گلبول های سفید (WBC) طبیعی، ۲۸ درصد، افزایش گلبول های سفید (لکوسیتوز) و هشت درصد، کاهش گلبول های سفید (لکوپنی) داشتند. در ۸۷ درصد بیماران، سرعت رسوب گلبولی بالای ۴۰ میلی متر در ساعت نخست، (میانگین=۵۸ میلی متر) بودند. آندوراسیون آزمایش پوستی توبرکولین (PPD)، در ۸۱ درصد موارد بالاتر از ۱۰ میلی متر بود. هشت نفر (۲۲ درصد) از ۳۶ بیمار، نیاز به عمل جراحی پیدا کردند. بیست و نه بیمار (۸۰ درصد) از ۳۶ بیمار، (شامل دو نفر بیمار مبتلا به سل نخاع و ۲۷ نفر با اسپوندیلیت سلی) پاسخی مناسب به درمان طبی به تنها یی همراه جراحی دادند و بیماری بدون ایجاد عارضه بهبود یافت. در دیگر ۲۰ درصد موارد، بهبود همراه با عارضه بود. این ۳۶ بیمار، شامل دو گروه بود. یک گروه، شامل ۲۹ مورد اسپوندیلیت سلی و یک گروه، شامل هفت مورد سل طناب نخاعی، بدون درگیری مهره ای بودند.

الف- ۲۹ بیمار سل ستون فقرات با توجه به گرافی ها و سی تی اسکن های انجام شده، از میان ۲۹ بیمار با سل ستون فقرات، بیشترین گرفتاری مهره های ای به ترتیب مربوط به درگیری همزمان مهره های پشتی-کمری (۱۲ مورد)، مهره های پشتی به تنها یی (هشت مورد)، مهره های کمری به تنها یی (پنج مورد)،

۳۵ تا ۵۵ سال گزارش گردید. تظاهرات بالینی آن به صورت درد کمر و سفتی ماهیچه های پیرامون ستون فقرات و احساس درد در معاینه بالینی، هنگام ضربه بر روی مهره ها است. در بیماران این پژوهش، تب، درد کمر و درد اندام شایع ترین علایم بالینی بودند. در مراحل آغازین، پرتونگاری طبیعی بوده که با گذشت زمان، تخریب استخوان و دیسک میان مهره ای نمایان می گردد [۱۴، ۱۵]. در این پژوهش، پرتونگاری ساده، تنها در بیماران مبتلا به سل ستون فقرات کمک کننده بود. نخستین جای درگیری معمولاً زاویه های فوقانی قدامی و تحتانی قدامی جسم مهره ای بوده که به دیسک میان مهره ای و مهره های مجاور انتشار می یابد و سرانجام، در صورت درمان نکردن منجر به تخریب دیسک و مهره و عارضه‌ی عصبی و دفورمیته گوژپشتی می گردد [۲]. ستون فقرات پشتی و کمری بیشتر از دیگر مهره ها درگیر شده و پس از آن، مهره های گردنی و ساکرال گرفتار می شوند [۲]. در بیماران این پژوهش هم گرفتاری همزمان مهره های پشتی-کمری در ۴۱ درصد (شایع ترین) و در مرحله‌ی بعدی، درگیری مهره های پشتی در ۲۷/۵ درصد موارد دیده شد. در پژوهشی که در عربستان سعودی [۱۶] بر روی ۶۹ مورد سل ستون فقرات در مدت ۱۴ سال انجام شد، میانگین سن بیماران ۵۲/۸ سال بود و بیشتر موارد (۶/۵۳) درصد) مرد بودند. تب و حساسیت مهره ای شایع ترین علایم این بیماران بود و پس از آن، پاراپارزی و کیفوزیس قرار داشت. در درصد

شانت بطنی - صفاقی، بیمار دچار دردکمر، فلج هر دو اندام تحتانی، بسی اختیاری ادرار و علامت بابنگی مثبت شد که با انجام میلوگرافی، شک بالینی توبرکولوم مطرح گردید و پس از عمل جراحی و برداشتن اثر فشاری نخاع، در آسیب شناسی، گرانولوم کازئوز از بافت نمونه برداری شده گزارش شد. نفر هفتم، مورد کمیاب سیرنگومیلی نخاع به دنبال منتشریت سلی است. زنی ۲۷ ساله با علایم سردرد، تب، سفتی گردنی، فلح اندام و دویینی مراجعه کرد. این بیمار با روش آزمون PCR مثبت مابع نخاع از نظر سل تأیید گردید و در بررسی میلوگرافی، آسیب درون نخاعی در بخش پایینی نخاع پشتی-کمری مشاهده شد، در پایان با عمل جراحی، تشخیص درون نخاع داده شده است [۱۲، ۱۳].

بحث

بخشی از پژوهش کنونی درباره ۲۹ بیمار با تشخیص سل ستون فقرات در شهر زاهدان انجام شد. سل در این منطقه بومی است. بیماری، بیشتر در افراد میانسال دیده می شود. شایع ترین عامل سل طناب نخاعی، ابتلا به سل ستون فقرات است که از سه راه هماتوژن، مجاورتی و انتشار لنفاتیک ایجاد می شود [۲]. در کشورهای بومی از نظر سل، سل ستون فقرات، بیشتر در بالغین جوان و میانسال دیده می شود ولی در کشورهای پیشرفته شیوع آن در افراد سالمند، بیشتر است [۲]. در پژوهش کنونی، سل ستون فقرات در دامنه‌ی سنی

اسپوندیلیت سلی و سل نخاع

پاهای در ۶۹ درصد موارد، بد شکلی گوژپشتی (Gibbus) در ۴۶ درصد، درد در ۲۱ درصد و توده‌ی قابل لمس در ۱۰ درصد موارد بوده است. در بررسی کنونی، عوارض کیفوز، ضعف و فلنج اندام‌ها به ترتیب در ۴۴، ۳۹ و ۲۵ درصد از افراد دیده شده است. این پژوهش، سل ستون فقرات را از علل مهم پاراپلزی در ترکیه بیان کرده و پیشنهاد می‌کند که در هر بیمار با یافته‌های عصبی ناشی از تحت فشار بودن طناب نخاعی و نیز بد شکلی ستون فقرات، این بیماری باید مد نظر باشد. پیش‌آگهی سل ستون فقرات در صورت رفع سریع اثر فشاری بر روی طناب نخاعی، خوب است [۱۷]. همانند همین پژوهش در سنگال نشان داد که بیماری پات (Pott's) یا سل ستون فقرات به عنوان نخستین علت فشار بر روی نخاع، در این کشور به شمار می‌آید [۱۸]. در پژوهش دیگر، که به وسیله‌ی سووتوا (Sovetova) در بالغین انجام شد، ۵۰ درصد موارد گرفتاری چند اندامی گزارش گردیده و در ۶۱/۲ درصد موارد، دو جسم مهره‌ی مجاور گرفتار بودند. در ۶۸ درصد موارد نقايسص عصبی دیده شده است [۱۹].

Frankel Vidyasagar بر پایه‌ی سیستم عالیم عصبی ناشی از سل مهره‌ای را به پنج گروه تقسیم کرده و پژوهشی بر روی ۲۰۰ مورد بیمار سل مهره‌ای با عوارض عصبی را گزارش کردن. وی میلوگرافی را بهترین روش تشخیص در زمان فشار بر نخاع دانسته و دارو درمانی ضد سل و جراحی را برای درمان این موارد

موارد سرعت رسوب در ساعت نخست بالاتر از ۲۰ میلی متر و در ۷۳/۲ درصد موارد بیشتر از ۴۰ میلی متر گزارش گردید. این یافته، با پژوهش کنونی همخوانی دارد که سرعت رسوب در ۸۰ درصد موارد بالاتر از ۴۰ میلی متر در ساعت بوده است. در سی تی اسکن و ام آر آی در ۵۵ درصد موارد گرفتاری مهره‌های توراسیک گزارش شد. در پژوهش کنونی، ۲۷/۵ درصد بیماران گرفتاری مهره‌های پشتی به تنها یی را نشان دادند. در ۴۵ درصد موارد درگیری مهره‌های پشتی با دیگر مهره‌ها (کمر ۱۲ مورد و گردن در یک مورد) وجود داشت. در ۲۷/۵ درصد دیگر موارد گرفتاری دیگر مهره‌ها وجود داشت.

در پژوهش عربستان، ۵۴ درصد بیماران به درمان طبی پاسخ دادند و ۴۶ درصد نیاز به عمل جراحی پیدا کردند. در ۹۱ درصد موارد بهبودی کامل دیده شد [۱۶]. در پژوهش کنونی، در میان ۲۹ بیمار مبتلا به سل ستون فقرات، بهبودی در ۲۷ بیمار دیده شد (۹۳ درصد)، زیرا تشخیص بیماری بر پایه‌ی یافته‌های بالینی و پرتونگاری مشخص گردید، در حالی که در هفت بیمار مبتلا به سل نخاع، با توجه به درگیر نبودن مهره‌ها در پرتونگاری ساده، تشخیص دیررس بیماری و سرانجام، آسیب ریشه‌های نخاعی، بهبود تنها در دو مورد از هفت بیمار یاد شده (۲۸/۵ درصد) دیده شد. پژوهش دیگر در ترکیه [۱۷]، که بر روی ۶۹۴ بیمار مبتلا به سل ستون فقرات انجام شده نشانه‌های آغازین به صورت ضعف و پارزی

سل را از ۱۵ سال پیش گزارش می داد [۲۳]. Suzer هم یک مورد توبرکولوم ایترامدولری را در مردی ۲۰ ساله گزارش کرده که با ضعف پیشرونده‌ی پاها و ناتوانی جنسی و مشکلات ادراری مراجعه کرده که همانند Conus Tumor بود و با ام آر آی و آسیب شناسی، توبرکولوم سلی، تأیید گردید [۲۴]. Sanchez یک مورد توبرکولوم ایترامدولری نخاع با سیرنگومیلی را در نخاع توراسیک گزارش کرده که با ام آر آی تشخیص داده شده و به دارو درمانی ضد سل، به خوبی پاسخ داده است [۲۵]. در حالی که، در بیمار گزارش شده از زاهدان، توبرکولوم نخاعی همراه با آراکنوئیدیت و منژیت سلی بود که با وجود درمان منژیت سلی، عالیم درگیری ریشه‌های نخاعی و کونوس نمایان گردیده که در پایان به دنبال اقدام جراحی، در گزارش آسیب شناسی وجود توبرکولوم تأیید شده است.

عارضه‌ی سیرنگومیلی، ثانویه به منژیت سلی بسیار کمیاب است. نخستین مورد سیرنگومیلی در ناشی از سل به وسیله‌ی Marinesco در بیماری با منژیت مزمن سلی و حفره (کاویته) در طناب نخاعی که در اثر سل ریوی فوت شده بود، گزارش گردید [۴]. در بیمار معرفی شده از زاهدان، سیرنگومیلی ثانویه به منژیت سلی و به عنوان عارضه‌ی آن باعث عالیم عصبی در بیمار شده که درمان ضد سل و عمل جراحی به بهبود بالینی بیمار منجر نگردید. رادیکولومیلیت سلی یکی دیگر از عوارض سل ستون فقرات بوده

پیشنهاد می کند [۱۵]، در بررسی دیگر، ام آر آی روشنی بهتر برای تشخیص گزارش شده است [۱۹]. در بررسی کنونی، میلوگرافی در هفت مورد سل نخاع و دو مورد سل ستون فقرات انجام شد که در تشخیص بیماری کمک کننده بود.

Moon و همکاران نشان داده اند که پیش آگهی بیماری سل ستون فقرات در کودکان بهتر از بالغین بوده و نیز، بیمارانی که به مدت شش ماه فلج دائم داشتنند، پس از عمل جراحی، بهبود عصبی، در آنها مشاهده نشد. بنابراین، تصمیم به انجام عمل جراحی باید هر چه زود تر انجام شود [۱۴]. با توجه به این که در این بیماری فرایند عفونت سل و اثر فشاری بر روی طناب نخاعی، به صورت همزمان وجود دارد، بنابراین درمان طبی و جراحی همزمان پیشنهاد می شود. Meddeb افزودن استروئید را در این گونه موارد پیشنهاد کرده است [۲۱، ۲۰]. از شکل‌های غیر معمول و کمیاب سل نخاع، گزارش‌های متعددی در دست هست. از جمله، شکل‌های کمتر شایع درگیری نخاع توبرکولوم ایترامدولاری، توبرکولوم‌ای ایترادرورال، سیرنگومیلی ناشی از منژیت سلی و رادیکولومیلیت سلی هستند. این موارد معمولاً نیاز به عمل جراحی، افزون بر دارو درمانی ضد سل دارند ولی کمتر به درمان دارویی ضد سل و کورتون به تنها ی پاسخ داده اند [۲۲، ۱۰، ۹].

یک مورد توبرکولوم Conus Medullaris در مردی ۴۶ ساله‌ای که با ضعف و فلج پای چپ مراجعه کرده است گزارش شده است. وی پیشینه

اسپوندیلیت سلی و سل نخاع

رادیکولومیلت سلی گزارش شده از زاهدان، با آزمون PCR و اسمیر و کشت از مایع مغزی-نخاعی تأیید گردید [۱۲]. در موارد کمیاب، سل نخاع گزارش شده از زاهدان، در سه مورد رادیکومیلت، یک مورد سینرگومیلت و یک مورد توبرکولوم نخاعی، عارضه‌ی عصبی شدید در بیماران منجر به فلچ هر دو اندام تحتانی و اختلالات اسفنکتری گردید که متأسفانه با وجود درمان طبی و جراحی و رفع اثر فشاری بر روی نخاع، بهبود به دست نیامد. به نظر می‌رسد، که تشخیص و درمان زودرس از مهم ترین و اصلی ترین مسائل در برخورد با این بیماران است و عوارض عصبی را کاهش می‌دهد.

که می‌تواند بدون وجود آن نیز عارض گردد [۲۶]. رادیکولومیلت، بیشتر به صورت مجموعه‌ای از عالیم آسیب ریشه‌های عصبی ناحیه‌ی کمری و آسیب بافت نخاع در ناحیه‌ی کمری و کونوس است. در نتیجه، مجموعه‌ای از عالیم نورون محرکه‌ی فوقانی و تحتانی دیده می‌شود [۲۶، ۱۲]. Eroles-Vega، دو مورد HIV رادیکولومیلت سلی در بیماران HIV مثبت از اسپانیا گزارش کرده که بیماران با عالیم فلچ تحت حاد، درد ریشه‌ای، سطح حسی و مثانه‌ی نوروژنیک مراجعه کردند. ام آر آی و سی تی میلوگرافی در تشخیص بیماران بسیار کمک کننده بوده است [۲۷]. پنج مورد

Tuberculous Spondylitis and Spinal Tuberculosis

Background: Tuberculous spondylitis (TS) is considered the most dangerous and prevalent form of skeletal tuberculosis. Complications of TS can be devastating because of bone destruction, deformity and paraplegia. Therefore, early diagnosis and proper treatment are necessary to avoid long-term disabilities. **Patients and Methods:** In this retrospective study, tuberculous spondylitis and spinal tuberculosis were reported during a five-year period (1998-2003). Only those with clinical manifestations, laboratory or pathological confirmation or those who responded to treatment were included. **Results:** The study revealed 29 patients with tuberculous spondylitis, five patients with radiculomyelitis, one case with intramedullary tuberculosis and one case with syringomyelia secondary to tuberculous meningitis. Most of the patients were men aged 35-55 years. The most

A. Moghtaderi, M.D.,
 R. Alavi-Naini, M.D. **,
 M. Darvishi, M.D. ***,
 M. A. Davarpanah,
 M.D. **,
 *Assistant Professor of
 Neurology,
 **Assistant Professor of
 Infectious Diseases,
 Zahedan University of
 Medical Sciences,
 ***Assistant Professor
 of Infectious Diseases,
 Army University of
 Medical Sciences,
 ^Assistant Professor of
 Infectious Diseases,
 Shiraz University of
 Medical Sciences,
 Shiraz, Iran*

frequent clinical manifestations were fever and backache. In more than 80% of the cases PPD and ESR were helpful in the diagnosis. In 13 patients the results of pathology, smear and culture of the tissue aspirate were compatible with tuberculosis. Multiorgan involvement was observed in 42% of the patients. Thoracolumbar spines were the most frequent site of involvement in the vertebral column (41%). Eight patients (22%) needed surgical intervention. Complete recovery was seen in 29 (80%) cases.

Conclusion: There are several reports of tuberculous spondylitis and spinal tuberculosis especially in endemic regions of the world. Clinical manifestations, imaging surveys and response to treatment are extremely helpful for diagnosis, and tissue aspirate is a good confirmatory method. Unfortunately, in comparison to other studies, positive results of the latter were not observed in our country. Early diagnosis and treatment (chemotherapy, corticosteroid therapy and surgery) are recommended to prevent severe neurologic deficits.

Keywords: Spondylitis, Spinal tuberculosis, Zahedan

Correspondence:

A. Moghtaderi

Department of

Neurology, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

Tel: +98-541-3234551

E-mail:

moghtaderi@zdmu.ac.ir

منابع

- [1]World Health Organization. **Groups at risk: WHO report on the tuberculosis epidemic.** Geneva, Switzerland: World Health Organization, 1996.
- [2]Haas DW: Mycobacterial diseases, In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. **Principles and practice of infectious diseases.** Oxford, England: Churchill Livingstone, 2000:2599-602.
- [3]Garcia-Monco JC: Central nervous system tuberculosis. **Neurol Clin** 1999;17(4):737-59.
- [4]Victor M, Ropper AH: Infections of the nervous system, In: **Adams and Victors' principles of neurology.** Philadelphia, USA: W.B. Saunders Co., 2001:734-83.
- [5]Pott P: The chirurgical works of Percivall Pott, F.R.S., surgeon to St. Bartholomew's Hospital, a new edition, with his last corrections. 1808. **Clin Orthop Relat Res** 2002(398):4-10.
- [6]Kandoo MR: Intradural tuberculoma: A case report with 3 years follow-up. **J Indian Med Assoc** 1998;96(8):256-8.
- [7]Rao GP: Spinal intramedullary tuberculous lesion: Medical management. Report of four cases. **J Neurosurg** 2000;93(Suppl 1):137-41.
- [8]Ur-Rahman N: Intracranial tuberculomas: Diagnosis and management. **Acta Neurochir (Wien)** 1987;88(3-4):109-15.
- [9]Hancı M: Intramedullary tuberculous abscess: A case report. **Spine** 1996;21(6):766-9.
- [10]Hui AC, Chan YL, Kay R: Syrinx and tuberculoma formation in tuberculous arachnoiditis. **Can J Neurol Sci** 2001;28(2):148-9.
- [11]Nomura S: Surgery for expansion of spinal tuberculoma during antituberculous chemotherapy: A case report. **Pediatr Neurosurg** 2001;35(3):153-7.

- [12] Moghtaderi A, Alavi-Naini R: Tuberculous radiculomyelitis: Review and presentation of five patients. *Int J Tuberc Lung Dis* 2003;7(12):1186-90.
- [13] Moghtaderi A, Alavi-Naini R, Rahimi-Movaghar V: Syringomyelia: An early complication of tuberculous meningitis. *Tropical Doctor* 2006;36(4):254-5.
- [14] Moon MS: Pott's paraplegia in patients with severely deformed dorsal or dorsolumbar spines: treatment and prognosis. *Spinal Cord* 2003;41(3):164-71.
- [15] Vidyasagar C, Murthy H K: Management of tuberculosis of the spine with neurological complications. *Ann R Coll Surg Engl* 1994;76(2):80-4.
- [16] Barriere V, Gepner P, Bricaire F, Bletry O, et al.: Current aspects of spinal tuberculosis: Apropos of 16 case reports. *Ann Med Interne* 1999;150(5):363-9.
- [17] Turgut M: Spinal tuberculosis (Pott's disease): Its clinical presentation, surgical management, and outcome. A survey study on 694 patients. *Neurosurg Rev* 2001;24(1):8-13.
- [18] Rychlicki F, Messori A, Recchioni MA, Morici D, et al.: Tuberculous spondylitis: A retrospective study on a series of 12 patients operated on in a 25-year period. *J Neurosurg Sci* 1998;42(4):213-9.
- [19] Sovetova NA, Oleinik VV, Mitusova GM, Nekachalova AZ, et al.: Clinical and radiographic manifestations of tuberculous spondylitis in adults. *Probl Tuberk* 2001(4):9-13.
- [20] Meddeb N, Rammeh N, Chahed M, et al.: Current aspects of Pott's disease in Tunisia. 29 cases. *Bull Soc Pathol Exot* 2002;95(4):269-71.
- [21] Upadhyay SS, Saji MJ, Yau AC: Duration of antituberculosis chemotherapy in conjunction with radical surgery in the management of spinal tuberculosis. *Spine* 1996;21(16):1898-903.
- [22] Sekaran VI, Ram PS, Paul PA, Natarajan M, et al.: Paraspinal granuloma. *J Indian Med Assoc* 1985;83(6):215-6.
- [23] Turgut M: Intradural extramedullary tuberculoma of the spinal cord: A case report. *Zentralbl Neurochir* 1993;54(4):197-9.
- [24] Suzer T: Intramedullary spinal tuberculoma presenting as a conus tumor: A case report and review of the literature. *Eur Spine J* 1998;7(2):168-71.
- [25] Sanchez Pernaute R: Intramedullary tuberculoma of the spinal cord with syringomyelia. *Neuroradiology* 1996;38(Suppl 1):105-6.
- [26] Yunten N, Alper H, Zileli M, Yuce K, et al.: Tuberculous radiculomyelitis as a complication of spondilodiscitis: MR demonstration. *J Neuroradiol* 1996;23(4):241-4.
- [27] Eroles Vega G, Castro Vilanova MD, Mendivil Ferrer M, et al.: Arachnoiditis and intraspinal lesion. Complications of tuberculous meningitis in 2 patients with human immunodeficiency virus infection. *Rev Clin Esp* 2001;201(10):575-8.