

شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی در استان تهران

حسین گلبابایی^۱، ابوالفضل خلیلپور^۲ و علیمحمد طهماسبی بیرگانی^۳

چکیده

بررسیهای موردنی در خصوص میزان جابه‌جایی ذرات خاک توسط باد در مناطق دشتی ایران مرکزی نشان می‌دهد که فرسایش خاک در این گونه اراضی بیشتر از فرسایش آبی در مناطق کوهستانی چنین مناطقی می‌باشد. دفتر تشییت شن و بیابانزدایی متولی مبارزه با فرسایش بادی و کاهش اثرات بیابانزایی در کشور است. براساس پیشنهاد استانهای بیابانی طرحهایی به تصویب رسیده و اجراء می‌شود، ولی واقعیت این است که با امکانات محدود کشور از نظر اعتباری نمی‌توان با فرسایش بادی مبارزه کرد و جلوی حرکت ماسه‌های روان را گرفت و شاید در مکانهایی که حرکت ماسه‌های روان خسارتی وارد نمی‌کند کنترل آنها ضرورت نداشته باشد. مطالعات انجام شده در مناطق بیابانی ایران نشان می‌دهد که بهترین مرحله مبارزه با فرسایش بادی در مرحله برداشت است. مبارزه با فرسایش بادی در مرحله برداشت علاوه بر صرف هزینه کمتر با موفقیت بیشتری نسبت به دو منطقه دیگر همراه خواهد بود، هرچند که در برخی از مناطق به دلیل خسارت‌های ناشی از منطقه رسوبگذاری به ناچار باید در منطقه رسوبگذاری نیز عملیات اجرایی صورت پذیرد. بنابراین در طرحی ملی دفتر تشییت شن و بیابانزدایی اقدام به شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی و برآورد خسارت‌های ناشی از آن و همچنین اولویت‌بندی کانونهای بحرانی نمود که در مقاله حاضر به وضعیت استان تهران در زمینه مذکور پرداخته شده است.

تاریخ دریافت: اسفند ۱۳۸۲
تاریخ پذیرش: آبان ۱۳۸۳

- ۱- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران.
E-mail: hgol3baba@yahoo.com
۲- کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران.
۳- کارشناس ارشد دفتر فنی تشییت شن و بیابانزدایی.

برای انجام طرح شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی در استان تهران از روش منشاء‌یابی تپه‌های ماسه‌ای در ایران (اختصاصی - احمدی) استفاده شده است. در این روش، عوامل مؤثر در شناسایی نقاط برداشت در نظر گرفته شده و با روندی منظم و گام به گام مناطق برداشت، حمل و رسوبگذاری تپه‌های ماسه‌ای تعیین شدند. در جهت‌یابی مناطق برداشت با بهره‌گیری از اطلاعات منطقه‌ای و تکمیل پرسشنامه‌های محلی، بررسی مورفولوژیکی نهشته‌های بادی و مطالعه رژیم بادهای فرساینده و مؤثر در فرسایش بادی جهت حرکت ماسه‌های روان شناسایی می‌شود.

طی بررسیهای بعمل آمده مشخص شد که از مجموع ۱۲ شهرستان استان تهران با مساحت ۱۸۹۰۹۰۰ هکتار فقط ۱۰۱۷۲۵ هکتار به عنوان کانونهای بحرانی هستند که این کانونها در ماهدشت در شهرستان کرج و نجم‌آباد شهرستان ساوجبلاغ و ابردز شهرستان ورامین واقع شده‌اند و با توجه به شدت و منابع تحت خسارت مشخص شد که ماهدشت کرج در اولویت اول و ابردز ورامین و نجم‌آباد ساوجبلاغ در اولویت دوم قرار دارند.

واژه‌های کلیدی: فرسایش بادی، بیابانزدایی، نقاط بحرانی، تپه‌های ماسه‌ای، بیابانزایی

روش کار

برای شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی در استان تهران از روش منشاء‌یابی تپه‌های ماسه‌ای در ایران (اختصاصی - احمدی ۱۳۷۴) استفاده شده است. این روش که یک روش کاربردی منشاء‌یابی رسوبهای بادی می‌باشد، اغلب عوامل مؤثر را در شناسایی نقاط برداشت مدنظر قرار می‌دهد.

در این روش عدم وجود یکی از عوامل مؤثر به دلیل تعداد موارد در نظر گرفته شده در تعیین منشاء رسوبها و همچنین در صحبت آنها مشکلی ایجاد نخواهد کرد. به علاوه استفاده از عوامل گوناگون و مؤثر در تعیین منشاء رسوبهای بادی باعث کنترل یکدیگر شده و صحبت و دقت نتایج حاصل شده را افزایش می‌دهد. از نتایج و ویژگیهای بسیار مهم این روش، روند منظم و گام به گام آن است که باعث کاهش هزینه و سهولت انجام تحقیق در زمینه منشاء‌یابی تپه‌های ماسه‌ای می‌گردد. این روش دارای دو مرحله جهت‌یابی و مکان‌یابی مناطق برداشت است. در جهت‌یابی مناطق برداشت با بهره‌گیری از اطلاعات منطقه‌ای و تکمیل پرسشنامه محلی، بررسی و مقایسه عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای مربوط به دوره‌های زمانی مختلف، بررسی مورفولوژیکی نهشته‌های بادی و مطالعه رژیم بادهای فرساینده و مؤثر در فرسایش بادی (اطلاعات بادسنگی ایستگاهها) جهت حرکت ماسه‌های روان شناسایی می‌شود. به دلیل این که در استان تهران سه منطقه تحت تأثیر فرسایش بادی شناسایی شده است در هر منطقه تحت تأثیر روش منشاء‌یابی تپه‌های ماسه‌ای و عوامل مؤثر در شناسایی یا جهت‌یابی مناطق برداشت و در مرحله بعد مؤلفه‌های مکان‌یابی مناطق برداشت مدنظر قرار گرفته و نقاط برداشت و حمل و رسوبگذاری در این مناطق تحت تأثیر مشخص شده‌اند. مؤلفه‌های مدنظر در مرحله مکان‌یابی مناطق برداشت در روش منشاء‌یابی تپه‌های ماسه‌ای در ایران (اختصاصی - احمدی) شامل بررسی و شناسایی رخساره‌های ژئومورفولوژیکی حساس به فرسایش با تأکید بر مورفودینامیک باد است. با بررسی مورفوسکپی عناصر

تپه‌های ماسه‌ای و سایر اراضی قطاع برداشت، انجام عملیات دانه‌بندی مورفومتری از محلهای حساس به فرسایش بادی و بررسی مورفوگلکنی عناصر ماسه‌ای قطاع برداشت ارتباط منطقه رسویگذاری و برداشت تعیین می‌گردد.

بنابراین در مرحله مکانیابی مناطق برداشت شناسایی رخسارهای حساس به فرسایش بادی، محدوده‌هایی از اراضی که دارای بیشترین نقش در رسویهای بادی هستند شناسایی می‌شوند.

در این تحقیق به دلیل وسعت طرح و بعد کشوری آن دو عامل عملیات دانه‌بندی مورفومتری و مورفوگلکنی صورت نگرفته و با انجام دو مؤلفه دیگر به انجام رسیده است.

با استفاده از جدول مبنا که به عنوان شاخص عمل می‌نمایند شدت مناطق برداشت، حمل و رسویگذاری تعیین می‌گردد (جدول مبنا در قسمت ضمائم ارائه شده است). بدین ترتیب که مناطق برداشت (O) به مناطق برداشت با شدت زیاد (O_1)، متوسط (O_2) و کم (O_3)، مناطق حمل (T) به مناطق با شدت زیاد (T_1) و کم (T_2) و مناطق ترسیب (S) شامل مناطق فعال (S_1)، نیمه فعال (S_2) با استفاده از دستورالعمل تعیین محدوده آنها بر روی نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ مشخص و بعد با توجه به بعد کشوری آن به مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ تبدیل شده است.

در این مطالعه به دلیل این که مناطق حمل به صورت شاخص مشاهده نشده است و مناطق حمل خود از قابلیت برداشت برخوردار بوده‌اند کل این مناطق تحت عنوان منطقه برداشت در نظر گرفته شده‌اند. پس از شناسایی مناطق برداشت، حمل و رسویگذاری از مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی بخشی از این مناطق که به منابع اقتصادی و زیستی خسارت وارد می‌نمایند تفکیک شده و از آنها تحت عنوان کانونهای بحرانی یاد شده است. این کانونهای بحرانی براساس میزان خسارت مشخص شده‌اند (جدول مبنا در قسمت ضمایم ارائه شده است).

به منظور اولویت‌بندی کانونهای بحرانی فرسایش بادی در استان با توجه به شدت مناطق برداشت، حمل و رسوبگذاری و همچنین میزان خسارت به منابع زیستی و اقتصادی مانند مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی، راههای مواصلاتی، تأسیسات مهم اقتصادی و منابع زیست محیطی براساس جداول مبنای این مهم به انجام رسیده است.

نتایج

به طوری که در روش کار تشریح گردید در این تحقیق ضمن بررسی منشاء رسوبهای بادی مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی در استان تهران کانونهای بحرانی فرسایش بادی استان نیز مورد شناسایی و تفکیک قرار گرفته‌اند به همین دلیل نتایج بدست آمده در دو بخش مجزا ارائه شده‌اند.

الف- شناسایی مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی (مناطق برداشت، حمل و رسوب) در استان تهران

از ۱۲ شهرستان استان تهران سه شهرستان کرج و ساوجبلاغ و ورامین با مشکل حرکت ماسه‌های روان و فرسایش بادی روپرو هستند. در جدول شماره ۱ سطوح مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی به تفکیک مناطق برداشت، حمل و رسوب و زیرمجموعه‌های آنها در شهرستانهای استان تهران ارائه گردیده است.

جدول شماره ۱- سطوح مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی به تفکیک مناطق برداشت، حمل و رسوب و زیرمجموعه‌های آنها در شهرستانهای استان تهران

شهرستان	تأثیر فرسایش	منطقه تحت											
		سطوح منطقه حمل (هکتار)	سطوح منطقه رسوب (هکتار) (هکتار)	سطوح منطقه برداشت (هکتار)			سطوح منطقه رسوب (هکتار)			سطوح منطقه حمل (هکتار)			جمع کل
		S1	S2	S3	جمع	T1	T2	جمع	O1	O2	O3	بادی	جع
کرج	ماهدشت	۴۰۶۵	۷۸۱	-	۷۸۱	-	-	۳۲۸۴	-	۴۶۹	۲۸۱۵	بادی	۴۰۶۵
ساوجبلاغ	نجم آباد	۳۴۳۷/۵	-	-	-	-	-	۳۴۳۷/۵	۲۰۳۱/۵	۱۴۰۶	-	بادی	۳۴۳۷/۵
ورامین	ابردهز	۲۶۷۰	۸۹۷/۵	-	۸۹۷/۵	-	-	۱۷۷۲/۵	-	۱۷۷۲/۵	-	بادی	۲۶۷۰
جمع		۱۰۱۷۲/۵	۱۶۷۸/۵	-	۱۶۷۸/۵			۸۴۹۴	۲۰۳۱/۵	۳۶۴۷/۵	۲۸۱۵	بادی	۱۰۱۷۲/۵
جمع												جمع	

ب- شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی

به طور کلی سه کانون بحرانی فرسایش بادی در استان تهران شناسایی شده است. این کانونهای بحرانی شامل کانون بحرانی ماهدشت از توابع شهرستان کرج، کانون بحرانی نجم‌آباد از توابع شهرستان ساوجبلاغ و کانون بحرانی ابردز از توابع شهرستان ورامین هستند. در جدول شماره ۲ سطح و موقعیت کانونهای بحرانی فرسایش بادی همراه با منابع زیستی و اقتصادی تأثیر آنها در استان تهران به تفکیک شهرستان ارائه شده است. کل خسارت‌های ناشی از کانونهای بحرانی فرسایش بادی در استان تهران سالیانه معادل ۵۰۱۴۱/۷ میلیون ریال برآورد می‌گردد. جداول شماره ۲ الی ۵ سطح و موقعیت کانونهای بحرانی فرسایش بادی همراه با منابع زیستی و اقتصادی تحت تأثیر آنها و اولویت‌بندی آنها و منابع تحت خسارت را نشان می‌دهد.

جدول شماره ۲- سطح و موقعیت کانونهای بحرانی فرسایش بادی همراه با منابع زیستی و اقتصادی تحت تأثیر آنها در استان تهران به تفکیک شهرستان

شهرستان بحرانی	نام کانون بحرانی	طول جغرافیایی از تا	عرض از تا	موقعیت جغرافیایی کانون بحرانی			مساحت کانون بحرانی (به هکتار)	منابع زیستی و اقتصادی تحت تأثیر	میزان خسارت به منابع اقتصادی و زیستی
				C ₁	C ₂	C ₃			
کرج	ماهدشت	۵۰°۴۳'	۵۰°۴۹'	۴۰۶۵	-	-	۴۰۶۵	اراضی کشاورزی، راههای مواصلاتی، مراکز صنعتی، شهرها و روستاهای	۱۶۰۵۴/۶
ساوجبلاغ	نجم آباد	۵۰°۲۶'	۵۰°۲۹'	۳۴۳۷/۵	-	۳۴۳۷/۵	-	اراضی کشاورزی، روستاهای و مرانع	۱۶۰۳۳/۹۵۲
ورامین	ابرذ	۵۲°۰۲'	۵۲°۰۸'	۲۶۷۰	۲۶۷۰	-	-	مراتج، راه آهن	۱۸۰۵۳/۱۷۵
جمع		-	-	۱۰۱۷۲/۰	۲۶۷۰	۳۴۳۷/۵	۴۰۶۵		۵۰۱۴۱/۷۲۷

جدول شماره ۳- حدود، اولویت‌بندی و نحوه برآورد خسارت به منابع اقتصادی و زیستی
در کانون بحرانی فرسایش بادی نجم‌آباد

نوع کانون بحرانی C	شدت	مساحت به هکتار	درصد مساحت	خسارت به منابع اقتصادی به هزار ریال
O	۱	۱۴۰۶	۴۱	۶۵۷۳۹۲۰
T	۲	۲۰۳۱/۵	۵۹	۹۴۶۰۰۳۲
S	۳			
جمع	۱۰۰	۳۴۳۷/۵	۱۶۰۳۳۹۵۲	

منابع تحت خسارت	مقدار تقریبی	برآورد خسارت در کانون در سال (به هزار ریال)
مسکونی	۸۰۸۲۰۰	
تأسیسات مهم		
کشاورزی (هکتار)	۲۲۰۰	۵۲۸۰۰۰
راههای موصلاتی (کیلومتر)	۱۳	۲۶۰۰۰۰
منابع زیست محیطی (مرتع، جنگل و ...) (هکتار)	۱۲۳۷	۷۱۹۵۲
موارد خاص		
جمع		۱۶۰۳۳۹۵۲

جدول شماره ۴- حدود، اولویت‌بندی و نحوه برآورد خسارت به منابع اقتصادی و زیستی
در کانون بحرانی فرسایش بادی ماهدشت

نوع کانون بحرانی C	شدت	مساحت به هکتار	درصد مساحت	خسارت به منابع اقتصادی به هزار ریال
O	۱	۳۲۸۴	۸۱	۱۳۰۰۴۲۲۶
T	۲			
S	۳			
جمع	۱۰۰	۷۸۱	۱۹	۳۰۵۰۳۷۴
				۱۶۰۵۴۶۰۰

منابع تحت خسارت	مقدار تقریبی	برآورد خسارت در کانون در سال (به هزار ریال)
مسکونی		۱۰۰۰۰۰
تأسیسات مهم		۲۵۰۰۰۰
کشاورزی (هکتار)	۴۰۶۵	۱۵۵۴۶۰
راههای مواصلاتی (کیلومتر)	۱۰	۲۰۰۰۰۰
منابع زیست محیطی (مرتع، جنگل و ...) (هکتار)		
موارد خاص		۱۶۰۵۴۶۰۰
جمع		

جدول شماره ۵ - حدود، اولویت‌بندی و نحوه برآورد خسارت به منابع اقتصادی و زیستی در کانون بحرانی فرسایش بادی ابردژ

نوع کانون بحرانی C	شدت	مساحت به هکتار به کانون	درصد مساحت	خسارت به منابع اقتصادی به هزار ریال
O	۱			۵۳۱۷۵
T	۲			۶۶/۳۸
S	۳			۱۷۷۲/۵
جمع	۱	۱۷۷۲/۵	۱۷۷۲/۵	۱۸۰۰۰۰۰
	۲			۳۳/۶۲
	۱			۸۹۷/۵
	۲			۱۸۰۵۳۱۷۵
	۳			۱۰۰
		۲۶۷۰		

منابع تحت خسارت	مقدار تقریبی	برآورد خسارت در کانون در سال (به هزار ریال)
مسکونی		
تأسیسات مهم		
کشاورزی (هکتار)		
راههای مواصلاتی (کیلومتر)	۹۰۰۰ متر	۱۸۰۰۰۰۰
منابع زیست محیطی (مرتع، جنگل و ...)		
(هکتار)	۱۷۷۲/۵	۵۳۱۷۵
موارد خاص		
جمع		۱۸۰۵۳۱۷۵

نتیجه‌گیری

به طوری که جدول شماره ۱ نشان می‌دهد از مجموع مساحت ۱۸۹۰۹۰۰ هکتاری استان تهران ۱۰۱۷۲/۵ هکتار آن تحت تأثیر فرسایش بادی قرار دارند. منطقه تحت تأثیر فرسایش بادی شهرستان کرج در جوار شهر ماهدشت واقع است. این منطقه با وسعتی معادل ۴۰۶۵ هکتار در معرض فرسایش بادی قرار دارد، در این محدوده سطح مناطق

برداشت برابر ۳۲۸۴ هکتار است که سطحی معادل ۲۸۱۵ هکتار دارای شدت زیاد (O1) و ۴۶۹ هکتار دارای شدت متوسط (O2) تشخیص داده شد و به دلیل نزدیک بودن منطقه برداشت با رسوب و غالب بودن پدیده برداشت در منطقه به طوری که منطقه حمل نیز خود به نوعی از قابلیت برداشت برخوردار بود، بنابراین منطقه حمل در نظر گرفته نشد و یک منطقه رسوب نیز در کانون مورد نظر تشخیص داده شد که وسعت آن ۷۸۱ هکتار در کل نیمه فعال (S2) برآورد گردیده است.

براساس جدول شماره ۱، ۴۰۶۵ هکتار در منطقه ماهدشت با شدت زیاد (C1) جزء کانونهای بحرانی قلمداد می‌شوند که شامل مناطق مهمی مانند شهر و روستا و راههای مواصلاتی و اراضی کشاورزی و صنعتی می‌باشند. سطحی معادل ۳۴۳۷/۵ هکتار با شدت متوسط (C2) مشخص گردیده است که در کل در کانونهای بحرانی نجم‌آباد قرار گرفته است.

مجموع کانونهای بحرانی منطقه ابردژ سطحی معادل ۲۶۷۰ هکتار است که با توجه به امتیازات داده شده دارای شدت کم (C3) می‌باشد و اراضی تحت تأثیر این کانون ریل راه آهن و اراضی مرتعی است.

با توجه به جدول مبنا که در روش کار توضیح داده شد (در ضمائم آمده است) کانون بحرانی ماهدشت واقع در شهرستان کرج با امتیاز ۷۳ دارای شدت ۱ و در اولویت اول استانی برای انجام طرحهای استانی و کنترل بیابانزایی قرار دارد.

جدول شماره ۶- اولویت‌بندی کانونهای بحرانی فرسایش بادی در استان تهران

اولویت در استان	نام کانون بحرانی	شهرستان	اولویت اجرایی	امتیاز	ملاحظات
۱	ماهدشت	کرج	I	۷۳	
۲	ابردژ	ورامین	II	۵۳	
۳	نجم‌آباد	ساوجبلاغ	II	۵۱	

ضمائیم:

جدول شماره ۷- شاخصهای تعیین میزان فعالیت (اولویت) مناطق برداشت (منشاء)

امتیاز	کم فعال (۳)	نیمه فعال (۲)	فعال (۱)	میزان فعالیت	
				شاخص	منشاء
				- ساحل خشک	
				- بستر رودخانه‌های ریزدانه	
				- اراضی دشت سیلانی با منشاء مارنی	۱- نوع اراضی و کاربری آن
				- دشت سرپوشیده	
				- کشاورزی، زراعت (چند فصل آیش)	
				- آثار بادبردگی خاک شدید	۲- آثار فرسایش سطحی در خاک
				- کلوت و یا ردانگ	
				- آثار شلجمی شکل نیکا و ربدو فعل	
				- آثار بادبردگی متوسط	۳- تراکم پوشش گیاهی
				- آثار شلجمی و نیکا غیر فعل	
				- آثار افزایش سنگریزه خاک سطحی	
				- آثار افزایش سنگریزه یا سله در سطح خاک	۴- سنگریزه یا سله در سطح خاک
				- آثار افزایش سنگریزه در سطح خاک	(الف) سنگریزه در سطح خاک
وجود پوسته‌های نمکی یا رسی که در اثر عبور انسان یا نوک پا به راحتی خرد نمی‌شود و لی می‌شکند.	وجود پوسته‌های نمکی یا رسی که در اثر عبور انسان یا نوک پا به راحتی خرد شده و از هم می‌پاشد.	وجود پوسته رسی یا نمکی که بر اثر عبور انسان یا ضربه نوک پا به طور کلی از هم پاشیده و پودر می‌شود.			
۰_۶	۶_۱۴	۱۴_۲۰	۰_۲۰		
۰_۳	۳_۷	۷_۱۰	۰_۱۰		
۱۵٪_۳۰	۵_۱۵	۱۵_۴۰	۰_۱۵		
۰_۵	۵_۱۰				

ادامه جدول شماره ۷- شاخصهای تعیین میزان فعالیت (اولویت) مناطق برداشت (منشاء)

امتیاز	کم فعال (۳)	نیمه فعال (۲)	فعال (۱)	میزان فعالیت	
				شاخص	مساهمه
۰_۳	شنی رسی - گراولی - رسی	- ماسههای درشت - سیلیتی رسی - رسی	- ماسههای ریز - سیلیتی	۵- بافت خاک	۰_۱۰
۰_۳	برداشتن یک مشت خاک از سطح خاک بسیار دشوار است	برداشتن یک مشت خاک از سطح زمین به سختی صورت می‌گیرد	به راحتی به وسیله دست یک مشت خاک را می‌توان برداشت	۷- مقاومت عمومی خاک	۰_۱۰
۰_۳	وجود نمکهای آهکی در خاک و عدم تورم پوکی بعد از بارش	وجود نمکهای گجدار و تورم نسبی بعد از بارندگی و پوکی در موقع خشکی شدید	پراکنده کننده در سطح خاک بعد از بارش باعث تورم و پوکی می‌شود خاصه نمکهای هالیت	۷- وجود نمک در خاک و پراکنده‌گی	۰_۱۰
۰_۳	< ۱۰ Km	۰_۱۰ Km	< ۵ Km	۸- فاصله منشاء تا تپه‌های ماسه‌ای	۰_۱۰
۰_۳	۰_۳۱	۳۱_۶۹	۷_۱۰	۷_۹۱_۱۰۰	۰_۱۰
جمع امتیازات				۱۰۰_۰	

در نقاطی که سطح خاک سنگریزه دار است (دشت ریگی یا هاما) فقط امتیاز ردیف (الف) سنگریزه‌دار و در اراضی رسی سله دار یا نمکی در سطح خاک فقط ردیف (ب) تکمیل می‌شود.

در صورت وجود امکانات بیشتر می‌توان از روش‌های تجربی برآورد فرسایش بادی مانند اریفر و یا روش تله رسوب گیر و طبقه‌بندی رسوب حمل شده در واحد عرض در سال استفاده نمود.

جدول شماره ۸- شاخصهای تعیین میزان فعالیت اراضی ترانزیت

امتیاز	کم فعال ₂	فعال ₁	شاخص و دامنه امتیاز	اولویت
				فاصله بین برداشت تا رسوبگذاری
< ۵ Km	< ۵ Km		۱- فاصله بین برداشت تا رسوبگذاری	
۰_۱۰	۱۰_۲۰		۲- عرض مناطق ترانزیت (کanal باد)	
< ۵ Km	< ۵ Km		۳- جمع شدن نهشته بادی در پای سنگها و دیوارها و یا شانه جاده	
۰_۱۰	۱۰_۲۰			
کم و به صورت موردي	بسیار زیاد و چشمگیر			
۰_۱۰	۱۰_۲۰			
حریان حمل به صورت یکپارچه در سطح منطقه وجود دارد.	مناطق حمل به صورت کanalهای باد (کریدور) در محل خاص عمل می کند.		۴- وجود کanalهای باد در منطقه (کریدورهای طبیعی)	
۰_۱۵	۱۵_۲۰			
خسارت در منطقه به صورت یکنواخت و یکسان عمل می کند و شدت آن زیاد نیست.	خسارت در نقاطی خاص که غبار آلودگی و حمل ذرات زیاد است حاصل شده		۵- کاهش شدید دید، ایجاد خسارت به منابع اقتصادی در حین وقوع طوفان	
۰_۱۰	۱۰_۲۰			
۰_۵۰	۵۰_۱۰۰		جمع امتیازات	
			۰_۱۰۰	

جدول شماره ۹- شاخصهای تعیین میزان فعالیت تپه‌های ماسه‌ای

میزان فعالیت			
شاخص و امتیاز			
فعال (۱)	نیمه فعال (۲)	کم فعال یا غیر فعال (۳)	امتیاز
۱- ارتفاع تپه ماسه‌ای ۰_۲۰	۵ < ارتفاع ۱۵_۲۰	۱۰ M > ارتفاع ۰_۵	۵_۱۰ M
۲- شکل تپه ماسه‌ای ۰_۲۰	- بارگذاری - سیف - بارخانی - بارخانویید	- قوردن - تپه‌های صعودی (رفلکسی) - تپه‌های ماسه‌ای مواجه درشت دانه (زیبار) ۰_۵	- بارخان - سیلک - الب - ریورسینگ (رفت و برگشت) ۵_۱۵
۳- تپه‌ها در واحد سطح (هکتار) ۰_۲۰	۱۵_۲۰	(</۳۰) ۰_۵	متوسط (۳۰_۷۰) ۵_۱۵
۴- تراکم پوشش گیاهی بر روی تپه‌های ماسه‌ای و اراضی بین آنها ۰_۲۰	۱۵_۲۰	تپه‌های لخت، کمرت از ۵۰ بوته در هکتار تعداد بوته ۵۰_۲۰۰ در هکتار (۵_٪/۲۰) ۵_۱۵	تپه‌های نیمه لخت، زیاد با تعداد بوته بیشتر از ۲۰۰ عدد در هکتار (٪/۲۰ تراکم) ۰_۵
۵- جابه‌جایی تپه‌های ماسه‌ای در طول سال ۰_۲۰	۷۵_۱۰۰	هجموم ماسه‌ها به اراضی شهری، کشاورزی و یا جاده کاملاً مشهود است. (> ۵۰ m) در سال	در پاره‌ای از سالها تپه‌ها به منابع اقتصادی کند و بطيئی. (< ۵ m) در سال
جمع امتیاز	۷۵_۱۰۰	۲۵_۷۵	۰_۲۵

**جدول شماره ۱۰- شاخصهای شناسایی و اولویت‌بندی کانونهای بحرانی
از نظر کنترل فرسایش بادی (C)**

شناخت و دامنه امتیاز	اولویت	اولویت ۱	اولویت ۲	اولویت ۳	امتیاز
۱- نوع مرحله فرسایش بادی (از روی نقشه منشاء تپه‌های ماسه‌ای) ۰_۲۰					
مناطق حمل (ترانزیت) ۰_۵	مناطق تپه ماسه‌ای (رسوب) ۵_۱۵	مناطق برداشت ۱۵_۲۰	مناطق حساسیت (II) ۵_۱۵	مناطق حساسیت (III) ۰_۵	
خسارت به مراتع، اراضی بکر و بدون پوشش ۰_۵	خسارت به اراضی کشاورزی و جاده‌های فرعی و تأسیسات درجه ۲ ۵_۱۵	خسارت به شهر، روستا و یا به تأسیسات و جاده‌های اصلی و کشاورزی مهم ۱۵_۲۰	خسارت به اراضی کشاورزی و پوشش ۰_۵	درخواست محدود درخواست نشده است ۰_۵	
درخواست بیش از ۱۰ Km ۰_۵	بوده و تنها در پرسشنامه خواسته شده است ۵_۱۵	شدیداً مورد خواست مردم و دستگاه دولتی ۱۵_۲۰	< ۵ Km ۱۵_۲۰	۰_۲۵	
۲- میزان فعالیت در هر مرحله فرسایش بادی (از روی نقشه منشاء تپه‌های ماسه‌ای) ۰_۲۰					
۳- نوع خسارت به منابع زیستی، اقتصادی در کانون بحرانی یا در مسیر آن از روی پرسشنامه‌های مردمی ۰_۲۰					
۴- میزان درخواست مردم و یا دستگاه‌های اجرایی از طریق مراجعه به دفتر ثبتیت ماسه‌های روان و یا پرسشنامه مردمی ۰_۲۰					
۵- دوری یا نزدیکی رخدار فرسایش به منابع تحت خسارت و جهت آن به سمت منبع تحت تأثیر ۰_۲۰					
جمع امتیازات	۷۵_۱۰۰	۲۵_۷۵	۵_۱۰ Km	۰_۵	۰_۲۵

توجه: در پاره‌ای از نقاط ممکن است مناطق برداشت، حمل رسوب بسیار نزدیک و یا در مجاورت هم قرار داشته باشند و یا در هم تداخل نمایند و در هر بخش نیز خسارت‌هایی به منبع اقتصادی و زیستی وارد گردد که در این صورت باید جداول هر قسمت به طور جداگانه تکمیل گردد.

**جدول شماره ۱۱ - اولویت‌بندی ضرورت عملیات اجرایی در هر یک از
کانونهای بحرانی استان**

ردیف	میزان امتیاز	میزان امتیاز		
		I	II	III
۱	جمعیت	(> ۵۰۰۰) = ۲۰	(۱۰۰_۵۰۰۰) = ۱۴	(۱۰۰ < نفر) = ۶
۲	اراضی کشاورزی	(درجه ۱) = ۱۵	(درجه ۲) = ۱۰	(درجه ۳) = ۵
۳	خطوط مواصلاتی	(درجه ۱) = ۱۵	(درجه ۲) = ۱۰	(درجه ۳) = ۵
۴	تأسیسات اقتصادی	(درجه ۱) = ۱۵	(درجه ۲) = ۱۰	(درجه ۳) = ۵
۵	مواد خاص	(درجه ۱) = ۱۰	(درجه ۲) = ۷	(درجه ۳) = ۳
۶	تخرب پوشش گیاهی تحت تأثیر ماسه و مدفون شدن آن	(زیاد) = ۱۱	(متوسط) = ۷	(کم) = ۳
۷	برآورد خسارت کل منابع در سال	(> ۵۰۰) = ۱۵ زیاد (میلیون ریال) (ریال)	(۱۰۰_۵۰۰) = ۱۰ میلیون ریال	(کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال) = ۵
		۶۸_۱۰۰	۳۲_۶۸	۰_۳۲
				۱۰۰

منابع مورد استفاده

- ۱- دفتر فنی بیابانزدایی، ۱۳۸۱. طرح شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی و تعیین اولویتهای اجرایی.
- ۲- دفتر فنی بیابانزدایی، طرحهای بیابانزدایی استان تهران.
- ۳- احمدی، ح.، ۱۳۶۷. ژئومورفولوژی کاربردی، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۵۹۲ ص.
- ۴- احمدی، ح.، ۱۳۷۷. ژئومورفولوژی کاربردی، جلد دوم بیابان و فرسایش بادی، ۵۷۰ ص.
- ۵- احمدی، ح.، طهماسبی پیرگانی. ع. م.، رفاهی، ح. ق. و اختصاصی، م. ر.، ۱۳۷۸. بررسی منشاء رسوبهای بادی دشت نگار، مجله منابع طبیعی ایران.
- ۶- اختصاصی، م. ر.، ۱۳۷۲. تهیه نقشه حساسیت به فرسایش بادی اراضی دشت یزد به کمک دستگاه سنجش فرسایش بادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ۲۳۷ ص.
- ۷- اختصاصی، م. ر.، ۱۳۷۵. منشاء‌یابی تپه‌های ماسه‌ای در حوزه دشت یزد - اردکان، چاپ اول، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراعت، ۲۶۰ ص.
- ۸- اختصاصی، م. ر. و احمدی، ح.، ۱۳۷۴. منشاء‌یابی تپه‌های ماسه‌ای در ایران (مطالعه موردنی)، منشاء‌یابی ارگ یزد، مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۴۷، ص ۲۲ - ۵.
- ۹- آمارنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، سال ۱۳۷۹.
- ۱۰- ترکارژان، ۱۹۶۹. اشکال ناهمواری در مناطق خشک، (برگردان صدیقی مهدی و پورکرمانی محسن ۱۳۶۹)، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۶۳۳ ص.

- ۱۱- رفاهی. ح. ق.، ۱۳۷۸. فرسایش بادی و کنترل آن، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۳۲۰ ص.
- ۱۲- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه عملیات مشترک زمینی (توپوگرافی) با مقیاسهای ۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰.
- ۱۳- مرکز سنجش از دور ایران، فایلهای رقومی تصاویر ماهواره‌ای سالهای ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ میلادی.
- ۱۴- سازمان هواشناسی کشور، آمارهای ایستگاههای هواشناسی استان تهران.
- ۱۵- طهماسبی بیرگانی، ع. م.، مقایسه پتانسیل رسوبدهی فرسایشهای آبی و بادی با استفاده از مدل‌های IRIFK و MPSIAC در حوزه آبخیز آب شجاء.