

بورسی سازگاری (استقرار و زنده مانی) تعدادی از گیاهان مرتعمی در مراوه تپه گنبد

عباسعلی سندگل^۱

چکیده:

در سالهای ۱۳۶۴ - ۱۳۶۸ به منظور معرفی گونه‌های مرتعمی سازگار، مرغوب و دائمی جهت اصلاح مراتع منطقه چناران مراوه تپه تعداد ۲۷ گونه و اکوتیپ مرتعمی انتخاب و در قالب طرح فاکتوریل با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. هر گونه روی خطوط پاافتصله ۷۰ سانتیمتر از هم کشت شدند (بوته‌ای‌ها روی خطوط ۲۵ متری و با فاصله کاشت ۲،۵ متری) و تعداد ۱۶۰ پایه از هریک در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. از میان گونه‌های مورد بررسی تعداد ۸ گونه از استقرار، شادابی و رشد مطلوبی برخوردار شدند. تجزیه آماری تعداد گونه‌های موفق مورد آزمایش در سال پنجم نشان داد که میان استقرار گونه‌ها تفاوت معنی دار وجود دارد ($P=0.05$). مقایسه میانگین تعداد استقرار گونه‌ها با روش دانکن نشان داد که گونه‌های *Atriplex halimus*, *Bromus tomentellus*, *Medicago scutellata* گویه *Puccinellia distans* در رتبه دوم و گونه *Atriplex canescens* در رتبه سوم و *Agropyron elongatum*, *Medicago sativa cri.*, *Medicago sativa codi* گویه‌های در رتبه چهارم قرار گرفتند.

واژه‌های کلیدی: سازگاری، گونه‌های مرتعمی، چناران مراوه تپه.

تاریخ پذیرش: ۲۵/۴/۸۴

تاریخ دریافت: ۵/۲/۸۴

^۱ عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

مقدمه

در منطقه چناران مراوهه په به علت چرای شدید، بسیاری از گونه‌های دائمی از بین رفته و گونه‌های یکساله جایگزین آنها شده است. در حال حاضر از گونه‌های دائمی افراد پراکنده‌ای از آرتمیزیا سیبری مشاهده می‌شود. در مناطق مجاور منطقه مورد بررسی، گونه‌های اسپرس و تعدادی از گونه‌های دائمی گرامینه و سایر خانواده‌ها دیده می‌شود. توان تولیدی مراع چناران و مراوهه په به مراتب بیشتر از تولید بالفعل آن می‌باشد و می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح مرتعداری و وارد نمودن گونه‌های جدید دائمی و با ارزش مرتتعی به اصلاح و احیا این قبیل مراع پرداخت. طرح حاضر به منظور دستیابی به گونه‌های مرتتعی سازگار، مرغوب و دائمی جهت اصلاح مراع مورد اشاره در نظر گرفته شده بود. جهت تحقق این هدف، یکی از کارهای مقدماتی، بررسی سازش گونه‌ها و زنده مانی آنها با شرایط محل بود. بر این اساس، در سال ۱۳۶۴ تعداد ۲۷ گونه گیاهی از خانواده‌های مختلف که در پیش در ایستگاه‌های تحقیقاتی، مورد بررسی اولیه قرار گرفته و به نحوی با شرایط مشابه سازش داشتند انتخاب و در قطعات مجزا مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این رابطه تعدادی از گونه‌ها که در دامنه بارندگی ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیمتر امکان استقرار داشتند انتخاب گردیدند.

ووگل و جنسون (۲۰۰۱) سازگاری حدود ۵۵ گونه و ۱۰۰ اکوتیپ گندمیان دائمی خانواده تریاسه از جمله گونه‌ها و اکو تیپ‌های *Agropyron cristatum*, *Agropyron desertorum*, *Hordeum bulbosum* در شرایط ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیمتر بارندگی سالانه و دمای حداقل ۴۰ و حد اکثر +۴۰ درجه سانتیگراد، به مدت ۳ سال مورد بررسی قرار دادند و اعلام داشتند که در سال سوم، زنده مانی سه گونه فوق و اکو تیپ‌های آنها ۶۶ تا ۱۰۰ بوده است.

استیدهام و همکاران (۱۹۸۲) نهال‌های حاصل از بذر ۱۴ گونه بوته‌ای از جمله *Atriplex canescens*, *Artemisaa tridentata*

در سال دوم، در مراتع شمال اوکلاهما در ارتفاع ۲۹۰ متر از سطح دریا و در بارندگی ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیمتر مورد بررسی قرار دادند. این محققان نتیجه گرفتند که کلیه گونه های مورد بررسی در خاکهای مرطوب تر از زنده مانی و رشد بیشتری برخوردار بودند.

هولچک و همکاران (۱۹۸۲) نتیجه استقرار گونه های کاشته شده در اراضی معدنی جنوب شرق مونتنا با بارندگی ۳۹۰ - ۵۷۰ میلیمتر از جمله *Agropyron cristatum*, *Atriplex canescens*, *Medicago sativa* که گونه های مورد بررسی از استقرار و زنده مانی رضایت بخشی برخوردار بودند. یک و زیمس (۱۹۸۴) نتایج سازگاری و استقرار ۳۶ ساله تعدادی از گونه های دائمی گراس را در دشت های مرتفع جنوبی تگزاس با بارندگی حدود ۲۰۰ تا ۴۶۰ میلیمتر مورد ارزیابی قرار دادند و اظهار داشتند که تعدادی از گونه های مورد بررسی پس از ۳۶ سال در محل استقرار یافته بودند.

کمف و همکاران (۱۹۷۶) زنده مانی و استقرار سیزده گونه گیاهی دارای رشد در فصل سرد را در ارتفاع ۱۵۰۰ متر از سطح دریا و بارندگی ۳۶۰ میلیمتر در سال و در خاک لومی - رسی عمیق در غرب مارفای تگزاس مورد بررسی فرار دادند و نتیجه گرفتند که در میان گونه های مورد بررسی چهار گونه *Agropyron cristatum*, *Phalaris tuberosa*, *Elymus junceus*, *Bouteloua curtipendula*, *Sanguisorba minor* نسبت به سایر گونه های مورد بررسی از سازگاری (زنده مانی و استقرار) خوبی برخوردار بودند. گونه *Elymus junceus* با حدود ۹۵ درصد زنده مانی در رتبه اول و گونه های *Bouteloua curtipendula* و *Agropyron cristatum* و *Sanguisorba minor* و *Phalaris tuberosa* با حدود ۷۵ درصد زنده مانی در رتبه دوم و گونه های *Phalaris tuberosa* با حدود ۵ درصد زنده مانی در رتبه سوم قرار گرفتند.

کوبر و حیدر (۱۹۵۸) یازده گونه مرتعی گراس از جمله *Agropyron cristatum* یازده گونه مرتعی گراس از جمله *Agropyron elongatum Agropyron desertorum* متراز سطح دریا و در خاک لومی رسی و با بارندگی حدود ۳۰۰ میلیمتر در غرب اور گون مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که همه گونه های مورد بررسی از جمله گونه های فوق از سازگاری نسبتاً خوبی برخوردارند. این محققان گزارش کردند که در سالهای خشک (۱۰۰ میلیمتر) گونه *Ag. elongatum*, از نظر تولید بسیار ضعیف و در سالهای عادی (۳۰۰ میلیمتر) نسبتاً خوب و گونه های

Ag. desertorum و *Ag. cristatum* به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند. ایرا و لاری جود (۱۹۷۶) نتیجه سازگاری ۴۸ گونه مرتعی بومی و بیگانه از جمله، *Eragrostis curvula Atriplex canescens Agropyron desertorum* سال در چهار تیپ گیاهی بوته زار های نیمه بیابانی، چابارل، علفزار های نیمه بیابانی و جنگلهای ارس در منطقه آریزونا مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل در تیپ علفزار های نیمه بیابانی با ارتفاع ۱۷۰۰ متر از سطح دریا و بارندگی ۵۰۰ میلیمتر در سال بدین قرار بود که به تدریج گونه های کشت شده به جز گونه های *Eragrostis Tridens albescens*, *Agropyron desertorum.curvula* رفتند. گونه های *Eragrostis curvula* و *Agropyron desertorum* بعد از ۲۰ سال نیز زنده بودند.

هول (۱۹۷۴) نتایج حاصل از سازگاری و زندگانی حدود ۹۰ گونه گیاهی در ۲۴۵۰ نقطه از مراتع تخریب یافته در جنوب ایدaho با بارندگی ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر و خاک های لومی رسی و در بعضی موارد خاکهای لومی رسی شور و قلیابی را بعد از ۴۰ سال مورد ارزیابی قرار داد و نتیجه گرفت که به جز تعداد محدودی از گونه ها بقیه بعد از ۲۰ تا ۴۰ سال بیش از ۹۷ درصد از بین رفته و تنها گونه های *Agropyron* در مناطق خشک تر (*Agropyron cristatum deserterom*) بارندگی حدود ۲۰۰

میلیمتر) و گونه‌های *Agropyron trichopherum* *Agropyron intermedium* در مناطق با بارندگی زیاد تر (حدود ۴۰۰ میلیمتر) موفق بوده است. استوارت (۱۹۵۴) بذرکاری‌های مناطق مختلف ناحیه *Intermountain* یوتا را مورد بررسی قرار داد و گزارش کرد که *Agropyron deserterom* تنها گونه به واقع مقاوم به خشکی در مناطق خشک و گرم ناحیه *Intermountain* یوتا بوده و در مناطق سرد تر و مطبوع‌تر گونه *Agropyron intermedium* از سازگاری خوبی بر خوردار است. وی اظهار داشت که حداقل بارندگی مورد نیاز برای بذرکاری مرتع حدود ۲۰۰ میلیمتر در سال است. شوندیمن (۱۹۵۶) نتایج حاصل از معرفی نباتات را در رابطه با اصلاح مرتع در مناطق مختلف امریکا مورد بررسی قرار داد و خصوصیات برخی از گونه‌های سازگار *Bromus* *Elymus junceus*، *Agropyron elongatum*، *tomentellus* را ذکر کرده است.

پیمانی فرد و همکاران (۱۳۷۳) برای مناطق با بارندگی ۱۸۰ تا ۳۵۰ میلیمتر

گونه‌های زیر را توصیه کرده‌اند:

Agropyron tauri, *Bromus tomentellus*, *Secale ceremont*, *Elymus Canadensis*, *Stipa barbata*, *Hordeum fragile*, *Poterium sanguisorba*, *Kochia prostrata*, *Melilotus officinalis*, *Onobrychis sativa*, *Astragalus siliquosus*, *Onobrychis melanotrica*, *Onobrychis gaubae*, *Artemisia herba-alba*, *Salsola rigida*, *Oryzopsis holciformis*, *Agropyron desertorum*, *Agropyron trichophorum*, *Agropyron elongatum*, *Agropyron dasystachyum*, *Elymus junceus*, *Medicago sativa*

مواد و روشها

۱- شرایط محل اجرای آزمایش

- موقعیت جغرافیایی: این طرح در اراضی چناران واقع در ۱۰ کیلومتری جنوب مراوه تپه که دارای طول جغرافیایی ۴۶ و ۵۵ و عرض جغرافیائی ۵۱ و ۳۷ و ارتفاع ۳۷۰ متر از سطح دریا می‌باشد به اجرا گذاشته شده است.
- شرایط اقلیمی: براساس آمار ایستگاه هواشناسی مراوه تپه میزان بارندگی متوسط سالانه در این منطقه حدود ۳۲۵ میلیمتر است که به طور عمده در پاییز و زمستان و اوایل بهار می‌بارد. میزان بارندگی و دمای متوسط هوا در ماه‌های رشد دوره بررسی در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. حداقل دمای مطلق طی دوره بررسی پنج درجه زیر صفر و حداکثر دمای مطلق ۴۵ درجه سانتیگراد است. بنابراین منطقه مطالعاتی دارای تابستان خشک و گرم و زمستانهای معتدل و ملایم است.

جدول شماره ۱: توزیع بارندگی و درجه حرارت ماههای بهار، تابستان و پاییز در منطقه
مراوهه تپه

ماه	عوامل	۶۷-۶۸	۶۶-۶۷	۶۵-۶۶	۶۴-۶۵	۶۳-۶۴
خرداد	حرارت متوسط C	۲۸	۲۷,۰	۲۸/۴	۲۶/۹	۲۷
	بارندگی mm	۱۰	۵	۲/۵	۲۹/۰	-
اردیبهشت	حرارت متوسط C	۲۲,۳	۲۲,۱	۲۲/۲	۲۱/۵	۲۳/۹
	بارندگی mm	۵	۳	۳	۷/۵	۱
فروردین	حرارت متوسط C	۱۴,۷	۱۰,۲	۱۴/۷	۱۴	۱۸/۱
	بارندگی mm	۳۷	۴۸	۶۰/۰	۴۴/۰	۵
اسفند	حرارت متوسط C	۱۱	۱۳	۱۴	۱۳/۲	۸/۷
	بارندگی mm	۴۴	۳۹	۴۲	۲۴/۰	۵۴/۰
بهمن	حرارت متوسط C	۱۰,۴	۱۰	۱۰/۲	۷	۱۲/۸
	بارندگی mm	۷۲	۶۳	۵۰	۷۰	۵۶/۵
دی	حرارت متوسط C	۱۰	۸	۱۲	۱۰/۷	۶/۲
	بارندگی mm	۳۵	۲۸	۳۷	۲۶	۵۵/۰
آذر	حرارت متوسط C	۱۰,۲	۱۱	۹/۲	۱۳/۲	۱۰/۲
	بارندگی mm	۴۶	۷۱	۴۸/۰	۴۰	۴۳
آبان	حرارت متوسط C	۱۵,۱	۱۴,۸	۱۵/۳	۱۶/۶	۱۴/۴
	بارندگی mm	۲۴	۲۰	۲۱	۱۷/۰	۴۲
مهر	حرارت متوسط C	۱۹,۳	۲۱	۲۲/۳	۲۱/۷	۱۹/۲۱
	بارندگی mm	۲۶	۱۸	۲۸/۵	۲۰/۰	۲۰/۰

- خاک -

منطقه اجرای طرح دارای خاکهای استپی قهقهه‌ای با رنگ روشن بوده که در عمق بیشتر از ۵۰ سانتیمتر به افقهای آهکی با رنگ روشن ختم می‌شود. بافت خاک سیلتی - لوم و با اسیدیته ۸,۳ و هدایت الکتریکی ۰,۴۶ تا ۰,۵۲ میلیموس بر سانتیمتر و با

حاصلخیزی متوسط تا ضعیف (مقدار نیتروژن ۰،۰۳ تا ۰،۰۶ درصد و مقدار فسفر ۱ تا ۲٪ قسمت در میلیون و پتاسیم ۷۰ تا ۱۶۰ قسمت در میلیون) می باشد.

- پوشش گیاهی موجود

پوشش گیاهی طبیعی منطقه را به طور عمده تیپ درمنه تشکیل می دهد. عمده ترین گونه های همراه آن را گراسهای یکساله، *Poa bulbosa*. و نیز بقولات یکساله از جنس *Galium aparine*, *Adonis flam*, *Helicephylla malekii*, *Allium stramoineum*, *Veronica persica*, *Crepis arenarius*, *Artemisia sieberi*, *Stipa hoehnackeriana* :

Poa bulbosa, *Medicago minima*, *Medicago radiata*, *Medicago hispida*, *Lophocloa sp.*, *Allium stramineum*, *Ranunculus bulbosum*, *Setaria viridis* *Galium aparine*, *Adonis flam*, *Helicephylla malekii*, *Allium stramoineum*, *Veronica persica*, *Crepis arenarius*, *Artemisia sieberi*, *Stipa hoehnackeriana*

۲- روش بررسی

- گونه های مورد بررسی

در این بررسی تعداد ۲۷ گونه زیر طی ۵ سال مورد بررسی قرار گرفتند:

Agropyron cristatum, *Agropyron desertorum*, *Agropyron elongatum*, *Agropyron intermedium*, *Agropyron trihcophorum*, *Bromus inermis*, *Bromus tomentellus*, *Festuca arundinaceae*, *Hordeum bulbosum*, *Lolium perenne*, *Oryzopsis hymenoides*, *Secale ceremont*, *Secale montanum*, *Puccinelia distans*, *Puccinelia capilaris*, *Arrhenatherum elatius*, *Poterium sanguisorba*, *Medicago sativa col. crisary*, *Medicugo sativa col. cody*, *Medicago sativa col. simerchenskaia*, *Medicago scutellata*, *Melilotus officinalis*, *Melilotus alba*, *Onobrychis sativa*, *Onobrychis radiata*, *Astragalus siliquosus*, *Atriplex canecens*, *Atriplex halimus*

- طرح آماری و روش کاشت

گونه‌های انتخابی در قالب طرح آماری فاکتوریل با عوامل گونه و سال در چهار تکرار و روی خطوط دومتری با فاصله ۷۰ سانتیمتر از یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتند. در آبان ماه از هر گونه در هر تکرار دو خط کشت گردید. در رابطه با کشت بوته‌ای‌ها، فاصله خطوط کاشت از هم ۲.۵ متر و فاصله کاشت نهال روی هر خط نیز ۲.۵ متر بود. به منظور بررسی اثر سالها بر استقرار اولیه کشت تعدادی از گونه‌ها در سالهای ۶۵-۶۶ و ۶۶-۶۷ نیز تکرار گردید و تعداد گیاه استقرار یافته پس از دوسال شمارش و از این طریق اثر سالها در رابطه با تغییرات بارندگی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج**الف : - پایه‌های موجود گونه‌ها در سالهای آزمایش**

تعداد پایه‌های موجود گونه‌ها در سالهای آزمایش به شرح مندرج در جدول شماره

۲ بود:

جدول شماره ۲ : تعداد پایه‌های موجود گونه‌ها در سالهای آزمایش

	سال پنجم	سال چهارم	سال سوم	سال دوم	سال اول	گونه
<i>Agropyron cristatum</i>	۴۸	--	۲۰	۲۰	۶	-
<i>Agropyron desertorum</i>	۷۵	۳۲	۲۱	۲	-	-
<i>Agropyron elongatum</i>	۱۰۱	۸۱	۷۶	۷۳	۶۲	-
<i>Agropyron intermedium</i>	۷۰	۵۴	۴۲	۳۵	۲۹	-
<i>Agropyron tricophorum</i>	۸۵	۳۸	۳۰	۱۸	-	-
<i>Arrhenatherum elatius</i>	۱۵۸	۵۲	۲۰	۴	-	-
<i>Astragalus siliquosus</i>	۱۴۳	۳۹	۳۰	۲۶	۹	-
<i>Atriplex canescens</i>	۱۶۰	۱۲۸	۱۳۶	۱۲۶	۱۲۲	-
<i>Atriplex halimus</i>	۱۶۰	۱۵۲	۱۳۸	۱۳۴	۱۲۱	-
<i>Bromus inermis</i>	۱۰۴	۳۴	۲۷	۱۴	-	-
<i>Bromus tomentellus</i>	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	-
<i>Festuca arundinaceae</i>	۱۵۳	۶۲	۳۶	۱۲	-	-
<i>Hordeum bulbosum</i>	۱۲۳	۱۲۶	۱۰۳	۴۵	-	-
<i>Lolium perenne</i>	۱۴۶	-	-	-	-	-
<i>Medicago sativa</i> <i>col.simerchenskaya</i>	۹۳	۸۲	۷۷	۱۹	۱۹	-
<i>Medicago sativa</i> <i>col.crisary</i>	۹۱	۸۸	۸۳	۵۵	۵۱	-
<i>Medicago scutellata</i>	۱۱۲	زادآوری	زادآوری	زادآوری	زادآوری	زادآوری
<i>Medicago sativa</i> <i>col.cody</i>	۷۶	۷۰	۶۵	۶۲	۶۱	-
<i>Melilotus alba</i>	۱۶۰	-	-	-	-	-
<i>Melilotus officinalis</i>	۸۲	۱۸	۶	-	-	-
<i>Onobrychis radiata</i>	۶۴	۵۲	۴۳	۳۲	۲۶	-
<i>Onobrychis sativa</i>	۱۴۸	۱۲۶	۵۴	۸	-	-
<i>Oryzopsis hymenoides</i>	۸۷	۷۴	۲۲	۶	۳	-
<i>Phalaris tuberosa</i>	۵۸	۳۹	۳۵	۳۲	۲۸	-
<i>Puccinellia capilaris</i>	۱۰۰	۴۲	۳۵	۲۲	۱۹	-
<i>Puccinellia distans</i>	۱۱۸	۱۰۲	۸۶	۷۶	۷۰	-
<i>Poterium sanguisorba</i>	۱۴۳	۸۷	۴۳	۱۵	-	-
<i>Secale ceramont</i>	۸۵	-	-	-	-	-
<i>Secale montanum</i>	۱۰۲	۵۸	۳۲	۱۸	-	-

ب : گونه‌هایی که بیشتر از ۵۰ درصد استقرار یافته‌اند به شرح جدول شماره ۳ بودند:

جدول شماره ۳ : گونه‌هایی که بیشتر از ۵۰ درصد استقرار یافته‌اند

گونه	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
<i>Agropyron elongatum</i>	۱۰۱	۸۱	۷۶	۷۲	۶۲
<i>Atriplex canecens</i>	۱۶۰	۱۳۸	۱۳۶	۱۲۶	۱۲۲
<i>Atriplex halimus</i>	۱۶۰	۱۵۲	۱۳۸	۱۲۴	۱۳۱
<i>Bromus tomentellus</i>	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷
<i>Medicago sativa col.crisari</i>	۹۱	۸۸	۸۳	۵۵	۵۱
<i>Medicago scutellata</i>	۱۱۲	زادآوری	زادآوری	زادآوری	زادآوری
<i>Medicugo sativa col. codi</i>	۷۶	۷۰	۶۵	۶۲	۶۱
<i>Puccinellia distans</i>	۱۱۸	۱۰۲	۸۶	۷۶	۷۵

ج : فنولوژی گونه‌های با بیش از ۵۰ درصد استقرار در سال پنجم در جدول شماره ۴ آمده است:

جدول شماره ۴: فنولوژی گونه‌های با بیش از ۵۰ درصد استقرار در سال پنجم

خشک	ریزش	رسیدن بذر	ظهور خوش	رویشی	گونه	شدن	بذر	شهریور
<i>Agropyron elongatum</i>					اواسط خرداد تا اواسط خرداد	مرداد	اوخر	
					تا اوخر نیز	مرداد	-	
<i>Atriplex canescens</i>					اوخر آبان اواسط مهر	آبان	-	
					اواسط آبان	-		
<i>Atriplex halimus</i>					اوخر آبان اواسط مهر	آبان	اوخر	
					اواسط آبان	-	-	
<i>Bromus tomentellus</i>					اواسط سال اردیبهشت	خرداد	اوخر	
					اردیبهشت نا	خرداد	-	
					اوخر اردیبهشت	-		
<i>Medicago sativa col. crisari</i>					اوخر خرداد اوخر اردیبهشت	آبان	اوبل	
					نا اوخر مرداد	مرداد	-	
					مرداد	مرداد	-	
<i>Medicago scutellata</i>					اوخر فروردین اواسط اردیبهشت	خرداد	اوبل	
					فروردین تما اواسط	خرداد	-	
					اردیبهشت	-		
<i>Medicago sativa col. cody</i>					اوخر خرداد اوخر اردیبهشت	آبان	اوبل	
					نا اوخر مرداد	مرداد	-	
					مرداد	مرداد	-	
<i>Puccinellia distans</i>					اوخر خرداد اوایل اردیبهشت	آبان	اوخر	
					آبان اوخر اردیبهشت	خرداد	-	
					اردیبهشت	-		

د- تجزیه و تحلیل آماری استقرار گونه‌های نسبتاً موفق

جدول شماره ۵: استقرار گونه‌ها در تکرارهای آزمایش

گونه	تکرار ۱	تکرار ۲	تکرار ۳	تکرار ۴
<i>Agropyron elongatum</i>	۱۸	۲۲	۲۲	-
<i>Atriplex canecens</i>	۳۵	۳۰	۳۲	۲۵
<i>Atriplex halimus</i>	۳۱	۳۵	۳۵	۳۰
<i>Bromus tomentellus</i>	۴۰	۴۰	۳۷	-
<i>Medicago sativa col. crisari.</i>	۱۸	۱۶	۱۷	-
<i>Medicago scutellata</i>	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
<i>Medicago sativa col.codi</i>	۱۹	۲۶	۱۶	-
<i>Puccinellia distans</i>	۱۴	۲۶	۳۵	-

با توجه به غیر عادی بودن تعداد نباتات استقرار یافته در تکرار ۴ تجزیه و تحلیل آماری بر اساس سه تکرار انجام شد. بدین منظور تیمارها (گونه‌ها) و تکرارها (نهایی) مورد استفاده به شرح جدول شماره ۶ بوده است.

جدول شماره ۶: تیمارها (گونه‌ها) و تکرارها ی نهایی

گونه	تکرار ۱	تکرار ۲	تکرار ۳	جمع
<i>Agropyron elongatum</i>	۱۸	۲۲	۲۲	۶۲
<i>Atriplex canecens</i>	۳۵	۳۰	۳۲	۹۷
<i>Atriplex halimus</i>	۲۱	۲۵	۲۵	۱۰۱
<i>Bromus tomentellus</i>	۴۰	۴۰	۳۷	۱۱۷
<i>Medicago sativa col.</i> <i>crisari</i>	۱۸	۱۶	۱۷	۵۱
<i>Medicago scutellata</i>	۴۰	۴۰	۴۰	۱۲۰
<i>Medicago sativa col.</i> <i>codi</i>	۱۹	۲۶	۱۶	۵۱
<i>Puccinellia distans</i>	۱۴	۲۶	۳۵	۷۵

برای تجزیه آماری این گروه از گونه‌ها از طرح بلوک‌های کامل تصادفی یک عامله استفاده شد که نتیجه آن در جدول شماره ۷ ذکر شده است.

جدول شماره ۷: جدول نجزیه واریانس عملکرد گونه‌های موفق

F	درجه آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	منبع تغییرات
۰.۷۸	۱۵.۸۷۵	۳۱.۷۵	۲	تکرار
۱۱.۷۱	۲۸۳.۴	۱۶۶۹.۳	۷	تیمار (گونه‌ها)
	۲۰.۳۵	۲۸۴.۹	۱۴	اشتباه
	۱۹۸۶	۱۹۸۶	۲۳	کا

تجزیه آماری تعداد گونه‌های موفق مورد آزمایش در سال پنجم نشان داد که میان استقرار این گونه‌ها تفاوت معنی‌دار وجود دارد ($P=0.5$). مقایسه میانگین گونه‌ها با روش دانکن نشان داد که گونه‌های *Atriplex halimus*, *Bromus tomentellus*, *Atriplex canecens* در رتبه اول و گونه *Medicago scutellata* در رتبه دوم و *Agropyron elongatum*, *Puccinellia distans* در رتبه سوم و گونه‌های

در رتبه چهارم قرار *Medicago sativa col crisari.*, *Medicago sativa col.codi* گرفتند.

بحث و نتیجه گیری

نتایج بدست آمده از تعداد گیاهان استقرار یافته طی سالهای آزمایش نشان می دهد که به رغم وجود پایه های قابل توجه از کلیه گونه ها در سال اول، لیکن تعداد گیاه مستقر شده در سالهای بعد به شدت کاهش یافته و بسیاری از گونه ها نتوانسته اند در سالهای بعد از رشد مجددی برخوردار باشند. این امر تجزیه و تحلیل آماری داده ها را برای اغلب گونه ها با مشکل مواجه نموده است. از این روی جهت تجزیه و تحلیل آماری تنها از گونه هایی که از استقرار نسبتاً خوبی برخوردار بودند استفاده شد. همان طور که از جدول شماره ۶ استنباط می شود از سیان ۲۷ گونه مورد بررسی تنها *Agropyron elongatum*, *Bromus tomentellus*, *Puccinellia distans*, ^A گونه و *Medicago sativa cri*, *Medicago sativa.codi*, *Medicago scutellata*, *Atriplex canecens* و *Atriplex halimus* توانسته اند در سال پنجم آزمایش نیز از رشد مجلد برخوردار باشند.

گونه های *Secale ceremont*, *Melilotus alba* و *Lolium perenne* در سال اول از موفقیت زیادی برخوردار بوده، به قسمی که زنده مانی پایه های آنها در آخر فصل رویش به ترتیب ۸۹ و ۱۰۰ و ۵۳ درصد بوده است. با این وجود این سه گونه در سال دوم از بین رفته و در سالهای بعد از رشد مجددی برخوردار نشدند. گونه *Melilotus officinalis* از سال چهارم و گونه های *Agropyron cristatum*, *Agropyron desertorum*, *Bromus*, *Arrhenatherum elatius*, *Agropyron trichophorum*, *Onobrychis sativa*, *Hordeum bulbosum*, *Festuca arundinaceae*, *inermis* و *Poterium sanguisorba* از سال پنجم به بعد از بین رفند.

نتایج بدست آمده در این تحقیق با یافته‌های ووگل و جنسون (۲۰۱۱) که سازگاری حدود ۵۵ گونه از جمله *Agropyron cristatum*, *Agropyron desertorum*, *Hordeum bulbosum* به مدت ۳ سال مورد بررسی فرار دادند و اعلام داشتند که در سال سوم، تنها سه کونه نواستند ۶۶ تا ۱۰۰ درصد مستقر نموده‌محض ای دارد، بررسی کاھتر تعداد یابی‌های کونه‌های مورد بررسی نشان داد که به رغم بارندگی نسبتاً یکسان در ۴ سال آخر اجرای بررسی نلفات کونه‌ها در سالهای بعد بسیار جشمکبر بوده و این امر گویای این مطلب است که اغلب گونه‌های مورد بررسی نیاز به رطوبت بینتری دانسته و تابستانهای خشک منطقه بررسی را تحمل می‌کنند. این موضوع با تابع استیده‌ام و همکاران (۱۹۸۲) که نهالهای حاصل از بذر گونه *Atriplex canecens*, *Atriplex canescens* و *Agropyron elongatum* مطابقت می‌کند. این محققان نتیجه گرفتند که کلیه گونه‌های مورد بررسی در حاکه‌های مرضوب نزدیک زنده مانی و رشد بیشتری برخوردار بودند بررسی رفتار رویشی گونه‌ها گرچه می‌نواست، در بارندگی ۲۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر از استقرار خوبی برخوردار بانست لیکن رشد و موفقیت آنها در سطوح با بارندگی زیادتر بینتر می‌باشد. این یافته با نتایج کوبر و حدر (۱۹۵۸) که بازده کونه مرتعی گراس از جمله *Agropyron cristatum*, *Agropyron elongatum*, *Agropyron desertorum* را به مدت ۵ سال در بارندگی ۳۰۰ میلیمتر مورد بررسی قرار دادند مطابق می‌کند. این محققان نتیجه گرفتند که همه گونه‌های مورد بررسی از جمله کوبه فوق از سارکاری نسبتاً خوبی برخوردارند. لیکن در سالهای حکم (۱۵۰ میلیمتر) گونه *Agropyron elongatum* از نظر نولید بسیار ضعیف و در سالهای عادی (۳۰۰ میلیمتر) از رشد و تولید نسأاً خوبی برخوردار است. کوبه *Atriplex canecens* گرچه بنا بر کزارمن ابرا ولاری جسد (۱۹۷۶) در بارندگی ۵۰۰ میلیمتر از سازگاری خوبی برخوردار است، لیکن در بارندگی‌های کمتر (۱۵۰ - ۲۰۰) میلیمتر نیز مستقر شده لیکن از رشد ناچیزی برخوردار است. این محققان اظهار داشتند که ایس گونه از دیرزبستی طولانی برخوردار بیست و بعد از ۲۰ سال آثاری از آن به جا نمانده است بر عکس

گونه *Agropyron elongatum* بعد از ۴۰ سال حتی در مناطق شور و قلیایی نیز از شادابی و تولید خوبی برخوردار است. این موضوع در بررسی هول (۱۹۷۴) که نتایج حاصل از سازگاری و زندگانی حدود ۹۰ گونه گیاهی را در بارندگی ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر و خاکهای لومنی - رسی و در بعضی موارد خاک‌های لومنی - رسی شور و قلیایی را بعد از ۴۰ سال مورد ارزیابی قرار داد مشاهده می‌گردد. رفتار رویشی و زندگانی ۸ گونه نسبتاً موفق در شرایط چنان‌چنان گنبد نشان می‌دهد که می‌توان از این گونه‌ها در این منطقه و نیز مناطق با بارندگی و خاک مشابه در امر اصلاح مرتع تخریب یافته استفاده کرد. این نتیجه با یافته‌های شوندیمن (۱۹۵۶) و پیمانی فرد و همکاران (۱۳۷۳) مطابقت دارد. این محققان نیز گونه‌های موفق در این بررسی را برای مناطقی با بارندگی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیمتر توصیه کرده‌اند شرایط بارندگی فصول پاییز، زمستان و بهار طی سالهای آزمایش نشان داد که میزان بارندگی در سالهای دوم، سوم و چهارم و پنجم آزمایش نسبت به سال اول از وضعیت بهتری برخوردار بوده و بنابراین انتظار بر آن بود تا گونه‌های باقیمانده از سال اول بتوانند در سالهای بعد از رشد و موفقیت بیشتری برخوردار باشند. اما این مقدار بارندگی نتوانسته است اثر خشکی نسبتاً طولانی تابستانه را جبران نموده و باعث رشد مجدد کافی بیشتر گیاهان در فصل رشد بعدی شود.

با توجه به مباحث انجام شده و نیز نتایج حاصل از پنج سال بررسی و با توجه به مرشت اکلولوژیکی گونه‌های مورد بررسی می‌توان نتیجه گرفت که شرایط محل آزمایش برای اکثر گونه‌های مورد بررسی ساعد نبوده و نتوانسته‌اند از تولید و شادابی مناسبی برخوردار باشند. با وجود در میان گونه‌های مورد آزمایش موفقیت گونه *Agropyron elongatum*, *Bromus tomentellus*, *Puccinellia distans*, *Medicago sativa cri*, *Atriplex halimus* *Medicago sativa.codi*, *Medicago scutellata*, *Atriplex canecens* از بقیه بیشتر بوده است و نتوانسته‌اند تا سال پنجم در محل مستقر باشند. با این وجود به نظر می‌رسد که هر گاه این گونه‌ها همراه با تیمار ذخیره نزولات آسمانی کشت گردند از موفقیت بیشتری برخوردار شوند.

سیاسگزاری:

این مقاله حاصل اجرای طرح تحقیقاتی شماره ۱۳۵-۱۴-۱۱۷ مصوب مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراعع کشور است که به این وسیله از حمایت‌های همه جانبه مؤسسه مذکور سیاسگزاری می‌شود.

منابع مورد استقاده:

- ۱ پیمانی فرد، ب.. ب. ملک پور، م. فائزی پور، ۱۳۷۳. معرفی گیاهان مهم مرتعم و راهنمای کشت آنها برای مناطق مختلف ایران، تهران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراعع
- ۲ مساواتی، سید احمد، ۱۳۶۶. گزارش مطالعات خاکشناسی تفصیلی ایستگاه چیرقویمه (گند). انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب
- 3-K. P. Vogel and K. J. Jensen.2001.Adaptation of perennial Triticeae to the eastern central Great Plains. J.Range Manage.54(6) : 675-679.
- 4-N.D.Stidham,J.Powell,F.Gray, and P.L.Claypool 1982.Establishment, Growth, Utilization and chemical compotion of introduced shrubs on Oklahoma Tallgrass Prairie. J.Range Manage.35(3) : 301-305.
- 5-J.L. Holechek , E.J.Depuit J.Coenenberg, and R.Valdez . 1982.Long – term plant establishment on mined lands in southeastern Montana. J.Range Manage.35(4) : 522-526.
- 6- H.V. Eek and P.L. Sims .1984. Grass species adaptability in the southern High Plains – a 36 – year assessment . J.Range Manage.37(3) : 311-218.
- 7-G.S. Kemph, J.L. J.L. Schuster , and T.G. Welch. 1976. Survival of cool-season species under Texas-Pecos conditions. J.Range Manage.29(5) : 410-413.
- 8- C.S. Cooper and D.N. Hyder.1958.Adaptability and yield of eleven grasses grown on the Oregon High Desert. J.Range Manage.11(5) : 235-238.
- 9-B.I. Judd and L.W. Judd . 1976. Plant survival in the arid southwest 30 years after seeding . J.Range Manage.29(3) : 248-251.
- 10- A.C. Hull .1974. Species for seeding arid rangeland in southern Idaho. J.Range Manage.27(3) : 216-218..
- 11- G. Stewart . 1954. Reseeding research in Intermountain Region . J.Range Manage. () : 52-59.
- 12- J.L. Schewendiman .1956. Improvement of native range through new grass introduction. J.Range Manage.9(2) : 91-96.