

واکنش پانیکوم (*Panicum antidotale*) نسبت به تکرار و شدت‌های مختلف برداشت

حمید هویزه^{۱*} و مامک احمدیان^۲

*- نویسنده مسئول، مریض پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

پست الکترونیک: hamhow36@yahoo.com

- کارشناس ارشد بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراعع کشور

تاریخ دریافت: ۹۰/۰۱/۱۵ تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۰/۰۳

چکیده

پانیکوم گیاهیست پایا، با فصل رویشی گرم و پراکندگی طبیعی بسیار محدود در جنوب ایران و از گونه عمدۀ گندمیان پابلند در مراعع ماسه‌ای می‌باشد. گیاهی آبدار و مغذی در دوره جوانی رویشی، اما به سرعت چوبی و خشبي می‌گردد. تولید علوفه آن در سالهای ابتدایی رشد و استقرار بسیار خوب است، اما قدرت رویشی آن به مرور زمان کاهش می‌یابد. پانیکوم به دلیل ارزش علوفه‌ای مناسب، در مناطقی که خاک سبک داشته و نیاز به عملیات بیولوژیک حفاظت خاک دارند، بطور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش با هدف عده تعیین واکنش پانیکوم نسبت به تکرار برداشت و مشخص نمودن شدت برداشت بهمنظور افزایش پایداری و بقاء گیاه در ایستگاه ثبت شدن خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بصورت آماری و با استفاده از روش کرتهاخ خرد شده در چهار تکرار و با تیمارهای اصلی (تکرار برداشت) و فرعی (شدت برداشت) هر کدام با سه سطح مورد بررسی قرار گرفت. نتایج سه ساله عملیات برداشت نشان داد که سطح سوم تیمار اصلی (هر ۱۸ روز یکبار برداشت) تأثیر برتری نسبت به سایر تیمارها داشت. بعد از دوره سه ساله اجرای طرح، متوسط جوانه‌های رویشی تولید شده برابر ۳۶ عدد در هر کلن در تیمار برتر بود. پایداری و بقاء بهتر، و تولید جوانه‌های رویشی بیشتر در تیمار موفق موجب افزایش زمان و فرصت بیشتر گیاه برای ترمیم و انباست مجدد ذخیره غذایی و تولید گردید.

واژه‌های کلیدی: واکنش، پانیکوم، تکرار، شدت، برداشت، خوزستان

در وضعیت حاکم بر مراعع، اعمال مدیریت صحیح و اجرای عملیات اصلاحی و احیای مناسب با توجه به شناخت رویشگاه، از جمله پوشش گیاهی و بهویژه گونه‌های مهم و کلیدی می‌باشد. در خوزستان حدود ۳۵۰ هزار هکتار تپه‌های ماسه‌ای و شنزار وجود دارد که به رغم تلاشها و موفقیت‌های چشمگیر در خصوص ثبت شنهای روان در کشور با

مقدمه

بی‌گمان در بیشتر رویشگاه‌های مرتعی کشور در اثر مداخلات مستقیم و غیرمستقیم انسان بصورت بهره‌برداری‌های نامناسب، وضعیت مرتع سیر قهقرایی طی می‌نماید و بسیاری از گونه‌های بومی در شرایط آسیب‌پذیر و حتی در معرض خطر نابودی و انهدام قرار گرفته‌اند. لازمه تغییر مثبت

اختلال می‌گردد. مطالعات و تجربیات (Miller 1976) نشان داده که برای جلوگیری از حالت ناپایداری پانیکوم و غلبه بر آن، باید به نوعی رشد گیاه را تحريك نمود. بنابراین، چرای شدید و متناوب دام، برداشت دستی علوفه (درو) و نیز مصرف کودهای ازته بهترین و مؤثرترین راه برای این منظور توصیه شده است.

Dabaghao *et al.*, (1973) در سال برداشت متناوب هر ۲۰ روز یکبار تا ارتفاع ۱۰ سانتی‌متری سطح خاک را در سالهای مرطوب و هر ۳۰ روز یکبار تا ارتفاع ۱۵ سانتی‌متری سطح خاک را در سالهای معمولی برای تولید بیشتر و Riveros (1990) پایداری بهتر توصیه نمودند. در عین حال (Skerman & Skerman & (2004) و Robinett (2004) اشاره کردند که کشت و فرق مطلق پانیکوم (*Panicum antidotale*) در مراعع موجب از بین رفتن این گیاه خواهد شد. ضمن اینکه با اجرای روش‌های چرای متناوب توسط دام و همچنین برداشت دستی علوفه و افزایش کود ازته سطوح وسیعی از اراضی زیر کشت پانیکوم (*Panicum antidotale*) با طول عمر بیش از ۱۵ سال، کاملاً شاداب و با تولید بالا به حیات خود ادامه می‌دهند (Riveros 1990 و Skerman & Riveros 1976). (Miller, 1976)

همچنین (Miller 1976) یادآور شد که تناوب برداشت بصورت هر ۶، ۳ و ۹ هفته یکبار نشان داد که افزایش دوره تناوب درنهایت ضمن افزایش عملکرد علوفه، دامنه رویشی سالانه گیاه نیز توسعه پیدا کرد. بدین ترتیب این پژوهش با هدف عمدۀ تعیین واکنش پانیکوم نسبت به تکرا برداشت و مشخص نمودن روش مناسب برداشت (تناوب) به منظور افزایش پایداری و بقاء گیاه در ایستگاه تثیت شن خوزستان مورد بررسی قرار گرفت.

روشهای معمول، به علت عدم شناخت بالقوه توان‌های موجود، همواره از طریق روشهای سنتی تثیت شن فقط با بازکاشت تنها چند گیاه محدود آن هم بدون برنامه‌ریزی و مدیریت بهره‌برداری بعدی، بیش از ۶۰ هزار هکتار از آنها تثیت شده است. توان سازگاری خیلی خوب و استقرار پانیکوم در اراضی شنی و تولید علوفه مناسب در شرایط دیم توجه به این گیاه اعجاب‌انگیز را برای اقدامات بیولوژیک تثیت شنهای روان منحصر به فرد کرده است. پانیکوم (*Panicum antidotale*) گیاهی پایا، گرم‌سیری با فصل رشد گرم و شکل رویشی دسته‌ای، با پراکندگی طبیعی بسیار محدود در جنوب شرقی کشور، که در سال ۱۳۳۹ توسط اداره برسیهای بنگاه جنگل‌بانی، بذر آن برای اولین بار از کشور هندوستان وارد و در شرایط دیم تپه‌های ماسه‌ای الاجی اهواز با موفقیت کشت گردید. به رغم گستردگی کم طبیعی، ضخیم و خشبي بودن ساقه‌های این گیاه، به واسطه ویژگیها و خصوصیات بارز آن مانند رشد سریع، تولید علوفه زیاد در شرایط دیم ۱ تا ۲ تن خشک و آبی ۶ تن خشک در هکتار (تلوری و صالحی، ۱۳۶۷)، حفاظت خاک، به ویژه تثیت شنهای روان، مقاومت زیاد به خشکی، برداری نسبت به چرای سنگین دام، فصل رشد طولانی، تولید بذر بسیار خوب، تجدید حیات غیرجنسی (ریزوم) آسان و کیفیت مناسب علوفه آن، از گونه‌های با ارزش مرجعی محسوب می‌گیرد. بهمنین دلیل به عنوان گونه‌ای مرغوب در احیاء و اصلاح مراعع گرم‌سیری با خاکهای سبک و ماسه‌ای، تثیت شنهای روان، ایجاد چراگاههای آبی و تولید علوفه مورد استفاده قرار می‌گردد. این گیاه در دوره رشد رویشی تا مرحله گله‌ی خوشخوارک می‌باشد، ولی به سرعت چوبی و خشبي گردیده و کیفیت علوفه آن به شدت کاهش یافته، پس از گذشت ۳ تا ۴ سال تولید آن تقلیل و پایداری گیاه دچار

مقایسات با استفاده از آزمون دانکن و بر مبنای تعداد جوانه‌های رویشی و عملکرد علوفه در سال پایانی دوره اجرایی طرح انجام شد. یکی از روش‌های متداول برای تعیین تولید جاری (درصد بهره‌برداری) استفاده از رابطه ارتفاع به وزن (خطکش تولید) است. برای این منظور لازم است که ارتباط بین مقدار وزن علوفه برداشت شده و ارتفاع برای گیاه تحت مطالعه تعیین شود. بنابراین تعداد ۱۰ پایه از گیاه پانیکوم، در سه تکرار (دسته) از نظر متوسط دامنه ارتفاعی گیاه (۸۰، ۹۰ و ۱۱۰ سانتی‌متری) واقع در عرصه طبیعی شنزارهای منطقه اجرای طرح نخپیچی شده و از کف زمین قطع گردیدند. سپس در ستاد هر کدام به تفکیک و به ترتیب از بالا به قطعات ۵ سانتی‌متری قطع و توزین گردید و رابطه وزن به ارتفاع آنها تعیین شد و خطکش تولید (بهره‌برداری) گیاه مورد مطالعه (پانیکوم) مشخص شد.


نتایج

تعیین خطکش تولید (بهره‌برداری)

پس از انجام عملیات قطع و توزین، رابطه وزن به ارتفاع گیاه پانیکوم تعیین شده و بعد از آن و با استفاده از ارقام بدست‌آمده اقدام به تهیه خطکش بهره‌برداری جهت تعیین تولید جاری در عرصه آزمایشی گردید. همان‌گونه که در شکل (۱) مشاهده می‌گردد، ارتباط بین ارتفاع و وزن برای گونه پانیکوم غیرخطی بوده و بیشتر وزن آن در قسمت پایین گیاه متمرکز بوده و نتیجه اینکه ۳۰ تا ۳۵ درصد تولید جاری در ارتفاع ۵۰ سانتی‌متری، ۵۰ درصد تولید جاری در ارتفاع ۶۵ سانتی‌متری و ۷۰ درصد تولید جاری در ارتفاع ۸۰ سانتی‌متری از نوک بالای گیاه قرار گرفته است.

روش تحقیق

این آزمایش در سال زراعی (۱۳۸۱ - ۱۳۸۰) در تپه‌های ماسه‌ای کوه میشداخ در منطقه مرزی بستان در قالب آماری با روش طرح کرتهای خرد شده (Split plot) با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. عرصه آزمایشی در بخشی از شنهای روان ثبت شده با مالچهای نفتی (سال قبل) و تقریباً عاری از پوشش گیاهی انتخاب گردید. کشت بصورت باز کاشت نشاء (گلدانی) پانیکوم، در شرایط دیم و بعد از اولین بارندگی مؤثر پاییزی (اواخر آذر و اوایل دی‌ماه) انجام گردید. اندازه کرتچه‌ها 4×6 متر و فواصل خطوط کشت در هر کرت ۲ متر و نشاء‌ها با فواصل ۱ متر بر روی خطوط کشت گردیدند. تیمار اصلی در این آزمایش تکرار برداشت و تیمار فرعی شدت برداشت، هر کدام در ۳ سطح مورد بررسی قرار گرفتند. سه سطح تیمار اصلی یعنی تکرار برداشت شامل (هر ۶ روز، ۱۲ روز و ۱۸ روز یکبار) و سه سطح تیمار فرعی یعنی شدت برداشت مشتمل بر سبک (۳۰ درصد تولید جاری)، متوسط (۵۰ درصد تولید جاری) و سنگین (۷۰ درصد تولید جاری) بوده است. برداشت علوفه با دست (درو) و برای تعیین شدت برداشت یا تولید جاری از خطکش تولید (عملکرد و ارتفاع) که در طی سال اول این آزمایش و در همین منطقه از گیاه پانیکوم بدست‌آمده است، استفاده گردید. اعمال تیمارها در هر سال زراعی از اسفند تا پایان فروردین‌ماه اجرا گردیده و پس از آن تا اواخر خداداده فرصت رشد به گیاهان داده و بعد از آن شمارش پایه‌های علامت‌گذاری شده در هر کرتچه انجام شد. در سال پایانی دوره اجرای طرح، برداشت علوفه و شمارش جوانه‌های رویشی، همزمان و در خرداد ماه انجام شد. علوفه برداشت شده در سایه خشک و توزین گردید.



شکل ۱- منحنی ارتباط بین وزن و ارتفاع برای گیاه پانیکوم (خطکش تولید)

تیمارهای پیش‌بینی شده در روش تحقیق)، مقایسه آماری براساس رکورددگیری سال سوم یاداشت برداریها (سال پایانی طرح) انجام شده و نتایج زیر بدست آمد. نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند (جدولهای ۱ و ۲). اما مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از روش آزمون دانکن تفاوت اثر سطوح تیمارها را به شرح زیر معنی‌دار نشان دادند (جدولهای ۳ و ۴).

تجزیه واریانس تکرار و شدت برداشت

پس از سال دوم و استقرار کامل پایه‌های کشت شده گیاه پانیکوم، اعمال تیمارها شامل شدت و تکرار برداشت برای مدت سه سال انجام شد. یادداشت برداریهای آماری مشتمل بر شمارش تعداد جوانه‌های رویشی در پایان هر فصل رویشی و عملکرد علوفه، فقط در سال پایانی انجام گردید. با توجه به هدف آزمایش (پایداری گیاه پانیکوم بعد از اعمال

جدول ۱- تجزیه واریانس تعداد جوانه‌های رویشی

F محاسبه شده	مجذور مربعات	مجموع مربعات	درجه آزادی	منابع تغییرات
۵/۲ *	۳۲۹/۲۲	۹۸۷/۶۶	۳	بلوک
۳/۹۶ns	۲۵۱/۰۲	۵۰۲/۰۵	۲	تناوب برداشت
۰/۲۳ ns	۳/۱۱	۶/۲۲	۲	شدت برداشت
۰/۹۲ns	۱۲/۳۶	۴۹/۴۴	۴	اثر متقابل
	۷۶/۶	۶۱۹/۸۳	۲۴	اشتباه آزمایش
			۳۵	کل

*: معنی‌داری در سطح ۵٪ ns: عدم معنی‌داری

جدول ۲- تجزیه واریانس متوسط عملکرد علوفه خشک تک پایه‌های گیاه پانیکوم

منابع تغییرات	درجه آزادی	مجموع مربعات	مجدول مربعات	F محاسبه شده
بلوک	۳	۱۳۰۳۷/۵۸	۴۳۴۵/۸۶	۲/۶ ns
تناوب برداشت	۲	۶۶۹۰/۰۳	۳۳۴۵/۰۱	۲/۰۸ ns
شدت برداشت	۲	۸۹۶/۳۴	۴۴۸/۱۷	۴/۲۶ ns
اثر متقابل	۴	۵۸۳/۵۲	۱۴۵/۸۸	۱/۳۸ ns
اشتباه آزمایش	۲۴	۱۱۸۸۲/۷۳	۱۷۷۰/۴۹	
کل	۳۵			

ns: عدم معنی داری

جدول (۳) نشان می‌دهد که تفاوت معنی دار بین میانگین تعداد جوانه‌های رویشی و میانگین عملکرد علوفه خشک تک پایه گیاه (گرم خشک) از بقیه تیمارها برتر است.

جدول ۳- مقایسه میانگین اثر سطوح تیمار اصلی (تکرار برداشت) بر تعداد جوانه‌های رویشی و عملکرد علوفه هر پایه گیاه (گرم خشک)

تیمارها	میانگین تعداد جوانه‌های رویشی	میانگین عملکرد علوفه
هر ۶ روز یکبار برداشت	۱۹b	۴۳/۷۵b
هر ۱۲ روز یکبار برداشت	۲۳/۱۱b	۵۵/۰۲b
هر ۱۸ روز یکبار برداشت	۳۱a	۸۶/۶۸a

جدول ۴- مقایسه میانگین اثر سطوح تیمار فرعی (شدت برداشت) بر تعداد جوانه‌های رویشی و عملکرد علوفه هر پایه گیاه (گرم خشک)

تیمارها	میانگین تعداد جوانه‌های رویشی	میانگین عملکرد علوفه
۷۰ درصد تولید جاری	۲۳/۷۷a	۵۲/۴۱b
۳۰ درصد تولید جاری	۲۴/۲۲a	۶۶/۳۴a
۵۰ درصد تولید جاری	۲۵/۱۱a	۶۶/۷a

بحث تفاوت معنی دار بین میانگین تعداد جوانه‌های رویشی مشاهده نگردید. اما بین میانگین عملکرد علوفه تفاوت معنی دار مشاهده گردید و اثر تیمار برداشت ۷۰ درصد تولید جاری از بقیه تیمارها برتر است (جدول ۴).

به رغم رشد و تولید علوفه بسیار مناسب در ۳ تا ۴ سال اولیه استقرار گیاه پانیکوم (*Panicum antidotale*) مهمترین ویژگی که می‌توان به عنوان ضعفی برای این گیاه

سالهای مرطوب و هر ۳۰ روز یکبار تا ارتفاع ۱۵ سانتی‌متری سطح خاک در سالهای معمولی را برای تولید بیشتر و پایداری بهتر توصیه نمودند.

با توجه به موقعیت تپه‌های ماسه‌ای و شن‌زارها در خوزستان از نظر اقلیمی و محدودیت بارندگی سالانه و همه عوامل مؤثر و محدودکننده بیلان آبی در مناطق شنی و نظر به اهمیت علوفه در شرایط کنونی به‌ویژه برای بهره‌برداران محلی، ایجاد مرتع مصنوعی در این مناطق امریست که علاوه بر ثبت بیولوژیک شن‌زارها، از طریق بهره‌مندی از نتایج مفید این پژوهش، یعنی مدیریت صحیح بهره‌برداری از مرتع مصنوعی بعد از احداث، یعنی برداشت علوفه دستی (درو) و متناوب (هر ۱۸ روز) و حداقل ۲ تا ۳ بار در طی برداشت سالانه، اهداف دیگری مانند اشتغال‌زایی، افزایش تولید علوفه در منطقه و کاهش فشار چرای دام به‌منظور افزایش پایداری پوشش گیاهی طبیعی و مرتع مصنوعی را نیز دنبال می‌کند.

پیشنهادها

توان استعداد مناطق شنی در نفوذ سریع و انتقال آسان آب مورد نیاز گیاه، حداقل حرکت موئینه رطوبت و کاهش تبخیر درون آنها، و همچنین تکاشف بخار آب در افق‌های سطحی آنها باعث ایجاد شرایط رویشی مناسب، برای استقرار و گسترش پوشش گیاهی می‌گردد. نظر به اهمیت بهره‌برداری بهینه از مناطق شنی ثبت شده و توان گیاهان پرمحصول و سازگار در شرایط مذکور جهت برنامه‌ریزی ایجاد پوشش گیاهی چندمنظوره به‌ویژه حفاظت خاک و تولید مستمر علوفه با هدف احیاء و اصلاح شن‌زارها و تبدیل آنها به مرتع مصنوعی، رعایت

قلمداد نمود، ناپایداری طبیعی آن پس از مدت فوق در عرصه شن‌زارهاست. بعد از این مدت به مرور از میزان تولید علوفه و جثه آن کاسته شده و گیاه پایداری خود را از دست داده و پس از چندی از بین می‌رود (مقیمی، Robinett et al., 2004) و (Riveros & Skerman, 1990). یادآور شدن که کشت و قرق مطلق پانیکوم در مرتع موجب از بین رفتن این گیاه خواهد شد. Skerman & Riveros (1990) و Miller (1976) اظهار نمودند که اجرای روش‌های چرای متناوب توسط دام و همچنین برداشت دستی علوفه و افزایش کود ازته در اراضی کشت شده پانیکوم (با طول عمر بیش از ۱۵ سال)، موجب افزایش عملکرد علوفه و شادابی آن گردید. بنابراین برای حل مشکل ناپایداری گیاه مذکور از طریق بررسی تأثیر تکرار و شدت برداشت علوفه اقدام به تحریک گیاه برای تولید بیشتر جوانه‌های رویشی و پایداری گردید.

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که تأثیر تکرار برداشت (هر ۱۸ روز یکبار) بر روی تولید بیشتر جوانه‌های رویشی و عملکرد علوفه گیاه پانیکوم، مؤثر و برتر بوده است. Miller (1976) نشان داده است که برای جلوگیری از حالت ناپایداری پانیکوم و غلبه بر آن، باید به نوعی رشد گیاه را تحریک نمود. بنابراین، چرای شدید و متناوب دام، برداشت دستی علوفه (درو) و نیز مصرف کودهای ازته را بهترین و مؤثرترین راه برای این منظور توصیه نمود. او یادآور شد که تناوب برداشت بصورت هر ۳، ۶ و ۹ هفته یکبار نشان داد که افزایش دوره تناوب درنهایت ضمن افزایش عملکرد علوفه، دوره رویشی گیاه را نیز بیشتر کرد.

Dabadghao et al., (1973) برداشت متناوب هر ۲۰ روز یکبار تا ارتفاع ۱۰ سانتی‌متری سطح خاک را در

- روحی پور، ح.، ۱۳۷۳. تعادل رطوبت و وضعیت آب در شنزارهای مناطق خشک. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، نشریه شماره ۹۴.
- مقیمی، ج.، ۱۳۸۴. معرفی برخی گونه‌های مهم مرتعی مناسب برای توسعه و اصلاح مراتع. سازمان جنگلها و مراتع کشور.
- هویزه، ح.، ۱۳۷۹. آت‌اکولوژی گونه مرتعی خورنال *Cenchrus ciliaris* جهت اصلاح مراتع استپ گرم خوزستان. گزارش پایانی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام خوزستان.
- هویزه، ح.، ۱۳۸۳. شناسایی و تکثیر گراسهای گرمسیری بومی. همایش ملی مرتع داری ایران، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی کرج.
- Beaty, E.R. and Powell John, D., 1976. Response of switchgrass (*Panicum virgatum*) to clipping Frequency. *Journal of Range Management*, 29 (2).
 - Dabagha, P.M., Roy, R.D. and Marwaha, S.P., 1973. The effect of interval and intensity of defoliation on the dry matter production of some important grass species of western Rajasthan. *Ann. Arid. Zone*, 12:1- 8.
 - Miller, J.E., 1976. *Grasses and Legumes in Texas*. Texas University.
 - Robinett, D., 2004. Management and uses of blue panic. U.S. Department of Agriculture and Natural Resources Service, Tucson, Arizona.
 - Skerman, P.J. and Riveros, F., 1990. *Tropical Grasses*, F.A.O.

نتایج بدست آمده از این تحقیق برای مدیریت گیاه پانیکوم در شنزارها را به شرح زیر تأکید می نماید:

- ۱ - بهمنظور جلوگیری از خشبي شدن اندامهای گیاه پانیکوم بعد از عملیات باز کاشت مناطق شنی، ضروریست فقط ۲ سال (سال باز کاشت به علاوه یک سال استقرار) مورد حفاظت و قرق کامل قرار گیرد.
- ۲ - بهمنظور جلوگیری از تردد دام در مناطق حساس شنی بعد از عملیات ثبتیت بیولوژیک، ضروریست برداشت علوفه بصورت دستی (درو) انجام گردد.
- ۳ - حداقل فاصله زمانی برداشت علوفه (تکرار) در هر دوره رویشی ۱۸ روز و حداقل ۲ بار در سال می باشد.

منابع مورد استفاده

- بصیری، ع.، ۱۳۵۶. طریقه‌های آماری در علوم کشاورزی. دانشگاه شیراز.
- تلوری، ع.ر. و صالحی، ح.، ۱۳۶۷. معرفی گونه‌های مهم پانیکوم و موارد استفاده آن. سازمان جنگلها و مراتع کشور، نشریه شماره ۵۹.
- ثابتی، ح.ا.، ۱۳۴۸. بررسی اقالیم حیاتی ایران. دانشگاه تهران.

Response of blue panicgrass (*Panicum antidotale*) to harvest frequency and intensity

Hoveizeh, H.^{1*} and Ahmadian, M.²

1*- Corresponding Author, Research Instructor, Research Center for Agriculture and Natural Resources, Khuzestan, Iran,
Email: hamhow36@yahoo.com

2- Senior Research Expert, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran.

Received: 04.04.2011

Accepted: 24.12.2011

Abstract

Blue panic (*Panicum antidotale*) is a perennial species with warm growing season and very limited natural distribution in southern Iran. It is considered as a main species of tall grasses in sandy rangelands. This species is succulent and nutritious at early growth stage but soon becomes woody and fibrous. Forage production is good in years of early growth and establishment but its vigor reduces over time. Due to its appropriate forage value, blue panicgrass is widely used in areas with light soils where biological soil conservation practices are needed. This research was aimed to study the response of blue panicgrass to harvest frequency and intensity and determine the appropriate intensity to increase the stability and survival of the species at Khuzestan sand stabilization station. The experiment was conducted in a split-plot design with four replications including main treatment (harvest frequency) and secondary treatment (harvest intensity) at three levels. Results showed that the third level of main treatment (harvested every 18 days) had a better impact compared to other treatments. After three years of experiment, average number of vegetative buds was 36 in superior treatment. Better stability and survival, and more vegetative buds in the successful treatment give the species more time and opportunity for repair and re-accumulation of food supply and production.

Key words: response, blue panicgrass, frequency, intensity, harvesting, Khuzestan