

مقایسه فنولوژی گونه *Artemisia sieberi* Besser. در مناطق مختلف استپی ایران

علی احسانی*

*- نویسنده مسئول، استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
پست الکترونیک: ehsani_arian@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۱/۱۲

تاریخ دریافت: ۹۰/۰۱/۱۷

چکیده

هدف از مطالعه فنولوژی گیاهان مرتعی، بررسی تغییرات مراحل مختلف فنولوژی به منظور تنظیم برنامه‌های بهره‌برداری از مراتع، جلوگیری از برداشت‌های بی‌موقع و شناخت ارزش غذایی گونه‌های گیاهی، تعیین زمان ورود و خروج دام و جمع آوری بذرها می‌باشد. گونه *Artemisia sieberi* با فرم بوته‌ای و ارزش علوفه‌ای مناسب به عنوان گونه غالب در ترکیب تیپ‌های مرتعی در مناطق استپی خشک و نیمه‌خشک و نواحی رویشی ایران و تورانی گسترش دارد. این گونه دارای ویژگی مقابله با شرایط سخت محیطی و شرایط خشکسالی و مقاومت نسبی به شوری خاک در طیف وسیعی از خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق لومی، شنی و لومی‌رسی رویش دارد. در این تحقیق مراحل مختلف فنولوژی گونه *Ar. sieberi* به عنوان یکی از گونه‌های مهم مرتعی در شش سایت متفاوت در مناطق مختلف استپی کشور مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس اطلاعات مربوط به مراحل فنولوژی در مقاطع زمانی ۱۵ روزه در مرحله رویشی و ۷ روزه در مرحله زایشی اندازه‌گیری و ثبت گردید. از آنجایی که تکوین مراحل فنولوژیکی ارتباط مستقیمی با عوامل اقلیمی به ویژه درجه حرارت و بارندگی دارد؛ آمار هواشناسی شامل درجه حرارت و میزان بارندگی از نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی نسبت به هر سایت استفاده شد. نتایج مقایسه مراحل مختلف فنولوژی در سالهای مورد بررسی نشان داد که رشد مرحله رویشی از اوایل اسفند تا اوایل فروردین ماه آغاز و در صورت وجود رطوبت تا تیرماه ادامه دارد. مرحله گلدهی از اوایل تیر آغاز و تا اواخر آبان‌ماه ادامه می‌یابد. مرحله رسیدن بذر به صورت تدریجی از اوایل مهر شروع و تا اواخر دی‌ماه به طول می‌انجامد. مرحله خواب زمستانه از اوایل اسفند ماه ادامه می‌یابد. براساس نتایج بدست‌آمده دوره فنولوژی این گونه طولانی است. این موضوع نشانگر دامنه برdbاری و مقاومت این گونه نسبت به شرایط محیطی می‌باشد. در نتیجه بر پایه شناخت کامل از مراحل مختلف فنولوژی گونه *Ar. sieberi* به عنوان یک گونه کلید و معروف می‌توان نسبت به برنامه‌ریزی جهت اعمال مدیریت چرا به منظور تعیین زمان ورود و خروج دام، تعیین تعداد مطلوب دام برای چرا و سیستم‌های مناسب چرایی اقدام نموده و از سوی مدیران و برنامه‌ریزان و بهره‌برداران مراتع مورد کاربرد قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: فنولوژی، *Artemisia sieberi*، آmadگی مرتع، استپ، زمان ورود و خروج دام

ریزش آن، خواب موقت، رشد پائیزه و خواب زمستانی می باشد.

گونه های مختلف جنس درمنه (*Artemisia*) از خانواده کاسنی (Asteraceae) با فرم بوته ای نیمه خشک و ارزش علوفه ای مناسب دارای ویژگی و قابلیت مقابله با شرایط خشک سالی و مقاومت نسبی به شوری در مناطق استپی خشک و نیمه خشک و اغلب در خاک های لومی، شنی و لومرسی رویش دارند. این گیاه جزء گونه های غالب اجتماعات گیاهی در استپ های خشک و نیمه خشک کشور محسوب می شود. ارتفاع این گونه بین ۳ تا ۵۰ سانتی متر دارای انشعابات متعدد و متراکم به شکل کپه ای می باشد. گیاه درمنه نیز در ایران همانند سایر نقاط دنیا دارای پراکنش وسیعی است، به طوری که در کلیه مناطق رویشی کشور از هیرکانیں گرفته تا سواحل خلیج فارس، دریای عمان، سند صحاری و نواحی ایران و تورانی مشاهده می گردد.

یکی از گونه های مهم و غالب در مناطق استپی ایران، گونه *Artemisia sieberi* می باشد. از ساختار مهم این گونه سیستم ریشه ای آن را می توان بر شمرد که نسبت آن به اندام های هوایی بسیار زیاد و ریشه اصلی نسبتاً "عمیق" بیش از یک متر است. تولید این گونه شدیداً تحت تأثیر نوسانه ای آب و هوایی است، و تفاوت در میزان تولید سالیانه گیاه متأثر از میزان و پراکنش بارندگی در طول فصل رویش و ذخیره رطوبت خاک در اول فصل رویش می باشد (احسانی، ۱۳۸۶).

مراحل مختلف فنولوژی گیاهان مرتعی در سطح زمین کاملاً به تغییر و تعرق خالص سالانه وابسته بوده و تغییر و تعرق نیز وابسته به اثرات دما، تابش و بارندگی است. دما به عنوان شاخصی از انرژی در سرعت حرکت

مقدمه

مرا潤 معمولاً دارای سیستم های پیچیده اکولوژیکی هستند که تحت تأثیر تغییرات عوامل آب و هوایی به ویژه بارندگی و درجه حرارت قرار دارند. تغییرات اقلیمی در پدیده های زیستی گیاه نظیر جوانه زنی، رشد رویشی، توسعه رشد رویشی، گلدهی و بذردهی بسیار اهمیت دارند. بنابراین مطالعه فنولوژی به منظور برنامه های بهره برداری از گیاهان، جلوگیری از برداشت های بی موقع و شناخت ارزش غذایی گونه های گیاهی، تعیین زمان ورود و خروج دام، جمع آوری بذر، پرورش زنبور عسل، از بین بردن گونه های مهاجم، مبارزه با آفات گیاهی، تعیین ترکیبات مؤثره و شناخت ارزش غذایی گونه های گیاهی حائز اهمیت است.

یکی از مشکلات اساسی مرا潤 ایران، عدم مدیریت چرایی بوده که درنهایت منجر به بهره برداری غیراصولی و نابهنجام از علوفه طبیعی مرا潤 و همچنین چرای بیش از ظرفیت می شود. براین اساس قسمت اعظم مرا潤 کشور دارای سیر قهقرایی و از نظر وضعیت جزء مرا潤 متوسط تا فقیر و خیلی فقیر دسته بندی می شوند. شرایط آمادگی مرتع و رعایت زمان ورود و خروج دام از مرتع ایجاب می نماید که به گیاهان فرصت داده شود تا مواد غذایی لازم را برای رشد بعدی خود ذخیره نمایند. عدم رعایت این امر موجب تقلیل تدریجی قدرت تولید و زادآوری گیاهان و بالاخره نابودی کامل آنها می گردد. یکی از راه حل های مناسب جهت تشخیص زمان بهره برداری از مرا潤، استفاده از مطالعه فنولوژی، شناخت و بررسی تاریخ بروز پدیده های زیستی مختلف گونه های مهم و کلیدی شامل مرحله شروع جوانه زنی و رشد و توسعه رویشی، مرحله گلدهی، مرحله بذردهی و بلوغ بذر و

جعفری و همکاران (۱۳۸۲) برخی ویژگیهای اکولوژیکی گونه *Artemisia sieberi* در مرتع استان اردبیل را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که با توجه به تنوع منطقه از لحاظ عوامل اکولوژیکی، این گونه با دامنه برداری وسیع توانست خود را با شرایط منطقه سازگار نماید. همچنین بیشترین تراکم در اراضی با بافت رسی و عمیق که در شیب‌های ملایم شرقی قرار گرفته مشاهده شده است.

(Sparks *et al.*, 2000)، روابط بین تاریخ‌های گلدهی و دما را با استفاده از رکوردهای فنولوژی طولانی مدت بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد وقوع فنولوژیکی به طور معنی‌داری ($P < 0.001$) با دما ارتباط داشته‌اند. (Sekhwela & Yates, 2007) و مطالعه فنولوژیکی سه گونه غالب و مهم از نظر اقتصادی شامل *Acacia.erioloba* و *A.luederitzii* در *A.mellofera* در دو منطقه *Tsabong* و *Maun* را در مناطقی با رژیم‌های مختلف در Kalahari در بوسوانا مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که هر سه گونه مورد مطالعه به طور کلی پاسخ‌های فصلی قابل مقایسه‌ای بدون در نظر گرفتن میانگین بارندگی سالانه در هر سایت داشتند. در گونه‌های *A.mellofera* و *A.erioloba* دما و طول روز روی علائم فنولوژیکی بسیار مهم بوده، در حالی که در گونه *A.luederitzii* عامل بارندگی مهم بوده است. تاریخ‌های فنولوژیکی از نظر اقتصادی بسیار مهم است. هر تغییر در عامل‌های اقلیمی که تحت تأثیر این تاریخ‌ها است، ممکن است پیامدهای زیان‌آوری داشته باشد. خشکسالی نمونه خوب شناخته‌شده‌ای از یک تغییر مفروط است. (Ansquer *et al.*, 2009) در مطالعه‌ای از فنولوژی برای تعیین زمان‌بندی عملیات مدیریتی در گراسلندهای غنی، در مناطق Pyrenees و Toulouse فرانسه، نتیجه گرفت که اختلاف

مولکولها و گرایش آنها به سمت هوا مؤثر است. اغلب برای پیش‌بینی مراحل فنولوژیکی زندگی گیاه درجه - روزهای متراکم (cumulative degree days) مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصطلاحات متناوب برای درجه - روز، واحد گرما، حاصل جمع گرما واحدهای حرارتی، رشد درجه - روزها و زمان حرارت بکار برده می‌شود (Ritchie & NeSmith, 1991) سانتی‌گراد دیواره سلولها را از هم گسیخته و بافت مرسیتم را در گیاهان از بین می‌برد (Pearce & Donald, 1978). دمای زیر صفر درجه تأثیر زیادی بر کاهش تولید علوفه مرتع بر جای می‌گذارد (Smart *et al.*, 2005). گیاهان در مرحله رشد رویشی، بخصوص گیاهان علفی بیشتر تحت تأثیر دمای قرار می‌گیرند و در نتیجه، تحت تأثیر دمای زیر صفر وزن خشک به شدت کاهش می‌یابد (Humphreys & Eagles, 1988) حرارت روزانه که جهت ظهور مراحل مختلف دوره رویش لازم است بنام واحدهای حرارتی و یا درجه - روز خوانده می‌شود. واحدهای حرارتی جمع میانگین درجه‌های حرارت روزانه بالا آستانه‌های بیولوژیک در طی مراحل مختلف رشد حاصل می‌گردد. بنابراین دما بعنوان یکی از شاخصهای اقلیمی، در فعالیتهای مختلف حیاتی گیاه به ویژه تولید و تبخیر و تعرق تأثیر گذار می‌باشد. اکثر Frank & Hofman, (Menke & Trica, 1981) و Frank, (Bertiller *et al.*, 1991, 1989) در بررسیهای خود در زمینه فنولوژی اظهار داشته‌اند از بین عوامل اقلیمی خصوصاً "درجه حرارت قویترین اثر را روی نمو گیاه از جمله بر روی طول دوره رویش و مراحل فنولوژیکی گیاهان می‌گذارد.

در این گونه دارد، در حالی که گونه *Arctostaphylos glauca* تحت تأثیر تغییرات فنولوژیکی وسیع قرار گرفته که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری سازگار یا تنفسی در این گونه دارد. هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه مراحل مختلف فنولوژی گونه *Ar.sieberi* به عنوان یکی از گونه‌های مهم مرتعی در شش سایت متفاوت در مناطق مختلف استپی کشور می‌باشد.

مواد و روشها

معرفی سایت‌های مورد مطالعه

مشخصات رویشگاهی شش سایت مطالعاتی (معرف مناطق مختلف استپی ایران) از سایت‌های طرح ملی تعیین علوفه قابل برداشت مراعع کشور به طور خلاصه در جدول یک آورده شده است.

بین زمان گلدهی بطور متوسط در جوامع گیاهی از حدود ۴۰ روز بیشتر بوده است که ناشی از ترکیب گونه‌ای جوامع گیاهی در مقایسه با حساسیت‌شان به عملیات مدیریتی است. (Mahall *et al.*, 2010)، فنولوژی دو گونه *Styrax officinalis* (گونه همیشه‌سبز) را در سایت‌های کوچک بروندگی‌های سنگی در کالیفرنیای جنوبی در طی چند سال خشک، مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که طول عمر برگها در گونه *Styrax officinalis* به طور متوسط ۱۸۰ روز و در گونه *Arctostaphylos glauca* ۸۴۹ روز می‌باشد. پیری و زوال برگها در گونه *Styrax officinalis* اغلب در Auguest و September اتفاق می‌افتد که ظاهراً به وقوع خشکسالی ارتباطی نداشته است. در طی چند سال خشکسالی گونه *Styrax officinalis* کمتر تحت تأثیر تغییرات قرار گرفته است که نشان‌دهنده سازگاری بالا و استحکام الگوی رشد

جدول ۱ - ویژگی‌های سایت‌های مورد مطالعه

نام سایت	استان	موقعیت جغرافیایی	ارتفاع از سطح دریا (متر)	تیپ گیاهی	متodoسط بارندگی سالانه (mm)
ندوشن	یزد	N ۳۱° ۵۲' ۵۷" E ۵۳° ۳۲' ۰۳"	۲۳۲۰	<i>Artemisia sieberi</i>	۱۳۰
سه	اصفهان	N ۳۳° ۱۹" E ۵۱° ۲۲' ۱۸"	۱۹۸۸	<i>Artemisia sieberi-Stipa arabica</i>	۱۷۵
دهنو	کرمان	N ۲۹° ۵۶' ۰۰" E ۵۶° ۱۶' ۰۰"	۲۳۰۰	<i>Artemisia sieberi – Zygocephalum eurypterum</i>	۱۵۰
تیل آباد	گلستان	N ۳۶° ۵۳' ۳۸" E ۵۵° ۲۸' ۵۱"	۱۰۰۰	<i>Artemisia sieberi</i>	۲۶۸/۹
طبس	یزد	N ۳۳° ۴۴' ۳۱" E ۵۶° ۵۱' ۳۸"	۷۲۵	<i>Cymbopogon olivieri – Hammada salicornica – Cornulaca monacantha</i>	۸۴
سلفچگان	قم	N ۳۴° ۳۱' ۰۸" E ۵۰° ۲۳' ۴۶"	۱۰۰۰	<i>Stipa arabica-Artemisia sieberi</i>	۲۸۲/۵

- مرحله خشک شدن گیاه و خواب زمستانه

عامل‌های اقلیمی مورد مطالعه

اطلاعات اقلیمی شامل دما و بارندگی در طول دوره مطالعه و تحقیق از نزدیکترین ایستگاه‌های هواشناسی برای هر سایت جمع‌آوری شد. جدولهای ۲ و ۳ مقادیر دما و بارندگی ماهانه و سالانه دو سایت را به عنوان نمونه در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ نشان می‌دهد.

مطالعه مراحل فنولوژی

به منظور شناخت مراحل فنولوژیکی گونه *Artemisia sieberi* در مقاطع زمانی ۱۵ روزه در مرحله رویشی و ۷ روزه در مرحله زایشی در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ در شش سایت معرف اندازه‌گیری شد.

- آغاز و خاتمه مرحله رویشی

- آغاز و خاتمه مرحله گلدهی

- آغاز و خاتمه مرحله رسیدن بذر

- مرحله ریزش بذر

جدول ۲- مقایسه مقادیر دما و بارندگی در سالهای مورد مطالعه ایستگاه کلیماتولوژی سه ارتفاع از سطح دریا ۱۹۸۰ متر

سال	دما (°C)	بارندگی (mm)																
۱۲/۷۷	۱۹/۹	۲۴/۹	۲۶/۳	۲۴/۷۱	۱۵/۶۵	۱۱/۸	۵/۰۶	۰/۳۸	۰/۲۲	۴/۰۴	۶/۷۴	۱۳/۵۲	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱
۱۹۱/۳۴	۰	۰	۷/۲	۱۵	۲۷/۳	۲۴/۸	۳۴/۵	۱۶/۷	۱۱/۱۴	۳۱/۲	۱۷/۸	۶/۷	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱
۱۴/۵	۴/۲۲	۳/۲۴	۱/۲۷	۳/۲۵	۳/۱۷	۱۴/۹۸	۱۱/۸۹	۲/۵۳	-۴/۰۶	۲/۴	۹/۹۵	۱۴/۸۷	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱
۴۴/۶	۳/۷	۱	۰	۰	۱/۵	۱۴/۵	۰	۰	۹/۸	۷/۵	۱/۵	۵/۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱
۱۳/۶	۱۸/۵۲	۲۶/۹	۲۷/۳	۲۱/۳۲	۱۸/۳	۱۰/۷۲	۸/۷۹	۰/۲	۰/۸	۲/۵۴	۶/۸۳	۱۶/۰۴	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱
۱۵۵/۶	۰	۰	۰	۱۰/۶	۱۳/۸	۲۹/۶	۲۶	۱۳/۵	۱۴/۵	۷	۲۸/۸	۱۱/۸	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱

جدول ۳- مقایسه مقادیر دما و بارندگی در سالهای مورد مطالعه ایستگاه سینوپتیک طبس ارتفاع از سطح دریا ۷۱۱ متر

سال	عامل	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	میانگین
۲۲/۸	دما (°C)	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱
۷۹	بارندگی (mm)	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱
۲۲/۴	دما (°C)	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱
۵۹	بارندگی (mm)	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱
۲۳/۱	دما (°C)	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱
۸۰/۷	بارندگی (mm)	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۰/۸۱

خرداد خاتمه می‌یابد. مرحله گلدهی و ظهور غنچه در سایتها مطالعاتی متفاوت می‌باشد. در سایت تیل آباد این مرحله به خاطر خشکی و افزایش درجه حرارت هوا در اوایل خردادماه آغاز می‌شود. در سایت ندوشن نیز این مرحله در اواسط مردادماه آغاز می‌شود. در سایتها طبس و سلفچگان این مرحله در اواسط آبان و در سایت دهنو در مهرماه شروع می‌شود. این مرحله به طور متوسط در اوایل دی‌ماه خاتمه می‌یابد. سایت سه مانند سال ۱۳۸۶ به علت گرما و خشکی، گیاه وارد مرحله گلدهی نشد. مرحله فنولوژیکی بذردهی در سایتها طبس و سلفچگان در اوایل آذرماه شروع و تا اواخر دی‌ماه ادامه می‌یابد و بعد از این مرحله در اواخر دی‌ماه وارد مرحله رکود می‌شود.

ج- نتایج بدست‌آمده از بررسی مراحل فنولوژی گونه *Ar.sieberi* در سال ۱۳۸۸ (شکل یک) نشان می‌دهد که مرحله رویشی از اوایل اسفندماه شروع می‌شود. البته در سایت سلفچگان این مرحله از اوایل فروردین شروع شده است. این مرحله در سایت طبس حدوداً ۸ ماه به طول می‌انجامد که طولانی‌ترین مرحله رویشی را نسبت به بقیه سایتها نشان می‌دهد. به طور متوسط این مرحله در اواخر مهرماه خاتمه می‌یابد. مرحله گلدهی در سایتها تیل آباد و ندوشن زودتر از بقیه مناطق شروع شده است. این مرحله در اواسط خردادماه آغاز و در اواسط آبان به پایان می‌رسد. این مرحله در سایت سه از مرداد و تا اواخر شهریورماه به طول انجامید. این مرحله در سایت دهنو بسیار کوتاه بوده و حدود یکماه به طول انجامیده است. در سایت طبس و سلفچگان در آبان‌ماه شروع و در اواسط آذر به اتمام می‌رسد. در سایت ندوشن به دلیل خشکسالی شدید سال ۱۳۸۷ گونه *Ar. sieberi* به

نتایج

نتایج مراحل مختلف فنولوژی گونه *Ar.sieberi* در سالهای مختلف و در سایتها مختلف استپی مورد مطالعه عبارت است از:

الف- نتایج بدست‌آمده از مراحل فنولوژی گونه *Ar.sieberi* در سال ۱۳۸۶ در اکثر سایتها نشان داد که مرحله رویشی اوایل اسفندماه تا اواسط فروردین آغاز و تا اوایل تیرماه و حتی تا اواسط آبان ادامه می‌یابد. این مرحله تنها در سایت تیل آباد متفاوت بوده که از اوایل آذرماه شروع و تا اواسط خرداد ادامه داشته است. مرحله گلدهی در سال ۱۳۸۶ نیز در سایتها تیل آباد و ندوشن نسبت به سایر سایتها متفاوت بوده، این مرحله در خرداد شروع و تا اواسط آبان‌ماه پایان می‌یابد. مرحله گلدهی در سایتها سلفچگان، دهنو و طبس اوایل مهر تا اواسط آبان شروع و تا اواسط دی‌ماه به طول می‌انجامد. در سایت سه نیز این مرحله مشاهده نشد. مرحله بذردهی نیز اوایل آذر تا اواسط آذر شروع و تا اواخر دی‌ماه به طول می‌انجامد. در سایتها سه، ندوشن و تیل آباد این مرحله در سال ۱۳۸۶ به علت شدت گرما و خشکی رشد گیاه متوقف شده و وارد مرحله رکود رشد شده است. در سایتها سلفچگان، دهنو و طبس این مرحله از دی‌ماه شروع شده است.

ب- نتایج بدست‌آمده از بررسی فنولوژی گونه *Ar.sieberi* در سال ۱۳۸۷ نشان می‌دهد که مرحله رویشی در اوایل اسفندماه شروع می‌شود. شروع این مرحله در سایتها سه، سلفچگان و ندوشن به دلیل کاهش دما کمی به تأخیر می‌افتد و این دوره در فروردین‌ماه آغاز شده است. رشد رویشی این گونه تا اوایل آبان‌ماه ادامه می‌یابد و فقط در سایت تیل آباد این مرحله در اواخر

ساقه‌های سال قبل آغاز می‌شود. در این زمان خاک به سبب ریش بارانهای زمستانه دارای رطوبت کافی بوده و درجه حرارت محیط نیز مناسب رشد می‌باشد. درجه حرارت پایین مهمترین عامل محدودکننده رشد رویشی و افزایش ارتفاع این گونه در ابتدای فصل رویش محسوب می‌شود. بارندگی‌های دهه دوم اردیبهشت ماه و افزایش درجه حرارت باعث افزایش سرعت رشد و بیشترین رشد شده است. مرحله رشد رویشی با روند نسبتاً ثابت تا اوایل مردادماه ادامه می‌یابد. مرحله گلدهی به طور متوسط از اوایل تیرماه آغاز شده و تا اواخر آبان‌ماه ادامه می‌یابد. مرحله بذردهی به صورت تدریجی از اوایل مهرماه شروع و تا اواخر دی‌ماه به طول می‌انجامد. برپایه مطالعه و Ar. sieberi شناخت مراحل فنولوژیکی فوق، دوره فنولوژی گونه نسبتاً طولانی است. این موضوع نشانگر دامنه برداری و مقاومت این گونه نسبت به شرایط محیطی است. رشد رویشی این گونه براساس افزایش درجه حرارت سرعت می‌گیرد؛ به گونه‌ای که در صورت بروز بارندگی در ماههای اول رویش یعنی اردیبهشت‌ماه همراه با درجه حرارت در طی ده روز معادل ۵۰ روز رشد رویشی پیدا می‌کند. در مقابل کاهش بارندگی و رطوبت موجب توقف رشد رویشی می‌گردد. این نتیجه با نتایج Frank & Hofman, Menke & Trica, 1981؛ Smart et al., 1991؛ Bertiller et al., 1991؛ Frank, 1996؛ Frank et al., 1993؛ Bertiller et al., 1991؛ al., 2005؛ Thompson, 1990 و Keith, 2001 بررسی (Frank & Hofman, 1981؛ Menke & Trica, 1981؛ Smart et al., 1991؛ Bertiller et al., 1991؛ Frank, 1996؛ Frank et al., 1993؛ Bertiller et al., 1991؛ al., 2005؛ Thompson, 1990 و Keith, 2001) که بیان نموده‌اند از بین عوامل اقلیمی درجه حرارت بیشترین تأثیر را روی نمو گیاه در طول دوره رویش و مراحل فنولوژیکی گیاهان داشته، مطابقت دارد.

مقدار ناچیزی در نیمه دوم خردادماه به غنچه‌دهی رسید. گلدهی ناچیز در گونه Ar. sieberi از اثرات خشکسالی بر تغییرات فنولوژی در سال ۱۳۸۷ بوده است. در سال ۱۳۸۸ میزان بارندگی منطقه (۱۲۴ میلی‌متر) به متوسط درازمدت آن (۱۳۰ میلی‌متر) نزدیک شده است.

مرحله بذردهی در سایت سه در مهر شروع و در آبان‌ماه خاتمه می‌یابد. در سایتهاي سلفچگان و ندوشن این مرحله یکماه به طول می‌انجامد و بذرها سریع می‌رسند و در نهایت این گونه در آبان‌ماه وارد مرحله رکود و خشکشدن می‌شود. در سایت سه کاهش شدید رطوبت خاک در ابتدا و میانه فصل گرم (تابستان) باعث کاهش سرعت رشد و توقف ورود به مرحله زایشی شده است. به طورکلی به نظر می‌رسد کاهش شدید بارش سال ۱۳۸۷ و عدم بارش قابل توجه در طول زمستان سال ۱۳۸۸ باعث ضعف عمومی اکثر پایه‌های مورد بررسی شده است.

بحث

پوشش گیاهی مرتع از گونه‌های گیاهی مختلف تشکیل شده است. هر یک از گونه‌ها دارای مراحل فنولوژیکی متفاوتی می‌باشند. گونه Ar. sieberi اصلی‌ترین و فراوانترین گونه گیاهی با میدان وسیع اکولوژیک در عرصه‌های مرتعی مناطق مختلف استپی کشور به صورت درمنه‌زارهای خالص و یا گونه غالب در ترکیب تیپ‌های مرتعی حضور دارد.

نتایج بدست‌آمده از این بررسی نشان می‌دهد که مرحله شروع رشد رویشی گونه Ar. sieberi در سایتهاي مختلف رویشی بر پایه درجه حرارت و رطوبت خاک از اوایل اسفندماه تا اوایل فروردین از پایین

شکل ۱- مراحل مختلف فنولوژی گونه *Artemisia sieberi* در سال ۱۳۸۸

گونه *Ar.sieberi* به دلیل طی نمودن دوره کامل فنولوژی بدون صدمه دیدن از نظر چرا در زمان رشد رویشی، گلدهی، بذردهی و بذرریزی و شرایط مناسب زادآوری و توسعه و همچنین تولید نسبتاً بالا و مقاومت به خشکسالی در مدیریت مرتع به عنوان گونه کلید و اقتصادی توصیه می‌گردد.

بنابراین برپایه شناخت کامل از مراحل مختلف فنولوژی گونه *Ar.sieberi* می‌توان نسبت به برنامه‌ریزی جهت اعمال مدیریت صحیح سیستم‌های مناسب چرایی، تعیین زمان ورود و خروج دام، تعیین تعداد مطلوب دام برای چرا و تعیین زمان مناسب بذرگیری اقدام و بعارتی از سوی مدیران و برنامه‌ریزان و بهره‌برداران مرتع مورد کاربرد قرار گیرد.

منابع مورد استفاده

- احسانی، ع.، ۱۳۸۶. تعیین شاخص رویشگاهی به منظور برآورده تولید بلند مدت مرتع در مناطق استپی ایران، مطالعه موردی استان مرکزی. رساله دکتری مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ۳۰۱ صفحه.
- جعفری، م.، علی‌اکبرزاده، ا.، ارزانی، ح. و ملک پور، ب.، ۱۳۸۲. بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیکی گونه *Artemisia sieberi* در مرتع استان اردبیل. مجله محیط‌شناسی، ۳۲، ۱۳۸۲، ۶ صفحه.
- Ansquer, P., Al Haj Khaled, R., Cruz, P., Theau, J.P., Therond, O. and Duru, M., 2009. Characterizing and predicting plant phenology in species-rich grasslands. Grass and Forage Science, 64, 57–70.
- Bertiller, M.B., Beeskow, A.M. and Coronato, F., 1991. Seasonal environmental variation and plant phenology in arid Patagonia (Argentina). Journal of Arid Environments, 21: 1-11.
- Frank, A. and Hofmann, L., 1989. Relationship among grazing management, growing degree days and morphological development for native grasses on the northern Great Plains. Journal of range management, 42 (3).
- Frank, A., Sedivec, K. and Hofmann, L. 1993. Determination Grazing Reeding for native and Tame Pastures. www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/hay/r10.

گونه *Ar.sieberi* به علت دارا بودن ریشه‌های عمیق و استفاده از رطوبت خاک از توان بالاتری برای تحمل خشکسالی بخوردار بوده و به همین دلیل از نظر سپری نمودن مراحل فنولوژی اختلاف چندانی در سالهای مورد مطالعه وجود نداشته است. به عبارتی کمترین تغییرات فنولوژی را نسبت به خشکسالی نشان می‌دهد. البته این مطلب در خشکسالیهای بسیار شدید صدق نمی‌کند. گرچه این بررسی نشان داد که کاهش بارندگی سال قبل و کاهش بارندگی در فصل زمستان موجب ضعف عمومی پایه‌ها در فصل رویش شده است. در سایت ندوشن *Ar.sieberi* به دلیل خشکسالی شدید سال ۱۳۸۷ گونه *Ar.sieberi* توانسته بود به مقدار ناچیزی در نیمه دوم خرداد ماه به غنچه‌دهی برسد. گلدهی ناچیز ناشی از اثرهای خشکسالی و تغییرات تاریخ فنولوژی در سال ۱۳۸۷ بوده است. (Sekhwela & Yates, 2007) تاریخ‌های فنولوژیکی از نظر اقتصادی بسیار مهم است. هر تغییر در عامل‌های اقلیمی که تحت تأثیر این تاریخ‌ها است، ممکن است پیامدهای زیان‌آوری داشته باشد. خشکسالی نمونه خوب شناخته‌شده‌ای از یک تغییر مفرط است.

در نتیجه بهره‌برداری از مراحل فنولوژی گونه *Ar.sieberi* کمک می‌نماید که اعمال مدیریت بهره‌برداری پایدار از علوفه مرتع با تعیین زمان ورود و خروج دام موجب گردد تا گونه‌های گیاهی مورد تعلیف دام بدون صدمه دیدن از چرا، مراحل فنولوژیکی را طی نموده و در شرایط مناسب زادآوری و توسعه یابند. بدیهی است رعایت زمان ورود و خروج دام موجب توسعه پوشش گیاهی، ذخیره رطوبت خاک و پایداری تولید می‌گردد. این موضوع در مناطق خشک و نیمه‌خشک بسیار با اهمیت است.

- Ritchie, J.T. and NeSmith, D.S., 1991. Temperature and crop development in Modeling plant and Soil Systems, Eds. R.J. Hank and J.T. Ritchie. American Society of Agronomy, Madison, WI.
- Sekhwela, M.B.M. and Yates, D.J., 2007. A phenological study of dominant acacia tree species in areas with different rainfall regimes in the Kalahari of Botswana. Journal of Arid Environments, 70: 1–17.
- Smart, S.M., Bunce, R.G.H., Marrs, R., Le DucM, Firbank, L.G., Maskell, L.C., Scott, W.A., Thompson, K. and Walker, K.J., 2005. Large-scale changes in the abundance of common higher plant species across Britain between 1978, 1990 and 1998 as a consequence of human activity: tests of hypothesized changes in trait representation. Biological Conservation, 124: 355–371.
- Sparks, T.H., Jeffree, E.P. and Jeffree, C.E., 2000. An examination of the relationship between flowering times and temperature at the national scale using long-term phenological records from the UK. International Journal of Biometeorology, 44:82–87.
- Thompson, J.N., 1990. Coevolution and the evolutionary genetics of interactions among plants and insects and pathogens. pp 249-271 in: Pests, Pathogens, and Plant Communities, J.J. Burdon and S.R. Leather, eds. Oxford, Blackwell.
- Frank, A.B., 1991. Morphology, Cal development of crested and western wheat grass flowering grazing. Agronomy Journal, 38: 826-828.
- Frank, A.B., 1996. Evaluating Grass Development for Grazing Management. Rangelands. 18(3).
- Frank, A.B. and Hofmann, L., 1989. Relationship among Grazing Management, Growing Degree-days and Morphological Development for Native Grasses on the Northern Great Plains. Journal of Range Management, 42(3): 199-
- Humphreys, M.O. and Eagles, C.F., 1988. Assessment of perennial ryegrass (*Lolium perenne* L.) for breeding. I. Freezing tolerance, Euphytica, 38: 75-84.
- Keith, T.W., 2001. A method to incorporate phenology into land cover change analysis. Journal of Range Management, 54: A1-A7.
- Mahall, B.E., Thwing, L.K. and Tyler, C.M., 2010. A quantitative comparison of two extremes in chaparral shrub phenology. Flora, 205:513–526.
- Menke and Trlica., 1981. Carbohydrate Reserves, Phenology and Growth Cycles of Nine Colorado Range Species. Journal of Range Management, 34(3): 262-277.
- Pearce, R.S. and McDonald, I., 1978. The independent assessment of frost hardiness of excised laminae, excised roots and trimmed tillers of tall fescue (*Festuca arundinacea*). Journal of Applied Ecology, 15:885-895.

Comparison of phenology of *Artemisia sieberi* in different steppe regions of Iran

Ehsani, A.^{1*}

^{1*}- Corresponding Author, Assistant Professor, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran, Email: ehsani_arian@yahoo.com

Received: 06.04.2011

Accepted: 01.02.2012

Abstract

The objective of study on phenology of range plant species is to assess the changes of different phenology stages (germination, flowering, seed maturity stages, autumn growth and winter dormancy) in order to adjust range utilization programs, prevention of early or late grazing, recognition of nutritional value of the plant species, determining livestock entry and exit time and seed collection. *Artemisia sieberi* is a shrubby species with an appropriate forage value distributed as a dominant species in arid and semi arid steppe regions of Iran. It is resistant to drought and relative salinity which widely grows in loamy, sandy and loamy clay soils. In this study, phenological stages of *Artemisia sieberi* were investigated in six different sites of steppe regions of Iran. Accordingly, data of the phenological stages were recorded for vegetative and reproductive stages respectively in 15-day and 7-day intervals. With regard to the direct relationship between phenological stages and climatic factors especially temperature and precipitation, these data were taken from the nearest synoptic station for each site. According to the results, vegetative growth stage of *Artemisia sieberi* starts from early March early April and continues to July if moisture is available. The flowering stage starts from early July and continues to late October. Seed ripening stage gradually starts from early September to late January. The start of the winter dormancy is late January which continues to early February. Our results show a long-term phenology for *Artemisia sieberi* indicating its resistance to environmental conditions. Consequently, comprehensive recognition of phenological stages of *Artemisia sieberi* as a key species enables us to manage the grazing, adjust the entry and exit time for livestock, grazing intensity and appropriate grazing systems to be applied by range managers and utilizers.

Key words: Phenology, *Artemisia sieberi*, range readiness, steppe, livestock entry and exit time